

按病种收费技术规范（试行）

中国卫生经济学会
中国价格协会

二〇一七年五月

使用说明

一、《按病种收费技术规范（试行）》（以下简称《规范》），是在《全国医疗服务价格项目规范》（2012 年版）和国家卫生计生委办公厅印发的临床路径基础上研究制定的。本次发布的《规范》共推荐 320 个病种的“按病种收费技术规范表”。

二、本《规范》的病种是按照常见病种、诊断明确、技术成熟、并发症少，疗效确切、费用稳定的原则进行遴选，在疾病主诊断确定的情况下，结合治疗该疾病的主操作或治疗手段共同确定。《规范》根据事先确定的临床治疗方法，将诊疗全过程（包括在门诊按本次治疗方案设定的若干疗程或本次住院治疗全过程）设为一个服务包，以该服务包为单元制定收费标准和诊疗质量标准。

三、320 个病种的范围共涉及 17 个系统，包括：神经系统疾病 20 个；内分泌、营养及代谢疾病 11 个；眼和附器疾病 14 个；耳和乳突疾病 8 个；鼻咽喉疾病 6 个；口腔、颌面疾病 12 个；呼吸系统疾病 47 个；循环系统疾病 25 个；血液、造血器官、免疫系统疾病 10 个；消化系统疾病 66 个；肾脏和泌尿道疾病 14 个；男性生殖系统疾病 9 个；女性生殖系统疾病 22 个；妊娠、分娩和产褥期疾病 4 个；新生儿、孕期导致的婴儿疾病 1 个；肌肉骨骼系统和结缔组织疾病 38 个；皮肤、皮下组织疾病和烧伤疾病 13 个；其中包括 5 个社区治疗的病种。

四、《规范》中所列疾病名称原则上与国家标准化管理委员会于 2016 年 10 月 13 日发布的《疾病分类与代码（GB/T 14396-2016）》

疾病名称保持一致；所列操作名称和编码为国家发展改革委、原卫生部和国家中医药管理局联合印发的《全国医疗服务价格项目规范》(2012 年版)中的项目名称和编码（Chinese Classification of Health Interventions, CCHI）。

五、“按病种收费技术规范表”包括：病种编码、主要诊断、主要操作/主要治疗方式、入院标准、出院标准、最短住院日、变异条件、再入院间隔时间、基本项目和选择项目十个内容。

1. 病种编码：由字母和数字五位混合码组成。病种编码赋值含义见下表。

码位	第 1 位	第 2 位	第 3 位	第 4-5 位
要素	系统	治疗方式	有无合并症	顺序码
编码赋值	A-Q	M, S	0, 1	01-99
赋值含义		M-非手术；S-手术	0-无；1-有	

例：病种名称：结节性甲状腺肿

主要诊断：结节性甲状腺肿 主操作：甲状腺全切术

病种编码：BS001

码位	第 1 位	第 2 位	第 3 位	第 4-5 位
要素	系统	治疗方式	有无合并症	顺序码
要素内容	内分泌	手术	无	第 1 位
编码赋值	B	S	0	01

2. 主要诊断：指患者本次入院主要治疗的疾病名称，是对身体健康危害最大、花费医疗资源最多、住院时间最长的疾病诊断。编码采

用国家标准化管理委员会于 2016 年 10 月 13 日发布的《疾病分类与代码（GB/T 14396-2016）》。

3. 主要操作/主要治疗方式：指在本次住院诊疗中，针对“主要诊断”采取的主要治疗手段（如采取的主要手术方式、介入治疗方式或药物治疗等），部分内科治疗的病种其“主要操作/主要治疗方式”为空。

4. 入院标准：指患者本次住院诊疗过程中的主要疾病及治疗方式符合某病种的入院指征。同国家卫生计生委发布的临床路径确定的标准。

5. 出院标准：通过本“病种收费技术规范表”所列的诊治过程，使患者病情达到好转或治愈的标准。同国家卫生计生委发布的临床路径确定的标准。

6. 最短住院日：指本次入院治疗所需的最短住院日。

7. 变异条件：指本次诊疗过程中，使患者的病情发生变化，或由于病情及个体差异改变了预期治疗方式的因素。同国家卫生计生委发布的临床路径确定的标准。

8. 再入院间隔时间：指患者治疗出院后，因同一疾病再次入院应间隔的最短时间。

9. 基本项目：指执行该病种收费技术规范表时，必须向患者提供的基本医疗服务项目，包括各种护理、检查、治疗及用药等服务内容。

10. 选择项目：指执行该病种收费技术规范表时，根据患者病情或个体差异所选择提供的医疗服务项目，包括各种检查、治疗及用药等服务内容。

六、“按病种收费技术规范表” 框架设置

1. 手术治疗病种框架：根据不同的治疗方式，分为术前（治疗前）、术中（治疗中）和术后（治疗后）三个部分。

(1) 术前（治疗前）：指执行手术（或主要治疗方式）日前所接受的所有诊疗项目。

(2) 术中（治疗中）：指执行手术（或主要治疗方式）当日所接受的所有诊疗项目。

(3) 术后（治疗后）：指执行手术（或主要治疗方式）日后所接受的所有诊疗项目。

2. 非手术治疗病种框架：分为检查、治疗和药物三个部分，是以药物治疗方案为主所提供的所有诊疗项目。

目 录

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式

一、神经系统疾病

AM001	短暂性脑缺血发作	
AM002	脑出血	
AM003	吉兰-巴雷综合征	
AM004	多发性硬化	
AM005	癫痫	
AM006	重症肌无力	
AM007	脑梗死	
AM008	全面惊厥性癫痫持续状态（GCSE）	
AM009	肌萎缩侧索硬化（ALS）	
AM010	急性横贯性脊髓炎或可能急性横贯性脊髓炎	
AM011	视神经脊髓炎	
AM012	亚急性脊髓联合变性	
AM013	新型隐球菌脑膜炎	
AS001	三叉神经痛	显微镜下三叉神经根血管减压术
AS002	慢性硬脑膜下血肿	慢性硬脑膜下血肿钻孔术
AS003	小脑扁桃体下疝畸形	显微镜下寰枕畸形减压术
AS004	颅前窝底脑膜瘤	经鼻内镜前颅底肿瘤切除术

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
AS005	颅前窝底脑膜瘤	显微镜下大静脉矢状窦脑膜瘤切除血管 窦旁重建术
AS006	颅后窝脑膜瘤	颅底肿物切除术
AS007	颅后窝脑膜瘤	显微镜下大静脉窦汇区脑膜瘤切除血管 窦重建术

二、内分泌、营养及代谢疾病

BM009	1型糖尿病	血糖调整
BM010	1型糖尿病	社区诊治管理
BM011	2型糖尿病	社区诊治管理
BS001	结节性甲状腺肿	甲状腺全切术
BS002	结节性甲状腺肿	甲状腺次全切除术
BS003	结节性甲状腺肿	甲状腺部分切除术
BS004	甲状腺癌	甲状腺癌根治术
BS005	甲状腺癌	甲状腺癌扩大根治术
BS006	甲状腺良性肿瘤	甲状腺部分切除术
BS007	甲状腺良性肿瘤	甲状腺次全切除术
BS008	甲状腺肿瘤	甲状腺腺瘤摘除术

三、眼和附器疾病

CM001	巨细胞病毒视网膜炎	
CS001	原发性急性闭角型青光眼	小梁切除术
CS002	老年性白内障	白内障超声乳化摘除术
CS003	老年性白内障	白内障超声乳化吸除+人工晶状体植入 术

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
CS004	老年性白内障	小瞳孔白内障超声乳化吸除+人工晶状体植入术
CS005	上睑下垂	上睑提肌缩短上睑下垂矫正术
CS006	上睑下垂	额肌筋膜瓣悬吊上睑下垂矫正术
CS007	上睑下垂	额筋膜悬吊上睑下垂矫正术
CS008	单纯性孔源性视网膜脱离	巩膜环扎术
CS009	单纯性孔源性视网膜脱离	巩膜外加压术
CS010	翼状胬肉	翼状胬肉切除组织移植术
CS011	难治性青光眼	睫状体冷冻术
CS012	难治性青光眼	外路经巩膜激光睫状体光凝术
CS013	慢性泪囊炎	鼻内镜鼻腔泪囊吻合术

四、耳和乳突疾病

DS001	分泌性中耳炎	鼓膜置管术
DS002	慢性化脓性中耳炎	I型鼓室成形术
DS003	慢性化脓性中耳炎	经耳内镜I型鼓室成形术
DS004	慢性化脓性中耳炎	II型鼓室成形术
DS005	慢性化脓性中耳炎	III型鼓室成形术
DS006	慢性化脓性中耳炎	IV型鼓室成形术
DS007	慢性化脓性中耳炎	V型鼓室成形术
DS008	慢性化脓性中耳炎	外耳道鼓室成形术

五、鼻咽喉疾病

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
ES001	慢性扁桃体炎	扁桃体切除术
ES002	鼻中隔偏曲	经鼻内镜鼻中隔偏曲矫正术
ES003	声带息肉	经支撑喉镜激光辅助声带肿物切除术
ES004	慢性鼻窦炎	经鼻内镜全组鼻窦开放术
ES005	喉癌	喉全切除术
ES006	喉癌	喉次全切除术

六、口腔、颌面疾病

FS001	腮腺多形性腺瘤	腮腺浅叶肿物切除术
FS002	腮腺多形性腺瘤	腮腺部分切除术
FS003	唇裂	单侧唇皮下裂修复术
FS004	唇裂	唇正中裂修复术
FS005	腭裂	I 度腭裂修复术
FS006	腭裂	II 度腭裂修复术
FS007	乳牙中龋	牙体缺损充填术
FS008	舌癌	舌恶性肿物扩大切除术
FS009	下颌骨骨折	口内入路下颌骨骨折切开复位内固定术
FS010	下颌前突畸形	下颌升支矢状劈开截骨术
FS011	甲状舌管囊肿	甲状舌管囊肿切除术
FS012	鳃源性囊肿	鳃裂囊肿切除术

七、呼吸系统疾病

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
GM001	非小细胞肺癌	术后辅助化疗
GM002	原发性肺癌	术前新辅助治疗
GM003	原发性肺癌	术后辅助治疗
GM004	原发性肺癌	姑息治疗
GM005	肺血栓栓塞症	
GM006	社区获得性肺炎	
GM007	慢性阻塞性肺疾病急性加重期	
GM008	支气管哮喘发作	
GM009	初治菌阳肺结核	
GM010	原发性肺脓肿	
GM011	结核性胸膜炎	
GM012	支原体肺炎	
GS001	支气管肺癌	全肺切除术
GS002	支气管肺癌	肺段切除术
GS003	支气管肺癌	经胸腔镜肺段切除术
GS004	支气管肺癌	肺叶切除术
GS005	支气管肺癌	经胸腔镜肺叶切除术
GS006	肋骨骨折合并血气胸	经肋间胸腔闭式引流术
GS007	肋骨骨折合并血气胸	经肋床胸腔闭式引流术
GS008	非侵袭性胸腺瘤	胸腺切除术

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
GS009	非侵袭性胸腺瘤	经胸腔镜胸腺切除术
GS010	肺良性肿瘤	肺楔形切除术
GS011	肺良性肿瘤	经胸腔镜肺楔形切除术
GS012	肺良性肿瘤	肺叶切除术
GS013	肺良性肿瘤	经胸腔镜肺叶切除术
GS014	肺良性肿瘤	肺段切除术
GS015	肺良性肿瘤	经胸腔镜肺段切除术
GS016	支气管扩张	肺叶切除术
GS017	支气管扩张	右侧双肺叶切除术
GS018	支气管扩张	胸膜肺叶切除术
GS019	支气管扩张	经胸腔镜肺叶切除术
GS020	支气管扩张	肺段切除术
GS021	支气管扩张	经胸腔镜肺段切除术
GS022	支气管扩张	全肺切除术
GS023	自发性气胸	肺大泡切除修补术
GS024	自发性气胸	经胸腔镜肺大泡切除胸膜固定术
GS025	自发性气胸	胸膜固定术
GS026	自发性气胸	经胸腔镜胸膜固定术
GS027	纵隔恶性肿瘤	前纵隔肿物切除术
GS028	纵隔恶性肿瘤	后纵隔肿物切除术

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
GS029	纵膈良性肿瘤(包括纵膈囊肿)	前纵隔肿物切除术
GS030	纵膈良性肿瘤(包括纵膈囊肿)	后纵隔肿物切除术
GS031	原发性支气管肺癌	肺叶切除术
GS032	原发性支气管肺癌	全肺切除术
GS033	原发性支气管肺癌	袖状肺叶切除术
GS034	原发性支气管肺癌	肺楔形切除术
GS035	漏斗胸	经胸腔镜小儿漏斗胸胸骨抬举内固定术 (NUSS手术)

八、循环系统疾病

HM001	急性左心功能衰竭	
HM002	原发性高血压（低、中危）	社区诊治管理
HM003	原发性高血压（高危）	社区诊治管理
HM004	高血压+2型糖尿病	社区诊治管理
HS001	动脉导管未闭	经皮穿刺动脉导管未闭封堵术
HS002	房间隔缺损	房间隔缺损缝合术
HS003	房间隔缺损	房间隔缺损补片修补术
HS004	室间隔缺损	室间隔缺损缝合术
HS005	室间隔缺损	室间隔缺损补片修补术
HS006	风湿性心脏病二尖瓣病变	二尖瓣置换术
HS007	法洛四联症	法洛氏四联症根治术-不切右室
HS008	法洛四联症	法洛氏四联症非跨环补片根治术-切右室

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
HS009	法洛四联症	法洛氏四联症跨环补片根治术-切右室
HS010	升主动脉瘤	升主动脉瘤切除升主动脉替换术
HS011	主动脉瓣病变	主动脉瓣置换术
HS012	不稳定性心绞痛	经皮冠状动脉支架置入术
HS013	慢性稳定性心绞痛	经皮冠状动脉支架置入术
HS014	急性非ST段抬高性心肌梗死	经皮冠状动脉支架置入术
HS015	急性ST段抬高心肌梗死	经皮冠状动脉支架置入术
HS016	病态窦房结综合征	单腔永久起搏器安置术
HS017	病态窦房结综合征	双腔永久起搏器安置术
HS018	阵发性室上性心动过速	普通室上性心动过速射频消融术
HS019	非阵发性室性心动过速	室速射频消融术
HS020	非阵发性室性心动过速	埋藏式单腔心脏复律除颤器安置术
HS021	非阵发性室性心动过速	埋藏式双腔心脏复律除颤器安置术

九、血液、造血器官、免疫系统疾病

IM001	儿童急性早幼粒细胞白血病（APL） -初治患者
IM002	儿童急性早幼粒细胞白血病（APL） -诱导达完全缓解（CR）的患者
IM003	儿童急性淋巴细胞白血病（ALL）- 初治患者
IM004	儿童急性淋巴细胞白血病（ALL）- 诱导达完全缓解（CR）的患者
IM005	慢性淋巴细胞白血病-初治CLL成人 患者

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
IM006	慢性髓细胞白血病（CML）—初治 CML成人患者	
IM007	自身免疫性溶血性贫血-初治AIHA成 人患者	
IM008	特发性血小板减少性紫癜-初治ITP 成人患者	
IM009	成人急性早幼粒细胞白血病-初治 （APL）患者	
IM010	成人急性早幼粒细胞白血病（APL） -诱导达完全缓解（CR）的患者	

十、消化系统疾病

JM001	结肠癌	术后辅助治疗
JM002	结肠癌	姑息治疗
JM003	直肠癌	术前新辅助治疗
JM004	直肠癌	术后辅助治疗
JM005	直肠癌	姑息治疗
JM006	食管鳞癌	术前新辅助治疗
JM007	食管鳞癌	术后辅助治疗
JM008	食管鳞癌	姑息治疗
JM009	轻症急性胰腺炎	
JM010	胃十二指肠溃疡	
JM011	反流食管炎	
JM012	轮状病毒肠炎	
JM013	胃癌	术前新辅助治疗

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
JM014	胃癌	术后辅助治疗
JM015	胃癌	姑息治疗
JS001	胃癌	胃部分切除术
JS002	胃癌	根治性近端胃大部切除术
JS003	胃癌	根治性远端胃大部切除术
JS004	胃癌	扩大根治性近端胃大部切除术
JS005	胃癌	扩大根治性远端胃大部切除术
JS006	胃癌	根治性全胃切除术
JS007	胃十二指肠溃疡	远端胃大部切除术
JS008	胃十二指肠溃疡	经腹腔镜远端胃大部切除术
JS009	胃十二指肠溃疡	胃迷走神经干切断术
JS010	胃十二指肠溃疡	经腹腔镜胃迷走神经干切断术
JS011	急性单纯性阑尾炎	阑尾切除术
JS012	急性单纯性阑尾炎	经腹腔镜阑尾切除术
JS013	直肠息肉	经内镜直肠良性肿物切除术
JS014	腹股沟疝	腹股沟疝修补术
JS015	下肢静脉曲张	大隐静脉高位结扎+剥脱术
JS016	下肢静脉曲张	大隐静脉腔内激光闭合术
JS017	原发性甲状腺功能亢进	甲状腺次全切除术
JS018	胆管结石（无胆管炎或胆囊炎）	胆总管探查T管引流术

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
JS019	胆管结石（无胆管炎或胆囊炎）	胆总管切开取石+空肠Roux-y吻合术
JS020	胆管结石（无胆管炎或胆囊炎）	经腹腔镜胆管异物取出术
JS021	先天性胆管扩张症（胆总管囊肿）	先天性胆总管囊肿切除肝门空肠Roux-y成形术
JS022	腹股沟疝	无张力腹股沟疝修补术
JS023	血栓性外痔	血栓性外痔切除术
JS024	小肠间质瘤	肠切除肠吻合术
JS125	慢性胆囊炎或合并胆囊结石	经腹腔镜胆囊切除术
JS026	肛裂	肛裂切除术
JS027	食管癌	食管癌切除胃代食管胸内吻合术
JS028	食管癌	经胸腔镜食管癌切除术
JS029	贲门失弛缓症	经胸腔镜食管下段贲门肌层切开术
JS030	胃食管反流病	胃底折叠术
JS031	结肠癌	根治性结肠癌切除术
JS032	结肠癌	扩大根治性结肠癌切除术
JS033	结肠癌	经腹腔镜结肠癌根治术
JS034	食管平滑肌瘤	食管良性肿物切除术
JS035	胰腺癌	胰十二指肠切除术(Whipple手术)
JS036	胰腺癌	胰体尾切除术
JS037	直肠癌	超低位直肠癌根治术
JS038	直肠癌	经腹腔镜超低位直肠癌根治术

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
JS039	直肠癌	经腹会阴直肠癌根治术(Miles手术)
JS040	直肠癌	经腹腔镜会阴直肠癌根治术(Miles手术)
JS041	先天性巨结肠	经腹先天性巨结肠根治术
JS042	先天性巨结肠	经腹腔镜先天性巨结肠切除术
JS043	先天性幽门肥厚性狭窄	幽门环肌切开术
JS044	先天性幽门肥厚性狭窄	经腹腔镜幽门环肌切开术
JS045	急性肠套叠	肠扭转肠套叠复位术
JS046	急性化脓性阑尾炎	阑尾切除术
JS047	胆总管结石	经电子内镜胆管机械碎石取石术
JS048	胆总管结石	经电子内镜胆管结石激光碎石取石术
JS049	肝硬化腹水	经腹盆腹腔液性包块穿刺引流术
JS050	大肠息肉	经电子内镜结肠息肉激光切除术
JS051	大肠息肉	经电子内镜结肠息肉微波切除术

十一、肾脏和泌尿道疾病

KS001	肾癌	根治性肾切除术
KS002	肾癌	经腹腔镜根治性肾切除术
KS003	膀胱肿瘤	膀胱部分切除术
KS004	膀胱肿瘤	经腹腔镜膀胱部分切除术
KS005	膀胱肿瘤	经尿道膀胱肿瘤电切治疗
KS006	输尿管结石	经尿道输尿管镜超声碎石取石术

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
KS007	输尿管结石	经尿道输尿管镜激光碎石取石术
KS008	输尿管结石	经尿道输尿管镜气压弹道碎石取石术
KS009	输尿管癌	经腹腔镜肾部分切除术
KS010	尿道下裂	尿道下裂阴茎下弯矫治术
KS011	尿道下裂	尿道下裂Ⅰ期成形术
KS012	尿道下裂	尿道下裂Ⅱ期成形术
KS013	终末期肾脏病	自体动静脉内瘘成形术
KS014	终末期肾脏病	血液透析

十二、男性生殖系统疾病

LS001	良性前列腺增生	经尿道膀胱镜前列腺电切术
LS002	良性前列腺增生	经尿道前列腺激光气化切除术
LS003	肾结石	经皮肾镜超声碎石取石术
LS004	精索静脉曲张	精索静脉曲张高位结扎术
LS005	精索静脉曲张	经腹腔镜精索静脉曲张高位结扎术
LS006	睾丸鞘膜积液	睾丸鞘膜翻转术
LS007	隐睾（睾丸可触及）	隐睾下降固定术
LS008	隐睾（睾丸可触及）	经腹腔镜隐睾下降固定术
LS009	前列腺癌	保留神经前列腺癌根治术

十三、女性生殖系统疾病

MS001	子宫腺肌病	经腹子宫腺肌病灶切除术

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
MS002	子宫腺肌病	经腹腔镜子宫腺肌病灶切除术
MS003	卵巢良性肿瘤	经腹单侧卵巢囊肿剥除术
MS004	卵巢良性肿瘤	经腹腔镜单侧卵巢囊肿剥除术
MS005	卵巢良性肿瘤	经腹单侧卵巢切除术
MS006	卵巢良性肿瘤	经腹腔镜单侧卵巢切除术
MS007	输卵管妊娠	经腹单侧输卵管切除术
MS008	输卵管妊娠	经腹腔镜单侧输卵管切除术
MS009	输卵管妊娠	经腹单侧输卵管开窗术
MS010	输卵管妊娠	经腹腔镜单侧输卵管开窗术
MS011	子宫平滑肌瘤	经腹全子宫切除术
MS012	子宫平滑肌瘤	经腹腔镜全子宫切除术
MS013	子宫平滑肌瘤	经阴道全子宫切除术
MS014	子宫平滑肌瘤	经腹子宫次全切除术
MS015	子宫平滑肌瘤	腹腔镜联合阴式全子宫切除术
MS016	子宫平滑肌瘤	经宫腔镜黏膜下肌瘤切除术
MS017	宫颈癌	经腹腔镜全子宫切除术
MS018	宫颈癌	腹腔镜联合阴式全子宫切除术
MS019	宫颈癌	经腹膜外盆腔淋巴结切除术
MS020	宫颈癌	经腹全子宫切除术
MS021	宫颈癌	经腹广泛性子宫切除术

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
MS022	宫颈癌	经腹腔镜广泛子宫切除术

十四、妊娠、分娩和产褥期疾病

NS001	自然临产阴道分娩	单胎顺产接生
NS002	计划性剖宫产	子宫下段剖宫产术
NS003	产钳助产分娩	产钳助产术
NS004	胎膜早破（足月）行阴道分娩	单胎顺产接生

十五、新生儿、孕期导致的婴儿疾病

OM001	母婴ABO血型不合溶血病

十六、肌肉骨骼系统和结缔组织疾病

PS001	腰椎间盘突出症	腰椎间盘突出术
PS002	腰椎间盘突出症	经椎间盘镜髓核摘除术(MED)
PS003	腰椎间盘突出症	前路腰椎间盘突出人工椎间盘置换术
PS004	股骨颈骨折	全髋人工关节置换术
PS005	股骨颈骨折	人工股骨头置换术
PS006	胫骨平台骨折	胫骨骨折切开复位内固定术
PS007	踝关节骨折	踝关节骨折切开复位内固定术
PS008	股骨干骨折	股骨干骨折切开复位内固定术
PS009	股骨干骨折	股骨干骨折闭合复位髓内针内固定术
PS010	闭合性髌骨骨折	髌骨骨折闭合复位内固定术
PS011	闭合性髌骨骨折	髌骨骨折切开复位内固定术

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
PS012	闭合性尺骨鹰嘴骨折	尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术
PS013	闭合性尺骨鹰嘴骨折	尺骨鹰嘴骨折闭合复位内固定术
PS014	闭合性尺桡骨干骨折	尺骨干骨折闭合复位钢板螺丝钉内固定术
PS015	闭合性尺桡骨干骨折	桡骨干骨折切开复位钢板螺丝钉内固定术
PS016	闭合性尺桡骨干骨折	尺骨干骨折切开复位髓内针内固定术
PS017	闭合性尺桡骨干骨折	桡骨干骨折切开复位髓内针内固定术
PS018	闭合性肱骨干骨折	肱骨干骨折切开复位钢板螺丝钉内固定术
PS019	胫腓骨干骨折	胫骨骨折闭合复位钢板螺丝钉内固定术
PS020	胫腓骨干骨折	胫骨骨折闭合复位髓内针内固定术
PS021	胫腓骨干骨折	胫骨骨折切开复位髓内针内固定术
PS022	胫腓骨干骨折	胫骨骨折切开复位内固定术
PS023	胫腓骨干骨折	腓骨骨折闭合复位钢板螺丝钉内固定术
PS024	胫腓骨干骨折	腓骨骨折切开复位髓内针内固定术
PS025	闭合性胫骨平台骨折	胫骨平台骨折切开复位钢板螺丝钉内固定术
PS026	闭合性胫骨平台骨折	胫骨平台骨折闭合复位内固定术
PS027	发育性髋脱位	先天性髋关节脱位切开复位骨盆股骨截骨内固定术
PS028	股骨干骨折	股骨干骨折闭合复位外固定架固定术
PS029	股骨干骨折	股骨干骨折切开复位外固定架固定术
PS030	股骨干骨折	股骨干骨折闭合复位钢板螺丝钉内固定术
PS031	髋关节骨关节炎	全髋人工关节置换术

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
PS032	膝关节骨关节炎	关节镜下膝关节清理术
PS033	膝内翻畸形	胫骨高位外侧截骨术
PS034	膝内翻畸形	胫骨高位内侧截骨术
PS035	先天性肌性斜颈	肌肉松解术
PS036	重度膝关节骨关节炎	全膝人工关节置换术
PS037	颈椎病	前路颈椎间盘切除椎间植骨融合内固定术
PS038	股骨头坏死（FicatIII-IV期，严重疼痛伴功能障碍）	全髋人工关节置换术

十七、皮肤、皮下组织、乳腺疾病和烧伤

QM007	乳腺癌	术前新辅助治疗
QM008	乳腺癌	术后辅助治疗
QM009	乳腺癌	姑息治疗
QM010	带状疱疹（不伴有并发症）	
QM011	皮炎/多发性肌炎	
QM012	寻常型天疱疮	
QM013	重症多形红斑/中毒性表皮坏死松解型药疹	
QS001	急性乳腺炎	乳房浅表脓肿切开引流术
QS002	急性乳腺炎	乳房深部脓肿切开引流术
QS003	乳腺良性肿瘤	乳腺肿物切除术
QS004	乳腺癌	乳腺肿物切除术
QS005	乳腺癌	乳腺癌根治术(Halsted)
QS006	乳腺癌	乳腺癌改良根治术

一、神经系统疾病

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
AM001	短暂性脑缺血发作	
AM002	脑出血	
AM003	吉兰-巴雷综合征	
AM004	多发性硬化	
AM005	癫痫	
AM006	重症肌无力	
AM007	脑梗死	
AM008	全面惊厥性癫痫持续状态（GCSE）	
AM009	肌萎缩侧索硬化（ALS）	
AM010	急性横贯性脊髓炎或可能急性横贯性脊髓炎	
AM011	视神经脊髓炎	
AM012	亚急性脊髓联合变性	
AM013	新型隐球菌脑膜炎	
AS001	三叉神经痛	显微镜下三叉神经根血管减压术
AS002	慢性硬脑膜下血肿	慢性硬脑膜下血肿钻孔术
AS003	小脑扁桃体下疝畸形	显微镜下寰枕畸形减压术
AS004	颅前窝底脑膜瘤	经鼻内镜前颅底肿瘤切除术
AS005	颅前窝底脑膜瘤	显微镜下大静脉矢状窦脑膜瘤切除血管窦旁重建术
AS006	颅后窝脑膜瘤	颅底肿物切除术

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
AS007	颅后窝脑膜瘤	显微镜下大静脉窦汇区脑膜瘤切除血管窦重建术

短暂性脑缺血发作

适用对象：	病种编码：	AM001	
	主要诊断：	短暂性脑缺血发作	ICD-10码：G45.0, G45.1
	主要操作/主要治疗方式：		CCHI码：
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合短暂性脑缺血发作：椎基底动脉综合征（ICD-10：G45.0, G45.1），颈动脉综合征（大脑半球）（ICD-10：G45.100）疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。 3. 如有复杂病因诊断，在治疗后如需处理或诊断，应可出路径。	
	出院标准：	1. 患者病情稳定。 2. 没有需要住院治疗的并发症。	
	最短住院日参考值：	7-14天	
	变异条件：	1. 辅助检查异常，需要复查和明确异常原因，导致住院治疗时间延长和住院费用增加。 2. 住院期间病情加重，出现并发症，需要进一步诊治，导致住院治疗时间延长和住院费用增加。 3. 既往合并有其他系统疾病，短暂性脑缺血发作可能导致合并疾病加重而需要治疗，从而延长治疗时间和增加住院费用。 4. 短暂性脑缺血发作病因明确，反复发作并且有手术指征者转外科或介入科进一步治疗，转入相应治疗路径。 5. 若住院期间转为脑梗塞者转入脑梗塞临床路径。	
	再入院间隔时间：	一般不存在需一定的时间再次住院的问题	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		治疗		药物	
I 级护理	ACAC0001			抗血小板药物或抗凝药物	
II 级护理	ACAB0001			脑细胞代谢剂	
III级护理	ACAA0001			他汀类降血脂药	
检查				活血养血药	
血常规	全血细胞计数+3分群检测 CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测				
尿常规化学分析	CCAA2000				
粪便常规检查	CCCA3000				
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000或肌酐 (Cr)测定 CEEB8000或尿酸 (UA)测定 CEEF8000				
葡萄糖 (Glu)测定	CEFA8000				
血脂四项	甘油三酯(TG)测定 CEHB1000 和总胆固醇(TC) 测定CEHA1000 和高密度脂蛋白 胆固醇(HDL-C)测定 CEHC1000 和低密度脂蛋白 胆固醇(LDL-C)测定 CEHD1000				
电解质测定	钾(K)测定 CEJA8000和钠 (Na)测定 CEJB8000和氯 (Cl)测定 CEJC8000和总二 氧化碳(TCO ₂)测定 CEJD1000和镁 (Mg)测定 CEJE8000和总钙 测定CEJF8000				
肝功能检查	丙氨酸氨基转移 酶(ALT)测定 CECA1000和天门 冬氨酸氨基转移 酶(AST)测定 CECB1000和总胆 红素(T-Bil)测定 CELA1000和直接 胆红素(D-Bil)测定 CELB1000和γ- 谷氨酰基转移酶 (GGT)测定 CECC8000和总蛋 白(TP)测定 CEAA8000和白蛋 白(A1b)测定 CEAF8000和碱性				
C-反应蛋白 (CRP)测定	CGCA1000				
抗核抗体 (ANA)测定	CGDB1000				
类风湿因子 (RF)测定	CGFG1000				
乙型肝炎表面抗原(抗 HBs)测定	乙型肝炎表面抗 原定性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙 型肝炎表面抗原 定量(HBsAg)测定 CGLH1000				
丙型肝炎抗体(抗HCV) 测定	CGMA1000				
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体 抗体(抗TP) 测定	CGPP1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001				
头颅非增强磁共振动脉血管成像	ECABJ001				
头部磁共振增强成像	ECBBP001				
颈动脉彩色多普勒超声检查	EDCLF001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701 或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图				
血管超声造影	EDCM9001				
TCD	经颅彩色多普勒超声EDCBH002或经颅多普勒超声检查EDDBJ001				
Holter动态心电图	三通道动态心电图检查FKA03704或十二通道动态心电图检查FKA03705				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		治疗		药物	
同型半胱氨酸(Hcy)测定	CEEG1000			维生素类药	
血浆蛋白C活性(PC)测定	CAJG1000			抗凝药物	
血浆蛋白S测定(PS)	血浆蛋白S含量(PS:Ag)测定CAJK1000或血浆蛋白S活性(PS:A)测定CAIL1000				
ENA抗体谱六项测定	CGDC1000				
抗心磷脂抗体(ACA)测定	CGEL1000				
临床操作数字减影(DSA)引导	EAZZZ003				
临床操作X线透视引导	EAZZZ001				
临床操作C/U形臂引导	EAZZZ002				
头部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBBP001				
头颅非增强磁共振静脉血管成像	ECABM001				
头颅动脉磁共振血管增强成像	ECBBJ001				
普通二维超声心动图	EDFKA005				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
心脏彩色多普勒超声	EDFKA007				
胸部X线摄影	EABJT001				
经颅彩色多	EDCBH002				
颅脑磁共振	ECABA001				
经颅多普勒超声发泡试验	EDCBJ001				
经颅多普勒超声动脉栓子监测	EDCBJ005				
甲状腺功能检查	甲状腺摄碘试验 EEGDC001或甲状腺激素抑制试验 EEGDC002				
预防神经管畸形药 (FA) 测定	CEMA1000				

脑出血

适用对象：	病种编码：	AM002	
	主要诊断：	脑出血	ICD-10码：I61.0-I61.9
	主要操作/主要治疗方式：		CCHI码：
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10:I61.0-I61.9脑出血疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。 3. 如有其它疾病需要进一步诊断，可出路径。		
出院标准：	1. 患者病情稳定。 2. 没有需要住院治疗的并发症。		
最短住院日参考值：	7-14天		
变异条件：	1. 脑出血病情危重者如呼吸、循环功能不全，多脏器功能不全等需转入ICU，转入相应路径。 2. 辅助检查结果异常，需要复查，导致住院时间延长和住院费用增加。 3. 住院期间病情加重，出现并发症，需要进一步诊治，导致住院时间延长和住院费用增加。 4. 既往合并有其他系统疾病，脑出血可能导致既往疾病加重而需要治疗，导致住院时间延长和住院费用增加。		
再入院间隔时间：	一般不存在需一定的时间再次住院的问题		

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		治疗		药物	
I 级护理	ACAC0001			纠正水、电解质紊乱药物	
II 级护理	ACAB0001			脱水降颅压药物	
III级护理	ACAA0001			降血压药物	
检查				中成药治疗	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000				
尿常规化学分析	CCAA2000				
粪便常规检查	CCCA3000				
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000				
肌酸激酶(CK)测定	CECS1000				
肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定	CECT1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
谷氨酸脱氢酶 (GDH) 测定	CECP1000				
乳酸脱氢酶 (LD) 测定	CECW1000				
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000或肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000或尿酸 (UA) 测定 CEEE8000				
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000				
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测定 CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测定 CEJE8000和总钙 (Ca) 测定 CEJF8000				
肝功能测定八项	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定 CEAA8000和白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000				
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs) 测定	乙型肝炎表面抗原定性 (HBsAg) 测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量 (HBsAg) 测定 CGLH1000				
丙型肝炎抗体 (抗HCV) 测定	CGMA1000				
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV) 测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体 (抗TP) 测定	CGPP1000				
胸部X线摄影	EABJT001				
头部X线计算机体层 (CT) 平扫	EBABP001				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		治疗		药物	
临床操作数字减影 (DSA) 引导	EAZZZ003			止血药物	
临床操作X线透视引 导	EAZZZ001			胰岛素及其类似物	
头部X线计算机体层 (CT) 增强扫描	EBBBP001			抑酸剂	
头颅非增强磁共振动 脉血管成像	ECABJ001			康复治疗	
头颅非增强磁共振静 脉血管成像	ECABM001			抗菌药物	
头颅动脉磁共振血管 增强成像	ECBBJ001			缓泻药物	
头部磁共振增强成像	ECBBP001				
血脂四项	甘油三酯(TG)测定 CEHB1000 和总胆固醇(TC)测定 CEHA1000 和高密度脂蛋白胆固 醇(HDL-C)测定 CEHC1000 和低密度脂蛋白胆固 醇(LDL-C)测定 CEHD1000				
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000或ABO血 型鉴定(反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定(正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定(反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000				
血气分析	CEJM1000				
治疗					
骨髓穿刺术	FNA06101				
监测					
麻醉深度电生理监测	HAP05902				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
生命体征监测	有创连续动脉血压监测HAN05201或有创血流动力学监测 HAN05202或无创血流动力学监测HAN05701 或全身麻醉下呼吸功能监测HAN05902				

吉兰-巴雷综合征

适用对象：	病种编码：	AM003			
	主要诊断：	吉兰-巴雷综合征	ICD-10码：	G61.0	
	主要操作/主要治疗方式：		CCHI码：		
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：G61.0吉兰-巴雷综合征疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 神经功能缺损表现有所好转或基本恢复。 2. 治疗2周病情平稳。 3. 并发症得到有效控制。			
	最短住院日参考值：	2周			
	变异条件：	1. 住院期间合并感染（肺部、泌尿系、肠道等），需要进行抗感染治疗，导致住院时间延长、费用增加。 2. 患者可能出现呼吸肌麻痹，需要呼吸机辅助呼吸，导致住院时间延长、费用增加。 3. 合并其它疾病情况，则无法单病种			
	再入院间隔时间：	14天			

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		治疗		药物	
I 级护理	ACAC0001	导尿管留置	ABHA0002	免疫球蛋白	
II 级护理	ACAB0001	静脉输液	ABCA0001	抗休克药	
/特级护理	ACAD0001	呼吸机辅助呼吸	无创呼吸机辅助通气KJA21401或有创呼吸机辅助通气KJA21402	预防激素不良反应用药	
口腔护理	ACBH0001	监测		中成药治疗	
气管插管护理	ACBJ0003	无创心电监测	FKA05705		
检查		无创血压监测	FKA05709		
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000				
红细胞沉降率(ESR)测定	CAAJ1000				
尿常规化学分析	CCAA2000				
粪便常规检查	CCCA3000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
脑脊液检查	脑脊液 (CSF) 常规细胞计数检查CCDC4000和脑脊液糖定性测定CCDD4000和脑脊液蛋白定性测定CCDE4000				
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定CEEA8000或肌酐 (Cr) 测定CEEB8000或尿酸 (UA) 测定CEEE8000				
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000				
血气分析	CEJM1000				
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000和钠 (Na) 测定CEJB8000和氯 (Cl) 测定CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定CEJD1000和镁 (Mg) 测定CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000				
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (Alb) 测定CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定CECD8000				
生化常规检查	葡萄糖 (Glu) 测定CEFA8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000和无机磷 (P) 测定CEKA8000和钾 (K) 测定CEJA8000和钠 (Na) 测定CEJB8000和氯 (Cl) 测定CEJC8000和镁 (Mg) 测定CEJE8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定CEJD1000				
C3测定	CGAF1000				
C4测定	CGAG1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
免疫球蛋白测定	免疫球蛋白G(IgG)定量测定CGAT1000或免疫球蛋白M(IgM)定量测定CGAU1000或免疫球蛋白D(IgD)定量测定CGAV1000或免疫球蛋白E(IgE)定量测定CGAW1000或分泌型免疫球蛋白A测定CGAX1000或免疫球蛋白亚类定量测定CGBA1000或免疫球蛋白轻链测定CGBB8000或免疫球蛋白游离轻链测定CGBC8000或B细胞膜表面免疫球蛋白测定CGBH1000或脱敏免疫球蛋白IgG测定CGUU1000或脱敏免疫球蛋白IgG4测定CGUV1000				
风湿活动筛查	红细胞沉降率(ESR)测定CAAJ1000和抗链球菌溶血素O(ASO)测定CGPB1000和类风湿因子(RF)测定CGFG1000和超敏C反应蛋白(hs-CRP)测定CEAU1000				
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000				
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000				
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
肿瘤标志物检查	癌胚抗原(CEA)测定CGRA1000和甲胎蛋白(AFP)测定CGRB8000和糖类抗原CA-125测定CGRP1000和糖类抗原CA-153测定CGRR1000和糖类抗原CA-199测定CGRS1000和神经元特异性烯醇化酶(NSE)测定CGRH1000和肿瘤坏死因子 α (TNF- α)测定CGRY1000和糖类抗原CA-724测定CGRV1000				
一般细菌培养+鉴定	CJAP8000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
普通细菌药敏定性试验	CJBX9000				
胸部X线摄影	EABJT001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703				
同心圆针极肌电图检查	FCA03702				
运动神经传导速度测定	FCA03704				
F波测定	FCA03707				
H反射	FCA03708				
脑脊液生化检查	葡萄糖 (Glu) 测定 CEFA8000和微量总蛋白 (mTP) 测定 CEAB8000和氯 (Cl) 测定 CEJC8000				
寡克隆蛋白电泳分析	CEAQ4000				
24小时IgG鞘内合成率测定	CGAY8000				
多发性硬化功能残疾评分检查 (EDSS)	MAMZY004				
等速肌力测定	MABX8002				
监测					
无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710				
病理					
细针穿刺细胞学检查与诊断	BBAA0001				
治疗					
腰椎穿刺术	FVT06101				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		治疗		药物	
感觉神经传导速度测定	FCA03705	气管切开术	HJC50301		

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
无创机械通气智能压力滴定	FJE05702	经口气管插管术	HAM62401		
粪便空肠弯曲菌抗原测定	CGQH3000				
痰液常规检查	CCEK5000				
视诱发电位 (VEP) 检查	FEA03704				
脑干听觉诱发电位术中监护	KBF28701				
上肢体感诱发电位检查	FCZ03704				
下肢体感诱发电位检查	FCZ03705				
监测					
有创连续动脉血压监测	HAN05201				
治疗					
有创呼吸机辅助通气	KJA21402				

多发性硬化

适用对象：	病种编码：	AM004			
	主要诊断：	多发性硬化		ICD-10：G35	
	主要操作/主要治疗方式：			CCHI码：	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：G35多发性硬化疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 病人病情改善。 2. MRI复查稳定或较治疗前明显改善。 3. 没有需要住院治疗的并发症。			
	最短住院日参考值：	2周			
	变异条件：	1. 对于延髓或高颈段脱髓鞘病变，有可能病情加重需要气管切开并应用人工辅助呼吸，会延长治疗时间并增加住院费用。 2. 激素治疗可能增加高血压、糖尿病、感染等并发症的机会，导致住院时间延长、医疗费用增加。 3. 住院后伴发非神经系统疾病或为系统性自身免疫病时，需要进一步明确诊断，导致住院时间延长。			
	再入院间隔时间：	14天			

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		治疗		药物	
II级护理	ACAB0001			激素	
检查				辅助用药	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			抗休克药	
尿常规化学分析	CCAA2000			中成药治疗	
粪便常规检查	CCCA3000			神经营养药物	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEE8000或肌酐(Cr)测定CEEB8000或尿酸(UA)测定CEEE8000			康复治疗	
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000			免疫抑制剂	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
血脂四项	甘油三酯(TG)测定 CEHB1000 和总胆固醇(TC)测定 CEHA1000 和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定 CEHC1000 和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定 CEHD1000				
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000				
甲状腺功能检查	甲状腺摄碘试验 EEGDC001或甲状腺激素抑制试验EEGDC002				
生化常规检查	葡萄糖(Glu)测定 CEFA8000和总钙(Ca)测定 CEJF8000和无机磷(P)测定 CEKA8000和钾(K)测定 CEJA8000和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总二氧化碳(TCO2)测定 CEJD1000				
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定 CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定 CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定 CECC8000和总蛋白(TP)测定 CEAA8000和白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定 CECD8000				
抗核抗体(ANA)测定	CGDB1000				
抗核提取物抗体(抗ENA抗体)七项测定	CGDD1000				
风湿活动筛查	红细胞沉降率(ESR)测定 CAAJ1000和抗链球菌溶血素O(ASO)测定 CGPB1000和类风湿因子(RF)测定 CGFG1000和超敏C反应蛋白(hs-CRP)测定 CEAU1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000				
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000				
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
头部磁共振增强成像	ECBBP001				
颈部磁共振成像	ECAHY001				
胸部磁共振成像	ECAJT001				
视力检查	普通远视力检查 FEA01701或普通近视力检查FEA01702				
视野检查	普通视野计检查 FEA01709或视野检查-静态法FEA01710或视野检查-动态法FEA01711				
眼底检查	免散瞳眼底检查 FES01704或非散瞳直接检眼镜眼底检查 FES01705或前置镜眼底检查FES01706或间接眼底镜检查 FES01707或三面镜眼底检查FES01713				
多发性硬化功能残缺评分检查(EDSS)	MAMZY004				
脑脊液检查	脑脊液(CSF)常规细胞计数检查CCDC4000和脑脊液糖定性测定CCDD4000和脑脊液蛋白定性测定CCDE4000				
脑脊液生化检查	葡萄糖(Glu)测定 CEFA8000和微量总蛋白(mTP)测定 CEAB8000和氯(Cl)测定CEJC8000				
寡克隆蛋白电泳分析	CEAQ4000				
24小时IgG鞘内合成率测定	CGAY8000				
视诱发电位(VEP)检查	FEA03704				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
脑干听觉诱发电位检查	FBF03701				
上肢体感诱发电位检查	FCZ03704				
下肢体感诱发电位检查	FCZ03705				
多发性硬化功能残缺评分检查(EDSS)	MAMZY004				
抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA/LP)测定	CGFK1000				
抗核抗体谱八项测定	CGDE1000				
治疗					
腰椎穿刺术	FVT06101				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		治疗		药物	
红细胞沉降率(ESR)测定	CAAJ1000			抗肿瘤药	
C-反应蛋白(CRP)测定	CGCA1000			免疫球蛋白	
碱性髓鞘蛋白测定	CGCC8000				
免疫球蛋白G(IgG)定量测定	CGAT1000				
淋巴细胞亚类检测	CGCV8000				
肾上腺素(AD)测定	CERC1000				
脊髓磁共振水成像(MRM)	ECABS001				

癫痫

适用对象：病种编码：AM005

主要诊断：癫痫

ICD-10码：G40.0-
G40.9

主要操作/主要治疗
方式：

CCHI码：

入院标准：
1. 第一诊断必须符合ICD - 10：G40.0-G40.9癫痫疾病编码。
2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。

出院标准：
1. 诊断明确，药物治疗方案确定，可门诊随访。
2. 有手术指征者转入神经外科接受手术治疗。

最短住院日参考值：7天

变异条件：
1. 癫痫发作可能为非癫痫性发作，经住院检查和观察确认后，中止抗癫痫药物治疗并让患者出院。
2. 患者在住院期间出现癫痫持续状态，转入癫痫持续状态临床路径。

再入院间隔时间：14天

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		治疗		药物	
II级护理	ACAB0001			口服药物	
检查				抗癫痫药物	
血常规	全血细胞计数+3分群 检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分 类检测CAAB1000				
尿常规化学分析	CCAA2000			中成药治疗	
粪便常规检查	CCCA3000				
肌钙蛋白T(TnT)测定	CEAX1000				
肌酸激酶(CK)测定	CECS1000				
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEE8000或肌酐(Cr) 测定CEEB8000或尿酸 (UA)测定CEEE8000				
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
血脂四项	甘油三酯(TG)测定 CEHB1000 和总胆固醇(TC)测定 CEHA1000 和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定 CEHC1000 和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定 CEHD1000				
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定 CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定 CECD8000				
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000				
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000				
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
乳酸(LA)测定	CEGA8000				
血氨测定	CEEK1000				
头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001				
头部磁共振增强成像	ECBBP001				
脑电图	16导常规脑电图检查 FBC03701或64导脑电图检查FBC03703或 128导脑电图检查 FBC03704				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703				
治疗药物浓度测定	CENA1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
胸部X光片	胸部X线透视 EAAJT001或胸部X线 摄影EABJT001				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
单脏器单体素磁共振 波谱分析	ECCZX005				
单脏器多体素磁共振 波谱分析	ECCZX006				
SPECT/CT脑断层显像	EEDBH001				
32导颅内电极脑电图 录像监测	FBC05702				
64导颅内电极脑电图 录像监测	FBC05703				
256导颅内电极脑电 图录像监测	FBC05705				
脑功能磁共振成像	ECABC001				
SPECT/CT放射免疫断 层显像	EEDZX003				
脑磁图检查	FBC03709				
智力测定	智力成就责任问卷测 评FAC04703或绘人智 力测验FAC04705或中 国韦氏成人智力测验 FAC04712或中国韦氏 幼儿智力量表测验 (C-WYCSI)FAC04714 或中国韦氏儿童智力 量表测验(C- WISC)FAC04715或中 国幼儿智力量表 (ISCYC)测验 FAC04716				
自身免疫病检验	CGDA-CGKK				
精神焦虑抑郁筛查	宗(Zung)氏焦虑自评 量表测评FAL04701和 宗(Zung)氏抑郁自评 量表测评FAL04703				

重症肌无力

适用对象：	病种编码：	AM006			
	主要诊断：	重症肌无力	ICD-10：	G70.0	
	主要操作/主要治疗方式：		CCHI码：		
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：G70.0重症肌无力疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 肌无力症状好转。 2. 并发症得到有效控制。			
	最短住院日参考值：	14天			
	变异条件：	1. 住院期间合并感染（肺部、泌尿系、肠道等），导致住院时间延长、费用增加。 2. 使用糖皮质激素冲击疗法的患者，可能出现病情短期加重，导致住院时间延长、费用增加。 3. 发生重症肌无力危象的患者，转入相应临床路径。			
	再入院间隔时间：	14天			

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
护理				胆碱酯酶抑制剂	
II级护理	ACAB0001			抗休克药	
检查				免疫抑制剂	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			中成药治疗	
尿常规化学分析	CCAA2000			预防激素不良反应用药	
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000				
粪便常规检查	CCCA3000				
红细胞沉降率(ESR)测定	CAAJ1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000				
血气分析	CEJM1000				
血脂四项	甘油三酯 (TG) 测定 CEHB1000 和总胆固醇 (TC) 测定 CEHA1000 和高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C) 测定 CEHC1000 和低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C) 测定 CEHD1000				
免疫五项	IgA免疫复合物测定 CGUQ1000或IgG免疫复合物测定CGUR1000 或IgM免疫复合物测定CGUS1000或C3测定CGAF1000或C4测定CGAG1000				
甲状腺功能检查	甲状腺摄碘试验 EEGDC001或甲状腺激素抑制试验EEGDC002				
甲状腺素 (T4) 测定	CEQH1000				
三碘甲状原氨酸 (T ₃) 测定	CEQJ1000				
反T ₃ 测定	CEQK1000				
游离甲状腺素 (FT4) 测定	CEQL1000				
游离三碘甲状原氨酸 (FT3) 测定	CEQM1000				
甲状腺结合球蛋白 (TG) 测定	CEQN1000				
促甲状腺素受体抗体 (TRAb) 测定	CEQP1000				
甲状腺球蛋白 (TG) 测定	CEQQ1000				
生化常规检查	葡萄糖 (Glu) 测定 CEFA8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000和无机磷 (P) 测定CEKA8000 和钾 (K) 测定CEJA8000和钠 (Na) 测定CEJB8000和氯 (Cl) 测定CEJC8000和镁 (Mg) 测定CEJE8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定CEJD1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000或肌酐 (Cr) 测定CEEB8000或尿酸 (UA) 测定CEEE8000				
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红 素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶 (GGT) 测 定CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和 白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶 (ALP) 测定 CECD8000				
免疫球蛋白测定	免疫球蛋白G (IgG) 定 量测定CGAT1000或免 疫球蛋白M (IgM) 定量 测定CGAU1000或免疫 球蛋白D (IgD) 定量测 定CGAV1000或免疫球 蛋白E (IgE) 定量测定 CGAW1000或分泌型免 疫球蛋白A测定 CGAX1000或免疫球蛋 白亚类定量测定 CGBA1000或免疫球蛋 白轻链测定CGBB8000 或免疫球蛋白游离轻 链测定CGBC8000或B 细胞膜表面免疫球蛋 白测定CGBH1000或脱 敏免疫球蛋白IgG测定 CGUU1000或脱敏免 疫球蛋白IgG4测定 CGUV1000				
风湿活动筛查	红细胞沉降率 (ESR) 测定CAAJ1000 和抗链球菌溶血素 O (ASO) 测定CGPB1000 和类风湿因子 (RF) 测 定CGFG1000 和超敏C反应蛋白 (hs-CRP) 测定 CEAU1000				
C3测定	CGAF1000				
C4测定	CGAG1000				
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs) 测定	乙型肝炎表面抗原定 性 (HBsAg) 测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg) 测定 CGLH1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000				
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
肿瘤标志物检查	癌胚抗原(CEA)测定 CGRA1000和甲胎蛋白(AFP)测定CGRB8000 和糖类抗原CA-125测定CGRP1000和糖类抗原CA-153测定 CGRR1000和糖类抗原CA-199测定CGRS1000 和神经元特异性烯醇化酶(NSE)测定 CGRH1000和肿瘤坏死因子 α (TNF- α)测定 CGRY1000和糖类抗原CA-724测定CGRV1000				
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001				
胸部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBJT001				
重复神经电刺激检查	FCZ03710				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道 常规心电图检查FKA03702或十二通道 常规心电图检查FKA03703				
抗乙酰胆碱受体抗体测定	CGEZ1000				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目:					
检查		治疗		药物	
运动神经传导速度测定	FCA03704			钙剂	
感觉神经传导速度测定	FCA03705			钾剂	
同心圆针极肌电图检查	FCA03702			胃粘膜保护剂	

脑梗死

适用对象：	病种编码：	AM007			
	主要诊断：	脑梗死	ICD-10码：	I63.0-I63.6, I63.8-I63.9	
	主要操作/主要治疗方式：		CCHI码：		
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10: I63.0-I63.6, I63.8-I63.9脑梗死疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 患者病情稳定。 2. 没有需要住院治疗的并发症。			
	最短住院日参考值：	8天			
	变异条件：	1. 脑梗死病情危重者需转入ICU，转入相应路径。 2. 辅助检查结果异常，需要复查，导致住院时间延长和住院费用增加。 3. 住院期间病情加重，出现并发症，需要进一步诊治，导致住院时间延长和住院费用增加。 4. 既往合并有其他系统疾病，脑梗死可能导致既往疾病加重而需要治疗，导致住院时间延长和住院费用增加。			
	再入院时间间隔要求：				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		治疗		药物	
I 级护理	ACAC0001			脱水降颅压药物	
/ II 级护理	ACAB0001			降血压药物	
/ III级护理	ACAA0001			溶栓药物	
检查				中成药治疗	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			抗血小板药物	
尿常规化学分析	CCAA2000			纠正水、电解质紊乱药物	
粪便常规检查	CCCA3000				
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定CEE8000和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (Alb) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000				
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测定 CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测定 CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000无机磷 (P) 测定 CEKA8000				
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000				
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定 CAGA1000和活化部分凝血活酶时间 (APTT) 测定 CAGB1000和血浆凝血酶原时间 (PT) 测定 CAGC1000和血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000和纤维蛋白 (原) 降解产物 (FDP) 测定 CAJX1000和凝血酶原活动度 (PA) 和凝血酶原比值 (R) 和凝血酶原INR值 (INR) 和血浆D-二聚体 (D-Dimer) 测定 CAJY1000				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703				
胸部X光片	胸部X线透视 EAAJT001或胸部X线摄影EABJT001				
头部X线计算机体层 (CT) 平扫	EBABP001				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
血脂四项	甘油三酯(TG)测定 CEHB1000 和总胆固醇(TC)测定 CEHA1000 和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定 CEHC1000 和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定 CEHD1000				
椎动脉彩色多普勒超声检查	EDCLH001				
颈动脉彩色多普勒超声检查	EDCLF001				
经颅彩色多普勒超声	EDCBH002				
颅脑磁共振成像	ECABA001				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
血清肌酶测定	肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定 CECT1000或天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000或乳酸脱氢酶同工酶测定 CECX1000或肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定 CECT1000			抗菌药物	
				缓泻药物	
				防治应激性溃疡药物	

全面惊厥性癫痫持续状态（GCSE）

适用对象：	病种编码：	AM008	
	主要诊断：	全面惊厥性癫痫持续状态（GCSE）	ICD-10码：G40.308
	主要操作/主要治疗方式：		CCHI码：
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：G40.308成人全面惊厥性癫痫持续状态疾病编码。 2. 同时合并或伴有其他疾病，但住院期间不需特殊处理也不影响GCSE临床路径实施患者。		
出院标准：	1. GCSE终止，病因明确，病情稳定。 2. 抗癫痫药物的不良反应纠正，进一步治疗方案确定，神经功能评估完毕。		
最短住院日参考值：	7-14天		
变异条件：	1. 癫痫发作可能为非病性发作，经住院检查和观察后排除GCSE。 2. 难治性癫痫持续状态和需要病因治疗可适当延长住院时间。		
再入院间隔时间：			

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		治疗		药物	
I 级护理	ACAC0001	输液	静脉输液ABCA0001或输液泵辅助静脉输液ABCB0001或静脉输血ABCD0001或全胃肠外营养深静脉输注ABCF0001或外周静脉营养输注ABCG0001或输液泵辅助全胃肠外营养深静脉输注ABCH0001或抗肿瘤化疗药物/肠外营养液集中配置ABCJ0001	抗癫痫及抗惊厥药	
II 级护理	ACAB0001	肌肉注射	ABAC0001	抗癫痫及抗惊厥药	
III级护理	ACAA0001	氧疗	高压氧舱内常规治疗KJA21901或高压氧舱内常规治疗KJA21901或电针经络氧疗法KAZ38704或高压氧舱内常规治疗KJA21901	抗癫痫及抗惊厥药	
检查		物理降温	擦浴降温ABLA0001或贴敷降温ABLB0001或冰帽降温ABLC0001冰毯降温ABLD0001	中成药治疗	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			口服抗癫痫药物	
尿常规化学分析	CCAA2000			AEDs	
粪便常规检查	CCCA3000			抗癫痫及抗惊厥药	
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (Alb) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000			抗癫痫及抗惊厥药	
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000或肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000或尿酸 (UA) 测定 CEEE8000			抗癫痫及抗惊厥药	
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000			P450肝酶诱导药物	
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测定 CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测定 CEJE8000和总钙 (Ca) 测定 CEJF8000			纠正电解质紊乱、低血糖和酸中毒的药物	
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道常规心电图检查 FKA03702或十二通道常规心电图检查 FKA03703				
血清肌酶测定	肌酸激酶 (CK) 测定 CECS1000和乳酸脱氢酶 (LD) 测定 CECW1000和活化凝血时间 (ACT) 测定 CAHF1000和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
头颅MRI或CT	颅脑磁共振成像 ECABA001或头部X线 计算机体层(CT)平扫 EBABP001				
血气分析	CEJM1000				
脑电图	16导常规脑电图检查 FBC03701或32导常规 脑电图检查FBC03702 或64导脑电图检查 FBC037031或28导脑 电图检查FBC03704或 动态脑电图检查 FBC03706				
胸部X线摄影	EABJT001				
监测					
生命体征监测	有创连续动脉血压监 测HAN05201或有创血 流动力学监测 HAN05202或无创血流 动力学监测HAN05701 或全身麻醉下呼吸功 能监测HAN05902				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		治疗		药物	
腰椎穿刺脊髓X线造 影	EACBS002	支气管内插管术	HAM62402	脱水药	
痰液常规检查	CCEK5000	机械通气	无创呼吸机辅助通气 KJA21401或有创呼吸 机辅助通气KJA21402	营养药物	
		骨髓穿刺术	FNA06101		

肌萎缩侧索硬化（ALS）

适用对象：	病种编码：	AM009			
	主要诊断：	肌萎缩侧索硬化（ALS）	ICD-10码：	G12.201	
	主要操作/主要治疗方式：		CCHI码：		
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：G12.201肌萎缩侧索硬化疾病编码。 2. 具有其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响本临床路径流程实施患者。			
	出院标准：	1. 临床诊断明确，暂时排除其他疾病。 2. 没有需要住院治疗的并发症。			
	最短住院日参考值：	14 - 21天			
	变异条件：	1. 合并恶性肿瘤，或伴有严重并发症患者，转入相应临床路径诊治。 2. 发生呼吸肌麻痹需机械通气治疗，由此延长住院时间，增加住院费用患者转入相应临床路径。			
	再入院间隔时间：				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		治疗		药物	
I 级护理	ACAC0001			维生素类药	
II 级护理	ACAB0001			酶及辅酶类药	
III级护理	ACAA0001			维生素类药	
检查				中成药治疗	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000				
尿常规化学分析	CCAA2000				
粪便常规检查	CCCA3000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000				
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000或肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000或尿酸 (UA) 测定 CEEE8000				
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000				
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测定 CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测定 CEJE8000和总钙 (Ca) 测定 CEJF8000				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703				
血清肌酶测定	肌酸激酶 (CK) 测定 CECS1000和乳酸脱氢酶 (LD) 测定 CECW1000和活化凝血时间 (ACT) 测定 CAHF1000和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000				
血脂四项	甘油三酯 (TG) 测定 CEHB1000和总胆固醇 (TC) 测定 CEHA1000和高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C) 测定 CEHC1000和低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C) 测定 CEHD1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000				
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000				
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
胸部X线摄影	EABJT001				
同心圆针极肌电图检查	FCA03702				
运动神经传导速度测定	FCA03704				
感觉神经传导速度测定	FCA03705				
颈椎磁共振成像	ECAVH001				
腰椎磁共振成像	ECAVT001				
风湿三项	红细胞沉降率(ESR)测定CAAJ1000或类风湿因子(RF)测定 CGFG1000或抗链球菌溶血素O(ASO)测定 CGPB1000				
抗核抗体(ANA)测定	CGDB1000				
ENA抗体谱六项测定	CGDC1000				
抗双链DNA(抗dsDNA)测定	CGDT1000				
类风湿因子(RF)测定	CGFG1000				
预防神经管畸形药(FA)测定	CEMA1000				
免疫球蛋白测定	免疫球蛋白G(IgG)定量测定CGAT1000或免疫球蛋白M(IgM)定量测定CGAU1000或免疫球蛋白D(IgD)定量测定CGAV1000或免疫球蛋白E(IgE)定量测定CGAW1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
抗补体抗体测定	CGFD1000				
肌力检查	肌张力评定MABX8001 或等速肌力测定 MABX8002或等长肌力 评价MABX8003				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		治疗		药物	
肿瘤标志物检查	癌胚抗原 (CEA) 测定 CGRA1000和甲胎蛋白 (AFP) 测定CGRB8000 和糖类抗原CA-125测 定CGRP1000和糖类抗 原CA-153测定 CGRR1000和糖类抗原 CA-199测定CGRS1000 和神经元特异性烯醇 化酶 (NSE) 测定 CGRH1000和肿瘤坏死 因子 α (TNF- α) 测定 CGRY1000和糖类抗原 CA-724测定CGRV1000	理疗	LE	肌萎缩侧索硬化症治 疗药	
胃肠排空试验-钡餐 透视法	EACPA001	肌肉注射	ABAC0001	抗癫痫及抗惊厥药	
全消化道造影	EACPA002	机械通气	无创呼吸机辅助通气 KJA21401或有创呼吸 机辅助通气KJA21402	抗重症肌无力药	
免疫五项	IgA免疫复合物测定 CGUQ1000或IgG免疫 复合物测定CGUR1000 或IgM免疫复合物测 定CGUS1000或C3测定 CGAF1000或C4测定 CGAG1000				
颅脑磁共振成像	ECABA001				
腰穿脑脊液检查	腰椎穿刺术FVT06101 和脑脊液 (CSF) 常规 细胞计数检查 CCDC4000或脑脊液糖 定性测定CCDD4000或 脑脊液蛋白定性测定 CCDE4000或脑脊液细 胞学检查CCDF4000				

急性横贯性脊髓炎或可能急性横贯性脊髓炎

适用对象：	病种编码：	AM010			
	主要诊断：	急性横贯性脊髓炎或 可能急性横贯性脊髓炎	ICD-10码：	G37.3	
	主要操作/主要治疗方式：		CCHI码：		
入院标准：		1. 第一诊断必须符合ICD-10：G37.3急性横贯性脊髓炎或可能急性横贯性脊髓炎疾病编码。 2. 患有其他疾病，但住院期间无需特殊处理，也不影响第一诊断的检查与治疗。 3. 发病>28天的脊髓炎或可能为横贯性脊髓炎患者不再进入路径。			
出院标准：		1. 病情改善或平稳。 2. MRI复查病变稳定或比治疗前改善。 3. 没有需要继续住院治疗的并发症。			
最短住院日参考值：		4－6周			
变异条件：		1. 某些疾病（视神经脊髓炎、多发性硬化、播散性脑脊髓炎、脊髓肿瘤、脊髓血管畸形、结缔组织病和特殊感染类疾病等）在发病早期可有急性横贯性脊髓炎的表现，但随着病程的进展，出现各自特征性表现，因此入院时初步诊断为急性横贯性脊髓炎的患者可进入路径（宽进），但入院1－2周内应对不符合该诊断的患者进行修正诊断（严出），并退出路径/转入其他相应疾病路径。 2. 危重症患者因呼吸肌麻痹而需机械通气，或因严重感染等并发症而需特殊治疗时，需转入重症监护病房，进入相关路径。			
再入院间隔时间：					

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		治疗		药物	
II级护理	ACAB0001	静脉注射	ABAD0001	抗休克药	
检查		静脉输液	ABCA0001	预防激素不良反应用药	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	导尿管留置	ABHA0002	神经营养药物	
尿常规化学分析	CCAA2000	康复治疗	MB	中成药治疗	
粪便常规检查	CCCA3000			血管扩张药物	
隐血试验	CCCB8000			抗菌药物	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (Alb) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000			胃黏膜保护剂	
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000或肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000或尿酸 (UA) 测定 CEEE8000			营养药	
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000				
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测定 CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测定 CEJE8000和总钙 (Ca) 测定 CEJF8000				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道常规心电图检查 FKA03702或十二通道常规心电图检查 FKA03703				
血脂四项	甘油三酯 (TG) 测定 CEHB1000 和总胆固醇 (TC) 测定 CEHA1000 和高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C) 测定 CEHC1000 和低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C) 测定 CEHD1000				
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs) 测定	乙型肝炎表面抗原定性 (HBsAg) 测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量 (HBsAg) 测定 CGLH1000				
丙型肝炎抗体 (抗HCV) 测定	CGMA1000				
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV) 测定	CGMF1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
胸部X线摄影	EABJT001				
抗链球菌溶血素O (ASO) 测定	CGPB1000				
红细胞沉降率 (ESR) 测定	CAAJ1000				
超敏C反应蛋白 (hs-CRP) 测定	CEAU1000				
抗核提取物抗体(抗ENA抗体)七项测定	CGDD1000				
抗核抗体 (ANA) 测定	CGDB1000				
类风湿因子 (RF) 测定	CGFG1000				
抗中性粒细胞胞浆抗体 (cANCA) 测定	CGDS1000				
抗促甲状腺素抗体检测	CGHJ1000				
颅脑磁共振成像	ECABA001				
头部磁共振增强成像	ECBBP001				
脊髓磁共振水成像 (MRM)	ECABS001				
腰穿脑脊液检查	腰椎穿刺术FVT06101 和脑脊液 (CSF) 常规 细胞计数检查 CCDC4000或脑脊液糖 定性测定CCDD4000或 脑脊液蛋白定性测定 CCDE4000或脑脊液细 胞学检查CCDF4000				
IgG 指数	IgG免疫复合物测定 CGUR1000或脱敏免疫 球蛋白IgG测定 CGUU1000或IgG血型 (抗A) 抗体效价测定 CAMS1000或IgG血型 (抗B) 抗体效价测定 CANT1000或IgG血型 (抗D) 抗体效价测定 CAMU1000或IgG血型 (抗E或抗e或抗C或抗 c) 抗体效价测定 CAMV1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
寡克隆区带	寡克隆蛋白电泳分析 CEAQ4000				
24小时IgG鞘内合成率测定	CGAY8000				
诱发电位	视诱发电位 (VEP) 检查 FEA03704或脑干听觉诱发电位检查 FBF03701或上肢体感诱发电位检查 FCZ03704或下肢体感诱发电位检查 FCZ03705				
视力检查	普通远视力检查 FEA01701或普通近视力检查 FEA01702				
视野检查	视野检查-静态法 FEA01710或视野检查-动态法 FEA01711				
眼底	前置镜眼底检查 FES01706或间接眼底镜检查 FES01707或三面镜眼底检查 FES01713				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		治疗		药物	
TORCH抗体测定	CGMR1000			免疫球蛋白	
莱姆氏螺旋体抗体测定	CGPV1000			广谱抗病毒药物	
经皮穿刺插管脊髓血管造影术	FBT08201				

视神经脊髓炎

适用对象：	病种编码：	AM011			
	主要诊断：	视神经脊髓炎	ICD-10码：	G36.0	
	主要操作/主要治疗方式：		CCHI码：		
入院标准：		1. 第一诊断必须符合ICD-10：G36.0视神经脊髓炎疾病编码。 2. 神经功能明显受到影响（视神经、脊髓）。 3. 患有其他疾病，但在住院期间无需特殊检查和治疗，也不影响第一诊断临床路径流程实施。			
出院标准：		1. 病人病情改善或平稳。 2. MRI复查病灶无增加扩大或较治疗前明显改善。 3. 没有需要住院治疗的并发症。			
最短住院日参考值：	2 - 4周				
变异条件：		1. 高位段病变可能出现呼吸肌麻痹，病情加重，须转入ICU治疗，从而延长治疗时间和增加住院费用。 2. 激素治疗可能出现血压增高、血糖增高和机会感染等并发症，从而导致住院时间延长和费用增加。 3. 合并非神经系统疾病或系统性自身免疫病，需要进一步诊断和治疗，从而导致住院时间延长和医疗费用增加。			
再入院间隔时间：					

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		治疗		药物	
II级护理	ACAB0001	静脉注射	ABAD0001	抗休克药	
检查		静脉输液	ABCA0001	预防激素不良反应用药	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	康复治疗	MB	神经营养药物	
尿常规化学分析	CCAA2000	球后注射	HEF48102	中成药治疗	
粪便常规检查	CCCA3000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(Alb)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000				
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEE8000或肌酐(Cr)测定CEEB8000或尿酸(UA)测定CEEE8000				
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000				
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO ₂)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703				
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000				
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000				
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
胸部X线摄影	EABJT001				
抗链球菌溶血素O(ASO)测定	CGPB1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
红细胞沉降率 (ESR) 测定	CAAJ1000				
超敏C反应蛋白 (hs-CRP) 测定	CEAU1000				
抗核提取物抗体 (抗ENA抗体) 七项测定	CGDD1000				
抗核抗体 (ANA) 测定	CGDB1000				
类风湿因子 (RF) 测定	CGFG1000				
抗中性粒细胞胞浆抗体 (cANCA) 测定	CGDS1000				
抗促甲状腺素抗体检测	CGHJ1000				
颅脑磁共振成像	ECABA001				
头部磁共振增强成像	ECBBP001				
脊髓磁共振水成像 (MRM)	ECABS001				
腰穿脑脊液检查	腰椎穿刺术FVT06101 和脑脊液 (CSF) 常规 细胞计数检查 CCDC4000或脑脊液糖 定性测定CCDD4000或 脑脊液蛋白定性测定 CCDE4000或脑脊液细 胞学检查CCDF4000				
IgG 指数	IgG免疫复合物测定 CGUR1000或脱敏免疫 球蛋白IgG测定 CGUU1000或IgG血型 (抗A) 抗体效价测定 CAMS1000或IgG血型 (抗B) 抗体效价测定 CAMT1000或IgG血型 (抗D) 抗体效价测定 CAMU1000或IgG血型 (抗E或抗e或抗C或抗 c) 抗体效价测定 CAMV1000				
寡克隆蛋白电泳分析	CEAQ4000				
24小时IgG鞘内合成 率测定	CGAY8000				
多发性硬化功能残缺 评分检查 (EDSS)	MAMZY004				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
诱发电位	视诱发电位 (VEP) 检查FEA03704脑干听觉诱发电位检查 FBF03701上肢体感诱发电位检查FCZ03704 下肢体感诱发电位检查FCZ03705				
视力检查	普通远视力检查 FEA01701普通近视力检查FEA01702				
视野检查	视野检查-静态法 FEA01710或视野检查-动态法FEA01711				
眼底	前置镜眼底检查 FES01706或间接眼底镜检查FES01707或三面镜眼底检查 FES01713				
C-反应蛋白 (CRP) 测定	CGCA1000				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		治疗		药物	
水通道蛋白抗体 (NMO-IgG)				激素治疗	
淋巴细胞亚群绝对计数	CGBY1000			免疫球蛋白	
抗肾上腺皮质抗体检测	CGGK1000			广谱抗病毒药物	
荧光素眼底血管造影	FEW08201				
相干光断层 (OCT) 眼底扫描	FES01709				

亚急性脊髓联合变性

适用对象：	病种编码：	AM012			
	主要诊断：	亚急性脊髓联合变性	ICD-10码：	E53.801+ G32.0*	
	主要操作/主要治疗方式：		CCHI码：		
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：E53.801+ G32.0*脊髓亚急性联合变性疾病编码。 2. 不需要手术治疗的胃肠道疾病。 3. 有其他疾病，但住院期间无需特殊处理（检查和治疗），不影响第一诊断临床路径流程实施。 4. 无严重合并疾病或并发症（恶性肿瘤、免疫系统疾病、心、肺、肝、肾功能衰竭等）。			
	出院标准：	1. 诊断明确，病情稳定。 2. 无需要住院治疗的并发症。			
	最短住院日参考值：	8 - 14日			
	变异条件：	1. 严重肠炎、胃炎等需要专科治疗。 2. 住院期间病情加重，或出现并发症，需进入ICU治疗，导致住院时间延长和住院费用增加。			
	再入院间隔时间：				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		治疗		药物	
II级护理	ACAB0001	康复治疗	MB	维生素类药	
检查		肌肉注射	ABAC0001	维生素类药	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000				
尿常规化学分析	CCAA2000			中成药治疗	
粪便常规检查	CCCA3000				
血脂四项	甘油三酯(TG)测定CEHB1000 和总胆固醇(TC)测定CEHA1000 和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定CEHC1000 和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定CEHD1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000				
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000或肌酐(Cr)测定CEEB8000或尿酸(UA)测定CEEE8000				
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000				
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO ₂)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703				
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000				
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000				
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
胸部X线摄影	EABJT001				
脊髓磁共振水成像(MRM)	ECABS001				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
腰穿脑脊液检查	腰椎穿刺术FVT06101 和脑脊液 (CSF) 常规 细胞计数检查 CCDC4000或脑脊液糖 定性测定CCDD4000或 脑脊液蛋白定性测定 CCDE4000或脑脊液细 胞学检查CCDF4000				
纤维胃镜检查	FPB01601				
肿瘤标记物检查	癌胚抗原 (CEA) 测定 CGRA1000和糖类抗原 CA-125测定CGRP1000 和糖类抗原CA-199测 定CGRS1000和糖类抗 原CA-242测定 CGRT1000和糖类抗原 CA-724测定CGRV1000				
心电图监测	FCA03710				
监测					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		治疗		药物	
胃液常规检查	CCEG5000			预防神经管畸形药	
骨髓穿刺检查	骨髓穿刺术FNA06101 和骨髓组织活检病理 诊断BCAC0001			铁剂	
诱发电位	视诱发电位 (VEP) 检 查FEA03704或脑干听 觉诱发电位检查 FBF03701或上肢体感 诱发电位检查 FCZ03704或下肢体感 诱发电位检查 FCZ03705			助消化药	
				稀盐酸合剂	
				抗癫痫及抗惊厥药	
				加抗癫痫及抗惊厥药	
				抗癫痫及抗惊厥药	
				麻醉辅助药	
				抗癫痫及抗惊厥药	
				抗精神病药物	
				抗精神病药	

新型隐球菌脑膜炎

适用对象：	病种编码：	AM013			
	主要诊断：	新型隐球菌脑膜炎	ICD-10码：	B45.101† G02.1*	
	主要操作/主要治疗方式：		CCHI码：		
	入院标准：	1. 第一诊断为新型隐球菌脑膜炎（ICD-10:B45.101†G02.1*） 2. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 患者病情稳定。 2. 脑脊液检查显示脑脊液压力正常，脑脊液常规、生化正常，病原学检查阴性。 3. 没有需要住院治疗的并发症。			
	最短住院日参考值：				
	变异条件：	1. 病情危重者需转入ICU，转入相应路径。 2. 辅助检查结果异常，需要复查，导致住院时间延长和住院费用增加。 3. 住院期间病情加重，出现并发症，需要进一步诊治，导致住院时间延长和住院费用增加。 4. 同时合并其他并发症，如结核性脑膜炎、肺部感染，导致住院时间延长和住院费用增加。			
	再入院时间间隔要求：				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		治疗		药物	
I 级护理	ACAC0001	静脉输液	ABCA0001	脱水药物	
/ II 级护理	ACAB0001			抗真菌药物	
/III级护理	ACAA0001				
一般传染病护理	ACBD0001			中成药治疗	
检查					
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000				
尿常规化学分析	CCAA2000				
粪便常规检查	CCCA3000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
脑脊液 (CSF) 常规细胞计数检查	CCDC4000				
脑脊液糖定性测定	CCDD4000				
脑脊液蛋白定性测定	CCDE4000				
脑脊液细胞学检查	CCDF4000				
新型隐球菌墨汁染色镜检	CJHF4000				
抗酸染色	浓缩集菌涂片抗酸染色镜检CJAG8000或直接涂片抗酸染色镜检CJAF8000				
革兰氏染色	直接涂片革兰染色镜检查细菌CJAB8000或浓缩集菌涂片革兰染色镜检查细菌CJAC8000				
真菌培养	真菌培养CJHJ8000或真菌培养+鉴定CJHL8000或真菌培养+鉴定+药敏CJHM8000				
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定CEE8A8000和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000				
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (Alb) 测定CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定CECD8000				
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000和钠 (Na) 测定CEJB8000和氯 (Cl) 测定CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定CEJD1000和镁 (Mg) 测定CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000和葡萄糖 (Glu) 测定CEFA8000				
红细胞沉降率 (ESR) 测定	CAAJ1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
淋巴细胞亚群绝对计数	CGBY1000				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703				
生化常规检查	葡萄糖(Glu)测定CEFA8000和总钙(Ca)测定CEJF8000和无机磷(P)测定CEKA8000和钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和镁(Mg)测定CEJE8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000				
胸部X光片	胸部X线透视EAAJT001或胸部X线摄影EABJT001				
治疗					
腰椎穿刺术	FVT06101				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目:					
检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001				
颅脑磁共振成像	ECABA001				

三叉神经痛

显微镜下三叉神经根血管减压术

适用对象：	病种编码：	AS001			
	主要诊断：	三叉神经痛		ICD-10码：	G50.0
	主要操作/主要治疗方式：	显微镜下三叉神经根血管减压术		CCHI码：	HCF56301
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：G50.0三叉神经痛疾病编码。 2. 有适应证，无禁忌证。 3. 当患者合并其他疾病，如果在住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径实施时，可以进入路径。				
出院标准：	1. 患者术后恢复好，无头痛、发热。 2. 切口愈合良好。				
最短住院日参考值：	7天				
变异条件：	1. 部分患者受血性脑脊液刺激或对Teflon棉或其他材料有排异反应，术后会出现发热、头痛、颈项强直等情况，需要行腰椎穿刺，可能会导致住院时间延长与费用增加。 2. 少数患者显微血管减压术后原有疼痛不一定立刻消失，有可能恢复一段时间后逐渐减轻或消失。				
再入院间隔时间：	1周				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查		/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		中成药治疗	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	氧气吸入	ABJA0001	治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	院内遥测心电监护	KKA28701	换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	监测		药物	
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000			止血药物	
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	生命体征监测	有创连续动脉血压监测HAN05201或有创血流动力学监测HAN05202或无创血流动力学监测HAN05701或全身麻醉下呼吸功能监测HAN05902	止吐药物	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	麻醉		抗血管痉挛药物	
乙型肝炎表面抗体(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	全身麻醉	HAA42901	激素	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	手术		神经营养药物	
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	显微镜下三叉神经根血管减压术	HCF56301		
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	病理			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
胸部X线摄影	EABJT001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703	药物			
颅脑磁共振成像	ECABA001	抗菌药物			
治疗					
导尿	ABHA0001				
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活 量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403或最大 通气量功能检查 FJE01404			生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定 CECA1000和天门冬氨酸 氨基转移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素(T- BiI)测定CELA1000和直接 胆红素(D-BiI)测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转 移酶(GGT)测定CECC8000和 总蛋白(TP)测定CEAA8000 和白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP)测定CECD8000和乳酸 脱氢酶(LD)测定CECW1000 和尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr)测定 CEEB8000和尿酸(UA)测定 CEEE8000和肌酸激酶(CK) 测定CECS1000和肌酸激酶- MB同工酶活性(CK-MB)测定 CECT1000和甘油三酯(TG) 测定CEHB1000和总胆固醇 (TC)测定CEHA1000和高密 度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测 定CEHC1000和低密度脂蛋 白胆固醇(LDL-C)测定 CEHD1000和葡萄糖(Glu)测 定CEFA8000和总钙(Ca)测 定CEJF8000和无机磷(P)测 定CEKA8000和钾(K)测定 CEJA8000和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2)测定CEJD1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
弥散功能检查	肺弥散功能检查--一口气法FJE01405或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
气道阻力测定	FJB02401			治疗	
心功能检查	普通二维超声心动图EDFKA005或心电图踏车负荷试验FKA04701或冠状动脉CT三维成像EBCKU002	药物			
治疗				药物	
				止血药物	
药物				止吐药物	
				抗血管痉挛药物	
				激素	
				神经营养药物	

慢性硬脑膜下血肿

慢性硬脑膜下血肿钻孔术

适用对象：	病种编码：	AS002	
主要诊断：	慢性硬脑膜下血肿	ICD-10码：I62.003	
主要操作/主要治疗方式：	慢性硬脑膜下血肿钻孔术	CCHI码：HBB45304	
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10码：I62.003慢性硬脑膜下血肿疾病编码。 2. 有适应证，无禁忌证。 3. 当患者合并其他疾病，如果在住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 患者一般情况良好，各项化验无明显异常，体温正常。 2. 复查头颅CT显示颅内血肿基本消失，切口愈合良好。		
最短住院日参考值：	3-4天		
变异条件：	1. 对于不适合手术的患者，可适当采用脱水药脱水治疗。 2. 术后因血肿粘稠等原因造成引流不畅、血肿残留、血肿复发等情况，可适当延长引流时间。 3. 对于个别术后复发、钻孔引流效果不佳或无效者，应施行骨瓣开颅血肿摘除术，适应证：（1）血肿内容物为大量血凝块；（2）血肿壁厚，难以切开引流或引流后脑组织不能膨起者。 4. 术后继发其他部位硬脑膜外血肿、硬脑膜下血肿、脑内血肿等并发症，严重者需要再次开颅手术。 5. 住院后伴发其他内、外科疾病需进一步明确诊断，导致住院时间延长。 6. 合并其他慢性疾病。		
再入院间隔时间：	1周		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查		/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			引流管护理	ACBK0001
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		中成药治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	氧气吸入	ABJA0001	头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	麻醉		治疗	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000			换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO ₂)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	监测		药物	
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	无创心电监测	FKA05705	止血药物	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000和活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000和血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000和血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	生命体征监测	有创连续动脉血压监测HAN05201或有创血流动力学监测HAN05202或无创血流动力学监测HAN05701或全身麻醉下呼吸功能监测HAN05902	止吐药物	
乙型肝炎表面抗体(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710	抗血管痉挛药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	手术		激素	
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	慢性硬脑膜下血肿钻孔术	HBB45304	神经营养药物	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	病理			
胸部X线摄影	EABJT001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	药物			
头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001	抗菌药物			
治疗					
导尿	ABHA0001				
药物					
降颅压药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活 量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403或最大 通气量功能检查 FJE01404	血气分析	CEJM1000	生化全项	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定 CECA1000和天门冬氨酸氨基 转移酶(AST)测定CECB1000和 总胆红素(T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素(D- Bil)测定CELB1000和γ-谷氨 酰基转移酶(GGT)测定 CECC8000和总蛋白(TP)测定 CEAA8000和白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP) 测定CECD8000和乳酸脱氢酶 (LD)测定CECW1000和尿素 (Urea)测定CEEA8000和肌酐 (Cr)测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000和肌酸激 酶(CK)测定CECS1000和肌酸 激酶-MB同工酶活性(CK-MB) 测定CECT1000和甘油三酯 (TG)测定CEHB1000和总胆固 醇(TC)测定CEHA1000和高密 度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定 CEHC1000和低密度脂蛋白胆 固醇(LDL-C)测定CEHD1000和 葡萄糖(Glu)测定CEFA8000和 总钙(Ca)测定CEJF8000和无 机磷(P)测定CEKA8000和钾 (K)测定CEJA8000和钠(Na)测 定CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2)测定CEJD1000
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一口 气法FJE01405或肺 弥散功能检查-重复 呼吸法FJE01406	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测 CAAA1000或全血细胞计数+5 分类检测CAAB1000
心脏彩色多普勒超声	EDFKA007	颅内镜辅助操作	NAAA0000	颅脑磁共振成像	ECABA001
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	手术显微镜辅助操作	NABA0000	血浆D-二聚体 (D-Dimer)测 定	CAJY1000
气道阻力测定	FJB02401	骨微动力系统	NBCA0000	下腔静脉彩色 多普勒超声检 查	EDCML001
心功能检查	普通二维超声心动图 EDFKA005或心电图踏 车负荷试验FKA04701 或冠状动脉CT三维成 像EBCKU002	颅微动力系统	NBAA0000	床旁彩色多普 勒超声检查	EDCZZ001
颅脑磁共振成像	ECABA001	纤维支气管镜引导下 气管插管术	HAM62603	治疗	
血气分析	CEJM1000	院内遥测心电监护	KKA28701	氧气雾化吸入	ABKB0001
院内会诊	AADB0001	麻醉		引流管更换	ABZG0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
治疗		全身麻醉	HAA42901	重症监护	ABPB0001
药物		监测		药物	
降压药物		有创连续动脉血压监测	HAN05201	止血药物	
降血糖药		全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902	止吐药物	
		药物		抗血管痉挛药物	
		止血药物		激素	
				神经营养药物	
				降压药物	
				降血糖药	
				抗生素	

小脑扁桃体下疝畸形

显微镜下寰枕畸形减压术

适用对象：	病种编码：	AS003	
	主要诊断：	小脑扁桃体下疝畸形	ICD-10码：Q07.0
	主要操作/主要治疗方式：	显微镜下寰枕畸形减压术	CCHI码：HBN56302
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10码：Q07.0小脑扁桃体下疝畸形疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断时，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 患者一般情况良好，各项化验无明显异常，体温正常。 2. 复查头颅CT及MRI显示枕下减压满意。 3. 切口愈合良好。		
最短住院日参考值：	8天		
变异条件：	1. 合并其他慢性疾病导致术前准备、术后恢复时间延长。 2. 术后继发硬脑膜外血肿、硬脑膜下血肿、脑内血肿等并发症，严重者需要再次开颅手术，导致住院时间延长与费用增加。 3. 术后切口感染、渗液、发热和神经功能障碍等，导致住院时间延长与费用增加。		
再入院间隔时间：	1周		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
Ⅱ级护理	ACAB0001	Ⅰ级护理	ACAC0001	Ⅰ级护理	ACAC0001
检查		检查		/Ⅱ级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		中成药治疗	ECABA001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	颅微动力系统	NBAA0000	颈椎磁共振成	ECAVH001
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	监测	NABA0000	头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	氧气吸入	ABJA0001	治疗	
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	院内遥测心电图监护	KKA28701	换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	监测		药物	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	生命体征监测	有创连续动脉血压监测HAN05201或有创血流动力学监测HAN05202或无创血流动力学监测HAN05701或全身麻醉下呼吸功能监测HAN05902	止血药物	
乙型肝炎表面抗体(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	麻醉		止吐药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	全身麻醉	HAA42901	抗血管痉挛药物	
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	手术		激素	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	显微镜下寰枕畸形减压术	HBN56302	神经营养药物	
胸部X线摄影	EABJT001	药物			
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	抗菌药物			
颅脑磁共振成像	ECABA001	止血药物			
颈椎磁共振成像	ECAVH001	激素			
治疗					
导尿	ABHA0001				
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
颈椎X线摄影	EABVH001	术中神经电生理监测	FCZ05101	颈椎X线摄影	EABVH001
颈部X线计算机体层(CT)平扫	EBAHY001	术中彩色多普勒超声检查	EDCZZ002	颈部X线计算机体层(CT)平扫	EBAHY001
胸椎磁共振成像	ECAVN001	血气分析	CEJM1000	胸椎磁共振成像	ECAVN001
上肢体感诱发电位检查	FCZ03704	治疗		上肢体感诱发电位检查	FCZ03704
下肢体感诱发电位检查	FCZ03705	颅内镜辅助操作	NAAA0000	下肢体感诱发电位检查	FCZ03705

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
下肢运动诱发电位检查	FCZ03702	骨微动力系统	NBCA0000	下肢运动诱发电位检查	FCZ03702
上肢运动诱发电位检查	FCZ03701	脑干听觉诱发电位术中监护	KBF28701	上肢运动诱发电位检查	FCZ03701
脑干听觉诱发电位检查	FBF03701	体感诱发电位术中监护	KBS28701	脑干听觉诱发电位检查	FBF03701
头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001	纤维支气管镜引导下气管插管术	HAM62603	生化全项	
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404	监测		血常规	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000和乳酸脱氢酶(LD)测定CECW1000和尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000和肌酸激酶(CK)测定CECS1000和肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定CECT1000和甘油三酯(TG)测定CEHB1000和总胆固醇(TC)测定CEHA1000和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定CEHC1000和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定CEHD1000和葡萄糖(Glu)测定CEFA8000和总钙(Ca)测定CEJF8000和无机磷(P)测定CEKA8000和钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000
弥散功能检查	肺弥散功能检查—一口气法FJE01405或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	有创连续动脉血压监测	HAN05201	血浆D-二聚体(D-Dimer)测定	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
心脏彩色多普勒超声	EDFKA007	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902	下腔静脉彩色多普勒超声检查	CAJY1000
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	麻醉		治疗	EDCML001
气道阻力测定	FJB02401			氧气雾化吸入	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
心功能检查	普通二维超声心动图 EDFKA005或心电图踏 车负荷试验FKA04701 或冠状动脉CT三维成 像EBCKU002	手术		吞咽障碍电刺 激训练	ABKB0001
吞咽功能障碍检查	MAGGK001	显微镜下寰枕畸形枕 大孔区减压+枕颈固 定术	HBN56301	上肢综合运动 训练	MBDZX010
眼震电图检查	FFA03701	经颅内镜寰枕畸形减 压术	HBN56501	下肢综合运动 训练	MBBWA001
院内会诊	AADB0001	椎管减压术	HBQ56301	引流管更换	MBBXA001
治疗		治疗		重症监护	ABZG0001
		颅微动力系统	NBAA0000	药物	ABPB0001
药物		病理		止血药物	
神经营养药物				止吐药物	
		药物		抗血管痉挛药 物	
		激素		激素	
				神经营养药物	
				抗生素	

颅前窝底脑膜瘤

经鼻内镜前颅底肿瘤切除术

适用对象：	病种编码：	AS004			
	主要诊断：	颅前窝底脑膜瘤	ICD-10码：	D32.013/D42.0/C70.0	
	主要操作/主要治疗方式：	经鼻内镜前颅底肿瘤切除术	CCHI码：	HBN73601	
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：D32.013/D42.0/C70.0颅前窝底脑膜瘤疾病编码。 2. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需特殊处理，也不影响第一诊断的临床路径实施时，可以进入路径。				
出院标准：	1. 患者一般状态良好，饮食恢复。 2. 体温正常，各项化验无明显异常，切口愈合良好。 3. 复查头颅MRI显示肿瘤切除满意。 4. 临床医师认为患者符合出院标准时可以出院。				
最短住院日参考值：	10天				
变异条件：	1. 术中或术后继发手术部位或其他部位硬脑膜外血肿、硬脑膜下血肿、脑内血肿等并发症，严重者需要二次手术，导致住院时间延长、费用增加。 2. 术后继发脑脊液鼻漏、颅内感染和神经血管损伤等，导致住院时间延长。 3. 术后根据脑脊液漏的严重程度，可选择保守治疗，腰大池穿刺外引流术以及再次内镜下颅底修补术。				
再入院间隔时间：	14天				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查		/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	治疗		检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	氧气吸入	ABJA0001	中成药治疗	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	监测		头部磁共振增强成像	ECBBP001
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000或ABO血 型鉴定(反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定(正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定(反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000	心电监护	院内遥测心电监护 KKA28701 或无创心电监测 FKA05705	血常规	全血细胞计数+3分群 检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分 类检测CAAB1000
血浆纤维蛋白原测定	CAGD1000	监测		肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	全身麻醉	HAA42901	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000或肌酐(Cr) 测定CEEB8000或尿酸 (UA)测定CEEE8000
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧化 碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	手术		视力检查	普通远视力检查 FEA01701或普通近视 力检查FEA01702

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (Alb) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000	经鼻内镜前颅底肿瘤切除术	HBN73601	视野检查	普通视野计检查 FEA01709或视野检查-静态法FEA01710或 视野检查-动态法 FEA01711
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000或肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000或尿酸 (UA) 测定 CEEE8000	药物		治疗	
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs) 测定	乙型肝炎表面抗原定性 (HBsAg) 测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量 (HBsAg) 测定 CGLH1000	抑酸剂		换药	换药 (小) ABFA0001或 换药 (中) ABFA0002或 换药 (大) ABFA0003或 换药 (特大) ABFA0004
丙型肝炎抗体 (抗HCV) 测定	CGMA1000	抗癫痫药物		鼻腔填塞物取出术	HGC64601
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV) 测定	CGMF1000	抗菌药物		药物	
梅毒螺旋体抗体 (抗TP) 测定	CGPP1000	麻醉药		抑酸剂	
胸部X线摄影	EABJT001	激素		抗癫痫药物	
头部X线计算机体层 (CT) 平扫	EBABP001				
头部磁共振增强成像	ECBBP001				
鼻部鼻窦X线计算机体层 (CT) 平扫	EBAGF001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703				
视力检查	普通远视力检查 FEA01701或普通近视力 检查FEA01702				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
视野检查	普通视野计检查 FEA01709或视野检查-静态法FEA01710或视野检查-动态法FEA01711				
治疗					
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
运动心肺功能检查	FJE01702				
经皮穿刺桡动脉插管全脑血管造影术	EACBH002	治疗		治疗	
经皮穿刺股动脉插管全脑血管造影术	EACBH003	静脉输血	ABCD0001		
智力测定	智力成就责任问卷测评FAC04703或绘人智力测验FAC04705或中国韦氏成人智力测验FAC04712或中国韦氏幼儿智力量表测验(C-WYCSI)FAC04714或中国韦氏儿童智力量表测验(C-WISC)FAC04715或中国幼儿智力量表(ISCYC)测验FAC04716	药物		药物	
心功能测定	左心室收缩功能超声测定EDFKJ001或左心室舒张功能超声测定EDFKJ002				
肺功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404				
治疗					

颅前窝底脑膜瘤

显微镜下大静脉矢状窦脑膜瘤切除血管窦旁重建术

适用对象：	病种编码：	AS005			
	主要诊断：	颅前窝底脑膜瘤	ICD-10码：	D32.013/D42.0/C70.0	
	主要操作/主要治疗方式：	显微镜下大静脉矢状窦脑膜瘤切除血管窦旁重建术	CCHI码：	HBM74301	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：D32.013/D42.0/C70.0颅前窝底脑膜瘤疾病编码。 2. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需特殊处理，也不影响第一诊断的临床路径实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 患者一般状态良好，饮食恢复。 2. 体温正常，各项化验无明显异常，切口愈合良好。 3. 复查头颅MRI显示肿瘤切除满意。			
	最短住院日参考值：	10天			
	变异条件：	1. 术中或术后继发手术部位或其他部位硬脑膜外血肿、硬脑膜下血肿、脑内血肿等并发症，严重者需要二次手术，导致住院时间延长、费用增加。 2. 术后继发脑脊液鼻漏、颅内感染和神经血管损伤等，导致住院时间延长。 3. 术中发现肿瘤侵犯颅底骨质，为达到SimPson一级切除，可根据术中情况进行颅底骨质重建及修补。 4. 术中可用CUSA。			
	再入院间隔时间：	14天			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查		/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		中成药治疗	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	氧气吸入	ABJA0001	头部磁共振增强成像	ECBBP001
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000或ABO血 型鉴定(反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定(正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定(反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000	监测		血常规	全血细胞计数+3分群 检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分 类检测CAAB1000
血浆纤维蛋白原测定	CAGD1000	心电监护	院内遥测心电监护 KKA28701 或无创心电监测 FKA05705	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	麻醉		肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000或肌酐(Cr) 测定CEEB8000或尿酸 (UA)测定CEEE8000
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和二氧化 碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	全身麻醉	HAA42901	视力检查	普通远视力检查 FEA01701或普通近视 力检查FEA01702
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000	手术		视野检查	普通视野计检查 FEA01709或视野检查 -静态法FEA01710或 视野检查-动态法 FEA01711

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEE8000或肌酐 (Cr) 测定CEE8000或尿酸 (UA) 测定CEE8000	显微镜下大静脉矢状 窦脑膜瘤切除血管窦 旁重建术	HBM74301	治疗	
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs) 测定	乙型肝炎表面抗原定 性 (HBsAg) 测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg) 测定 CGLH1000	药物		换药	换药 (小) ABFA0001或 换药 (中) ABFA0002或 换药 (大) ABFA0003或 换药 (特大) ABFA0004
丙型肝炎抗体 (抗 HCV) 测定	CGMA1000	抑酸剂		药物	
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV) 测定	CGMF1000	抗癫痫药物		抑酸剂	
梅毒螺旋体抗体 (抗 TP) 测定	CGPP1000	抗菌药物		抗癫痫药物	
胸部X线摄影	EABJT001	麻醉药			
头部X线计算机体层 (CT) 平扫	EBABP001	激素			
头部磁共振增强成像	ECBBP001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703				
视力检查	普通远视力检查 FEA01701或普通近视 力检查FEA01702				
视野检查	普通视野计检查 FEA01709或视野检查 -静态法FEA01710或 视野检查-动态法 FEA01711				
治疗					
腰椎穿刺术	FVT06101				
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
运动心肺功能检查	FJE01702				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
经皮穿刺桡动脉插管全脑血管造影术	EACBH002	治疗		治疗	
经皮穿刺股动脉插管全脑血管造影术	EACBH003	静脉输血	ABCD0001		
智力测定	智力成就责任问卷测评FAC04703或绘人智力测验FAC04705或中国韦氏成人智力测验FAC04712或中国韦氏幼儿智力量表测验(C-WYCSI)FAC04714或中国韦氏儿童智力量表测验(C-WISC)FAC04715或中国幼儿智力量表(ISCYC)测验FAC04716	药物		药物	
心功能测定	左心室收缩功能超声测定EDFKJ001或左心室舒张功能超声测定EDFKJ002				
肺功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404				
治疗					
药物					

颅后窝脑膜瘤

颅底肿物切除术

适用对象：	病种编码：	AS006	
	主要诊断：	颅后窝脑膜瘤	ICD-10码： D32.013/D42.0/C70.0
	主要操作/主要治疗方式：	颅底肿物切除术	CCHI码：HBN73305
入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10：D32.013/D42.0/C70.0颅后窝脑膜瘤疾病编码。 2. 当患者同时并发其他疾病诊断时，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 切口愈合良好。 2. 无颅内感染。 3. 无需住院处理的并发症和/或合并症。		
最短住院日参考值：	10天		
变异条件：	1. 不耐受DSA检查的患者，可行CTA/MRV等。 2. 术中必要时使用内镜辅助，以减少神经、血管的损伤。 3. 术中可使用CUSA等。 4. 术中行脑干听觉诱发电位（BAEP），面神经、三叉神经监测，降低术中脑神经损伤几率。		
再入院间隔时间：	14天		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查		II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	中成药治疗	EBABP001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	血气分析	CEJM1000	颅脑磁共振成像	ECABA001
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000或ABO血 型鉴定(反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定(正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定(反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000或肌酐(Cr) 测定CEEB8000或尿酸 (UA)测定CEEE8000	头部磁共振增强成像	ECBBP001
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000或肌酐(Cr) 测定CEEB8000或尿酸 (UA)测定CEEE8000	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	治疗	
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和γ-谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000	换药	换药(小)ABFA0001或 换药(中)ABFA0002或 换药(大)ABFA0003或 换药(特大)ABFA0004
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	术中神经电生理监测	FCZ05101	腰椎穿刺术	FVT06101

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	治疗		静脉输液	ABCA0001
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	氧气吸入	ABJA0001	药物	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	腰椎穿刺术	FVT06101	激素	
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	体感诱发电位术中监护	KBS28701		
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	监测			
胸部X线摄影	EABJT001	生命体征监测	有创连续动脉血压监测HAN05201或有创血流动力学监测HAN05202或无创血流动力学监测HAN05701或全身麻醉下呼吸功能监测HAN05902		
临床操作数字减影(DSA)引导	EAZZZ003	麻醉			
头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001	全身麻醉	HAA42901		
头部磁共振增强成像	ECBBP001	/局部静脉内麻醉	HAB42201		
视力检查	普通远视力检查FEA01701或普通近视力检查FEA01702	手术			
视野检查	普通视野计检查FEA01709或视野检查-静态法FEA01710或视野检查-动态法FEA01711	颅底肿物切除术	HBN73305		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703	病理			
脑干听觉诱发电位检查	FBF03701	冷冻切片病理诊断	BCBA0001		
治疗		快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001		
		药物			
药物		抗菌药物			
抗菌药物		激素			
控制血糖药物		抑酸药物			
		降压药物			
		控制血糖药物			
		止吐药物			
		止血药物			
		镇痛药物			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
运动心肺功能检查	FJE01702				
三面镜眼底检查	FES01713	治疗		治疗	
步态分析检查	MABXA002	引流管更换	ABZG0001		
心功能测定	左心室收缩功能超声 测定EDFKJ001或左心 室舒张功能超声测定 EDFKJ002	静脉输血	ABCD0001	药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肺功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活 量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403或最大 通气量功能检查 FJE01404	药物			
药物		神经营养药物			

颅后窝脑膜瘤

显微镜下大静脉窦汇区脑膜瘤切除血管窦重建术

适用对象：	病种编码：	AS007	
	主要诊断：	颅后窝脑膜瘤	ICD-10 码:D32.013/D42.0/C70.0
	主要操作/主要治疗方式：	显微镜下大静脉窦汇区脑膜瘤切除血管窦重建术	CCHI码：HBM74302
入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10：D32.013/D42.0/C70.0颅后窝脑膜瘤疾病编码。 2. 当患者同时并发其他疾病诊断时，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 切口愈合良好。 2. 无颅内感染。 3. 无需住院处理的并发症和/或合并症。		
最短住院日参考值：	10天		
变异条件：	1. 不耐受DSA检查的患者，可行CTA/MRV等。 2. 术中必要时使用内镜辅助，以减少神经、血管的损伤。 3. 术中可使用CUSA等。 4. 术中行脑干听觉诱发电位（BAEP），面神经、三叉神经监测，降低术中颅神经损伤几率。		
再入院间隔时间：	14天		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
Ⅱ级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查		Ⅱ级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	中成药治疗	EBABP001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	血气分析	CEJM1000	颅脑磁共振成像	ECABA001
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000或ABO血 型鉴定(反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定(正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定(反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000或肌酐(Cr) 测定CEEB8000或尿酸 (UA)测定CEEE8000	治疗	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000或肌酐(Cr) 测定CEEB8000或尿酸 (UA)测定CEEE8000	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	换药	换药(小)ABFA0001或 换药(中)ABFA0002或 换药(大)ABFA0003或 换药(特大)ABFA0004
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和γ-谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000	腰椎穿刺术	FVT06101
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	术中神经电生理监测	FCZ05101	静脉输液	ABCA0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	治疗		药物	
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	氧气吸入	ABJA0001	激素	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	体感诱发电位术中监护	KBS28701		
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	监测			
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	生命体征监测	有创连续动脉血压监测HAN05201或有创血流动力学监测HAN05202或无创血流动力学监测HAN05701或全身麻醉下呼吸功能监测HAN05902		
胸部X线摄影	EABJT001	麻醉			
临床操作数字减影(DSA)引导	EAZZZ003	全身麻醉	HAA42901		
头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001	/局部静脉内麻醉	HAB42201		
头部磁共振增强成像	ECBBP001	手术			
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	显微镜下大静脉窦汇区脑膜瘤切除血管窦重建术	HBM74302		
脑干听觉诱发电位检查	FBF03701	病理			
治疗		冷冻切片病理诊断	BCBA0001		
		快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
药物		药物			
抗菌药物		抗菌药物			
控制血糖药物		激素			
		抑酸药物			
		降压药物			
		控制血糖药物			
		止吐药物			
		止血药物			
		镇痛药物			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
运动心肺功能检查	FJE01702				
三面镜眼底检查	FES01713	治疗		治疗	
步态分析检查	MABXA002	引流管更换	ABZG0001		
视野检查	普通视野计检查 FEA01709或视野检查-静态法FEA01710或 视野检查-动态法 FEA01711	静脉输血	ABCD0001	药物	
心功能测定	左心室收缩功能超声测定EDFKJ001或左心室舒张功能超声测定EDFKJ002	药物			
肺功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404	神经营养药物			
药物					

二、内分泌、营养及代谢疾病

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
BM009	1型糖尿病	血糖调整
BM010	1型糖尿病	社区诊治管理
BM011	2型糖尿病	社区诊治管理
BS001	结节性甲状腺肿	甲状腺全切术
BS002	结节性甲状腺肿	甲状腺次全切除术
BS003	结节性甲状腺肿	甲状腺部分切除术
BS004	甲状腺癌	甲状腺癌根治术
BS005	甲状腺癌	甲状腺癌扩大根治术
BS006	甲状腺良性肿瘤	甲状腺部分切除术
BS007	甲状腺良性肿瘤	甲状腺次全切除术
BS008	甲状腺肿瘤	甲状腺腺瘤摘除术

1型糖尿病

血糖调整

适用对象：	病种编码：	BM009			
	主要诊断：	1型糖尿病	ICD-10码：	E10.9	
	主要操作/主要治疗方式：	血糖调整	CCHI码：		
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10码：E10.9的1型糖尿病（不伴有并发症）患者。 2. 无合并症、并发症，需要对血糖进行调整的患者。				
出院标准：	1. 血糖控制趋于稳定即可出院。				
最短住院日：	7天				
变异条件：	1. 出现急性并发症（酮症酸中毒、低血糖昏迷、高渗性综合征、乳酸酸中毒等），则按照相应路径或指南进行救治，退出本路径。 2. 伴有增加控制血糖难度的合并症，延长住院时间，则按照相应路径或指南进行治疗。 3. 若必须同时服用对血糖或胰岛素及其类似物作用有影响的药物，或患者对胰岛素及其类似物制剂有过敏情况时。 4. 出现严重的糖尿病慢性并发症（糖尿病肾病、眼病、心血管、周围血管/神经系统并发症、皮肤病变、糖尿病足），或合并感染。 5. 住院期间发现新的病症需要明确诊断及进行治疗者，延长住院时间，则按相应路径或指南进行治疗。				
再入院间隔时间：	1周				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		治疗	CCHI码	药物	
II级护理	ACAB0001			胰岛素及其类似物	
检查					
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000				
尿常规化学分析	CCAA2000				
粪便常规检查	CCCA3000				
尿酮体定性试验	CCAM2000				
血酮体(KET)测定	CEZA1000				
血糖定量测定	CCAL2000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000或肌酐(Cr) 测定CEEB8000或尿酸 (UA)测定CEEE8000				
糖化血红蛋白 (HbA1c)测定	CEBD1000				
糖化血清蛋白(GSP) 测定	CEBC1000				
血脂四项	甘油三酯(TG)测定 CEHB1000 和总胆固醇(TC)测定 CEHA1000 和高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)测定 CEHC1000 和低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)测定 CEHD1000				
血气分析	CEJM1000				
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化 碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000				
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和γ-谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000				
胸部X线摄影	EABJT001				
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001				
经腹部妇科B超检查 (女性)	EDBTA001				
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000				
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703				
抗谷氨酸脱羧酶抗体 (GAD)检测	CGGL1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
抗胰岛细胞抗体 (IAA) 检测测定	CGEE1000				
抗酪氨酸磷酸酶 (IA2) 抗体检测	CGGM1000				
甲状腺功能检查	甲状腺摄碘试验 EEGDC001或甲状腺激素抑制试验EEGDC002 或游离甲状腺素 (FT4) 测定CEQL1000 或促甲状腺激素 (TSH) 测定CEQD1000 或游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3) 测定 CEQM1000或三碘甲状腺原氨酸 (T3) 测定 CEQJ1000或甲状腺素 (T4) 测定CEQH1000				
红细胞沉降率 (ESR) 测定	CAAJ1000				
超敏C反应蛋白 (hs-CRP) 测定	CEAU1000				
抗甲状腺抗体	抗甲状腺微粒体抗体 (TMAb) 测定CGEN1000 或抗甲状腺过氧化物酶抗体 (TPOAb) 测定 CGEP1000或抗甲状腺球蛋白抗体 (TGAbs) 测定 CGEM1000				
尿微量蛋白或尿蛋白白/肌酐比	肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000				
尿蛋白定量	CCAF2000				
眼底检查	免散瞳眼底检查 FES01704或非散瞳直接检眼镜眼底检查 FES01705或前置镜眼底检查FES01706或间接眼底镜检查 FES01707或三面镜眼底检查FES01713				
普通二维超声心动图	EDFKA005				
颈动脉彩色多普勒超声检查	EDCLF001				
下肢动脉彩色多普勒超声检查	EDCL5001				
神经传导速度	运动神经传导速度测定FCA03704或感觉神经传导速度测定 FCA03705				
体感诱发电位检查	上肢体感诱发电位检查FCZ03704或下肢体感诱发电位检查 FCZ03705				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
膀胱残余尿量B超测定	EDBRG001				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		治疗		药物	
淀粉酶 (AMY) 测定	CEDC8000			胰岛素及其类似物样生长因子	
胰腺CT	上腹部X线计算机体层 (CT) 平扫EBAQT001 或下腹部X线计算机体层 (CT) 平扫EBAQT002				
免疫球蛋白测定	免疫球蛋白G (IgG) 定量测定CGAT1000或免疫球蛋白M (IgM) 定量测定CGAU1000或免疫球蛋白D (IgD) 定量测定CGAV1000或免疫球蛋白E (IgE) 定量测定CGAW1000或分泌型免疫球蛋白A测定CGAX1000或免疫球蛋白亚类定量测定CGBA1000或免疫球蛋白轻链测定CGBB8000或免疫球蛋白游离轻链测定CGBC8000或B细胞膜表面免疫球蛋白测定CGBH1000或脱敏免疫球蛋白IgG测定CGUU1000或脱敏免疫球蛋白IgG4测定CGIV1000				
总补体 (CH50) 测定	CGAA1000				
抗核抗体 (ANA) 测定	CGDB1000				
ENA抗体谱六项测定	CGDC1000				
抗肾上腺抗体	抗肾上腺细胞抗体 (AAA) 检测CGEH1000 或抗肾上腺皮质抗体检测CGGK1000				
抗卵巢抗体测定	CGET1000				
抗甲状旁腺抗体测定	CGHY1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
内分泌腺体功能评估 (肾上腺激素)	促肾上腺皮质激素 (ACTH) 测定CEQG1000 或促肾上腺皮质激素 释放激素 (CRF) 兴奋 试验FDA04203或促肾 上腺皮质激素 (ACTH) 兴奋试验-快速法 FDF04201或促肾上腺 皮质激素 (ACTH) 兴奋 试验-传统法 FDF04901				
/内分泌腺体功能评 估(性激素)	/雌酮测定CERG1000 或雌二醇 (E2) 测定 CERH1000或雌三醇 (E3) 测定CERJ1000或 非结合型雌三醇 (UE3) 测定CERK1000 或孕酮 (P) 测定 CERL1000或睾酮 (T) 测定CERM1000或双氢 睾酮 (DHT) 测定 CERN1000或17 α 羟孕 酮测定CERP1000或6- 酮前列腺素F1 α 测定 CERQ1000或人绒毛膜 促性腺激素 (HCG) 测 定CERR8000或 β 人绒 毛膜促性腺激素 (β - HCG) 测定CERS1000或 β 人游离绒毛膜促性 腺激素 (free β -HCG) 测定CERT1000或性激 素结合球蛋白 (SHBG) 测定CERU1000				
/内分泌腺体功能评 估(垂体激素)	抗利尿激素 (ADH) 测 定CEQA1000或泌乳素 (PRL) 测定CEQB8000 或生长激素 (GH) 测定 CEQC8000或促甲状腺 激素 (TSH) 测定 CEQD1000或卵泡刺激 素 (FSH) 测定 CEQE8000或促黄体生 成素 (LH) 测定 CEQF8000或促肾上腺 皮质激素 (ACTH) 测定 CEQG1000				
胃肠排空试验-钡餐 透视法	EACPA001				
胰岛素及其类似物释 放试验	静脉推注葡萄糖胰岛 素及其类似物释放试 验-延长法FDE04204 或口服葡萄糖胰岛素 及其类似物释放试验 —3小时法FDE04405 或口服葡萄糖胰岛素 及其类似物释放试验 —5小时法FDE04406				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
C肽释放实验	静脉推注葡萄糖C肽释放试验-延长法 FDE04206 3小时口服葡萄糖C肽释放试验FDE04408或 5小时口服葡萄糖C肽释放试验FDE04409或 馒头餐C肽释放试验 FDE04410				
胃镜	电子胃镜检查 FPB01602和消化道内 镜活检术FPA07601或 消化内镜检查麻醉术 FPA42201				

1型糖尿病
社区诊治管理

适用对象：	病种编码：	BM010			
	主要诊断：	1型糖尿病	ICD-10码：	E10.9	
	主要操作/主要治疗方式：	社区诊治管理	CCHI码：		
	纳入标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10码：E10.9的1型糖尿病患者。 2. 无合并症、并发症。			
	考核标准：	1. 每周至少血糖检查5-7次，或每天至少尿糖1次； 2. 每年完成糖化血红蛋白测定2-4次、肝肾功能血脂1-2次、尿常规4次。 3. 规范使用胰岛素及其类似物药物			
	最短住院日：	7天			
	变异条件：	1. 出现急性并发症（酮症酸中毒、低血糖昏迷、高渗性昏迷、乳酸酸中毒等）； 2. 伴有增加控制血糖难度的合并症，延长住院时间，则按照相应路径或指南进行治疗。 3. 若必须同时服用对血糖或胰岛素及其类似物作用有影响的药物，或患者对胰岛素及其类似物制剂有过敏情况时，导致住院时间延长、住院费用增加。 4. 出现严重的糖尿病慢性并发症（糖尿病肾病、眼病、心血管、周围血管/神经系统并发症、皮肤病变、糖尿病足），或合并感染，导致住院时间延长、住院费用增加。 5. 住院期间发现新的病症需要明确诊断及进行治疗者，延长住院时间，则按相应路径或指南进行治疗。			
	再入院间隔时间：	一周			

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
检查		护理		药物	
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000	I级护理	ACAC0001	胰岛素及其类似物	
糖化血红蛋白 (HbA1c) 测定	CEBD1000				
尿常规化学分析	CCAA2000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肝功能检查	内氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000				
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000				
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703				
肌酐(Cr)测定	CEEB8000				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
血气分析	CEJM1000	补液、纠酸		酸碱平衡调节药	
24小时尿蛋白定量	CCAF2000	饮食管理、降糖、降压、减少蛋白尿		ACEI（血管紧张素转换酶抑制剂）或ARB（血管紧张素受体阻断剂）	
腹部彩超检查	胃肠充盈造影B超检查EDBPA002和肝胆胰脾彩色多普勒超声检查EDCQT001	改善微循环、抗凝、调脂		调节血脂药及抗动脉粥样硬化药	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
心功能检查	普通二维超声心动图 EDFKA005或心电图踏 车负荷试验FKA04701 或冠状动脉CT三维成 像EBCKU002				

2型糖尿病
社区诊治管理

适用对象：	病种编码：	BM011			
	主要诊断：	2型糖尿病		ICD-10码：	E11.9
	主要操作/主要治疗方式：	社区诊治管理		CCHI码：	
	纳入标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10码：E11.9的2型糖尿病患者。 2. 无合并症、并发症。			
	考核标准：	1. 血糖检查至少每月一次；使用胰岛素及其类似物者，至少每周一次。 2. 每年完成糖化血红蛋白测定至少2次、肝肾功能、血脂一年至少2次、尿常规一年至少4次。			
	最短住院日：	7天			
	变异条件：	1. 出现急性并发症（酮症酸中毒、低血糖昏迷、高渗性综合征、乳酸酸中毒等），则按照相应路径或指南进行救治，退出本路径。 2. 伴有增加控制血糖难度的合并症，延长住院时间，则按照相应路径或指南进行治疗。 3. 若必须同时服用对血糖或胰岛素及其类似物作用有影响的药物，或患者对胰岛素及其类似物制剂有过敏情况时，导致住院时间延长、住院费用增加。 4. 出现严重的糖尿病慢性并发症（糖尿病肾病、眼病、心血管、周围血管/神经系统并发症、皮肤病变、糖尿病足），或合并感染，导致住院时间延长、住院费用增加。 5. 住院期间发现新的病症需要明确诊断及进行治疗者，延长住院时间，则按相应路径或指南进行治疗。			
	再入院间隔时间：	1周			

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
检查		治疗		药物	
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000			人胰岛素及其类似物注射液	
糖化血红蛋白 (HbA1c) 测定	CEBD1000				
尿常规化学分析	CCAA2000			他汀类、贝特类调脂药	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(Alb)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000				
血脂四项	总胆固醇(TC)测定CEHA1000和甘油三酯(TG)测定CEHB1000和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定CEHC1000和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定CEHD1000				
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000和 β 2微球蛋白(β 2-MG)测定CEAS8000				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703				
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目:					
检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
血气分析	CEJM1000	补液、纠酸		ACEI(血管紧张素转换酶抑制剂)或ARB(血管紧张素受体阻断剂)	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肌酐(Cr)测定	CEEB8000	饮食管理、降糖、降压、减少蛋白尿		调节血脂药及抗动脉粥样硬化药	
24小时尿蛋白定量	CCAF2000	抗凝、调脂			
腹部彩超检查	胃肠充盈造影B超检查EDBPA002和肝胆胰脾彩色多普勒超声检查EDCQT001				
心功能检查	普通二维超声心动图EDFKA005或心电图踏车负荷试验FKA04701或冠状动脉CT三维成像EBCKU002				

结节性甲状腺肿

甲状腺全切术

适用对象：	病种编码：	BS001			
	主要诊断：	结节性甲状腺肿	ICD-10码：	E04.902	
	主要操作/主要治疗方式：	甲状腺全切术	CCHI码：	HDC75301	
	入院标准：	1. 第一诊断符合ICD10：E04.902结节性甲状腺肿疾病编码。 2. 年龄≤70岁。 3. 需要进行手术治疗。 4. 当患者同时具有其他疾病诊断时，但在住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。 5. 对具有甲状腺功能亢进、甲状腺癌变可能等病情复杂的病例，不进入路径。			
	出院标准：	1. 一般情况良好。 2. 无引流管或引流管拔除。 3. 可门诊拆线，切口愈合良好。			
	最短住院日参考值：	5天			
	变异条件：	1. 因患者术后出现严重并发症而延期出院。 2. 术后诊断甲状腺机能亢进或甲状腺恶性肿瘤等情况。			
	再入院间隔时间：	2周			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	II级护理	ACAB0001
检查		检查			
全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000			三碘甲状原氨酸(T ₃)测定	CEQJ1000
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	治疗		甲状腺素(T ₄)测定	CEQH1000
尿常规化学分析	CCAA2000	氧气吸入	ABJA0001	促甲状腺激素(TSH)测定	CEQD1000
三碘甲状原氨酸(T ₃)测定	CEQJ1000	院内遥测心电监护	KKA28701	甲状腺球蛋白(TG)测定	CEQQ1000
甲状腺素(T ₄)测定	CEQH1000	监测		甲状旁腺激素(PTH)测定	CEQR1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
促甲状腺激素 (TSH) 测定	CEQD1000			抗甲状腺过氧化物酶抗体 (TPOAb) 测定	CGEP1000
甲状腺球蛋白 (TG) 测定	CEQQ1000	麻醉		治疗	
甲状旁腺激素 (PTH) 测定	CEQR1000	全身麻醉	HAA42901	换药	换药 (中) ABFA0002或换药 (大) ABFA0003
抗甲状腺过氧化物酶抗体 (TPOAb) 测定	CGEP1000	手术		药物	
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000	甲状腺全切术	HDC75301		
生化常规检查	葡萄糖 (Glu) 测定 CEFA8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000和无机磷 (P) 测定CEKA8000和钾 (K) 测定CEJA8000和钠 (Na) 测定CEJB8000和氯 (Cl) 测定CEJC8000	病理			
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (Alb) 测定CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定CECD8000	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感染标本冷冻切片病理诊断BCBB0001		
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001		
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间 (APTT) 测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间 (PT) 测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	药物			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000	静脉补液			
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000				
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
咽喉功能检查	纤维喉镜检查 FGM01602或电子纤维喉镜检查FGM01603				
院内会诊	AADB0001				
气管相X线摄影	EABJC001				
胸部X线摄影	EABJT001				
十二通道常规心电图检查	FKA03703				
甲状腺彩色多普勒超声检查	EDCDC001				
治疗					
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
治疗		治疗		治疗	
药物		药物		药物	

结节性甲状腺肿
甲状腺次全切除术

适用对象：	病种编码：	BS002			
	主要诊断：	结节性甲状腺肿		ICD-10码：	E04.902
	主要操作/主要治疗方式：	甲状腺次全切除术		CCHI码：	HDC73306
	入院标准：	1. 第一诊断符合ICD10：E04.902结节性甲状腺肿疾病编码。 2. 年龄≤70岁。 3. 需要进行手术治疗。 4. 当患者同时具有其他疾病诊断时，但在住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。 5. 对具有甲状腺功能亢进、甲状腺癌变可能等病情复杂的病例，不进入路径。			
	出院标准：	1. 一般情况良好。 2. 无引流管或引流管拔除。 3. 可门诊拆线，切口愈合良好。			
	最短住院日参考值：	5天			
	变异条件：	1. 因患者术后出现严重并发症而延期出院。 2. 术后诊断甲状腺机能亢进或甲状腺恶性肿瘤等情况。			
	再入院间隔时间：	2周			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	II级护理	ACAB0001
检查		检查			
全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000			三碘甲状原氨酸(T ₃)测定	CEQJ1000
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	治疗		甲状腺素(T ₄)测定	CEQH1000
尿常规化学分析	CCAA2000	氧气吸入	ABJA0001	促甲状腺激素(TSH)测定	CEQD1000
三碘甲状原氨酸(T ₃)测定	CEQJ1000	院内遥测心电图监护	KKA28701	甲状腺球蛋白(TG)测定	CEQQ1000
甲状腺素(T ₄)测定	CEQH1000	监测		甲状旁腺激素(PTH)测定	CEQR1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
促甲状腺激素 (TSH) 测定	CEQD1000			抗甲状腺过氧化物酶抗体 (TPOAb) 测定	CGEP1000
甲状腺球蛋白 (TG) 测定	CEQQ1000	麻醉		治疗	
甲状旁腺激素 (PTH) 测定	CEQR1000	颈丛神经阻滞麻醉	HAF42101	换药	换药 (中) ABFA0002或换药 (大) ABFA0003
抗甲状腺过氧化物酶抗体 (TPOAb) 测定	CGEP1000	/全身麻醉	HAA42901	药物	
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000	手术			
生化常规检查	葡萄糖 (Glu) 测定 CEFA8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000和无机磷 (P) 测定CEKA8000和钾 (K) 测定 CEJA8000和钠 (Na) 测定CEJB8000和氯 (Cl) 测定CEJC8000	甲状腺次全切除术	HDC73306		
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000	病理			
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感染标本冷冻切片病理诊断BCBB0001		
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间 (APTT) 测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间 (PT) 测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000	药物			
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	静脉补液			
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
咽喉功能检查	纤维喉镜检查 FGM01602或电子纤维喉镜检查FGM01603				
院内会诊	AADB0001				
颈椎X线摄影	EABVH001				
胸部X线摄影	EABJT001				
十二通道常规心电图检查	FKA03703				
甲状腺彩色多普勒超声检查	EDCDC001				
治疗					
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目:					
检查		检查		检查	
治疗		治疗		治疗	
药物		药物		药物	

结节性甲状腺肿

甲状腺部分切除术

适用对象：	病种编码：	BS003			
	主要诊断：	结节性甲状腺肿		ICD-10码：	E04.902
	主要操作/主要治疗方式：	甲状腺部分切除术		CCHI码：	HDC73304
入院标准：		1. 第一诊断符合ICD10：E04.902结节性甲状腺肿疾病编码。 2. 年龄≤70岁。 3. 需要进行手术治疗。 4. 当患者同时具有其他疾病诊断时，但在住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。 5. 对具有甲状腺功能亢进、甲状腺癌变可能等病情复杂的病例，不进入路径。			
出院标准：		1. 一般情况良好。 2. 无引流管或引流管拔除。 3. 可门诊拆线，切口愈合良好。			
最短住院日参考值：		5天			
变异条件：		1. 因患者术后出现严重并发症而延期出院。 2. 术后诊断甲状腺机能亢进或甲状腺恶性肿瘤等情况。			
再入院间隔时间：		2周			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	II级护理	ACAB0001
检查		检查			
全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000			三碘甲状原氨酸(T ₃)测定	CEQJ1000
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	治疗		甲状腺素(T ₄)测定	CEQH1000
尿常规化学分析	CCAA2000	氧气吸入	ABJA0001	促甲状腺激素(TSH)测定	CEQD1000
三碘甲状原氨酸(T ₃)测定	CEQJ1000	院内遥测心电监护	KKA28701	甲状腺球蛋白(TG)测定	CEQQ1000
甲状腺素(T ₄)测定	CEQH1000	监测		甲状旁腺激素(PTH)测定	CEQR1000
促甲状腺激素(TSH)测定	CEQD1000			抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)测定	CGEP1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
甲状腺球蛋白 (TG) 测定	CEQQ1000	麻醉		治疗	
甲状旁腺激素 (PTH) 测定	CEQR1000	颈丛神经阻滞麻醉	HAF42101	换药	换药 (中) ABFA0002或 换药 (大) ABFA0003
抗甲状腺过氧化物酶 抗体 (TPOAb) 测定	CGEP1000	/全身麻醉	HAA42901	药物	
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000	手术			
生化常规检查	葡萄糖 (Glu) 测定 CEFA8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000和无机 磷 (P) 测定CEKA8000 和钾 (K) 测定 CEJA8000和钠 (Na) 测 定CEJB8000和氯 (Cl) 测定CEJC8000	甲状腺部分切除术	HDC73304		
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红 素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶 (GGT) 测 定CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和 白蛋白 (Alb) 测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶 (ALP) 测定 CECD8000	病理			
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEE8000和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感 染标本冷冻切片病理 诊断BCBB0001		
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间 (APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间 (PT) 测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	快速石蜡切片病理诊 断	BCBC0001		
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs) 测定	乙型肝炎表面抗原定 性 (HBsAg) 测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg) 测定 CGLH1000	药物			
丙型肝炎抗体 (抗 HCV) 测定	CGMA1000	静脉补液			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
咽喉功能检查	纤维喉镜检查 FGM01602或电子纤维 喉镜检查FGM01603				
院内会诊	AADB0001				
颈椎X线摄影	EABVH001				
胸部X线摄影	EABJT001				
十二通道常规心电图 检查	FKA03703				
甲状腺彩色多普勒超 声检查	EDCDC001				
治疗					
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目:					
检查		检查		检查	
治疗		治疗		治疗	
药物		药物		药物	

甲状腺癌
甲状腺癌根治术

适用对象：	病种编码：	BS004			
	主要诊断：	甲状腺癌		ICD-10码：C73	
	主要操作/主要治疗方式：	甲状腺癌根治术		CCHI码：HDC77301	
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：C73甲状腺癌疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。				
出院标准：	1. 伤口愈合好。 2. 没有需要住院处理的并发症。				
最短住院日参考值：	15天				
变异条件：	1. 有影响手术的合并症，需要进行相关的诊断和治疗。 2. 不能耐受规范根治性手术的患者，酌情适当缩小手术范围。 3. 晚期已有远处转移的PTC及FTC患者，行全甲状腺切除术，术后给予131I治疗。 4. 甲状腺癌通常对外照射放疗不敏感。但对于有术中无法彻底切除的残余癌灶者，不能经手术或131I治疗的局部晚期患者，以及有骨和肺转移灶患者，可考虑采用外照射放疗。				
再入院间隔时间：	1周				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查			ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗			
粪便常规检查	CCCA3000	氧气吸入	ABJA0001	治疗	
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	导尿管留置	ABHA0002	换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000	监测		病理	
电解质测定	钾(K)测定 CEJA8000和钠(Na) 测定CEJB8000和氯 (Cl)测定CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2)测定 CEJD1000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	院内遥测心电监护	KKA28701	冷冻切片病理诊断	特异性感染标本冷冻 切片病理诊断 BCBB0001或快速石蜡 切片病理诊断 BCBC0001
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	麻醉		药物	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000或ABO血 型鉴定(反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定(正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定(反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000	全身麻醉	HAA42901	抗菌药物	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	手术		静脉补液	
离子钙(Ca2+)测定	CEJG1000	甲状腺癌根治术	HDC77301		
无机磷(P)测定	CEKA8000	甲状旁腺细胞移植术	HDD89302		
三碘甲状原氨酸(T ₃) 测定	CEQJ1000	喉返神经解剖术	喉返神经探查术 FCL09301		
甲状腺素(T ₄)测定	CEQH1000	病理			
游离三碘甲状原氨酸 (FT3)测定	CEQM1000				
游离甲状腺素(FT4) 测定	CEQL1000	药物			
抗甲状腺球蛋白抗体 (TGAb)测定	CGEM1000	抗菌药物			
促甲状腺激素(TSH) 测定	CEQD1000	静脉补液			
甲状腺球蛋白(TG)测 定	CEQQ1000				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
甲状旁腺激素 (PTH) 测定	CEQR1000				
抗甲状腺过氧化物酶抗体 (TPOAb) 测定	CGEP1000				
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs) 测定	乙型肝炎表面抗原定性 (HBsAg) 测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量 (HBsAg) 测定 CGLH1000				
丙型肝炎抗体 (抗HCV) 测定	CGMA1000				
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV) 测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体 (抗TP) 测定	CGPP1000				
甲状腺彩色多普勒超声检查	EDCDC001				
颈椎X线摄影	EABVH001				
胸部X线摄影	EABJT001				
喉镜检查	直达喉镜检查 FGM01401或间接喉镜检查FGM01402或支撑喉镜检查FGM01403或频闪喉镜检查 FGM01601或纤维喉镜检查FGM01602				
普通病理会诊	疑难病理读片会诊 AADCO001或同步远程病理会诊AADD0001或非同步远程病理会诊AADD0002				
治疗					
导尿管留置	ABHA0002				
病理					
甲状腺针吸细胞活检查	FDC07101				
/活检组织病理诊断	BCAB0001				
药物					
抗菌药物					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
颈部磁共振成像	ECAHY001			血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
颈部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBHY001			肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001	治疗		肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000
上消化道X线造影	EACPB001			电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和总钙(Ca)测定CEJF8000
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404			葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000
普通二维超声心动图	EDFKA005			胸部X线摄影	EABJT001
院内会诊	AADB0001	病理		离子钙(Ca ²⁺)测定	CEJG1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
治疗		冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感 染标本冷冻切片病理 诊断BCBB0001	无机磷(P)测定	CEKA8000
				三碘甲状原氨酸(T3) 测定	CEQJ1000
药物		药物		甲状腺素(T4)测定	CEQH1000
				游离三碘甲状原氨酸 (FT3)测定	CEQM1000
				游离甲状腺素(FT4) 测定	CEQL1000
				抗甲状腺球蛋白抗体 (TGAb)测定	CGEM1000
				促甲状腺激素(TSH) 测定	CEQD1000
				甲状腺球蛋白(TG)测 定	CEQQ1000
				甲状旁腺激素(PTH) 测定	CEQR1000
				抗甲状腺过氧化物酶 抗体(TPOAb)测定	CGEP1000
				监测	
				院内遥测心电监护	KKA28701
				病理	
				免疫组织化学染色诊 断	BEBA0001
				药物	
				止痛药物	

甲状腺癌

甲状腺癌扩大根治术

适用对象：	病种编码：	BS005			
	主要诊断：	甲状腺癌		ICD-10码：	C73
	主要操作/主要治疗方式：	甲状腺癌扩大根治术		CCHI码：	HDC77302
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：C73甲状腺癌疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。				
出院标准：	1. 伤口愈合好。 2. 没有需要住院处理的并发症。				
最短住院日参考值：	15天				
变异条件：	1. 有影响手术的合并症，需要进行相关的诊断和治疗。 2. 不能耐受规范根治性手术的患者，酌情适当缩小手术范围。 3. 晚期已有远处转移的PTC及FTC患者，行全甲状腺切除术，术后给予131I治疗。 4. 甲状腺癌通常对外照射放疗不敏感。但对于有术中无法彻底切除的残余癌灶者，不能经手术或131I治疗的局部晚期患者，以及有骨和肺转移灶患者，可考虑采用外照射放疗。				
再入院间隔时间：	1周				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
Ⅱ级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查			ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗			
粪便常规检查	CCCA3000	氧气吸入	ABJA0001	治疗	
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	导尿管留置	ABHA0002	换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000	监测		病理	
电解质测定	钾(K)测定 CEJA8000和钠(Na) 测定CEJB8000和氯 (Cl)测定CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2)测定 CEJD1000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	院内遥测心电监护	KKA28701	冷冻切片病理诊断	特异性感染标本冷冻 切片病理诊断 BCBB0001或快速石蜡 切片病理诊断 BCBC0001
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	麻醉		药物	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000或ABO血 型鉴定(反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定(正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定(反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMP1000	全身麻醉	HAA42901	抗菌药物	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	手术		静脉补液	
离子钙(Ca2+)测定	CEJG1000	甲状腺癌扩大根治术	HDC77302		
无机磷(P)测定	CEKA8000	甲状旁腺细胞移植术	HDD89302		
降钙素原(PCT)检测	CEQT1000	喉返神经探查术	FCL09301		
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	病理			
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	冷冻切片病理诊断	BCBA0001		
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	药物			
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000	抗菌药物			
甲状腺彩色多普勒超 声检查	EDCDC001	静脉补液			
三碘甲状原氨酸(T ₃) 测定	CEQJ1000				
甲状腺素(T ₄)测定	CEQH1000				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
促甲状腺激素 (TSH) 测定	CEQD1000				
甲状腺球蛋白 (TG) 测定	CEQQ1000				
甲状旁腺激素 (PTH) 测定	CEQR1000				
抗甲状腺过氧化物酶抗体 (TPOAb) 测定	CGEP1000				
游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3) 测定	CEQM1000				
游离甲状腺素 (FT4) 测定	CEQL1000				
抗甲状腺球蛋白抗体 (TGAb) 测定	CGEM1000				
颈椎X线摄影	EABVH001				
胸部X线摄影	EABJT001				
喉镜检查	直达喉镜检查 FGM01401或间接喉镜检查 FGM01402或支撑喉镜检查 FGM01403或频闪喉镜检查 FGM01601或纤维喉镜检查 FGM01602或电子纤维喉镜检查 FGM01603				
普通病理会诊	疑难病理读片会诊 AADC0001或同步远程病理会诊 AADD0001或非同步远程病理会诊 AADD0002				
治疗					
导尿管留置	ABHA0002				
病理					
甲状腺针吸细胞活术	ABHA0002				
/活检组织病理诊断	BCAB0001				
药物	FDC07101				
抗菌药物	BCAB0001				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
颈部X线计算机体层 (CT) 平扫	EBAHY001			血常规	全血细胞计数+3分群检测 CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测 CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
颈部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBHY001	治疗		肝功能检查	内氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(Alb)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001			肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000
上消化道X线造影	EACPB001			电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和总钙(Ca)测定CEJF8000
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404			葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一口气法FJE01405或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406			胸部X线摄影	EABJT001
普通二维超声心动图	EDFKA005	病理		离子钙(Ca2+)测定	CEJG1000
PET/CT肿瘤显像	PET/CT肿瘤局部显像EEFZX001或PET/CT肿瘤全身显像EEFZY001	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断BCBA0001或特异性感染标本冷冻切片病理诊断BCBB0001	无机磷(P)测定	CEKA8000
治疗		药物		三碘甲状原氨酸(T3)测定	CEQJ1000
				甲状腺素(T4)测定	CEQH1000
药物				促甲状腺激素(TSH)测定	CEQD1000
				甲状腺球蛋白(TG)测定	CEQQ1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
				甲状旁腺激素 (PTH) 测定	CEQR1000
				抗甲状腺过氧化物酶抗体 (TPOAb) 测定	CGEP1000
				甲状腺彩色多普勒超声检查	EDCDC001
				游离三碘甲状原氨酸 (FT3) 测定	CEQM1000
				游离甲状腺素 (FT4) 测定	CEQL1000
				抗甲状腺球蛋白抗体 (TGAbs) 测定	CGEM1000
				颈部X线计算机体层 (CT) 平扫	EBAHY001
				颈部X线计算机体层 (CT) 增强扫描	EBBHY001
				胸部X线计算机体层 (CT) 平扫	EBAJT001
				治疗	
				监测	
				院内遥测心电监护	KKA28701
				病理	
				免疫组织化学染色诊断	BEBA0001
				药物	
				止痛药物	

甲状腺良性肿瘤

甲状腺部分切除术

适用对象：	病种编码：	BS006	
	主要诊断：	甲状腺良性肿瘤	ICD-10码：D34
	主要操作/主要治疗方式：	甲状腺部分切除术	CCHI码：HDC73304
	入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10：D34甲状腺良性编码。 2. 需要进行手术治疗。 3. 当患者同时具有其他疾病诊断时，但在住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。 4. 对具有甲状腺功能亢进、甲状腺癌变可能等病情复杂的病例，不进入路径。	
	出院标准：	1. 一般情况良好。 2. 无引流管或引流管拔除。 3. 可门诊拆线，切口愈合良好。	
	最短住院日参考值：	5天	
	变异条件：	1. 因患者术后出现严重并发症而延期出院。 2. 术后诊断甲状腺机能亢进或甲状腺恶性肿瘤等情况。	
	再入院间隔时间：	2周	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
					ACAB0001
检查		检查		检查	
全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000			三碘甲状原氨酸(T ₃)测定	CEQJ1000
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	治疗		甲状腺素(T ₄)测定	CEQH1000
尿常规化学分析	CCAA2000	氧气吸入	ABJA0001	促甲状腺激素(TSH)测定	CEQD1000
游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定	CEQM1000	院内遥测心电监护	KKA28701	甲状腺球蛋白(TG)测定	CEQQ1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
游离甲状腺素 (FT4) 测定	CEQL1000	监测		甲状旁腺激素 (PTH) 测定	CEQR1000
促甲状腺激素 (TSH) 测定	CEQD1000			抗甲状腺过氧化物酶抗体 (TPOAb) 测定	CGEP1000
甲状腺球蛋白 (TG) 测定	CEQQ1000	麻醉		游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3) 测定	CEQM1000
甲状旁腺激素 (PTH) 测定	CEQR1000	颈丛神经阻滞麻醉	HAF42101	游离甲状腺素 (FT4) 测定	CEQL1000
抗甲状腺过氧化物酶抗体 (TPOAb) 测定	CGEP1000	/全身麻醉	HAA42901	抗甲状腺球蛋白抗体 (TGAb) 测定	CGEM1000
三碘甲状腺原氨酸 (T ₃) 测定	CEQJ1000	手术		治疗	
甲状腺素 (T ₄) 测定	CEQH1000	甲状腺部分切除术	HDC73304		
抗甲状腺球蛋白抗体 (TGAb) 测定	CGEM1000	甲状旁腺细胞移植术	HDD89302	换药	换药 (大) ABFA0003或 换药 (中) ABFA0002
生化常规检查	葡萄糖 (Glu) 测定 CEFA8000和总钙 (Ca) 测定 CEJF8000和无机磷 (P) 测定 CEKA8000和钾 (K) 测定 CEJA8000和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测定 CEJC8000	喉返神经探查术	FCL09301	皮内注射	ABAA0001
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定 CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定 CEAA8000和白蛋白 (Alb) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000	病理		皮下注射	ABAB0001
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000和尿酸 (UA) 测定 CEEE8000	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感染标本冷冻切片病理诊断 BCBB0001	肌肉注射	ABAC0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	快速石蜡切片病理诊 断	BCBC0001	静脉注射	ABAD0001
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	药物		静脉输液	ABCA0001
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000			空气压缩泵雾化吸入	ABKC0001
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000			引流管更换	ABZG0001
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000			颈部综合运动训练	MBBHY001
声带功能检查对应咽 喉功能检查	纤维喉镜检查 FGM01602或电子纤维 喉镜检查FGM01603			药物	
间接喉镜检查	FGM01402			化痰药物	
胸部X线摄影	EABJT001				
十二通道常规心电图 检查	FKA03703				
甲状腺彩色多普勒超 声检查	EDCDC001				
院内会诊	AADB0001				
治疗					
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
颈椎X线摄影	EABVH001				
治疗		治疗		治疗	
胰岛素及其类似物皮 下注射	HDE48101	胰岛素及其类似物皮 下注射	HDE48101	术中能量平台使用 (超声刀)	
药物		静脉输血	ABCD0001	双极电凝止血术	
甲状腺激素及抗甲状 腺类药		药物		外周静脉营养输注	ABCG0001
抗生素		抗生素		胃管置管术	ABGB0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
		钙剂		清洁灌肠	ABGE0004
		糖皮质激素		人工辅助通便	ABGG0001
				导尿	ABHA0001
				导尿管留置	ABHA0002
				氧气吸入	ABJA0001
				擦浴降温	ABLA0001
				危重病人抢救	ABMA0001
				会阴擦洗	ABZE0001
				吸痰护理	ACBJ0004
				一般尸体料理	AZBA0001
				胰岛素及其类似物皮下注射	HDE48101
				气管切开护理	ACBJ0001
				气管切开套管更换	ACBJ0002
				药物	
				抗生素	
				止痛药物	
				镇静药物	
				糖皮质激素	
				钙剂	
				甲状腺激素及抗甲状腺类药	

甲状腺良性肿瘤

甲状腺次全切除术

适用对象：	病种编码：	BS007		
	主要诊断：	甲状腺良性肿瘤	ICD-10码：D34	
	主要操作/主要治疗方式：	甲状腺次全切除术	CCHI码：HDC73306	
入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10：D34甲状腺良性肿瘤编码。 2. 年龄≤70岁。 3. 需要进行手术治疗。 4. 当患者同时具有其他疾病诊断时，但在住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。 5. 对具有甲状腺功能亢进、甲状腺癌变可能等病情复杂的病例，不进入路径。			
出院标准：	1. 一般情况良好。 2. 无引流管或引流管拔除。 3. 可门诊拆线，切口愈合良好。			
最短住院日参考值：	7天			
变异条件：	1. 因患者术后出现严重并发症而延期出院。 2. 术后诊断甲状腺机能亢进或甲状腺恶性肿瘤等情况。			
再入院间隔时间：	2周			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
Ⅱ级护理	ACAB0001	Ⅰ级护理	ACAC0001	Ⅰ级护理	ACAC0001
					ACAB0001
检查		检查		检查	
全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000			三碘甲状腺原氨酸(T ₃)测定	CEQJ1000
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	治疗		甲状腺素(T ₄)测定	CEQH1000
尿常规化学分析	CCAA2000	氧气吸入	ABJA0001	促甲状腺激素(TSH)测定	CEQD1000
游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)测定	CEQM1000	院内遥测心电图监护	KKA28701	甲状腺球蛋白(TG)测定	CEQQ1000
游离甲状腺素(FT4)测定	CEQL1000	监测		甲状旁腺激素(PTH)测定	CEQR1000
三碘甲状腺原氨酸(T ₃)测定	CEQJ1000			游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)测定	CEQM1000
甲状腺素(T ₄)测定	CEQH1000	麻醉		游离甲状腺素(FT4)测定	CEQL1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
抗甲状腺球蛋白抗体(TGAb)测定	CGEM1000	颈丛神经阻滞麻醉	HAF42101	抗甲状腺球蛋白抗体(TGAb)测定	CGEM1000
促甲状腺激素(TSH)测定	CEQD1000	/全身麻醉	HAA42901	抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)测定	CGEP1000
甲状腺球蛋白(TG)测定	CEQQ1000	手术			
甲状旁腺激素(PTH)测定	CEQR1000	甲状腺次全切除术	HDC73306		
抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)测定	CGEP1000	甲状旁腺细胞移植术	HDD89302	治疗	
生化常规检查	葡萄糖(Glu)测定 CEFA8000和总钙(Ca)测定 CEJF8000和无机磷(P)测定 CEKA8000和钾(K)测定 CEJA8000和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000	喉返神经解剖术	喉返神经探查术 FCL09301	换药	换药(大)ABFA0003或 换药(中)ABFA0002
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定 CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定 CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定 CECC8000和总蛋白(TP)测定 CEAA8000和白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定 CECD8000	病理		皮内注射	ABAA0001
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEE8000和肌酐(Cr)测定 CEEB8000和尿酸(UA)测定 CEEE8000	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感染标本冷冻切片病理诊断 BCBB0001	皮下注射	ABAB0001
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001	肌肉注射	ABAC0001
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000	药物		静脉注射	ABAD0001
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000			静脉输液	ABCA0001
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000			空气压缩泵雾化吸入	ABKC0001
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000			引流管更换	ABZG0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
声带功能检查对应咽喉功能检查	纤维喉镜检查 FGM01602或电子纤维 喉镜检查FGM01603			颈部综合运动训练	MBBHY001
间接喉镜检查	FGM01402			药物	
胸部X线摄影	EABJT001			化痰药物	
十二通道常规心电图检查	FKA03703				
甲状腺彩色多普勒超声检查	EDCDC001				
院内会诊	AADB0001				
治疗					
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
颈椎X线摄影	EABVH001				
治疗		治疗		治疗	
胰岛素及其类似物皮下注射	HDE48101	胰岛素及其类似物皮下注射	HDE48101	外周静脉营养输注	ABCG0001
药物		静脉输血	ABCD0001	胃管置管术	ABGB0001
甲状腺激素及抗甲状腺类药		药物		清洁灌肠	ABGE0004
抗生素		抗生素		人工辅助通便	ABGG0001
		钙剂		导尿	ABHA0001
		糖皮质激素		导尿管留置	ABHA0002
				氧气吸入	ABJA0001
				擦浴降温	ABLA0001
				危重病人抢救	ABMA0001
				会阴擦洗	ABZE0001
				吸痰护理	ACBJ0004
				一般尸体料理	AZBA0001
				胰岛素及其类似物皮下注射	HDE48101
				气管切开护理	ACBJ0001
				气管切开套管更换	ACBJ0002
				药物	
				抗生素	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
				止痛药物	
				镇静药物	
				糖皮质激素	
				钙剂	
				甲状腺激素及抗甲状腺类药	

甲状腺肿瘤

甲状腺腺瘤摘除术

适用对象：	病种编码：	BS008	
	主要诊断：	甲状腺肿瘤	ICD-10码：C73/D09.301/D34/D44.0
	主要操作/主要治疗方式：	甲状腺腺瘤摘除术	CCHI码：HDC73303
入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10：C73/D09.301/D34/D44.0甲状腺肿瘤编码。 2. 年龄≤70岁。 3. 需要进行手术治疗。 4. 当患者同时具有其他疾病诊断时，但在住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。 5. 对具有甲状腺功能亢进、甲状腺癌变可能等病情复杂的病例，不进入路径。		
出院标准：	1. 一般情况良好。 2. 无引流管或引流管拔除。 3. 可门诊拆线，切口愈合良好。		
最短住院日参考值：	5天		
变异条件：	1. 因患者术后出现严重并发症而延期出院。 2. 术后诊断甲状腺机能亢进或甲状腺恶性肿瘤等情况。		
再入院间隔时间：	2周		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
					ACAB0001
检查		检查		检查	
全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000			游离三碘甲状原氨酸(FT ₃)测定	CEQM1000
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	治疗		游离甲状腺素(FT ₄)测定	CEQL1000
尿常规化学分析	CCAA2000	氧气吸入	ABJA0001	促甲状腺激素(TSH)测定	CEQD1000
游离三碘甲状原氨酸(FT ₃)测定	CEQM1000	监测		甲状腺球蛋白(TG)测定	CEQQ1000
游离甲状腺素(FT ₄)测定	CEQL1000	院内遥测心电图监护	KKA28701	甲状旁腺激素(PTH)测定	CEQR1000
三碘甲状原氨酸(T ₃)测定	CEQJ1000	麻醉		三碘甲状原氨酸(T ₃)测定	CEQJ1000
甲状腺素(T ₄)测定	CEQH1000	颈丛神经阻滞麻醉	HAF42101	甲状腺素(T ₄)测定	CEQH1000
抗甲状腺球蛋白抗体(TGAb)测定	CGEM1000	/全身麻醉	HAA42901	抗甲状腺球蛋白抗体(TGAb)测定	CGEM1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
促甲状腺激素 (TSH) 测定	CEQD1000	手术		抗甲状腺过氧化物酶抗体 (TPOAb) 测定	CGEP1000
甲状腺球蛋白 (TG) 测定	CEQQ1000	甲状腺腺瘤摘除术	HDC73303	治疗	
甲状旁腺激素 (PTH) 测定	CEQR1000	甲状旁腺细胞移植术	HDD89302	换药	换药 (中) ABFA0002或换药 (大) ABFA0003
抗甲状腺过氧化物酶抗体 (TPOAb) 测定	CGEP1000	病理		皮内注射	ABAA0001
生化常规检查	葡萄糖 (Glu) 测定 CEFA8000和总钙 (Ca) 测定 CEJF8000和无机磷 (P) 测定 CEKA8000和钾 (K) 测定 CEJA8000和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测定 CEJC8000	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感染标本冷冻切片病理诊断 BCBB0001	皮下注射	ABAB0001
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定 CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定 CEAA8000和白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001	肌肉注射	ABAC0001
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000和尿酸 (UA) 测定 CEEE8000	药物		静脉注射	ABAD0001
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间 (APTT) 测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间 (PT) 测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000			静脉输液	ABCA0001
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs) 测定	乙型肝炎表面抗原定性 (HBsAg) 测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量 (HBsAg) 测定 CGLH1000			空气压缩泵雾化吸入	ABKC0001
丙型肝炎抗体 (抗HCV) 测定	CGMA1000			引流管更换	ABZG0001
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV) 测定	CGMF1000			颈部综合运动训练	MBBHY001
梅毒螺旋体抗体 (抗TP) 测定	CGPP1000			药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
声带功能检查对应咽喉功能检查	纤维喉镜检查 FGM01602或电子纤维喉镜检查FGM01603			化痰药物	
间接喉镜检查	FGM01402				
胸部X线摄影	EABJT001				
十二通道常规心电图检查	FKA03703				
甲状腺彩色多普勒超声检查	EDCDC001				
院内会诊	AADB0001				
治疗					
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
心脏彩色多普勒超声	EDFKA007	甲状旁腺激素（PTH）测定	CEQR1000	胸部X光片	胸部X线透视 EAAJT001或胸部X线摄影EABJT001
院际会诊	AADA0001	院际会诊	AADA0001	胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001
颈椎X线摄影	EABVH001	院内会诊	AADB0001	院际会诊	AADA0001
治疗		治疗		院内会诊	AADB0001
胰岛素及其类似物皮下注射	HDE48101	胰岛素及其类似物皮下注射	HDE48101	治疗	
药物		静脉输血	ABCD0001	外周静脉营养输注	ABCG0001
甲状腺激素及抗甲状腺类药		药物		胃管置管术	ABGB0001
抗生素		抗生素		清洁灌肠	ABGE0004
		钙剂		人工辅助通便	ABGG0001
		糖皮质激素		导尿	ABHA0001
				导尿管留置	ABHA0002
				氧气吸入	ABJA0001
				擦浴降温	ABLA0001
				危重病人抢救	ABMA0001
				会阴擦洗	ABZE0001
				吸痰护理	ACBJ0004

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
				一般尸体料理	AZBA0001
				胰岛素及其类似物皮下注射	HDE48101
				气管切开护理	ACBJ0001
				气管切开套管更换	ACBJ0002
				药物	
				抗生素	
				止痛药物	
				镇静药物	
				糖皮质激素	
				钙剂	

三、眼和附器疾病

病种编码	主诊断	主要操作/主要治疗方式
CM001	巨细胞病毒视网膜炎	
CS001	原发性急性闭角型青光眼	小梁切除术
CS002	老年性白内障	白内障超声乳化摘除术
CS003	老年性白内障	白内障超声乳化吸除+人工晶状体植入术
CS004	老年性白内障	小瞳孔白内障超声乳化吸除+人工晶状体植入术
CS005	上睑下垂	上睑提肌缩短上睑下垂矫正术
CS006	上睑下垂	额肌筋膜瓣悬吊上睑下垂矫正术
CS007	上睑下垂	额筋膜悬吊上睑下垂矫正术
CS008	单纯性孔源性视网膜脱离	巩膜环扎术
CS009	单纯性孔源性视网膜脱离	巩膜外加压术
CS010	翼状胬肉	翼状胬肉切除组织移植术
CS011	难治性青光眼	睫状体冷冻术
CS012	难治性青光眼	外路经巩膜激光睫状体光凝术
CS013	慢性泪囊炎	鼻内镜鼻腔泪囊吻合术

巨细胞病毒视网膜炎

适用对象：	病种编码：	CM101	
	主要诊断：	巨细胞病毒视网膜炎	ICD-10码：B25.802†
	主要操作/主要治疗方式：		CCHI码：
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：B25.802†巨细胞病毒视网膜炎疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，只要住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。	
	出院标准：	1. 完成2-3周诱导治疗。 2. 症状有所缓解。临床稳定24小时以上。	
	最短住院日参考值：		
	变异条件：	1. 存在并发症，需要进行相关的诊断和治疗，延长住院时间。 2. 病情严重，需要呼吸支持者，归入其他路径。	
	再入院时间间隔要求：		

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		治疗		药物	
I 级护理	ACAC0001	静脉输液	ABCA0001	抗巨细胞病毒药物	
/ II 级护理	ACAB0001				
/ III级护理	ACAA0001				
检查					
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000				
尿常规化学分析	CCAA2000				
粪便常规检查	CCCA3000				
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000和 β 2 微球蛋白 (β 2-MG) 测 CEAS8000				

肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素 (D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶 (GGT) 测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白 (A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶 (ALP) 测定 CECD8000				
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000				
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测 定CEJC8000和总二氧 化碳 (TCO2)测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测 定CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000				
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703				
胸部X光片	胸部X线透视 EAAJT001或胸部X线 摄影EABJT001				
人免疫缺陷病毒检查	人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV) 测定 CGMF1000或艾滋病联 合试验 (HIVcombin) CGMG100 0或人免疫缺陷病毒 P24抗原测定 CGMH1000或人免疫缺 陷病毒抗体确认试验 CGMJ1000				
巨细胞病毒检查	巨细胞病毒抗原血症 (CMVPP65)测定 CGML8000或巨细胞病 毒抗体测定CGMM1000				
眼底检查	免散瞳眼底检查 FES01704或非散瞳直 接检眼镜眼底检查 FES01705或前置镜眼 底检查FES01706或间 接眼底镜检查 FES01707				
视功能检查	普通远视力检查 FEA01701或普通近视 力检查FEA01702或光 机能检查FEA01703				

眼压测量	压陷式眼压计测量 FEA02704或非接触眼 压计(NCT)测量 FEA02705或压平眼压 计(Goldmann眼压计) 测量FEA02706或动态 轮廓眼压计测量 FEA02707或电子压平 眼压计测量FEA02708 或回弹式眼压计测量 FEA02709				
裂隙灯检查	裂隙灯检查FEA01726				
眼底照像	荧光素眼底血管造影 FEW08201或吲哚青绿 脉络膜血管造影 FEW08202眼底照相 FES01702儿童眼底照 相FES01703				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
双眼B超检查	EDBEA001				
胸部CT（平扫+增强 扫描）	胸部X线计算机体层 (CT)平扫EBAJT001和 胸部X线计算机体层 (CT)增强扫描 EBBJT001				
胸部影像学检查	胸部X线摄影 EABJT001或胸部X线 计算机体层(CT)平扫 EBAJT001或胸部X线 计算机体层(CT)增强 扫描EBBJT001				
验光	综合验光FEA01720或 显然验光FEA01722或 睫状肌麻痹验光 FEA01723或电脑验光 FEA01724				
普通视野计检查	FEA01709				
前房穿刺房水巨细胞 病毒DNA测定	前房冲洗术HEJ48101 和巨细胞病毒抗体测 定CGMM1000				

原发性急性闭角型青光眼

小梁切除术

适用对象：	病种编码：	CS001			
	主要诊断：	原发性急性闭角型青光眼	ICD-10码：	H40. 203	
	主要操作/主要治疗方式：	小梁切除术	CCHI码：	HEJ73301	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：H40. 203原发性急性闭角型青光眼疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 高眼压得到控制。 2. 前房基本恢复正常。 3. 结膜切口愈合好，无感染征象。			
	最短住院日参考值：	5天			
	变异条件：	1. 患者术前存在持续性眼压高或眼轴短，真性小眼球等因素，容易出现恶性青光眼或脉络膜脱离等并发症，术后可能出现前房形成迟缓，需药物治疗甚至手术处理，导致住院时间相应延长。 2. 出现手术并发症，如结膜伤口愈合不良、滤过泡渗漏、前房形成迟缓、脉络膜渗漏、驱逐性脉络膜出血等，转入相应路径。 3. 第一诊断为原发性急性闭角型青光眼，又合并老年性白内障，需行青白联合手术者，不进入路径。 4. 需行全麻手术者不进入本路径。另一眼需作虹膜周切者不进入本路径。			
	再入院间隔时间：	1天			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	II级护理	ACAB0001	II级护理	ACAB0001
/III级护理	ACAA0001	检查		检查	
检查		治疗		视力检查	普通远视力检查FEA01701或普通近视力检查FEA01702或光机能检查FEA01703
血常规	全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	麻醉		眼压测量	压陷式眼压计测量FEA02704或非接触眼压计(NCT)测量FEA02705或压平眼压计(Goldmann眼压计)测量FEA02706或动态轮廓眼压计测量FEA02707或电子压平眼压计测量FEA02708或回弹式眼压计测量FEA02709
尿常规化学分析	CCAA2000			裂隙灯检查	FEA01726

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000和肌酸激酶(CK)测定CECS1000和甘油三酯(TG)测定CEHB1000和总胆固醇(TC)测定CEHA1000和葡萄糖(Glu)测定CEFA8000和钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000	手术		眼底检查	免散瞳眼底检查FES01704或非散瞳直接检眼镜眼底检查FES01705或前置镜眼底检查FES01706或间接眼底镜检查FES01707
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	小梁切除术	HEJ73301	治疗	
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	病理		换药(小)	ABFA0001
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	麻醉药		药物	
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	药物		抗菌药物	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	表面麻醉药		抗眼部感染药	
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	抗菌药物			
视力检查	普通远视力检查FEA01701或普通近视力检查FEA01702或光机能检查FEA01703	抗眼部感染药			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
眼压测量	压陷式眼压计测量 FEA02704或非接触眼 压计(NCT)测量 FEA02705或压平眼压 计(Goldmann眼压计) 测量FEA02706或动态 轮廓眼压计测量 FEA02707或电子压平 眼压计测量FEA02708 或回弹式眼压计测量 FEA02709或眼压日曲 线描记FEA02710或眼 压描记FEA02711	眼用消毒剂			
裂隙灯检查	FEA01726	平衡盐溶液			
视野检查	普通视野计检查 FEA01709或视野检查 -静态法FEA01710或 视野检查-动态法 FEA01711				
眼底检查	免散瞳眼底检查 FES01704或非散瞳直 接检眼镜眼底检查 FES01705或前置镜眼 底检查FES01706或间 接眼底镜检查 FES01707				
前房角镜检查	FEJ01701				
治疗					
静脉注射	ABAD0001				
泪道冲洗	HEE48401				
结膜囊冲洗	HEG48302				
药物					
麻醉药					
抗菌药物滴眼液					
高渗剂降眼压					
碳酸酐酶抑制剂					
α 受体激动剂					
β 受体阻断剂					
缩瞳剂					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
检查		检查		检查	
胸部X线摄影	EABJT001	治疗		显然验光	FEA01722
眼部A超	EDAEA001	氧气吸入	ABJA0001	治疗	
双眼B超检查	EDBEA001	监测		药物	
视网膜视力检查	FEA01707	动态血压监测	FKA05708	缩瞳剂	
显然验光	FEA01722	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710	高渗剂	
角膜检查	角膜结膜染色检查 FEH01701或角膜地形图检查FEH01702或角膜内皮镜检查 FEH01703或眼前节分析仪角膜厚度检查 FEH01704或角膜厚度检查-光学法 FEH01705或角膜厚度检查-超声法 FEH01706	无创心电监测	FKA05705	散瞳药	
眼底扫描	相干光断层扫描 FES01708或相干光断层(OCT)眼底扫描 FES01709或视网膜断层(HRT)眼底扫描 FES01710或偏振激光(GDx)眼底扫描 FES01711或激光扫描 检眼镜眼底检查 FES01712	药物		抗纤维瘢痕药	
超声活体显微镜检查	FEU01702	散瞳药		非甾体类消炎药	
眼前节照相	FEU01701	抗纤维瘢痕药		神经营养药物	
治疗					
睑板腺按摩	KED20701				
药物					
甾体或非甾体消炎药					
止血药物					
镇静药物					

老年性白内障

白内障超声乳化摘除术

适用对象：	病种编码：	CS002			
	主要诊断：	老年性白内障	ICD-10码：	H25.0-H25.2/H25.8/H25.9	
	主要操作/主要治疗方式：	白内障超声乳化摘除术	CCHI码：	HEP65302	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD10：H25.0-H25.2/H25.8/H25.9老年性白内障疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，如住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断临床路径流程的实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 手术后反应较轻，病情稳定。 2. 切口闭合好，前房形成。 3. 眼压正常，裂隙灯检查无明显异常，人工晶体位置良好。			
	最短住院日参考值：	6天			
	变异条件：	1. 等待术前检验结果。 2. 手术炎症反应或其它并发症。 3. 患者其他原因。			
	再入院间隔时间：	1天			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
/III级护理	ACAA0001	/II级护理	ACAB0001	/II级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			眼压测量	压陷式眼压计测量FEA02704或非接触眼压计(NCT)测量FEA02705或压平眼压计(Goldmann眼压计)测量FEA02706或动态轮廓眼压计测量FEA02707或电子压平眼压计测量FEA02708或回弹式眼压计测量FEA02709
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		裂隙灯检查	FEA01726
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	麻醉		眼底检查	免散瞳眼底检查FES01704或非散瞳直接检眼镜眼底检查FES01705或前置镜眼底检查FES01706或间接眼底镜检查FES01707

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(Alb)测定CEAE8000和尿素(Urea)测定CEE8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000和肌酸激酶(CK)测定CECS1000和甘油三酯(TG)测定CEHB1000和总胆固醇(TC)测定CEHA1000和葡萄糖(Glu)测定CEFA8000和钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000			视力检查	普通远视力检查FEA01701或普通近视力检查FEA01702或光机能检查FEA01703
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	手术		治疗	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	白内障超声乳化摘除术	HEP65302	换药	换药(小)ABFA0001
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	药物		药物	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	眼用消毒剂		抗菌药物眼用制剂	
双眼B超检查	EDBEA001	麻醉药		抗眼部感染药	
人工晶体度数测量	眼轴人工晶状体度数测量-超声法FEA02702或眼轴人工晶状体度数测量-光学法FEA02703	灌注液			
角膜地形图检查	FEH01702	粘弹剂			
角膜曲率测量	FEH02701	抗眼部感染药			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
眼压测量	压陷式眼压计测量 FEA02704或非接触眼 压计(NCT)测量 FEA02705或压平眼压 计(Goldmann眼压计) 测量FEA02706或动态 轮廓眼压计测量 FEA02707或电子压平 眼压计测量FEA02708 或回弹式眼压计测量 FEA02709	抗眼部感染药			
视力检查	普通远视力检查 FEA01701或普通近视 力检查FEA01702或光 机能检查FEA01703或 视网膜视力检查 FEA01707	抗菌药物			
裂隙灯检查	FEA01726				
眼底检查	免散瞳眼底检查 FES01704或非散瞳直 接检眼镜眼底检查 FES01705或前置镜眼 底检查FES01706或间 接眼底镜检查 FES01707				
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703				
眼部A超	EDAEA001				
光机能检查	FEA01703				
治疗					
静脉注射	ABAD0001				
泪道冲洗	HEE48401				
结膜囊冲洗	HEG48302				
药物					
散瞳药					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
阿姆斯勒(Amsler)表 检查	FEA01708			眼前节照相	FEU01701

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
眼轴测量	FEA02701	治疗		显然验光	FEA01722
粪便常规检查	CCCA3000	氧气吸入	ABJA0001	治疗	
隐血试验	CCCB8000	监测		药物	
胸部X线透视	EAAJT001	无创心电监测	FKA05705	非甾体类消炎药	
胸部X线摄影	EABJT001	药物		散瞳药	
显然验光	FEA01722	缩瞳剂		降眼压药	
对比敏感度仪检查	FEA01716				
眼前节形态测定	FEU02701				
图形视网膜电流图(P-ERG)检查	FEA03701				
视诱发电位(VEP)检查	FEA03704				
超声活体显微镜检查	FEU01702				
角膜检查	角膜结膜染色检查 FEH01701或角膜内皮 镜检查FEH01703或眼 前节分析仪角膜厚度 检查FEH01704或角膜 厚度检查-光学法 FEH01705或角膜厚度 检查-超声法 FEH01706或角膜知觉 检查-棉丝法 FEH01707或角膜知觉 检查-知觉仪法 FEH01708或角膜刮片 检查FEH01709				
泪膜破裂时间测定	FEE02701				
泪液分泌试验	FEE04701				
眼前节照相	FEU01701				
治疗					
睑板腺按摩	KED20701				
药物					

老年性白内障

白内障超声乳化吸除+人工晶状体植入术

适用对象：	病种编码：	CS003	
	主要诊断：	老年性白内障	ICD-10码：H25. 0-H25. 2/H25. 8/H25. 9
	主要操作/主要治疗方式：	白内障超声乳化吸除+人工晶状体植入术	CCHI码：HEP61302
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD10：H25. 0-H25. 2/H25. 8/H25. 9老年性白内障疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，如住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断临床路径流程的实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 手术后反应较轻，病情稳定。 2. 切口闭合好，前房形成。 3. 眼压正常，裂隙灯检查无明显异常。		
最短住院日参考值：	6天		
变异条件：	1. 等待术前检验结果。 2. 手术炎症反应或其它并发症。 3. 患者其他原因。 4. 被点名手术医生其他原因。		
再入院间隔时间：	1天		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
/III级护理	ACAA0001	/II级护理	ACAB0001	/II级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			眼压测量	压陷式眼压计测量FEA02704或非接触眼压计(NCT)测量FEA02705或压平眼压计(Goldmann眼压计)测量FEA02706或动态轮廓眼压计测量FEA02707或电子压平眼压计测量FEA02708或回弹式眼压计测量FEA02709
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		裂隙灯检查	FEA01726

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	麻醉		眼底检查	免散瞳眼底检查 FES01704或非散瞳直 接检眼镜眼底检查 FES01705或前置镜眼 底检查FES01706或间 接眼底镜检查 FES01707
生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和尿素 (Urea)测定CEEA8000 和肌酐(Cr)测定 CEEB8000和尿酸(UA) 测定CEEE8000和肌酸 激酶(CK)测定 CECS1000和甘油三酯 (TG)测定CEHB1000和 总胆固醇(TC)测定 CEHA1000和葡萄糖 (Glu)测定CEFA8000 和钾(K)测定 CEJA8000和钠(Na)测 定CEJB8000和氯(Cl) 测定CEJC8000			视力检查	普通远视力检查 FEA01701或普通近视 力检查FEA01702或光 机能检查FEA01703
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	手术		治疗	
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	白内障超声乳化吸除 +人工晶状体植入术	HEP61302	换药	换药(小)ABFA0001
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	药物		药物	
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000	眼用消毒剂		抗菌药物眼用制剂	
双眼B超检查	EDBEA001	麻醉药		抗眼部感染药	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
人工晶体度数测量	眼轴人工晶状体度数测量-超声法 FEA02702或眼轴人工晶状体度数测量-光学法FEA02703	灌注液			
角膜地形图检查	FEH01702	粘弹剂			
角膜曲率测量	FEH02701	抗眼部感染药			
眼压测量	压陷式眼压计测量 FEA02704或非接触眼压计(NCT)测量 FEA02705或压平眼压计(Goldmann眼压计)测量 FEA02706或动态轮廓眼压计测量 FEA02707或电子压平眼压计测量 FEA02708或回弹式眼压计测量 FEA02709	抗眼部感染药			
视力检查	普通远视力检查 FEA01701或普通近视力检查 FEA01702或光机能检查 FEA01703或视网膜视力检查 FEA01707	抗菌药物			
裂隙灯检查	FEA01726				
眼底检查	免散瞳眼底检查 FES01704或非散瞳直接检眼镜眼底检查 FES01705或前置镜眼底检查 FES01706或间接眼底镜检查 FES01707				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道常规心电图检查 FKA03702或十二通道常规心电图检查 FKA03703				
眼部A超	EDAEA001				
光机能检查	FEA01703				
治疗					
静脉注射	ABAD0001				
泪道冲洗	HEE48401				
结膜囊冲洗	HEG48302				
药物					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
散瞳药					
抗生素					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
阿姆斯勒(Amsler)表检查	FEA01708			眼前节照相	FEU01701
眼轴测量	FEA02701	治疗		显然验光	FEA01722
粪便常规检查	CCCA3000	氧气吸入	ABJA0001	治疗	
隐血试验	CCCB8000	监测		药物	
胸部X线透视	EAAJT001	无创心电监测	FKA05705	非甾体类消炎药	
胸部X线摄影	EABJT001	药物		散瞳药	
显然验光	FEA01722	缩瞳剂		降眼压药	
对比敏感度仪检查	FEA01716				
眼前节形态测定	FEU02701				
图形视网膜电图(P-ERG)检查	FEA03701				
视诱发电位(VEP)检查	FEA03704				
超声活体显微镜检查	FEU01702				
角膜检查	角膜结膜染色检查 FEH01701或角膜内皮镜检查FEH01703或眼前节分析仪角膜厚度检查FEH01704或角膜厚度检查-光学法FEH01705或角膜厚度检查-超声法FEH01706或角膜知觉检查-棉丝法FEH01707或角膜知觉检查-知觉仪法FEH01708或角膜刮片检查FEH01709				
泪膜破裂时间测定	FEE02701				
泪液分泌试验	FEE04701				
眼前节照相	FEU01701				
治疗					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
睑板腺按摩	KED20701				
药物					

老年性白内障

小瞳孔白内障超声乳化吸除+人工晶状体植入术

适用对象：	病种编码：	CS004			
	主要诊断：	老年性白内障		ICD-10码：	H25. 0-H25. 2/H25. 8/H25. 9
	主要操作/主要治疗方式：	小瞳孔白内障超声乳化吸除+人工晶状体植入术		CCHI码：	HEP61303
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD10：H25. 0-H25. 2/H25. 8/H25. 9老年性白内障疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，如住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断临床路径流程的实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 手术后反应较轻，病情稳定。 2. 切口闭合好，前房形成。 3. 眼压正常，裂隙灯检查无明显异常，人工晶体位置良好。			
	最短住院日参考值：	6天			
	变异条件：	1. 等待术前检验结果。 2. 手术炎症反应或其它并发症。 3. 患者其他原因。			
	再入院间隔时间：	1天			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
/III级护理	ACAA0001	/II级护理	ACAB0001	/II级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			眼压测量	压陷式眼压计测量FEA02704或非接触眼压计(NCT)测量FEA02705或压平眼压计(Goldmann眼压计)测量FEA02706或动态轮廓眼压计测量FEA02707或电子压平眼压计测量FEA02708或回弹式眼压计测量FEA02709
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		裂隙灯检查	FEA01726

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	麻醉		眼底检查	免散瞳眼底检查 FES01704或非散瞳直 接检眼镜眼底检查 FES01705或前置镜眼 底检查FES01706或间 接眼底镜检查 FES01707
生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(Alb)测定 CEAE8000和尿素 (Urea)测定CEE8000 和肌酐(Cr)测定 CEEB8000和尿酸(UA) 测定CEEE8000和肌酸 激酶(CK)测定 CECS1000和甘油三酯 (TG)测定CEHB1000和 总胆固醇(TC)测定 CEHA1000和葡萄糖 (Glu)测定CEFA8000 和钾(K)测定 CEJA8000和钠(Na)测 定CEJB8000和氯(Cl) 测定CEJC8000			视力检查	普通远视力检查 FEA01701或普通近视 力检查FEA01702或光 机能检查FEA01703
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	手术		治疗	
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	小瞳孔白内障超声乳 化吸除+人工晶状体 植入术	HEP61303	换药	换药(小)ABFA0001或 换药(中)ABFA0002或 换药(大)ABFA0003或 换药(特大)ABFA0004
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	药物		药物	
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000	眼用消毒剂		抗菌药物眼用制剂	
双眼B超检查	EDBEA001	麻醉药		抗眼部感染药	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
人工晶体度数测量	眼轴人工晶状体度数测量-超声法 FEA02702或眼轴人工晶状体度数测量-光学法FEA02703	灌注液			
角膜地形图检查	FEH01702	粘弹剂			
角膜曲率测量	FEH02701	抗眼部感染药			
眼压测量	压陷式眼压计测量 FEA02704或非接触眼压计(NCT)测量 FEA02705或压平眼压计(Goldmann眼压计)测量 FEA02706或动态轮廓眼压计测量 FEA02707或电子压平眼压计测量 FEA02708或回弹式眼压计测量 FEA02709	抗眼部感染药			
视力检查	普通远视力检查 FEA01701或普通近视力检查 FEA01702或光机能检查 FEA01703或视网膜视力检查 FEA01707	抗菌药物			
裂隙灯检查	FEA01726				
眼底检查	免散瞳眼底检查 FES01704或非散瞳直接检眼镜眼底检查 FES01705或前置镜眼底检查 FES01706或间接眼底镜检查 FES01707				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道常规心电图检查 FKA03702或十二通道常规心电图检查 FKA03703				
眼部A超	EDAEA001				
光机能检查	FEA01703				
治疗					
静脉注射	ABAD0001				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
泪道冲洗	HEE48401				
结膜囊冲洗	HEG48302				
药物					
散瞳滴眼药					
抗菌药物眼用制剂					
表麻药或其它麻醉药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
阿姆斯勒(Amsler)表检查	FEA01708			眼前节照相	FEU01701
眼轴测量	FEA02701	治疗		显然验光	FEA01722
粪便常规检查	CCCA3000	氧气吸入	ABJA0001	治疗	
隐血试验	CCCB8000	监测		药物	
胸部X线透视	EAAJT001	无创心电监测	FKA05705	激素眼药水	
胸部X线摄影	EABJT001	药物		激素	
视网膜视力检查	FEA01707	缩瞳剂		缩瞳剂	
显然验光	FEA01722			散瞳滴眼液	
对比敏感度仪检查	FEA01716			非甾体类消炎药	
眼前节形态测定	FEU02701			降眼压药	
图形视网膜电流图(P-ERG)检查	FEA03701				
角膜检查	角膜结膜染色检查 FEH01701或角膜内皮 镜检查FEH01703或眼 前节分析仪角膜厚度 检查FEH01704或角膜 厚度检查-光学法 FEH01705或角膜厚度 检查-超声法 FEH01706或角膜知觉 检查-棉丝法 FEH01707或角膜知觉 检查-知觉仪法 FEH01708或角膜刮片 检查FEH01709				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
角膜厚度检查	眼前节分析仪角膜厚度检查FEH01704或角膜厚度检查-光学法FEH01705或角膜厚度检查-超声法FEH01706				
视诱发电位 (VEP) 检查	FEA03704				
超声活体显微镜检查	FEU01702				
泪膜破裂时间测定	FEE02701				
泪液分泌试验	FEE04701				
眼前节照相	FEU01701				
治疗					
睑板腺按摩	KED20701				
药物					
(全身用) 抗菌药物					

上睑下垂

上睑提肌缩短上睑下垂矫正术

适用对象：	病种编码：	CS005			
	主要诊断：	上睑下垂		ICD-10码：	H02.4, Q10.0
	主要操作/主要治疗方式：	上睑提肌缩短上睑下垂矫正术		CCHI码：	HEV83303
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10:H02.4, Q10.0上睑下垂疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理、不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 伤口愈合好，无活动性出血及感染征象。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。			
	最短住院日参考值：	5天			
	变异条件：	1. 术前化验检查异常，需要复查相关检查，导致住院时间延长。 2. 有影响手术的合并症，如矫正不足、矫正过度、上睑内翻倒睫、暴露性角膜炎、结膜脱垂和眉额区血肿等，需要进行相关的诊断和治疗，导致住院时间延长、费用增加。			
	再入院间隔时间：	15天（出现并发症除外）			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
III级护理	ACAA0001	II级护理	ACAB0001	II级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			视力检查	普通远视力检查FEA01701或普通近视力检查FEA01702或光机能检查FEA01703或特殊视力检查FEA01705或选择性观看检查FEA01706
尿常规化学分析	CCAA2000			上睑下垂检查	FED01701
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000			角膜检查	角膜结膜染色检查FEH01701或眼前节分析仪角膜厚度检查FEH01704或角膜厚度检查-光学法FEH01705或角膜知觉检查-棉丝法FEH01707或角膜知觉检查-知觉仪法FEH01708或角膜刮片检查FEH01709或角膜地形图检查FEH01702
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	治疗		裂隙灯检查	FEA01726

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000			治疗	
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000	麻醉		换药(中)	ABFA0002
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000	局部静脉内麻醉	HAB42201	药物	
生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定 CELB1000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定CEAE8000和尿素 (Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定 CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000和肌酸 激酶(CK)测定CECS1000和甘油三酯 (TG)测定CEHB1000和总胆固醇(TC)测定 CEHA1000和葡萄糖(Glu)测定CEFA8000 和钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000			抗菌药物	
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道 常规心电图检查FKA03702或十二通道 常规心电图检查FKA03703	手术			
视力检查	普通远视力检查FEA01701或普通近视 力检查FEA01702或光机能检查FEA01703或 特殊视力检查FEA01705或选择性观 看检查FEA01706	上睑提肌缩短上睑下垂矫正术	HEV83303		
显光验光	FEA01722	额肌筋膜瓣悬吊上睑下垂矫正术	HEV83301		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
诊断眼位斜视度测定	FEA02713	药物			
裂隙灯检查	FEA01726	抗菌药物（眼用剂）			
上睑下垂检查	FED01701	麻醉药			
治疗					
静脉注射	ABAD0001				
泪道冲洗	HEE48401				
结膜囊冲洗	HEG48302				
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
胸部X线摄影	EABJT001				
普通二维超声心动图	EDFKA005	治疗		治疗	
泪膜破裂时间测定	FEE02701				
上睑下垂药物试验	FED04101	药物		药物	
泪液分泌试验	FEE04701	止血药物		止血药物	
光机能检查	FEA01703	抗菌素眼用剂		抗菌素眼用制剂	
眼底检查	免散瞳眼底检查 FES01704或非散瞳直接检眼镜眼底检查 FES01705或前置镜眼底检查FES01706或间接眼底镜检查 FES01707			眼用润滑剂	
眼位照相	FEA01733				
眼前节照相	FEU01701				
角膜结膜染色检查	FEH01701				

上睑下垂

额肌筋膜瓣悬吊上睑下垂矫正术

适用对象：	病种编码：	CS006			
	主要诊断：	上睑下垂	ICD-10码：		
			H02. 4, Q10. 0		
	主要操作/主要治疗方式：	额肌筋膜瓣悬吊上睑下垂矫正术	CCHI码：	HEV83301	
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：H02. 4, Q10. 0上睑下垂疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理、不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。				
出院标准：	1. 伤口愈合好，无活动性出血及感染征象。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。				
最短住院日参考值：	5-7天				
变异条件：	1. 术前化验检查异常，需要复查相关检查，导致住院时间延长。 2. 有影响手术的合并症，如矫正不足、矫正过度、上睑内翻倒睫、暴露性角膜炎、结膜脱垂和眉额区血肿等，需要进行相关的诊断和治疗，导致住院时间延长、费用增加。				
再入院间隔时间：	14天				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
III级护理	ACAA0001	II级护理	ACAB0001	II级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			视力检查	普通远视力检查FEA01701或普通近视力检查FEA01702或光机能检查FEA01703或视网膜视力检查FEA01707
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		裂隙灯检查	FEA01726
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000			上睑下垂检查	FED01701

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000	麻醉		角膜检查	角膜结膜染色检查 FEH01701或眼前节分析仪角膜厚度检查 FEH01704或角膜厚度检查-光学法 FEH01705或角膜知觉检查-棉丝法 FEH01707或角膜知觉检查-知觉仪法 FEH01708或角膜刮片检查FEH01709或角膜地形图检查FEH01702
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	/全身麻醉	HAA42901	角膜内皮镜检查	FEH01703
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	/局部静脉内麻醉	HAB42201	治疗	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000			换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
胸部X线摄影	EABJT001	手术		药物	
生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定 CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定 CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定 CECD8000	额肌筋膜瓣悬吊上睑下垂矫正术	HEV83301	抗菌药物滴眼液	
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查 FKA03702或十二通道常规心电图检查 FKA03703	药物		抗菌药物眼膏	
视力检查	普通远视力检查FEA01701或普通近视力检查FEA01702或光机能检查FEA01703或视网膜视力检查FEA01707	抗菌药物滴眼液		人工泪液和凝胶	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
裂隙灯检查	FEA01726	抗菌药物眼膏			
上睑下垂检查	FED01701	麻醉药			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		治疗		药物	
泪膜破裂时间测定	FEE02701			眼用消毒剂	
上睑下垂药物试验	FED04101	药物		止血药物	
泪液分泌试验	FEE04701			抗炎镇痛药	
光机能检查	FEA01703				
显然验光	FEA01722				
三面镜眼底检查	FES01713				
普通二维超声心动图	EDFKA005				
眼位照相	FEA01733				
眼前节照相	FEU01701				
诊断眼位斜视度测定	FEA02713				
角膜结膜染色检查	FEH01701				

上睑下垂

额筋膜悬吊上睑下垂矫正术

适用对象：	病种编码：	CS007			
	主要诊断：	上睑下垂	ICD-10码：		
			H02. 4, Q10. 0		
	主要操作/主要治疗方式：	额筋膜悬吊上睑下垂矫正术	CCHI码：	HEV83302	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10:H02. 4, Q10. 0上睑下垂疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理、不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 伤口愈合好，无活动性出血及感染征象。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。			
	最短住院日参考值：	5-7天			
	变异条件：	1. 术前化验检查异常，需要复查相关检查，导致住院时间延长。 2. 有影响手术的合并症，如矫正不足、矫正过度、上睑内翻倒睫、暴露性角膜炎、结膜脱垂和眉额区血肿等，需要进行相关的诊断和治疗，导致住院时间延长、费用增加。			
	再入院间隔时间：	14天			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
III级护理	ACAA0001	II级护理	ACAB0001	II级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			视力检查	普通远视力检查FEA01701或普通近视力检查FEA01702或光机能检查FEA01703或视网膜视力检查FEA01707
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		裂隙灯检查	FEA01726
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000			上睑下垂检查	FED01701

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000	麻醉		角膜检查	角膜结膜染色检查 FEH01701或眼前节分析仪角膜厚度检查 FEH01704或角膜厚度检查-光学法 FEH01705或角膜知觉检查-棉丝法 FEH01707或角膜知觉检查-知觉仪法 FEH01708或角膜刮片检查FEH01709或角膜地形图检查FEH01702
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	/全身麻醉	HAA42901	角膜内皮镜检查	FEH01703
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	/局部静脉内麻醉	HAB42201	治疗	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000			换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
胸部X线摄影	EABJT001	手术		药物	
生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定 CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定 CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定 CECD8000	颞筋膜悬吊上睑下垂矫正术	HEV83302	抗菌药物滴眼液	
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查 FKA03702或十二通道常规心电图检查 FKA03703	药物		抗菌药物眼膏	
视力检查	普通远视力检查FEA01701或普通近视力检查FEA01702或光机能检查FEA01703或视网膜视力检查 FEA01707	抗菌药物滴眼液		人工泪液和凝胶	
裂隙灯检查	FEA01726	抗菌药物眼膏			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
上睑下垂检查	FED01701	麻醉药			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		治疗		药物	
泪膜破裂时间测定	FEE02701			眼用消毒剂	
上睑下垂药物试验	FED04101			止血药物	
泪液分泌试验	FEE04701			抗炎镇痛药	
光机能检查	FEA01703				
显然验光	FEA01722				
三面镜眼底检查	FES01713				
普通二维超声心动图	EDFKA005				
眼位照相	FEA01733				
眼前节照相	FEU01701				
诊断眼位斜视度测定	FEA02713				
角膜结膜染色检查	FEH01701				

单纯性孔源性视网膜脱离

巩膜环扎术

适用对象：	病种编码：	CS008	
	主要诊断：	单纯性孔源性视网膜脱离	ICD-10码：H33.0
	主要操作/主要治疗方式：	巩膜环扎术	CCHI码：HEN81302
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：H33.0单纯性孔源性视网膜脱离编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理、不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 伤口愈合好，无活动性出血及感染征象。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。		
最短住院日参考值：	7天		
变异条件：	1. 术前评估为严重的增殖性玻璃体视网膜病变、巨大或多发或后部视网膜裂孔需行玻璃体切割术，出现眼部（如结膜炎）或全身感染（感冒等）者，不进入路径。 2. 黄斑裂孔性视网膜脱离，或同时合并黄斑裂孔者不进入路径。 3. 复发性、牵拉性或渗出性视网膜脱离者，不进入路径。 4. 伴严重玻璃体积血、脉络膜脱离、先天性脉络膜缺损、脉络膜脱离等眼部异常，不进入路径。 5. 出现严重手术并发症（脉络膜驱逐性出血，巩膜穿孔，严重玻璃体积血，眼内炎等），转入相应路径。 6. 需行全麻手术者不进入路径。		
再入院间隔时间：	1天		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	II级护理	ACAB0001	II级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
眼底检查	免散瞳眼底检查 FES01704或非散瞳直接检眼镜眼底检查 FES01705或前置镜眼底检查FES01706或间接眼底镜检查 FES01707			视力检查	普通远视力检查 FEA01701或普通近视力检查FEA01702或光机能检查FEA01703或视网膜视力检查 FEA01707或阿姆斯勒(Amsler)表检查 FEA01708

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	治疗		眼压测量	压陷式眼压计测量FEA02704或非接触眼压计(NCT)测量FEA02705或压平眼压计(Goldmann眼压计)测量FEA02706或动态轮廓眼压计测量FEA02707或电子压平眼压计测量FEA02708或回弹式眼压计测量FEA02709
尿常规化学分析	CCAA2000			裂隙灯检查	FEA01726
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAG1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	麻醉		眼底检查	前置镜眼底检查FES01706或间接眼底镜检查FES01707
眼底检查	前置镜眼底检查FES01706或间接眼底镜检查FES01707	局部静脉内麻醉	HAB42201	眼压测量	压陷式眼压计测量FEA02704或非接触眼压计(NCT)测量FEA02705或压平眼压计(Goldmann眼压计)测量FEA02706或动态轮廓眼压计测量FEA02707或电子压平眼压计测量FEA02708或回弹式眼压计测量FEA02709或眼压日曲线描记FEA02710或眼压描记FEA02711
生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000和肌酸激酶(CK)测定CECS1000和甘油三酯(TG)测定CEHB1000和总胆固醇(TC)测定CEHA1000和葡萄糖(Glu)测定CEFA8000和钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000	手术		视力检查	普通远视力检查FEA01701或普通近视力检查FEA01702或光机能检查FEA01703或伪盲检查FEA01704或特殊视力检查FEA01705或选择性观看检查FEA01706或视网膜视力检查FEA01707或阿姆斯勒(Amsler)表检查FEA01708

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000	巩膜环扎术	HEN81302	治疗	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	药物		换药(小)	ABFA0001
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	抗菌药物		药物	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	散瞳药		抗菌药物	
眼部A超	EDAEA001	麻醉药		散瞳药(眼用制剂)	
双眼B超检查	EDBEA001			抗眼部感染药	
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道常规心电图检查 FKA03702或十二通道常规心电图检查 FKA03703				
胸部X线摄影	EABJT001				
眼压测量	压陷式眼压计测量 FEA02704或非接触眼压计(NCT)测量 FEA02705或压平眼压计(Goldmann眼压计) 测量FEA02706或动态轮廓眼压计测量 FEA02707或电子压平眼压计测量FEA02708 或回弹式眼压计测量 FEA02709或眼压日曲线描记FEA02710或眼压描记FEA02711				
裂隙灯检查	FEA01726				
视力检查	普通远视力检查 FEA01701或普通近视力检查FEA01702或光 机能检查FEA01703或 伪盲检查FEA01704或 特殊视力检查 FEA01705或选择性观 看检查FEA01706或 视网膜视力检查 FEA01707或阿姆斯勒 (Amsler)表检查 FEA01708				
治疗					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
静脉注射	ABAD0001				
泪道冲洗	HEE48401				
结膜囊冲洗	HEG48302				
药物					
镇静药物					
散瞳药					
抗菌素					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
相干光断层(OCT)眼底扫描	FES01709	治疗		双眼B超检查	EDBEA001
眼底照相	眼底照相FES01702或 儿童眼底照相 FES01703			眼底照相	眼底照相FES01702或 儿童眼底照相 FES01703
荧光素眼底血管造影	FEW08201	药物		治疗	
治疗					

单纯性孔源性视网膜脱离

巩膜外加压术

适用对象：	病种编码：	CS009	
	主要诊断：	单纯性孔源性视网膜脱离	ICD-10码：H33.0
	主要操作/主要治疗方式：	巩膜外加压术	CCHI码：HEN55301
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：H33.0单纯性孔源性视网膜脱离编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理、不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 伤口愈合好，无活动性出血及感染征象。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。		
最短住院日参考值：	5天		
变异条件：	1. 术前评估为严重的增殖性玻璃体视网膜病变、巨大或多发或后部视网膜裂孔需行玻璃体切割术，出现眼部（如结膜炎）或全身感染（感冒等）者，不进入路径。 2. 黄斑裂孔性视网膜脱离，或同时合并黄斑裂孔者不进入路径。 3. 复发性、牵拉性或渗出性视网膜脱离者，不进入路径。 4. 伴严重玻璃体积血、脉络膜脱离、先天性脉络膜缺损、脉络膜脱离等眼部异常，不进入路径。 5. 出现严重手术并发症（脉络膜驱逐性出血，巩膜穿孔，严重玻璃体积血，眼内炎等），转入相应路径。 6. 需行全麻手术者不进入路径。		
再入院间隔时间：	1天		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	II级护理	ACAB0001	II级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			视力检查	普通远视力检查FEA01701或普通近视力检查FEA01702或光机能检查FEA01703或视网膜视力检查FEA01707或阿姆斯勒(Amsler)表检查FEA01708
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		裂隙灯检查	FEA01726

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000			间接眼底镜检查	FES01707
生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(Alb)测定 CEAE8000和尿素 (Urea)测定CEEA8000 和肌酐(Cr)测定 CEEB8000和尿酸(UA) 测定CEEE8000和肌酸 激酶(CK)测定 CECS1000和甘油三酯 (TG)测定CEHB1000和 总胆固醇(TC)测定 CEHA1000和葡萄糖 (Glu)测定CEFA8000 和钾(K)测定 CEJA8000和钠(Na)测 定CEJB8000和氯(Cl) 测定CEJC8000	麻醉		眼底照相	眼底照相FES01702或 儿童眼底照相 FES01703
乙型肝炎表面抗原 (AntiHBs)测定测定	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	局部静脉内麻醉	HAB42201	眼底检查	前置镜眼底检查 FES01706或间接眼底 镜检查FES01707
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	手术		治疗	
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	巩膜外加压术	HEN55301	换药(小)	ABFA0001
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000	药物			
双眼B超检查	EDBEA001	抗菌药物滴眼液点术 眼			
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703	抗菌药物眼膏涂术眼			
眼底照相	眼底照相FES01702或 儿童眼底照相 FES01703			药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
眼压测量	压陷式眼压计测量 FEA02704或非接触眼 压计(NCT)测量 FEA02705或压平眼压 计(Goldmann眼压计) 测量FEA02706或动态 轮廓眼压计测量 FEA02707或电子压平 眼压计测量FEA02708 或回弹式眼压计测量 FEA02709或眼压日曲 线描记FEA02710或眼 压描记FEA02711			抗菌药物滴眼液	
裂隙灯检查	FEA01726			抗菌药物眼膏	
视力检查	普通远视力检查 FEA01701或普通近视 力检查FEA01702或光 机能检查FEA01703或 伪盲检查FEA01704或 特殊视力检查 FEA01705或选择性观 看检查FEA01706或 视网膜视力检查 FEA01707或阿姆斯勒 (Amsler)表检查 FEA01708			换药辅料	
间接眼底镜检查	FES01707			散瞳药	
眼底检查	前置镜眼底检查 FES01706或间接眼底 镜检查FES01707			抗眼部感染药	
治疗					
静脉注射	ABAD0001				
泪道冲洗	HEE48401				
结膜囊冲洗	HEG48302				
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
三面镜眼底检查	FES01713			双眼B超检查	EDBEA001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
光机能检查	FEA01703	治疗			
相干光断层 (OCT) 眼底扫描	FES01709			治疗	
荧光素眼底血管造影	FEW08201	药物			
治疗				药物	
				降眼压药	

翼状胬肉

翼状胬肉切除组织移植术

适用对象：	病种编码：	CS010			
	主要诊断：	翼状胬肉		ICD-10码：	H11.0
	主要操作/主要治疗方式：	翼状胬肉切除组织移植术		CCHI码：	HEH89309
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10:H11.0翼状胬肉疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，如住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断临床路径流程的实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 手术后反应较轻，病情稳定。 2. 切口闭合好，游离结膜瓣在位，角膜面无感染迹象。 3. 眼压正常，裂隙灯检查无明显异常。			
	最短住院日参考值：	1天			
	变异条件：	1. 等待术前检验检查结果。 2. 手术炎症反应或其它并发症。 3. 患者其他原因(如需要全身麻醉等)。 4. 被点名手术医生其他原因。			
	再入院间隔时间：	1天			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	II级护理	ACAB0001	II级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	治疗		裂隙灯检查	FEA01726
尿常规化学分析	CCAA2000	监测		视力检查	普通远视力检查FEA01701或普通近视力检查FEA01702或光机能检查FEA01703
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	无创心电监测	FKA05705	治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素 (D-Bil)测定 CELB1000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白 (Alb)测定 CEAE8000和尿素 (Urea)测定CEEA8000 和肌酐 (Cr)测定 CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000和肌酸 激酶 (CK) 测定 CECS1000和甘油三酯 (TG)测定CEHB1000和 总胆固醇 (TC)测定 CEHA1000和葡萄糖 (Glu)测定CEFA8000 和钾 (K)测定 CEJA8000和钠 (Na)测 定CEJB8000和氯 (Cl) 测定CEJC8000	麻醉		换药 (小)	ABFA0001
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定 性 (HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	局部静脉内麻醉	HAB42201	药物	
丙型肝炎抗体 (抗 HCV)测定	CGMA1000	手术		抗菌药物	
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	翼状胬肉切除组织移 植术	HEH89309	眼用润滑剂	
梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)测定	CGPP1000	药物			
视力检查	普通远视力检查 FEA01701或普通近视 力检查FEA01702或光 机能检查FEA01703或 视网膜视力检查 FEA01707	抗菌药物			
裂隙灯检查	FEA01726				
眼底检查	免散瞳眼底检查 FES01704或非散瞳直 接检眼镜眼底检查 FES01705或前置镜眼 底检查FES01706或间 接眼底镜检查 FES01707				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
眼压测量	压陷式眼压计测量 FEA02704或非接触眼 压计 (NCT) 测量 FEA02705或压平眼压 计 (Goldmann眼压计) 测量FEA02706或动态 轮廓眼压计测量 FEA02707或电子压平 眼压计测量FEA02708 或回弹式眼压计测量 FEA02709				
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703				
治疗					
泪道冲洗	HEE48401				
结膜囊冲洗	HEG48302				
麻醉					
局部静脉内麻醉	HAB42201				
药物					
抗菌药物眼药水					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
粪便常规检查	CCCA3000			眼压测量	压陷式眼压计测量 FEA02704或非接触眼 压计 (NCT) 测量 FEA02705或压平眼压 计 (Goldmann眼压计) 测量FEA02706或动态 轮廓眼压计测量 FEA02707或电子压平 眼压计测量FEA02708 或回弹式眼压计测量 FEA02709
隐血试验	CCCB8000	治疗		眼底检查（必要时）	免散瞳眼底检查 FES01704或非散瞳直 接检眼镜眼底检查 FES01705或前置镜眼 底检查FES01706或间 接眼底镜检查 FES01707
胸部X线摄影	EABJT001	氧气吸入	ABJA0001	眼前节照相	FEU01701

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
双眼B超检查	EDBEA001	药物		诊断眼位斜视度测定	FEA02713
显然验光	FEA01722	抗代谢药		泪膜破裂时间测定	FEE02701
角膜检查	角膜结膜染色检查 FEH01701或眼前节分 析仪角膜厚度检查 FEH01704或角膜厚度 检查-光学法 FEH01705或角膜知觉 检查-棉丝法 FEH01707或角膜知觉 检查-知觉仪法 FEH01708或角膜刮片 检查FEH01709或角膜 地形图检查FEH01702	抗眼部感染药		泪液分泌试验	FEE04701
眼前节形态测定	FEU02701	眼用消毒剂		治疗	
眼前节照相	FEU01701			睑板腺按摩	KED20701
眼位照相	FEA01733			药物	
诊断眼位斜视度测定	FEA02713			抗眼部感染药	
泪膜破裂时间测定	FEE02701				
泪液分泌试验	FEE04701				
治疗					
睑板腺按摩	KED20701				
药物					

难治性青光眼

睫状体冷冻术

适用对象：	病种编码：	CS011	
	主要诊断：	难治性青光眼	ICD-10码：H44. 501
	主要操作/主要治疗方式：	睫状体冷冻术	CCHI码：HEM72302
	入院标准：	青光眼绝对期或近绝对期, 各种难治性青光眼	
	出院标准：	1. 手术后反应较轻，病情稳定。 2. 无严重并发症。	
	最短住院日参考值：	4天	
	变异条件：	1. 等待术前检验结果。 2. 手术炎症反应或其它并发症。 3. 患者其他原因(如需要全身麻醉, 或者伴全身疾病等)。 4. 被点名手术医生其他原因。	
	再入院间隔时间：	1天	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II 级护理	ACAB0001	II 级护理	ACAB0001	II 级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			眼压测量	压陷式眼压计测量FEA02704或非接触眼压计 (NCT) 测量FEA02705或压平眼压计 (Goldmann眼压计) 测量FEA02706或动态轮廓眼压计测量FEA02707或电子压平眼压计测量FEA02708或回弹式眼压计测量FEA02709
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		裂隙灯检查	FEA01726
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间 (APTT) 测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间 (PT) 测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000			眼底检查	免散瞳眼底检查FES01704或非散瞳直接检眼镜眼底检查FES01705或前置镜眼底检查FES01706或间接眼底镜检查FES01707

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(Alb)测定CEAE8000和尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000和肌酸激酶(CK)测定CECS1000和甘油三酯(TG)测定CEHB1000和总胆固醇(TC)测定CEHA1000和葡萄糖(Glu)测定CEFA8000和钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000	麻醉		视力检查	普通远视力检查FEA01701或普通近视力检查FEA01702或光机能检查FEA01703
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	局部静脉内麻醉	HAB42201	治疗	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000			换药(小)	ABFA0001
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	手术		药物	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	睫状体冷冻术	HEM72302	抗菌药物	
视力检查	普通远视力检查FEA01701或普通近视力检查FEA01702或光机能检查FEA01703或视网膜视力检查FEA01707	药物		抗眼部感染药	
裂隙灯检查	FEA01726	麻醉药			
眼底检查	免散瞳眼底检查FES01704或非散瞳直接检眼镜眼底检查FES01705或前置镜眼底检查FES01706或间接眼底镜检查FES01707	抗菌药物			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
眼压测量	压陷式眼压计测量 FEA02704或非接触眼 压计 (NCT) 测量 FEA02705或压平眼压 计 (Goldmann眼压计) 测量FEA02706或动态 轮廓眼压计测量 FEA02707或电子压平 眼压计测量FEA02708 或回弹式眼压计测量 FEA02709	抗眼部感染药			
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703				
治疗					
泪道冲洗	HEE48401				
结膜囊冲洗	HEG48302				
药物					
抗菌药物					
降眼压药					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
胸部X线透视	EAAJT001			双眼B超检查	EDBEA001
胸部X线摄影	EABJT001			眼前节照相	FEU01701
双眼B超检查	EDBEA001	治疗		治疗	
眼部A超	EDAEA001				
视网膜视力检查	FEA01707	药物		药物	
显然验光	FEA01722	眼用消毒剂		抗炎镇痛药	
角膜检查	角膜结膜染色检查 FEH01701或角膜内皮 镜检查FEH01703或眼 前节分析仪角膜厚度 检查FEH01704或角膜 厚度检查-光学法 FEH01705或角膜厚度 检查-超声法 FEH01706或角膜知觉 检查-棉丝法 FEH01707或角膜知觉 检查-知觉仪法 FEH01708或角膜刮片 检查FEH01709	抗眼部感染药		止血药物	
角膜内皮镜检查	FEH01703	散瞳药		散瞳药	
眼前节形态测定	FEU02701			降眼压药	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
图形视网膜电流图(P-ERG)检查	FEA03701				
超声活体显微镜检查	FEU01702				
眼前节照相	FEU01701				
治疗					
静脉注射	ABAD0001				
药物					
麻醉药					
散瞳滴眼液					

难治性青光眼

外路经巩膜激光睫状体光凝术

适用对象：	病种编码：	CS012			
	主要诊断：	难治性青光眼	ICD-10码：	H44. 501	
	主要操作/主要治疗方式：	外路经巩膜激光睫状体光凝术	CCHI码：	HEM72301	
	入院标准：	青光眼绝对期或近绝对期, 各种难治性青光眼			
	出院标准：	1. 手术后反应较轻，病情稳定。 2. 无严重并发症。			
	最短住院日参考值：	4天			
	变异条件：	1. 等待术前检验结果。 2. 手术炎症反应或其它并发症。 3. 患者其他原因(如需要全身麻醉, 或者伴全身疾病等)。 4. 被点名手术医生其他原因。			
	再入院间隔时间：	1天			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II 级护理	ACAB0001	II 级护理	ACAB0001	II 级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			眼压测量	压陷式眼压计测量FEA02704或非接触眼压计 (NCT) 测量FEA02705或压平眼压计 (Goldmann眼压计) 测量FEA02706或动态轮廓眼压计测量FEA02707或电子压平眼压计测量FEA02708或回弹式眼压计测量FEA02709
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		裂隙灯检查	FEA01726
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间 (APTT) 测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间 (PT) 测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000			眼底检查	免散瞳眼底检查FES01704或非散瞳直接检眼镜眼底检查FES01705或前置镜眼底检查FES01706或间接眼底镜检查FES01707

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000和肌酸激酶(CK)测定CECS1000和甘油三酯(TG)测定CEHB1000和总胆固醇(TC)测定CEHA1000和葡萄糖(Glu)测定CEFA8000和钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000	麻醉		视力检查	普通远视力检查FEA01701或普通近视力检查FEA01702或光机能检查FEA01703
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	局部静脉内麻醉	HAB42201	治疗	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	手术		换药(小)	ABFA0001
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	外路经巩膜激光睫状体光凝术	HEM72301	药物	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	药物		抗菌药物	
视力检查	普通远视力检查FEA01701或普通近视力检查FEA01702或光机能检查FEA01703或视网膜视力检查FEA01707	麻醉药		抗眼部感染药	
裂隙灯检查	FEA01726	抗菌药物			
眼底检查	免散瞳眼底检查FES01704或非散瞳直接检眼镜眼底检查FES01705或前置镜眼底检查FES01706或间接眼底镜检查FES01707	抗眼部感染药			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
眼压测量	压陷式眼压计测量 FEA02704或非接触眼 压计(NCT)测量 FEA02705或压平眼压 计(Goldmann眼压计) 测量FEA02706或动态 轮廓眼压计测量 FEA02707或电子压平 眼压计测量FEA02708 或回弹式眼压计测量 FEA02709				
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703				
治疗					
泪道冲洗	HEE48401				
结膜囊冲洗	HEG48302				
药物					
抗菌药物					
降眼压药					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
胸部X线透视	EAAJT001			双眼B超检查	EDBEA001
胸部X线摄影	EABJT001	治疗		眼前节照相	FEU01701
双眼B超检查	EDBEA001	睑板腺按摩	KED20701	治疗	
眼部A超	EDAEA001	药物			
视网膜视力检查	FEA01707	眼用消毒剂		药物	
眼前节照相	FEU01701	抗眼部感染药		抗炎镇痛药	
显然验光	FEA01722	散瞳药		止血药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
角膜检查	角膜结膜染色检查 FEH01701或角膜内皮 镜检查FEH01703或眼 前节分析仪角膜厚度 检查FEH01704或角膜 厚度检查-光学法 FEH01705或角膜厚度 检查-超声法 FEH01706或角膜知觉 检查-棉丝法 FEH01707或角膜知觉 检查-知觉仪法 FEH01708或角膜刮片 检查FEH01709			散瞳药	
角膜内皮镜检查	FEH01703			降眼压药	
眼前节形态测定	FEU02701				
图形视网膜电流图 (P-ERG) 检查	FEA03701				
超声活体显微镜检查	FEU01702				
治疗					
静脉注射	ABAD0001				
药物					
散瞳滴眼液					
麻醉药					

慢性泪囊炎

鼻内镜鼻腔泪囊吻合术

适用对象：	病种编码：	CS013			
	主要诊断：	慢性泪囊炎		ICD-10码：	H04.401
	主要操作/主要治疗方式：	鼻内镜鼻腔泪囊吻合术		CCHI码：	HGC86601
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：H04.401慢性泪囊炎疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 伤口清洁,无红肿溢脓。 2. 泪道冲洗通畅。			
	最短住院日参考值：	5天			
	变异条件：	1. 泪总管阻塞需再行探通术或义管植入术,不进入路径。 2. 术后3天内泪道不通可请鼻科会诊，去鼻腔内血痂后再冲。 3. 术后出现严重感染,不进入路径。 4. 出现全身疾病,住院期间需继续治疗,不进入路径。 5. 需全麻者不进入路径。			
	再入院时间间隔要求：				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
Ⅲ级护理	ACAA0001	Ⅱ级护理	ACAB0001	Ⅱ级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000				
裂隙灯检查	FEA01726	治疗		治疗	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000和活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000和血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000和血浆纤维蛋白原测定CAGD1000			泪道冲洗	HEE48401

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
感染四项	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000和丙型肝炎抗体(抗HCV)测定 CGMA1000和梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定 CGPP1000和人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定 CGMF1000	麻醉		药物	
肝肾功能	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr)测定 CEEB8000丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定 CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定 CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定 CECC8000和总蛋白(TP)测定 CEAA8000和白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定 CECD8000	局部静脉内麻醉	HAB42201	抗菌素眼液	
尿常规化学分析	CCAA2000	手术		滴鼻剂	
胸部X光片	胸部X线透视 EAAJT001或胸部X线摄影 EABJT001	鼻内镜鼻腔泪囊吻合术	HGC86601	消毒药物	
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道常规心电图检查 FKA03702或十二通道常规心电图检查 FKA03703	药物			
视功能检查	普通远视力检查 FEA01701或普通近视力检查 FEA01702或光机能检查 FEA01703	抗菌素眼液			
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	滴鼻剂			
治疗					
泪道冲洗	HEE48401				
药物					
抗生素眼液					
滴鼻剂					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
检查		检查		治疗	
泪道X线造影	EACEE001	眼压测量	压陷式眼压计测量 FEA02704或非接触眼 压计(NCT) 测量 FEA02705或压平眼压 计(Goldmann眼压计) 测量FEA02706或动态 轮廓眼压计测量 FEA02707或电子压平 眼压计测量FEA02708 或回弹式眼压计测量 FEA02709	鼻腔冲洗治疗	KGC48401
鼻部鼻窦X线计算机 体层(CT) 平扫	EBAGF001	治疗		药物	
				止血药物	
		药物		抗生素	
		止血药物		糖皮质激素	
		抗生素			

四、耳和乳突疾病

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
DS001	分泌性中耳炎	鼓膜置管术
DS002	慢性化脓性中耳炎	I型鼓室成形术
DS003	慢性化脓性中耳炎	经耳内镜I型鼓室成形术
DS004	慢性化脓性中耳炎	II型鼓室成形术
DS005	慢性化脓性中耳炎	III型鼓室成形术
DS006	慢性化脓性中耳炎	IV型鼓室成形术
DS007	慢性化脓性中耳炎	V型鼓室成形术
DS008	慢性化脓性中耳炎	外耳道鼓室成形术

分泌性中耳炎
鼓膜置管术

适用对象：	病种编码：	DS001			
	主要诊断：	分泌性中耳炎		ICD-10码：	H65.300
	主要操作/主要治疗方式：	鼓膜置管术		CCHI码：	HFF62301
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：H65.300 分泌性中耳炎疾病编码，并有下列情况之一：有较高危险发生言语发育障碍（原有感音神经性聋、颅面部发育异常及神经和认识障碍、精神运动发育迟缓和腭裂）；已有言语发育延迟；复发性急性中耳炎伴分泌性中耳炎；鼓膜有严重的内陷袋形成伴或不伴粘连；分泌性中耳炎持续3个月以上。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。				
出院标准：	1. 一般情况好，无耳流脓液。 2. 通气管位置好。 3. 没有需要住院处理的并发症。				
最短住院日参考值：	1天（临床路径：标准住院日≤5天）				
变异条件：	1. 伴有影响手术的合并症，需进行相关诊断和治疗等。 2. 出现手术并发症，需进一步诊断和治疗。				
再入院间隔时间：	5天				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	II级护理	ACAB0001
/III级护理	ACAA0001	检查		检查	
检查					
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	治疗		治疗	
尿常规化学分析	CCAA2000	氧气吸入	ABJA0001		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 或天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000或总胆红素(T-Bil)测定 CELA1000或直接胆红素(D-Bil)测定 CELB1000或γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定 CECC8000或总蛋白(TP)测定CEAA8000或 白蛋白(Alb)测定CEAE8000或碱性磷酸酶(ALP)测定 CECD8000	院内遥测心电图监护	KKA28701	药物	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	监测		抗菌药物	
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000			鼻喷激素	
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	麻醉		黏液促排剂	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	全身麻醉	HAA42901		
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000	手术			
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	鼓膜置管术	HFF62301		
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	药物			
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
胸部x线摄影	EABJT001				
十二通道常规心电图检查	FKA03703				
纯音听阈测定	FFA02701				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
声导抗测听	FFA02401				
耳部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBFA001				
院内会诊	AADB0001				
治疗					
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
小儿行为听力测试	FFA02709				
听性脑干反应潜伏期测试	FFA02710	治疗		治疗	
听性脑干反应阈值测试	FFA02711				
听性脑干反应骨导阈值测试	FFA02712	药物		药物	
纤维喉镜检查	FGM01602				
治疗					
药物					

慢性化脓性中耳炎

I型鼓室成形术

适用对象：	病种编码：	DS002			
	主要诊断：	慢性化脓性中耳炎	ICD-10码：	H66. 1/H66. 2/H66. 3/H71/H74. 802	
	主要操作/主要治疗方式：	I型鼓室成形术	CCHI码：	HFE83301	
	主要操作/主要治疗方式：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：H66. 1/H66. 2/H66. 3/H71/H74. 802慢性化脓性中耳炎疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 一般情况良好，无伤口感染。 2. 没有需要住院处理的并发症。			
	最短住院日参考值：	≤3天			
	变异条件：	1. 伴有影响手术的合并症，需进行相关诊断和治疗等，导致住院时间延长，治疗费用增加。 2. 出现手术并发症，需进一步诊断和治疗，导致住院时间延长，治疗费用增加。			
	再入院时间间隔：	14天			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
/III级护理	ACAA0001	检查		/II级护理	ACAB0001
检查				检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	治疗		治疗	
尿常规化学分析	CCAA2000	氧气吸入	ABJA0001	换药	换药(小)ABFA0001或 换药(中)ABFA0002或 换药(大)ABFA0003或 换药(特大)ABFA0004

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000	院内遥测心电监护	KKA28701	药物	
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000和尿酸 (UA) 测定 CEEE8000	监测		抗菌药物	
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测定 CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测定 CEJE8000和总钙 (Ca) 测定 CEJF8000				
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000	麻醉			
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间 (APTT) 测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间 (PT) 测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000	局部静脉内麻醉	HAB42201		
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs) 测定	乙型肝炎表面抗原定性 (HBsAg) 测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量 (HBsAg) 测定 CGLH1000	/全身麻醉	HAA42901		
丙型肝炎抗体 (抗HCV) 测定	CGMA1000	手术			
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV) 测定	CGMF1000	I型鼓室成形术	HFE83301		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	病理			
单通道常规心电图检查	FKA03701	细针穿刺细胞学检查与诊断	BBAA0001		
/多通道常规心电图检查	FKA03702	穿刺组织活检病理诊断	BCAA0001		
/十二通道常规心电图检查	FKA03703	药物			
胸椎X线摄影	EABVN001	抗菌药物			
咽鼓管压力测定	FFH02401				
耳部X线计算机体层(CT)平扫	EBafa001				
头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001				
院内会诊	AADB0001				
病理及其它					
一般细菌培养+鉴定	CJAP8000				
普通细菌药敏试验	普通细菌药敏定性试验CJBX9000或普通细菌药敏定量试验CJBY9000				
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
面神经功能电脑检测	FCH03702	ABR检查	听性脑干反应潜伏期测试FFA02710和听性脑干反应阈值测试FFA02711和听性脑干反应骨导阈值测试FFA02712		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
治疗		面神经功能电脑检测	FCH03702	治疗	
		治疗		氧气吸入	ABJA0001
药物				监测	
		药物		心电监护	院内遥测心电监护 KKA28701 或无创心电监测 FKA05705
		糖皮质激素		药物	
		非耳毒性抗菌药物			

慢性化脓性中耳炎

经耳内镜I型鼓室成形术

适用对象：	病种编码：	DS003			
	主要诊断：	慢性化脓性中耳炎	ICD-10码：	H66. 1/H66. 2/H66. 3/H71/H74. 802	
	主要操作/主要治疗方式：	经耳内镜I型鼓室成形术	CCHI码：	HFE83601	
	主要操作/主要治疗方式：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：H66. 1/H66. 2/H66. 3/H71/H74. 802慢性化脓性中耳炎疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 一般情况良好，无伤口感染。 2. 没有需要住院处理的并发症。			
	最短住院日参考值：	≤3天			
	变异条件：	1. 伴有影响手术的合并症，需进行相关诊断和治疗等，导致住院时间延长，治疗费用增加。 2. 出现手术并发症，需进一步诊断和治疗，导致住院时间延长，治疗费用增加。			
	再入院时间间隔：	14天			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
Ⅱ级护理	ACAB0001	Ⅰ级护理	ACAC0001	Ⅰ级护理	ACAC0001
/Ⅲ级护理	ACAA0001	检查		/Ⅱ级护理	ACAB0001
检查				检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	治疗			
尿常规化学分析	CCAA2000	氧气吸入	ABJA0001	治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	院内遥测心电监护	KKA28701	换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	监测		药物	
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000			抗菌药物	
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	麻醉			
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	局部静脉内麻醉	HAB42201		
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	/全身麻醉	HAA42901		
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	手术			
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	经耳内镜I型鼓室成形术	HFE83601		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	病理			
单通道常规心电图检查	FKA03701	细针穿刺细胞学检查与诊断	BBAA0001		
/多通道常规心电图检查	FKA03702	穿刺组织活检病理诊断	BCAA0001		
/十二通道常规心电图检查	FKA03703	药物			
胸椎X线摄影	EABVN001	抗菌药物			
咽鼓管压力测定	FFH02401				
耳部X线计算机体层(CT)平扫	EBAFA001				
头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001				
院内会诊	AADB0001				
病理及其它					
一般细菌培养+鉴定	CJAP8000				
普通细菌药敏试验	普通细菌药敏定性试验CJBX9000或普通细菌药敏定量试验CJBY9000				
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
面神经功能电脑检测	FCH03702	ABR检查	听性脑干反应潜伏期测试FFA02710和听性脑干反应阈值测试FFA02711和听性脑干反应骨导阈值测试FFA02712		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
治疗		面神经功能电脑检测	FCH03702	治疗	
		治疗		氧气吸入	ABJA0001
药物				监测	
		药物		心电监护	院内遥测心电监护 KKA28701 或无创心电监测 FKA05705
		糖皮质激素		药物	

慢性化脓性中耳炎

Ⅱ型鼓室成形术

适用对象：	病种编码：	DS004			
	主要诊断：	慢性化脓性中耳炎	ICD-10码：	H66. 1/H66. 2/H66. 3/H71/H74. 802	
	主要操作/主要治疗方式：	Ⅱ型鼓室成形术	CCHI码：	HFE83302	
	主要操作/主要治疗方式：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：H66. 1/H66. 2/H66. 3/H71/H74. 802慢性化脓性中耳炎疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 一般情况良好，无伤口感染。 2. 没有需要住院处理的并发症。			
	最短住院日参考值：	≤7天			
	变异条件：	1. 伴有影响手术的合并症，需进行相关诊断和治疗等，导致住院时间延长，治疗费用增加。 2. 出现手术并发症，需进一步诊断和治疗，导致住院时间延长，治疗费用增加。			
	再入院时间间隔：	14天			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
Ⅱ级护理	ACAB0001	Ⅰ级护理	ACAC0001	Ⅰ级护理	ACAC0001
/Ⅲ级护理	ACAA0001	检查		/Ⅱ级护理	ACAB0001
检查				检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	治疗			
尿常规化学分析	CCAA2000	氧气吸入	ABJA0001	治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	院内遥测心电图监护	KKA28701	换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	监测		药物	
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000			抗菌药物	
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	麻醉			
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	局部静脉内麻醉	HAB42201		
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	/全身麻醉	HAA42901		
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	手术			
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	II型鼓室成形术	HFE83302		
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
单通道常规心电图检查	FKA03701	病理			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
/多通道常规心电图检查	FKA03702	细针穿刺细胞学检查与诊断	BBAA0001		
/十二通道常规心电图检查	FKA03703	穿刺组织活检病理诊断	BCAA0001		
胸椎X线摄影	EABVN001	药物			
咽鼓管压力测定	FFH02401	抗菌药物			
耳部X线计算机体层(CT)平扫	EBAFA001				
头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001				
院内会诊	AADB0001				
病理					
一般细菌培养+鉴定	CJAP8000				
普通细菌药敏试验	普通细菌药敏定性试验CJBX9000或普通细菌药敏定量试验CJBY9000				
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
面神经功能电脑检测	FCH03702	ABR检查	听性脑干反应潜伏期测试FFA02710和听性脑干反应阈值测试FFA02711和听性脑干反应骨导阈值测试FFA02712		
治疗		面神经功能电脑检测	FCH03702	治疗	
		治疗		氧气吸入	ABJA0001
药物				监测	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
		药物		心电监护	院内遥测心电监护 KKA28701 或无创心电监测 FKA05705
		糖皮质激素		药物	
				术后镇痛药	

慢性化脓性中耳炎

III型鼓室成形术

适用对象：	病种编码：	DS005	
	主要诊断：	慢性化脓性中耳炎	ICD-10码： H66.1/H66.2/H66.3/H71/H74.802
	主要操作/主要治疗方式：	III型鼓室成形术	CCHI码：HFE83303
	主要操作/主要治疗方式：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：H66.1/H66.2/H66.3/H71/H74.802慢性化脓性中耳炎疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。	
	出院标准：	1. 一般情况良好，无伤口感染。 2. 没有需要住院处理的并发症。	
	最短住院日参考值：	≤7天	
	变异条件：	1. 伴有影响手术的合并症，需进行相关诊断和治疗等，导致住院时间延长，治疗费用增加。 2. 出现手术并发症，需进一步诊断和治疗，导致住院时间延长，治疗费用增加。	
	再入院时间间隔：	14天	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
/III级护理	ACAA0001	检查		/II级护理	ACAB0001
检查				检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	治疗			
尿常规化学分析	CCAA2000	氧气吸入	ABJA0001	治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	院内遥测心电监护	KKA28701	换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	监测		药物	
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000			抗菌药物	
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	麻醉			
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	局部静脉内麻醉	HAB42201		
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	/全身麻醉	HAA42901		
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	手术			
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	II型鼓室成形术	HFE83302		
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
单通道常规心电图检查	FKA03701	病理			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
/多通道常规心电图检查	FKA03702	细针穿刺细胞学检查与诊断	BBAA0001		
/十二通道常规心电图检查	FKA03703	穿刺组织活检病理诊断	BCAA0001		
胸椎X线摄影	EABVN001	药物			
咽鼓管压力测定	FFH02401	抗菌药物			
耳部X线计算机体层(CT)平扫	EBAFA001				
头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001				
院内会诊	AADB0001				
病理					
一般细菌培养+鉴定	CJAP8000				
普通细菌药敏试验	普通细菌药敏定性试验CJBX9000或普通细菌药敏定量试验CJBY9000				
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
面神经功能电脑检测	FCH03702	听性脑干反应阈值测试	听性脑干反应潜伏期测试FFA02710和听性脑干反应阈值测试FFA02711和听性脑干反应骨导阈值测试FFA02712		
治疗		面神经功能电脑检测	FCH03702	治疗	
		治疗		氧气吸入	ABJA0001
药物				监测	
		药物		心电监护	院内遥测心电监护KKA28701或无创心电监测FKA05705
		糖皮质激素		药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
				术后镇痛药	

慢性化脓性中耳炎

IV型鼓室成形术

适用对象：	病种编码：	DS006			
	主要操作/主要治疗方式：	慢性化脓性中耳炎	ICD-10码：	H66. 1/H66. 2/H66. 3/H71/H74. 802	
	主要操作/主要治疗方式：	IV型鼓室成形术	CCHI码：	HFE83304	
入院标准：		1. 第一诊断必须符合ICD-10：H66. 1/H66. 2/H66. 3/H71/H74. 802慢性化脓性中耳炎疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
出院标准：		1. 一般情况良好，无伤口感染。 2. 没有需要住院处理的并发症。			
最短住院日参考值：		≤7天			
变异条件：		1. 伴有影响手术的合并症，需进行相关诊断和治疗等，导致住院时间延长，治疗费用增加。 2. 出现手术并发症，需进一步诊断和治疗，导致住院时间延长，治疗费用增加。			
再入院时间间隔：		14天			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
/III级护理	ACAA0001	检查		/II级护理	ACAB0001
检查				检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	治疗			
尿常规化学分析	CCAA2000	氧气吸入	ABJA0001	治疗	
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	院内遥测心电监护	KKA28701	换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000	监测		药物	
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000			抗菌药物	
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	麻醉			
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测定 CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	局部静脉内麻醉	HAB42201		
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	/全身麻醉	HAA42901		
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	手术			
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	II型鼓室成形术	HFE83302		
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000	病理			
单通道常规心电图检 查	FKA03701	细针穿刺细胞学检查 与诊断	BBAA0001		
/多通道常规心电图 检查	FKA03702	穿刺组织活检病理诊 断	BCAA0001		
/十二通道常规心电 图检查	FKA03703	药物			
胸椎X线摄影	EABVN001	抗菌药物			
咽鼓管压力测定	FFH02401				
耳部X线计算机体层 (CT)平扫	EBAFA001				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001				
院内会诊	AADB0001				
病理及其它					
一般细菌培养+鉴定	CJAP8000				
普通细菌药敏试验	普通细菌药敏定性试验CJBX9000或普通细菌药敏定量试验CJBY9000				
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
面神经功能电脑检测	FCH03702	ABR检查	听性脑干反应潜伏期测试FFA02710和听性脑干反应阈值测试FFA02711和听性脑干反应骨导阈值测试FFA02712		
治疗		面神经功能电脑检测	FCH03702	治疗	
		治疗		氧气吸入	ABJA0001
药物				监测	
		药物		心电监护	院内遥测心电监护KKA28701 或无创心电监测FKA05705
		糖皮质激素		药物	
				术后镇痛药	

慢性化脓性中耳炎

V型鼓室成形术

适用对象：	病种编码：	DS007			
	主要操作/主要治疗方式：	慢性化脓性中耳炎	ICD-10码：	H66. 1/H66. 2/H66. 3/H71/H74. 802	
	主要操作/主要治疗方式：	V 型鼓室成形术	CCHI码：	HFE83305	
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：H66. 1/H66. 2/H66. 3/H71/H74. 802慢性化脓性中耳炎疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。				
出院标准：	1. 一般情况良好，无伤口感染。 2. 没有需要住院处理的并发症。				
最短住院日参考值：	≤7天				
变异条件：	1. 伴有影响手术的合并症，需进行相关诊断和治疗等，导致住院时间延长，治疗费用增加。 2. 出现手术并发症，需进一步诊断和治疗，导致住院时间延长，治疗费用增加。				
再入院时间间隔：	14天				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
/III级护理	ACAA0001	检查		/II级护理	ACAB0001
检查				检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	治疗			
尿常规化学分析	CCAA2000	氧气吸入	ABJA0001	治疗	
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	院内遥测心电监护	KKA28701	换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000	监测		药物	
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000			抗菌药物	
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	麻醉			
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测定 CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	局部静脉内麻醉	HAB42201		
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	/全身麻醉	HAA42901		
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	手术			
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	II型鼓室成形术	HFE83302		
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000	病理			
单通道常规心电图检 查	FKA03701	细针穿刺细胞学检查 与诊断	BBAA0001		
/多通道常规心电图 检查	FKA03702	穿刺组织活检病理诊 断	BCAA0001		
/十二通道常规心电 图检查	FKA03703	药物			
胸椎X线摄影	EABVN001	抗菌药物			
咽鼓管压力测定	FFH02401				
耳部X线计算机体层 (CT)平扫	EBAFA001				
头部X线计算机体层 (CT)平扫	EBABP001				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
院内会诊	AADB0001				
病理及其它					
一般细菌培养+鉴定	CJAP8000				
普通细菌药敏试验	普通细菌药敏定性试验CJBX9000或普通细菌药敏定量试验CJBY9000				
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
面神经功能电脑检测	FCH03702	听性脑干反应阈值测试	听性脑干反应潜伏期测试FFA02710和听性脑干反应阈值测试FFA02711和听性脑干反应骨导阈值测试FFA02712		
治疗		面神经功能电脑检测	FCH03702	治疗	
		治疗		氧气吸入	ABJA0001
药物				监测	
		药物		心电监护	院内遥测心电监护KKA28701或无创心电监测FKA05705
		糖皮质激素		药物	
				术后镇痛药	

慢性化脓性中耳炎

外耳道鼓室成形术

适用对象：	病种编码：	DS008			
	主要操作/主要治疗方式：	慢性化脓性中耳炎	ICD-10码：	H66. 1/H66. 2/H66. 3/H71/H74. 802	
	主要操作/主要治疗方式：	外耳道鼓室成形术	CCHI码：	HFC83401	
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：H66. 1/H66. 2/H66. 3/H71/H74. 802慢性化脓性中耳炎疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。				
出院标准：	1. 一般情况良好，无伤口感染。 2. 没有需要住院处理的并发症。				
最短住院日参考值：	≤7天				
变异条件：	1. 伴有影响手术的合并症，需进行相关诊断和治疗等，导致住院时间延长，治疗费用增加。 2. 出现手术并发症，需进一步诊断和治疗，导致住院时间延长，治疗费用增加。				
再入院时间间隔：	14天				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II 级护理	ACAB0001	I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001
/III级护理	ACAA0001	检查		/II 级护理	ACAB0001
检查				检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	治疗			
尿常规化学分析	CCAA2000	氧气吸入	ABJA0001	治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(Alb)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	院内遥测心电监护	KKA28701	换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	监测		药物	
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000			抗菌药物	
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	麻醉			
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	局部静脉内麻醉	HAB42201		
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	/全身麻醉	HAA42901		
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	手术			
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	II型鼓室成形术	HFE83302		
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	病理			
单通道常规心电图检查	FKA03701	细针穿刺细胞学检查与诊断	BBAA0001		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
/多通道常规心电图检查	FKA03702	穿刺组织活检病理诊断	BCAA0001		
/十二通道常规心电图检查	FKA03703	药物			
胸椎X线摄影	EABVN001	抗菌药物			
咽鼓管压力测定	FFH02401				
耳部X线计算机体层(CT)平扫	EBAFA001				
头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001				
院内会诊	AADB0001				
病理					
一般细菌培养+鉴定	CJAP8000				
普通细菌药敏试验	普通细菌药敏定性试验CJBX9000或普通细菌药敏定量试验CJBY9000				
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
面神经功能电脑检测	FCH03702	听性脑干反应阈值测试	听性脑干反应潜伏期测试FFA02710和听性脑干反应阈值测试FFA02711和听性脑干反应骨导阈值测试FFA02712		
治疗		面神经功能电脑检测	FCH03702	治疗	
		治疗		氧气吸入	ABJA0001
药物				监测	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
		药物		心电监护	院内遥测心电监护 KKA28701 或无创心电监测 FKA05705
		糖皮质激素		药物	
				术后镇痛药	

五、鼻咽喉疾病

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
ES001	慢性扁桃体炎	扁桃体切除术
ES002	鼻中隔偏曲	经鼻内镜鼻中隔偏曲矫正术
ES003	声带息肉	经支撑喉镜激光辅助声带肿物切除术
ES004	慢性鼻窦炎	经鼻内镜全组鼻窦开放术
ES005	喉癌	喉全切除术
ES006	喉癌	喉次全切除术

慢性扁桃体炎
扁桃体切除术

适用对象：	病种编码：	ES001	
	主要诊断：	慢性扁桃体炎	ICD-10码：J35.0
	主要操作/主要治疗方式：	扁桃体切除术	CCHI码：HGS75301
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：J35.0。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 一般情况良好，咽喉部无明显感染征象。 2. 没有需要住院处理的并发症。		
最短住院日参考值：	9天		
变异条件：	1. 伴有影响手术的合并症，需进行相关诊断和治疗等，导致住院时间延长，治疗费用增加。 2. 出现手术并发症，需进一步诊断和治疗，导致住院时间延长，治疗费用增加。		
再入院间隔时间：	5天		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	II级护理	ACAB0001
/III级护理	ACAA0001	检查		检查	
检查					
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	治疗		治疗	
红细胞沉降率(ESR)测定	CAAJ1000	氧气吸入	ABJA0001		
尿常规化学分析	CCAA2000	院内遥测心电监护	KKA28701	药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 或天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000或总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000或直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000或γ-谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000或总蛋白 (TP) 测定CEAA8000或白蛋白 (Alb) 测定 CEAE8000或碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000	监测			
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000				
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测定 CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测定 CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000	麻醉			
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000	全身麻醉	HAA42901		
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间 (APTT) 测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间 (PT) 测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000	手术			
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs) 测定	乙型肝炎表面抗原定性 (HBsAg) 测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量 (HBsAg) 测定 CGLH1000	扁桃体切除术	HGS75301		
丙型肝炎抗体 (抗HCV) 测定	CGMA1000	病理			
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV) 测定	CGMF1000	细针穿刺细胞学检查与诊断	BBAA0001		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	穿刺组织活检病理诊断	BCAA0001		
胸部x线摄影	EABJT001	药物			
超敏C反应蛋白(hs-CRP)测定	CEAU1000	抗菌药物			
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703				
院内会诊	AADB0001				
治疗					
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
治疗		治疗		治疗	
药物		药物		药物	

鼻中隔偏曲

经鼻内镜鼻中隔偏曲矫正术

适用对象：	病种编码：	ES002			
	主要诊断：	鼻中隔偏曲		ICD-10码：	J34.2
	主要操作/主要治疗方式：	经鼻内镜鼻中隔偏曲矫正术		CCHI码：	HGD83601
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：J34.2。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。				
出院标准：	1. 切口愈合较好。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。				
最短住院日参考值：	7天				
变异条件：	1. 伴有影响手术的合并症，需进行相关诊断和治疗等，导致住院时间延长，治疗费用增加。 2. 出现手术并发症，需进一步诊断和治疗，导致住院时间延长，治疗费用增加。				
再入院间隔时间：	5天				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	II级护理	ACAB0001
/III级护理	ACAA0001	检查		检查	
检查				鼻内镜检查	FGA01601
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	治疗		治疗	
红细胞沉降率(ESR)测定	CAAJ1000	氧气吸入	ABJA0001	鼻腔冲洗治疗	KGC48401
尿常规化学分析	CCAA2000	肌肉注射	ABAC0001	换药（大）	ABFA0003

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 或天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000或总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000或直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000或γ-谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000或总蛋白 (TP) 测定CEAA8000或白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000或碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000	皮内注射	ABAA0001	静脉输液	ABCA0001
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000和尿酸 (UA) 测定 CEEE8000	院内遥测心电监护	KKA28701	氧气吸入	ABJA0001
酶及相关物质检验	肌酸激酶 (CK) 测定 CECS1000和肌酸激酶-MB同工酶活性 (CK-MB) 测定 CECT1000和乳酸脱氢酶 (LD) 测定 CECW1000	监测		皮内注射	ABAA0001
脂质及其相关物质检验	总胆固醇 (TC) 测定 CEHA1000和甘油三酯 (TG) 测定 CEHB1000和高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C) 测定 CEHC1000和低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C) 测定 CEHD1000			肌肉注射	ABAC0001
蛋白质及多肽类检验	总蛋白 (TP) 测定 CEAA8000和白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000	麻醉		静脉采血	ABBB0001
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测定 CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测定 CEJE8000和总钙 (Ca) 测定 CEJF8000	全身麻醉	HAA42901	药物	
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000	病理		鼻喷激素	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	活检组织病理诊断	BCAB0001	黏液促排剂	
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	手术		抗菌药物	
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	经鼻内镜鼻中隔偏曲 矫正术	HGD83601	口服激素	
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	药物		止血药物	
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000	抗菌药物			
胸部x线摄影	EABJT001	止血药物			
超敏C反应蛋白(hs- CRP)测定	CEAU1000				
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703				
前鼻镜检查	FGA01602				
变应原点刺试验	FYR04102				
嗅觉功能检查	FGA01401				
鼻阻力检查	FGA01402				
声反射鼻腔测量	FGC02401				
鼻分泌物细胞检测	FGA02401				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
院内会诊	AADB0001				
鼻内镜检查	FGA01601				
鼻部鼻窦X线计算机 体层(CT)平扫	EBAGF001				
治疗					
鼻腔冲洗治疗	KGC48401				
药物					
鼻喷激素					
黏液促排剂					
抗菌药物					
口服激素					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
		眼耳鼻喉微动力系统	NBBA0000		
治疗		治疗		治疗	
		经鼻内镜鼻中隔偏曲 三线减张术	HGD70601		
药物		药物		药物	

声带息肉

经支撑喉镜激光辅助声带肿物切除术

适用对象：	病种编码：	ES003		
	主要诊断：	声带息肉	ICD-10码： J38.102	
	主要操作/主要治疗方式：	经支撑喉镜激光辅助声带肿物切除术	CCHI码： HGP73601	
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10： J38.102。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
出院标准：	1. 一般情况良好，咽喉部无明显感染征象。 2. 没有需要住院处理的并发症。			
最短住院日参考值：	≤7天			
变异条件：	1. 伴有影响手术的合并症，需进行相关诊断和治疗等，导致住院时间延长，治疗费用增加。 2. 出现手术并发症，需进一步诊断和治疗，导致住院时间延长，治疗费用增加。			
再入院间隔时间：	5天			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	II级护理	ACAB0001
/III级护理	ACAA0001	检查		检查	
检查				电子纤维喉镜检查	FGM01603
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	治疗		治疗	
红细胞沉降率(ESR)测定	CAAJ1000	氧气吸入	ABJA0001	超声雾化吸入	ABKA0001
尿常规化学分析	CCAA2000	院内遥测心电监护	KKA28701	药物	
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000或天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000或总胆红素(T-Bil)测定CELA1000或直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000或γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000或总蛋白(TP)测定CEAA8000或白蛋白(A1b)测定CEAE8000或碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	监测		激素	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEE8000和肌酐(Cr)测定 CEE8000和尿酸(UA)测定 CEE8000			生理盐水	
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和 钠(Na)测定CEJB8000和 氯(Cl)测定CEJC8000和 总二氧化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙(Ca)测定 CEJF8000	麻醉		含漱液	
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	全身麻醉	HAA42901		
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分凝血 活酶时间(APTT)测定 CAGB1000或血浆凝血酶 原时间(PT)测定 CAGC1000或血浆纤维蛋 白原测定CAGD1000	手术			
乙型肝炎表面抗原(抗 HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性 (HBsAg)测定CGLG1000 或乙型肝炎表面抗原定 量(HBsAg)测定 CGLH1000	经支撑喉镜激光辅助声 带肿物切除术	HGP73601		
丙型肝炎抗体(抗HCV) 测定	CGMA1000	病理			
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	细针穿刺细胞学检查与 诊断	BBAA0001		
梅毒螺旋体抗体(抗TP) 测定	CGPP1000	穿刺组织活检病理诊断	BCAA0001		
胸部x线摄影	EABJT001	药物			
超敏C反应蛋白(hs- CRP)测定	CEAU1000	抗菌药物			
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道常规 心电图检查FKA03702或 十二通道常规心电图检 查FKA03703				
院内会诊	AADB0001				
频闪喉镜检查	FGM01601				
嗓音频谱检查	FGM01701				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
电子纤维喉镜检查	FGM01603				
治疗					
超声雾化吸入	ABKA0001				
药物					
激素					
生理盐水					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
				频闪喉镜检查	FGM01601
治疗		治疗		治疗	
药物		药物		药物	
抗菌药物				抗菌药物	

慢性鼻窦炎

经鼻内镜全组鼻窦开放术

适用对象：	病种编码：	ES004	
	主要诊断：	慢性鼻—鼻窦炎	ICD-10码： J32.0-J32.4/J32.8/J32.9
	主要操作/主要治疗方式：	经鼻内镜全组鼻窦开放术	CCHI码： HGF50605
入院标准		1. 第一诊断必须符合ICD-10： J32.0-J32.4/J32.8/J32.9慢性鼻窦炎疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。	
出院标准		1. 一般情况良好。 2. 没有需要住院处理的并发症。	
最短住院日参考值：≤5天			
变异条件		1. 伴有影响手术的合并症，需进行相关诊断和治疗等，导致住院时间延长，治疗费用增加。 2. 出现手术并发症，需进一步诊断和治疗，导致住院时间延长，治疗费用增加。	
再入院时间间隔：	14天		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	II级护理	ACAB0001
/III级护理	ACAA0001	检查		检查	
检查					
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	治疗		治疗	
尿常规化学分析	CCAA2000	氧气吸入	ABJA0001	换药	换药(小)ABFA0001 或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定 CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定 CECC8000和总蛋白(TP)测定 CEAA8000和白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定 CECD8000	院内遥测心电监护	KKA28701	鼻腔冲洗治疗	KGC48401
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr)测定 CEEB8000和尿酸(UA)测定 CEEE8000	监测		药物	
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000			抗菌药物	
电解质测定	钾(K)测定 CEJA8000和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙(Ca)测定 CEJF8000	麻醉		止血药物	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000	局部静脉内麻醉	HAB42201		
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000	/全身麻醉	HAA42901		
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	手术			
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	病理			
胸椎X线摄影	EABVN001	细针穿刺细胞学检查与诊断	BBAA0001		
单通道常规心电图检查	FKA03701	穿刺组织活检病理诊断	BCAA0001		
/多通道常规心电图检查	FKA03702	药物			
/十二通道常规心电图检查	FKA03703	止血药物			
鼻部鼻窦X线计算机体层(CT)平扫	EBAGF001				
药物					
术前抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
鼻功能测试					
病理		病理		病理	
血清过敏原特异IgE测定	CGUA1000				
治疗		治疗		治疗	
药物				药物	
糖皮质激素				糖皮质激素	
				黏液促排剂	
				术后镇痛药	

喉癌

喉次全切除术

适用对象：	病种编码：	ES005	
	主要诊断：	喉癌	ICD-10码：C32.0-C32.3/C32.8/C32.9
	主要操作/主要治疗方式：	喉全切除术	CCHI码：HGM73307
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：C32.0-C32.3/C32.8/C32.9喉癌疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 一般情况良好，咽喉部无明显感染征象。 2. 没有需要住院处理的并发症。		
最短住院日参考值：	18天		
变异条件：	1. 术中、术后出现并发症（如咽瘘等），需要特殊诊断治疗措施，导致住院时间延长，治疗费用增加。 2. 伴有影响本病治疗效果的合并症，需要采取进一步检查和诊断，导致住院时间延长，治疗费用增加。		
再入院间隔时间：	28天		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	压疮护理	ACBN0001
/III级护理	ACAA0001	检查		引流管护理	ACBK0001
检查				吸痰护理	ACBJ0004
肺功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404	治疗		气管切开套管更换	ACBJ0002
电子纤维喉镜检查	FGM01603	氧气吸入	ABJA0001	气管切开护理	ACBJ0001
纤维喉镜检查	FGM01602	监测		口腔护理	ACBH0001
频闪喉镜检查	FGM01601	院内遥测心电监护	KKA28701	特级护理	ACAD0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
颈部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBHY001	麻醉		I 级护理	ACAC0001
院外影像学资料会诊	AADE0001	全身麻醉	HAA42901	II 级护理	ACAB0001
ABO血型鉴定(正定型)	CAMA1000	手术		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	喉部术区修复术	复合组织游离移植术HYX89306或带蒂肌瓣移植术HYX89305或显微镜下吻合血管复合组织移植术HYX89309或邻位皮瓣移植术HYW89302或带蒂轴型皮瓣转移术HYW88301或带蒂复合组织瓣移植术HYW88302或带蒂皮瓣转移术HYW88305或岛状皮瓣成形术HYW88310或游离植皮术(大)HYV89303或游离植皮术(中)HYV89302或游离植皮术(小)HYV89301	手术标本病理诊断	BCAD0001
尿常规化学分析	CCAA2000	颈淋巴结清扫术	根治性颈淋巴结清扫术HNG73304或功能性颈淋巴结清扫术HNG73303或择区性颈淋巴结清扫术HNG73302或颈淋巴结清扫术HNG73301	生化检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000或天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000或总胆红素(T-Bil)测定CELA1000或直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000或γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000或总蛋白(TP)测定CEAA8000或白蛋白(A1b)测定CEAE8000或碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000 或尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000或钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000或葡萄糖(Glu)测定CEFA8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 或天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000或总胆红素(T-Bil)测定 CELA1000或直接胆红素(D-Bil)测定 CELB1000或 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定 CECC8000或总蛋白(TP)测定CEAA8000或白蛋白(A1b)测定 CEAE8000或碱性磷酸酶(ALP)测定 CECD8000	气管切开术	HJC50301	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr)测定 CEEB8000和尿酸(UA)测定 CEEE8000	喉部分切除术	喉裂开声带切除术 HGP73301或3/4喉切除+喉功能重建术 HGM74302或垂直半喉切除+喉功能重建术 HGM74301或喉次全切除术HGM73307或声门上水平喉切除术 HGM73306或环状软骨上部分喉切除术 HGM73304或颈侧径路喉部肿瘤切除术 HGM73303或喉裂开肿瘤切除术HGM73302	治疗	
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙(Ca)测定 CEJF8000	病理		频闪喉镜检查	FGM01601
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	冷冻切片病理诊断	BCBA0001	纤维喉镜检查	FGM01602
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000	药物		电子纤维喉镜检查	FGM01603

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000	抗菌药物		注射	皮内注射ABAA0001或皮下注射ABAB0001或肌肉注射ABAC0001或静脉注射ABAD0001
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000			氧气吸入	ABJA0001
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000			超声雾化吸入	ABKA0001
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000			导尿管留置	ABHA0002
胸部x线摄影	EABJT001			导尿	ABHA0001
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703			胃肠减压	ABGA0001
院内会诊	AADB0001			采血	动脉采血ABBA0001或静脉采血ABBB0001
治疗				换药	换药(特大)ABFA0004或换药(大)ABFA0003或换药(中)ABFA0002或换药(小)ABFA0001
吸痰护理	ACBJ0004			肠内营养灌注	ABGD0001
肠内营养灌注	ABGD0001			输液	静脉输液ABCA0001或输液泵辅助静脉输液ABCB0001或静脉输血ABCD0001或全胃肠外营养深静脉输注ABCF0001或外周静脉营养输注ABCG0001或输液泵辅助全胃肠外营养深静脉输注ABCH0001或抗肿瘤化疗药物/肠外营养液集中配置ABCJ0001
采血	动脉采血ABBA0001或静脉采血ABBB0001			药物	
气管切开护理	ACBJ0001			抗生素	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
气管切开套管更换	ACBJ0002			静脉营养液	
注射	皮内注射ABAA0001或皮下注射ABAB0001或肌肉注射ABAC0001或静脉注射ABAD0001			鼻饲营养液	
输液	静脉输液ABCA0001或输液泵辅助静脉输液ABCB0001或静脉输血ABCD0001或全胃肠外营养深静脉输注ABCF0001或外周静脉营养输注ABCG0001或输液泵辅助全胃肠外营养深静脉输注ABCH0001或抗肿瘤化疗药物/肠外营养液集中配置ABCJ0001			胃粘膜保护剂	
胃管置管术	ABGB0001			含漱液	
超声雾化吸入	ABKA0001			生理盐水	
药物				外用消毒液	
粘液促排剂					
止血药物					
外用消毒液					
抗生素					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		护理	
电子胃镜检查	FPB01602	支撑喉镜检查	FGM01403	重症监护	ABPB0001
喉空气动力学检查	FGM01703	治疗		检查	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
喉声图检查	FGM01702			颈动脉彩色多普勒超声检查	EDCLF001
嗓音频谱检查	FGM01701	药物		细菌镜检/培养/鉴定	直接涂片革兰染色镜 检查细菌CJAB8000或 直接涂片革兰染色镜 检查细菌CJAB8000或 呼吸道标本涂片革兰 染色镜检查细菌 CJAE8000或一般细菌 培养+鉴定+药敏 CJAR8000或厌氧菌培 养+鉴定+药敏 CJAX8000
支撑喉镜检查	FGM01403			痰液常规检查	CCEK5000
间接喉镜检查	FGM01402			隐血试验	CCCB8000
直达喉镜检查	FGM01401			粪便常规检查	CCCA3000
咽喉肌电生理检查	FGG01101			治疗	
PET肿瘤局部断层显像	EEEZX001			常规尸检病理诊断	BAAA0001
PET肿瘤全身断层显像	EEEZY001			尸体存放	AZBC0001
颈动脉彩色多普勒超声检查	EDCLF001			一般尸体料理	AZBA0001
颈部磁共振增强成像	ECBHY001			危重病人抢救	ABMA0001
颈动脉CT三维成像	EBCLF001			贴敷降温	ABLB0001
胸部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBJT001			擦浴降温	ABLA0001
上消化道X线造影	EACPB001			救护车使用费	AZAA0001
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000			清创(缝合)术	清创(缝合)术 (小)ABEA0001或清创 (缝合)术 (中)ABEA0002或清创 (缝合)术 (大)ABEA0003
RhD血型鉴定	CAMF1000			药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
活检组织病理诊断	BCAB0001			免疫调节剂	
穿刺组织活检病理诊断	BCAA0001			粘液促排剂	
咽喉组织活检术	FGM07601			胃动力药	
疑难病理读片会诊	AADC0001				
心脏彩色多普勒超声	EDFKA007				
肝胆胰脾彩色多普勒超声检查	EDCQT001				
超敏C反应蛋白(hs-CRP)测定	CEAU1000				
细针穿刺细胞学检查与诊断	BBAA0001				
治疗					
氧气吸入	ABJA0001				
药物					
激素					
生理盐水					
含漱液					

喉癌

喉全切除术

适用对象：	病种编码：	ES006	
	主要诊断：	喉癌	ICD-10码：C32.0-C32.3/C32.8/C32.9
	主要操作/主要治疗方式：	喉次全切除术	CCHI码：HGM75301
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：C32.0-C32.3/C32.8/C32.9喉癌的疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 一般情况良好，咽喉部无明显感染征象。 2. 没有需要住院处理的并发症。		
最短住院日参考值：	21天		
变异条件：	1. 术中、术后出现并发症（如咽瘘等），需要特殊诊断治疗措施，导致住院时间延长，治疗费用增加。 2. 伴有影响本病治疗效果的合并症，需要采取进一步检查和诊断，导致住院时间延长，治疗费用增加。		
再入院间隔时间：	28天		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	压疮护理	ACBN0001
/III级护理	ACAA0001	检查		引流管护理	ACBK0001
检查				吸痰护理	ACBJ0004
肺功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活 量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403或最大 通气量功能检查 FJE01404	治疗		气管切开护理	ACBJ0001
电子纤维喉镜检查	FGM01603	氧气吸入	ABJA0001	口腔护理	ACBH0001
纤维喉镜检查	FGM01602	监测		特级护理	ACAD0001
颈部X线计算机体层 (CT)增强扫描	EBBHY001	院内遥测心电监护	KKA28701	I级护理	ACAC0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
院外影像学资料会诊	AADE0001	麻醉		II级护理	ACAB0001
ABO血型鉴定(正定型)	CAMA1000	全身麻醉	HAA42901	气管切开套管更换	ACBJ0002
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	手术		检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	喉部术区修复术	复合组织游离移植术HYX89306或带蒂肌瓣移植术HYX89305或显微镜下吻合血管复合组织移植术HYX89309或邻位皮瓣移植术HYW89302或带蒂轴型皮瓣移植术HYW88301或带蒂复合组织瓣移植术HYW88302或带蒂皮瓣移植术HYW88305或岛状皮瓣成形术HYW88310或游离植皮术(大)HYV89303或游离植皮术(中)HYV89302或游离植皮术(小)HYV89301	手术标本病理诊断	BCAD0001
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000或天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000或总胆红素(T-Bil)测定CELA1000或直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000或 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000或总蛋白(TP)测定CEAA8000或白蛋白(A1b)测定CEAE8000或碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	颈淋巴结清扫术	根治性颈淋巴结清扫术HNG73304或功能性颈淋巴结清扫术HNG73303或择区域性颈淋巴结清扫术HNG73302或颈淋巴结清扫术HNG73301	生化检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000或天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000或总胆红素(T-Bil)测定CELA1000或直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000或 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000或总蛋白(TP)测定CEAA8000或白蛋白(A1b)测定CEAE8000或碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000或尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000或钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000或葡萄糖(Glu)测定CEFA8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素 (Urea)测定 CEE8000和肌酐 (Cr) 测定CEE8000和尿酸 (UA)测定CEE8000	气管切开术	HJC50301	血常规	全血细胞计数+3分群 检测CAAA1000或全血 细胞计数+5分类检测 CAAB1000
电解质测定	钾 (K)测定CEJA8000 和钠 (Na)测定 CEJB8000和氯 (Cl)测 定CEJC8000和总二氧化 碳 (TCO2)测定 CEJD1000和镁 (Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	喉全切除术	HGM75301	治疗	
葡萄糖 (Glu)测定	CEFA8000	病理		纤维喉镜检查	FGM01602
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间 (APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间 (PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	冷冻切片病理诊断	BCBA0001	电子纤维喉镜检查	FGM01603
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定 性 (HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	药物		注射	皮内注射ABAA0001或 皮下注射ABAB0001或 肌肉注射ABAC0001或 静脉注射ABAD0001
丙型肝炎抗体 (抗 HCV)测定	CGMA1000	抗菌药物		氧气吸入	ABJA0001
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000			超声雾化吸入	ABKA0001
梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)测定	CGPP1000			导尿管留置	ABHA0002
胸部x线摄影	EABJT001			导尿	ABHA0001
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703			胃肠减压	ABGA0001
院内会诊	AADB0001			采血	动脉采血ABBA0001或 静脉采血ABBB0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
治疗				换药	换药(特大)ABFA0004 或换药(大)ABFA0003 或换药(中)ABFA0002 或换药(小)ABFA0001
吸痰护理	ACBJ0004			肠内营养灌注	ABGD0001
肠内营养灌注	ABGD0001			输液	静脉输液ABCA0001或 输液泵辅助静脉输液 ABCB0001或静脉输血 ABCD0001或全胃肠外 营养深静脉输注 ABCF0001或外周静脉 营养输注ABCG0001或 输液泵辅助全胃肠外 营养深静脉输注 ABCH0001或抗肿瘤化 疗药物/肠外营养液 集中配置ABCJ0001
采血	动脉采血ABBA0001或 静脉采血ABBB0001			药物	
气管切开护理	ACBJ0001			抗生素	
气管切开设管更换	ACBJ0002			粘液促排剂	
注射	皮内注射ABAA0001或 皮下注射ABAB0001或 肌肉注射ABAC0001或 静脉注射ABAD0001			静脉营养液	
输液	静脉输液ABCA0001或 输液泵辅助静脉输液 ABCB0001或静脉输血 ABCD0001或全胃肠外 营养深静脉输注 ABCF0001或外周静脉 营养输注ABCG0001或 输液泵辅助全胃肠外 营养深静脉输注 ABCH0001或抗肿瘤化 疗药物/肠外营养液 集中配置ABCJ0001			鼻饲营养液	
胃管置管术	ABGB0001			胃粘膜保护剂	
超声雾化吸入	ABKA0001			含漱液	
药物				生理盐水	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
粘液促排剂				外用消毒液	
止血药物					
外用消毒液					
预防性抗生素					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		监测	
电子胃镜检查	FPB01602	支撑喉镜检查	FGM01403	重症监护	ABPB0001
喉空气动力学检查	FGM01703	治疗		检查	
喉声图检查	FGM01702			颈动脉彩色多普勒超声检查	EDCLF001
嗓音频谱检查	FGM01701	药物		细菌镜检/培养/鉴定	直接涂片革兰染色镜 检查细菌CJAB8000或 直接涂片革兰染色镜 检查细菌CJAB8000或 呼吸道标本涂片革兰 染色镜检查细菌 CJAE8000或一般细菌 培养+鉴定+药敏 CJAR8000或厌氧菌培 养+鉴定+药敏 CJAX8000
支撑喉镜检查	FGM01403			痰液常规检查	CCEK5000
间接喉镜检查	FGM01402			隐血试验	CCCB8000
直达喉镜检查	FGM01401			粪便常规检查	CCCA3000
咽喉肌电生理检查	FGG01101			频闪喉镜检查	FGM01601
PET肿瘤局部断层显像	EEEZX001			治疗	
PET肿瘤全身断层显像	EEEZY001			常规尸检病理诊断	BAAA0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
颈动脉彩色多普勒超声检查	EDCLF001			尸体存放	AZBC0001
颈部磁共振增强成像	ECBHY001			一般尸体料理	AZBA0001
颈动脉CT三维成像	EBCLF001			危重病人抢救	ABMA0001
胸部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBJT001			贴敷降温	ABLB0001
上消化道X线造影	EACPB001			擦浴降温	ABLA0001
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000			救护车使用费	AZAA0001
RhD血型鉴定	CAMF1000			清创(缝合)术 (小)ABEA0001或清创(缝合)术 (中)ABEA0002或清创(缝合)术 (大)ABEA0003	
活检组织病理诊断	BCAB0001			药物	
穿刺组织活检病理诊断	BCAA0001			免疫调节剂	
咽喉组织活检术	FGM07601			胃动力药	
疑难病理读片会诊	AADC0001				
细针穿刺细胞学检查与诊断	BBAA0001				
频闪喉镜检查	FGM01601				
心脏彩色多普勒超声	EDFKA007				
肝胆胰脾彩色多普勒超声检查	EDCQT001				
超敏C反应蛋白(hs-CRP)测定	CEAU1000				
治疗					
氧气吸入	ABJA0001				
药物					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
激素					
生理盐水					
含漱液					

六、口腔、颌面疾病

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
FS001	腮腺多形性腺瘤	腮腺浅叶肿物切除术
FS002	腮腺多形性腺瘤	腮腺部分切除术
FS003	唇裂	单侧唇皮下裂修复术
FS004	唇裂	唇正中裂修复术
FS005	腭裂	I 度腭裂修复术
FS006	腭裂	II 度腭裂修复术
FS007	乳牙中龋	牙体缺损充填术
FS008	舌癌	舌恶性肿瘤扩大切除术
FS009	下颌骨骨折	口内入路下颌骨骨折切开复位内固定术
FS010	下颌前突畸形	下颌升支矢状劈开截骨术
FS011	甲状舌管囊肿	甲状舌管囊肿切除术
FS012	鳃源性囊肿	鳃裂囊肿切除术

腮腺多形性腺瘤
腮腺浅叶肿物切除术

适用对象：	病种编码：	FS001			
	主要诊断：	腮腺多形性腺瘤	ICD-10码：	D11.0+M89400/0	
	主要操作/主要治疗方式：	腮腺浅叶肿物切除术	CCHI码：	HHL73302	
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：D11.0+M89400/0腮腺多形性腺瘤疾病编码。 2. 患者同时具有其他疾病诊断，如在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。 3. 在获得病理诊断后入径。				
出院标准：	1. 伤口愈合良好，拆线后出院。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。				
最短住院日参考值：	7天				
变异条件：	有影响手术的综合征，需要进行相关的检查、诊断和治疗，必要时需要行CT、MRI和超声心动图等检查。				
再入院间隔时间：	无				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查		/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗			
粪便常规检查	CCCA3000	氧气吸入	ABJA0001	治疗	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	院内遥测心电监护	KKA28701	氧气吸入	ABJA0001
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	监测		换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000			监测	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000或肌酐(Cr)测定CEEB8000或尿酸(UA)测定CEEE8000	麻醉		院内遥测心电监护	KKA28701
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	全身麻醉	HAA42901	药物	
乙型肝炎表面抗体(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000或乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	手术			
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	腮腺浅叶肿物切除术	HHL73302		
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	病理			
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	冷冻切片病理诊断	BCBA0001		
胸部X线摄影	EABJT001	手术标本病理诊断	BCAD0001		
治疗		药物			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
静脉采血	ABBB0001				
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
普通二维超声心动图	EDFKA005				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	治疗		治疗	
颈部X线透视	EAAHY001	静脉输血	ABCD0001		
治疗		药物		药物	
		抗菌药物		激素类药物、神经营养药	
药物				抗菌药物	
抗菌药物					

腮腺多形性腺瘤

腮腺部分切除术

适用对象：	病种编码：	FS002	
	主要诊断：	腮腺多形性腺瘤	ICD-10码：D11.0+M89400/0
	主要操作/主要治疗方式：	腮腺部分切除术	CCHI码：HHL73303
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：D11.0+M89400/0，腮腺多形性腺瘤疾病编码。 2. 患者同时具有其他疾病诊断，如在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 伤口愈合良好，拆线后出院。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。 3. 在获得病理诊断后入径。		
最短住院日参考值：	7天		
变异条件：	有影响手术的综合征，需要进行相关的检查、诊断和治疗，必要时需要行CT、MRI和超声心动图等检查。		
再入院间隔时间：	无		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查		/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗			
粪便常规检查	CCCA3000	氧气吸入	ABJA0001	治疗	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	院内遥测心电监护	KKA28701	氧气吸入	ABJA0001
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	监测		换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000			监测	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000或肌酐(Cr)测定CEEB8000或尿酸(UA)测定CEEE8000	麻醉		院内遥测心电图监护	KKA28701
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	全身麻醉	HAA42901	药物	
乙型肝炎表面抗体(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000或乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	腰麻复合连续硬膜外阻滞麻醉	HAC42103		
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	手术			
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	腮腺部分切除术	HHL73303		
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	面神经探查术	FCH09301		
胸部X线摄影	EABJT001	病理			
治疗		冷冻切片病理诊断	BCBA0001		
静脉采血	ABBB0001	手术标本病理诊断	BCAD0001		
药物		药物			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
普通二维超声心动图	EDFKA005				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	治疗		治疗	
颈部X线透视	EAAHY001	静脉输血	ABCD0001		
治疗		药物		药物	
		抗菌药物		激素类药物、神经营养药	
药物				抗菌药物	
抗菌药物					

唇裂

唇裂修复术

适用对象：	病种编码：	FS003			
	主要诊断：	唇裂		ICD-10码：Q36	
	主要操作/主要治疗方式：	单侧唇皮下裂修复术		CCHI码：HHN83319	
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：Q36唇裂疾病编码。 2. 患者同时具有其他疾病诊断，如在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。				
出院标准：	1. 伤口愈合良好，拆线后出院。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。				
最短住院日参考值：	7天				
变异条件：	1. 有影响手术的综合征，需要进行相关的检查、诊断和治疗，必要时需要行CT、MRI和超声心动图等检查。 2. 上颌骨段移位严重的唇裂必要时需要正畸辅助复位移位的骨段、缩小裂隙。 3. 裂隙过宽的双侧唇裂可能需要二次手术来分别关闭两侧的唇裂裂隙。				
再入院间隔时间：	3个月				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查		/ II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			口腔护理	ACBH0001
尿常规化学分析	CCAA2000			检查	
粪便常规检查	CCCA3000	治疗			
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	氧气吸入	ABJA0001	治疗	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	院内遥测心电图监护	KKA28701	氧气吸入	ABJA0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(Alb)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	监测		换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEE8000或肌酐(Cr)测定CEEB8000或尿酸(UA)测定CEEE8000			院内遥测心电监护	KKA28701
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	麻醉		监测	
乙型肝炎表面抗体(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000或乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	全身麻醉	HAA42901		
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000			药物	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	手术		抗菌药物	
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	单侧唇皮下裂修复术	HHN83319	止血药物	
胸部X线摄影	EABJT001	病理		营养支持	
治疗					
静脉采血	ABBB0001	药物			
药物		抗菌药物			
抗菌药物		解热镇痛类(栓剂)			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目:					
检查		检查		检查	
普通二维超声心动图	EDFKA005				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和 钠(Na)测定CEJB8000和 氯(Cl)测定CEJC8000和 总二氧化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙(Ca)测 定CEJF8000	治疗		治疗	
治疗		药物		药物	
		止血药物		解热镇痛类（小儿）	
药物				激素类药物	
				静脉补液	

唇裂

唇裂修复术

适用对象：	病种编码：	FS004			
	主要诊断：	唇裂		ICD-10码：	Q36
	主要操作/主要治疗方式：	唇正中裂修复术		CCHI码：	HHN83318
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：Q36唇裂疾病编码。 2. 患者同时具有其他疾病诊断，如在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。				
出院标准：	1. 伤口愈合良好，拆线后出院。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。				
最短住院日参考值：	7天				
变异条件：	1. 有影响手术的综合征，需要进行相关的检查、诊断和治疗，必要时需要行CT、MRI和超声心动图等检查。 2. 上颌骨段移位严重的唇裂必要时需要正畸辅助复位移位的骨段、缩小裂隙。 3. 裂隙过宽的双侧唇裂可能需要二次手术来分别关闭两侧的唇裂裂隙。				
再入院间隔时间：	3个月				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查		/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			口腔护理	ACBH0001
尿常规化学分析	CCAA2000			检查	
粪便常规检查	CCCA3000	治疗			
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	氧气吸入	ABJA0001	治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	院内遥测心电监护	KKA28701	氧气吸入	ABJA0001
肝功能检查	内氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000	监测		换药	换药(小)ABFA0001或 换药(中)ABFA0002或 换药(大)ABFA0003或 换药(特大)ABFA0004
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000或肌酐(Cr) 测定CEEB8000或尿酸 (UA)测定CEEE8000			院内遥测心电监护	KKA28701
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703	麻醉		监测	
乙型肝炎表面抗体 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗体定 性(抗HBs)测定 CGLK1000或乙型肝炎 表面抗体定量(抗 HBs)测定CGLL1000	全身麻醉	HAA42901		
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000			药物	
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000	手术		抗菌药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	唇正中裂修复术	HHN83318	止血药物	
胸部X线摄影	EABJT001	病理		营养支持	
治疗					
静脉采血	ABBB0001	药物			
药物		抗菌药物			
抗菌药物		解热镇痛类（栓剂）			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
普通二维超声心动图	EDFKA005				
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	治疗		治疗	
治疗		药物		药物	
		止血药物		解热镇痛类（小儿）	
药物				激素类药物	
				静脉补液	

腭裂

腭裂修复术

适用对象：	病种编码：	FS005
	主要诊断：	腭裂 ICD-10码：Q35
	主要操作/主要治疗方式：	I 度腭裂修复术 CCHI码：HHR83310
入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10：Q35腭裂疾病编码。 2. 患者同时具有其他疾病诊断，如在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。	
出院标准：	1. 伤口愈合良好。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。	
最短住院日参考值：	5天	
变异条件：	1. 有影响手术的综合征疾病，需要进行相关的检查、诊断和治疗，必要时需要行CT、MRI和超声心动图等检查。 2. 上颌骨段移位严重的腭裂必要时需要正畸辅助复位移位的骨段、缩小裂隙。 3. 裂隙过宽的单、双侧腭裂可能需要犁骨粘骨膜瓣来关闭腭裂的鼻腔侧裂隙。 4. 软腭过短、腭咽闭合功能差的腭裂必要时需要同时行咽成形术以改善发音。	
再入院间隔时间：	3个月	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II 级护理	ACAB0001	I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001
检查		检查		/ II 级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			口腔护理	ACBH0001
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		检查	
粪便常规检查	CCCA3000	氧气吸入	ABJA0001		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	院内遥测心电监护	KKA28701	治疗	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	监测		换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000				
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000或肌酐(Cr)测定CEEB8000或尿酸(UA)测定CEEE8000	麻醉		药物	
乙型肝炎表面抗体(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	全身麻醉	HAA42901	抗菌药物	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	手术		营养支持	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	I度腭裂修复术	HHR83310	止血药物	
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	病理			
胸部X线摄影	EABJT001				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703				
治疗		药物			
静脉采血	ABBB0001	抗菌药物			
药物		解热镇痛栓			
抗菌药物		止血药物			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
普通二维超声心动图	EDFKA005				
头颅X线摄影	EABVB001	治疗		治疗	
头部X线计算机体层 (CT) 平扫	EBABP001	静脉输血	ABCD0001		
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703	药物		药物	
治疗				解热镇痛类（小儿）	
				激素类药	
药物				静脉补液	

腭裂

腭裂修复术

适用对象：	病种编码：	FS006
主要诊断：	腭裂	ICD-10码：Q35
主要操作/主要治疗方式：	Ⅱ度腭裂修复术	CCHI码：HHR83311
入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10：Q35腭裂疾病编码。 2. 患者同时具有其他疾病诊断，如在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。	
出院标准：	1. 伤口愈合良好。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。	
最短住院日参考值：	5天	
变异条件：	1. 有影响手术的综合征疾病，需要进行相关的检查、诊断和治疗，必要时需要行CT、MRI和超声心动图等检查。 2. 上颌骨段移位严重的腭裂必要时需要正畸辅助复位移位的骨段、缩小裂隙。 3. 裂隙过宽的单、双侧腭裂可能需要犁骨粘骨膜瓣来关闭腭裂的鼻腔侧裂隙。 4. 软腭过短、腭咽闭合功能差的腭裂必要时需要同时行咽成形术以改善发音。	
再入院间隔时间：	3个月	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
Ⅱ级护理	ACAB0001	Ⅰ级护理	ACAC0001	Ⅰ级护理	ACAC0001
检查		检查		/Ⅱ级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			口腔护理	ACBH0001
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		检查	
粪便常规检查	CCCA3000	氧气吸入	ABJA0001		
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	院内遥测心电监护	KKA28701	治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	监测		换药	换药(小)ABFA0001或 换药(中)ABFA0002或 换药(大)ABFA0003或 换药(特大)ABFA0004
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000				
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000或肌酐(Cr) 测定CEEB8000或尿酸 (UA)测定CEEE8000	麻醉		药物	
乙型肝炎表面抗体 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	全身麻醉	HAA42901	抗菌药物	
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	手术		营养支持	
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000	I度腭裂修复术	HHR83310	止血药物	
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	病理			
胸部X线摄影	EABJT001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703				
治疗		药物			
静脉采血	ABBB0001	抗菌药物			
药物		解热镇痛栓			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
抗菌药物		止血药物			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
普通二维超声心动图	EDFKA005				
头颅X线摄影	EABVB001	治疗		治疗	
头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001	静脉输血	ABCD0001		
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	药物		药物	
治疗				解热镇痛类（小儿）	
				激素类药	
药物				静脉补液	

乳牙中龋

牙体缺损充填术

适应对象：	病种编码：	FS007	
	主要诊断：	乳牙中龋	ICD-10码：K02.901，K02.102
	主要操作/主要治疗方式：	牙体缺损充填术	CCHI码：KHS62401
入院标准：	1. 症状：一般无自觉症状，或偶有冷热酸甜敏感，无自发痛史。 2. 检查：表面可有颜色改变或呈墨浸样变，牙齿表面完整性破坏，质地粗糙、松软。 3. 第一诊断必须符合ICD-10:K04.003，K04.011乳牙慢性牙髓炎疾病编码。 4. 当患儿同时具有其他疾病诊断时，但在治疗期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	治愈：患牙无自觉症状，功能良好。		
最短就诊值：	1次		
变异条件：	1. 患牙大面积缺损，固位较差，需行预成冠等治疗。 2. 患儿因身心原因不能耐受或配合治疗时，需在征得监护人同意后采取全身麻醉、镇静或束缚下的治疗方式，此前需完成必要的相关检查。		
再治疗间隔时间：	无		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
		II级护理	ACAB0001		
检查		检查		检查	
牙片X线摄影	EABHS002				
治疗		麻醉		治疗	
		舌/下牙槽神经阻滞麻醉	HAD42111		
药物		治疗		药物	
		牙体缺损充填术	KHS62401		
		药物			
选择项目					
因病情需要选择项目：					
检查		检查		检查	
齿科X线计算机体层(CT)平扫	EBAHS001			咬合片X线摄影	EABHS003
				牙片X线一次成像(RVG)	EABHS001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
				牙片X线摄影	EABHS002
治疗		治疗		治疗	
药物		药物		药物	

舌癌

舌恶性肿瘤扩大切除术

适用对象：	病种编码：	FS008	
	主要诊断：	舌癌	ICD-10码：C01-C02
	主要操作/主要治疗方式：	舌恶性肿瘤扩大切除术	CCHI码：HHQ77401
入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10：C01-C02舌癌疾病编码。 2. 患者同时具有其他疾病诊断，如在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。 3. TNM分类：原发灶T1或T2，淋巴结N0或N1，远处转移M0。		
出院标准：	1. 患者一般情况良好，伤口愈合好，引流管拔除，伤口无感染，无皮下积液（或门诊可处理的少量积液），无组织坏死。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。		
最短住院日参考值：	≤14天		
变异条件：	1. 有影响手术的全身疾病或合并症，需要进行相关的诊断和治疗。 2. 必要时需要进行CT、MRI等检查以明确肿瘤范围。 3. 越过中线的舌癌，根据情况可以行双侧颈淋巴结清扫术。 4. 侵及口底接近下颌骨的舌癌，扩大切除肿瘤时可能需要切除部分下颌骨。 5. 舌体局部切除后需要皮瓣修复者不进入该路径。		
再入院间隔时间：	14天		

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	特级护理	ACAD0001	I级护理	ACAC0001
/III级护理	ACAA0001			II级护理	ACAB0001
检查		检查		III级护理	ACAA0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			口腔护理	ACBH0001
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		检查	
粪便常规检查	CCCA3000	静脉输液	ABCA0001		
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	氧气吸入	ABJA0001	治疗	

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000			氧气吸入	ABJA0001
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	创面密封负压引流术	HYR45301	雾化吸入	氧气雾化吸入 ABKB0001或超声雾化吸入ABKA0001或空气压缩泵雾化吸入ABKC0001或蒸汽雾化吸入ABKD0001或经呼吸机管道雾化吸入ABKE0001
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	监测		换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000和乙肝病病毒表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定CGLJ1000和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	无创心电监测	FKA05705	常压高流量吸氧	KJA21404
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	麻醉		监测	
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	全身麻醉	HAA42901	无创心电监测	FKA05705

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	手术		病理	
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	舌恶性肿瘤扩大切除术	HHQ77401	手术标本病理诊断	BCAD0001
胸部X线摄影	EABJT001	颈淋巴结清扫术	HNG73301	药物	
治疗		病理		二代头孢类药物	
皮内注射	ABAA0001	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001	甲硝唑	
静脉采血	ABBB0001	药物		抗菌药物	
胃管置管术	ABGB0001	二代头孢类药物			
口腔护理	ACBH0001	止血药物			
龈上洁治	KHW65401	抗菌药物			
药物					
患者既往基础用药					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
普通二维超声心动图	EDFKA005	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401和用力肺活量功能检查FJE01402和肺每分通气量功能检查FJE01403和最大通气量功能检查FJE01404和肺弥散功能检查--一口气法FJE01405和流速容量曲线(V-V曲线)测定FJE02401和残气容积测定-体描箱法FJE02402	手术		电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000
颌部CT	上颌部X线计算机体层(CT)平扫EBAHF001和下颌部X线计算机体层(CT)平扫EBAHG001			治疗	
病理				胃管置管术	ABGB0001
活检组织病理诊断	BCAB0001			自控静脉镇痛治疗	HAZ48101
治疗		药物		药物	
静脉输液	ABCA0001			胃粘膜保护剂	
导尿管留置	ABHA0002			止血药物	
药物					
胃粘膜保护剂					
止血药物					

下颌骨骨折

口内入路下颌骨骨折切开复位内固定术

适用对象：	病种编码：	FS009			
	主要诊断：	下颌骨骨折		ICD-10码：	S02.6
	主要操作/主要治疗方式：	口内入路下颌骨骨折切开复位内固定术		CCHI码：	HHG70302
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：S02.6下颌骨骨折疾病编码。 2. 患者同时具有其他疾病诊断，如在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 全身一般情况稳定。 2. 切口I/甲（口外切口）或（和）II/甲（口内或开放性伤口）愈合。 3. 咬合关系恢复。 4. 影像学检查显示骨折复位固定良好。			
	最短住院日参考值：	≤14天			
	变异条件：	1. 需手术治疗的颌下颞突骨折，下颌骨粉碎性骨折，下颌骨骨折合并面中部骨折，下颌骨病理性骨折不进入该路径。 2. 急诊病人不进入该路径。			
	再入院时间间隔：	14天			

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
基本项目					
护理		护理		护理	
I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001
II 级护理	ACAB0001	检查		II 级护理	ACAB0001
III级护理	ACAA0001			III级护理	ACAA0001
检查		治疗		口腔护理	ACBH0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	氧气吸入	ABJA0001	检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	常压高流量吸氧	KJA21404	下颌骨X线摄影	EABHG001
粪便常规检查	CCCA3000	监测		口腔曲面体层摄影	EABHM001
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	无创心电监测	FKA05705	全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	麻醉		治疗	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEE8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	全身麻醉	HAA42901	雾化吸入	氧气雾化吸入ABKB0001或超声雾化吸入ABKA0001或空气压缩泵雾化吸入ABKC0001或蒸汽雾化吸入ABKD0001或经呼吸机管道雾化吸入ABKE0001
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000和乙肝病病毒表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定CGLJ1000和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	手术		静脉输液	ABCA0001
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	颌骨骨折颌间牵引钉颌间固定术	HHE71304	监测	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	口内入路下颌骨骨折切开复位内固定术	HHG70302	无创心电监测	FKA05705
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	药物		药物	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	抗菌药物		抗菌药物	
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703			激素类药物	
下颌骨X线摄影	EABHG001			止血药物	
口腔曲面体层摄影	EABHM001				
治疗					

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
静脉采血	ABBB0001				
龈上洁治	KHW65401				
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
头颅X线摄影	EABVB001				
普通二维超声心动图	EDFKA005	治疗		下颌部X线计算机体层(CT)平扫	EBAHG001
普通细菌药敏试验	普通细菌药敏定性试验CJBX9000或普通细菌药敏定量试验CJBY9000	皮内注射	ABAA0001	治疗	
下颌部X线计算机体层	EBAHG001	静脉输液	ABCA0001	静脉输血	ABCD0001
治疗		静脉输血	ABCD0001	胃管置管术	ABGB0001
胃管置管术	ABGB0001	导尿	ABHA0001	导尿管留置	ABHA0002
导尿管留置	ABHA0002	胃管置管术	ABGB0001	麻醉	
静脉输血	ABCD0001	导尿管留置	ABHA0002	自控静脉镇痛治疗	HAZ48101
唇弓制备	HHZ24704	药物		药物	
正颌外科咬合导板制备	HHZ24707				
药物					

下颌前突畸形

下颌升支矢状劈开截骨术

适用对象：	病种编码：	FS010			
	主要诊断：	下颌前突畸形		ICD-10码：	K07.108
	主要操作/主要治疗方式：	下颌升支矢状劈开截骨术		CCHI码：	HHG83307
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：K07.108下颌前突畸形疾病编码。 2. 患者同时具有其他疾病诊断，如在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 一般情况良好、可进流食、活动自如；面部肿胀逐渐消退。 2. 上下牙列就位于咬合导板内，咬合关系稳定。 3. X线片显示：无意外骨折，各骨段位置符合设计要求；各骨内固定物就位良好；髁突位置在正常范围。 4. 手术创口在愈合中，无脓性分泌物；手术区无明显积液。			
	最短住院日参考值：	≤10天			
	变异条件：	2. 对极少数下颌前突畸形患者，应行神经外科会诊，以排除脑垂体瘤等病因，避免术后复发。			
	再入院间隔时间：	14天			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
III级护理	ACAA0001	I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001
检查		检查		II 级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
粪便常规检查	CCCA3000	胃肠减压	ABGA0001	头颅X线摄影	EABVB001
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	氧气吸入	ABJA0001	口腔曲面体层摄影	EABHM001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	常压高流量吸氧	KJA21404	治疗	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEE8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	雾化吸入	氧气雾化吸入 ABKB0001或超声雾化吸入ABKA0001或空气压缩泵雾化吸入ABKC0001或蒸汽雾化吸入ABKD0001或经呼吸机管道雾化吸入ABKE0001	换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	静脉输液	ABCA0001	胃肠减压	ABGA0001
生化常规检查	葡萄糖(Glu)测定CEFA8000和总钙(Ca)测定CEJF8000和无机磷(P)测定CEKA8000和钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和镁(Mg)测定CEJE8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000	导尿管留置	ABHA0002	胃管置管术	ABGB0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000 和乙肝病毒表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定 CGLK1000和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定 CGLL1000	监测		导尿管留置	ABHA0002
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	无创心电图监测	FKA05705	氧气吸入	ABJA0001
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	麻醉		口腔护理	ACBH0001
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	全身麻醉	HAA42901	常压高流量吸氧	KJA21404
头颅X线摄影	EABVB001	手术		自控静脉镇痛治疗	HAZ48101
口腔曲面体层摄影	EABHM001	口内入路下颌升支矢状劈开颌骨畸形矫正术	HHG83319	雾化吸入	氧气雾化吸入 ABKB0001或超声雾化吸入 ABKA0001或空气压缩泵雾化吸入 ABKC0001或蒸汽雾化吸入 ABKD0001或经呼吸机管道雾化吸入 ABKE0001
胸部X线摄影	EABJT001	颌骨骨折颌间牵引钉颌间固定术	HHE71304	监测	
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道常规心电图检查 FKA03702或十二通道常规心电图检查 FKA03703	下颌升支矢状劈开截骨术	HHG83307	生命体征监测	有创连续动脉血压监测 HAN05201或有创血流动力学监测 HAN05202或无创血流动力学监测 HAN05701或全身麻醉下呼吸功能监测 HAN05902
治疗		药物		手术	
皮内注射	ABAA0001	抗菌药物		颌骨骨折颌间结扎固定术	HHE71302
静脉采血	ABBB0001	激素		颌骨骨折颌间牵引钉颌间固定术	HHE71304
胃管置管术	ABGB0001	止血药物		药物	
导尿	ABHA001	麻醉用药		抗菌药物	
龈上洁治	KHW65401			激素类药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
正颌外科手术设计	HHZ41701			止血药	
模型外科设计	HHZ41704			镇痛类药物	
正颌外科咬合导板制备	HHZ24707				
静脉输液	ABCA0001				
唇弓制备	HHZ24704				
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
下颌部X线计算机体层(CT)平扫	EBAH008			下颌部X线计算机体层(CT)平扫	EBAH008
治疗		治疗		治疗	
		唇弓制备	HHZ24704		
药物		静脉输血	ABCD0001	药物	
		药物		止吐药	
				镇痛药	
				神经营养药	
				抗菌药物	

甲状舌管囊肿

甲状舌管囊肿切除术

适用对象：	病种编码：	FS011	
	主要诊断：	甲状舌管囊肿	ICD-10码：Q89.202
	主要操作/主要治疗方式：	甲状舌管囊肿切除术	CCHI码：HDC73301
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10码：Q89.202甲状舌管囊肿疾病编码。 2. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需特殊处理，也不影响第一诊断的临床路径实施时，可以进入路径。 3. 如囊肿或瘻存在明显感染，不进入路径。		
出院标准：	1. 一般情况良好。 2. 伤口愈合良好，无出血、感染或瘻。 3. 无其他需要住院处理的并发症。		
最短住院日参考值：	5-7天		
变异条件：	1. 围手术期并发症等造成住院日延长和费用增加。 2. 术后切口感染、瘻复发等并发症。		
再入院间隔时间：	14天（出现其他并发症除外）		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查		/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			检查	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
尿常规化学分析	CCAA2000			治疗	
粪便常规检查	CCCA3000	皮内注射	ABAA0001	静脉输液	ABCA0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	静脉输液	ABCA0001	换药(中)	ABFA0002
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	肌肉注射	ABAC0001	药物	
C-反应蛋白(CRP)测定	CGCA1000	监测		抗菌药物	
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	院内遥测心电图监护	KKA28701		
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902		
甲状腺B超检查	EDBDC001	麻醉恢复室监护	HAP28901		
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	术中体温监测	HAN05702		
胸部X线摄影	EABJT001	无创血流动力学监测	HAN05701		
治疗		麻醉			
静脉采血	ABBB0001	全身麻醉	HAA42901		
药物		手术			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
		甲状舌管囊肿切除术	HDC73301		
		病理			
		手术标本病理诊断	BCAD0001		
		药物			
		抗菌药物			
		液体补充			
		电解质			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
颈部X线计算机体层(CT)平扫	EBAHY001				
颈部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBHY001	治疗		治疗	
三碘甲状腺原氨酸(T3)测定	CEQJ1000	自控静脉镇痛治疗	HAZ48101	院内遥测心电监护	KKA28701
游离甲状腺素(FT4)测定	CEQL1000	药物		药物	
甲状腺静态显像	EEADC001	镇痛药物		补充液体	
锝[⁹⁹ Tc]治疗	LBZZX003			电解质	
治疗				抗菌药	
药物					

鳃源性囊肿

鳃裂囊肿切除术

适用对象：	病种编码：	FS012	
	主要诊断：	鳃源性囊肿	ICD-10码：Q18.002
	主要操作/主要治疗方式：	鳃裂囊肿切除术	CCHI码：HHZ73307
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10码：Q18.002鳃源性囊肿疾病编码。 2. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需特殊处理，也不影响第一诊断的临床路径实施时，可以进入路径。 3. 如囊肿或瘻存在明显感染，不进入路径。		
出院标准：	1. 一般情况良好。 2. 伤口愈合良好，无出血、感染或瘻。		
最短住院日参考值：	5-7天		
变异条件：	1. 围手术期并发症等造成住院日延长和费用增加。 2. 术后切口感染、瘻复发等并发症。		
再入院间隔时间：	14天（出现其他并发症除外）		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查		/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			检查	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
尿常规化学分析	CCAA2000			治疗	
粪便常规检查	CCCA3000	皮内注射	ABAA0001	静脉输液	ABCA0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000	静脉输液	ABCA0001	换药 (中)	ABFA0002
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000	肌肉注射	ABAC0001	药物	
C-反应蛋白 (CRP) 测定	CGCA1000	院内遥测心电监护	KKA28701	抗菌药物	
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测定 CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测定 CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000	监测			
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间 (APTT) 测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间 (PT) 测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000				
甲状腺B超检查	EDBDC001	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703	无创血流动力学监测	HAN05701		
胸部X线摄影	EABJT001	麻醉恢复室监护	HAP28901		
治疗		术中体温监测	HAN05702		
静脉采血	ABBB0001	无创血流动力学监测	HAN05701		
药物		麻醉			
		全身麻醉	HAA42901		
		手术			
		鳃裂囊肿切除术	HHZ73307		
		病理			
		手术标本病理诊断	BCAD0001		
		药物			
		抗菌药物			
		补充液体和电解质			
		麻醉药物			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
颈部X线计算机体层 (CT) 增强扫描	EBBHY001				
颈部X线计算机体层 (CT) 平扫	EBAHY001	治疗		治疗	
三碘甲状原氨酸 (T3) 测定	CEQJ1000	自控静脉镇痛治疗	HAZ48101		
游离甲状腺素 (FT4) 测定	CEQL1000	药物		监测	
甲状腺静态显像	EEADC001	镇痛药物		院内遥测心电监护	KKA28701

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
锝 ^{99m} Tc治疗	LBZZX003			药物	
治疗				补充液体	
				抗菌药	
				电解质	

七、呼吸系统疾病

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
GM001	非小细胞肺癌	术后辅助化疗
GM002	原发性肺癌	术前新辅助治疗
GM003	原发性肺癌	术后辅助治疗
GM004	原发性肺癌	姑息治疗
GM005	肺血栓栓塞症	
GM006	社区获得性肺炎	
GM007	慢性阻塞性肺疾病急性加重期	
GM008	支气管哮喘发作	
GM009	初治菌阳肺结核	
GM010	原发性肺脓肿	
GM011	结核性胸膜炎	
GM012	支原体肺炎	
GS001	支气管肺癌	全肺切除术
GS002	支气管肺癌	肺段切除术
GS003	支气管肺癌	经胸腔镜肺段切除术
GS004	支气管肺癌	肺叶切除术
GS005	支气管肺癌	经胸腔镜肺叶切除术
GS006	肋骨骨折合并血气胸	经肋间胸腔闭式引流术
GS007	肋骨骨折合并血气胸	经肋床胸腔闭式引流术
GS008	非侵袭性胸腺瘤	胸腺切除术
GS009	非侵袭性胸腺瘤	经胸腔镜胸腺切除术

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
GS010	肺良性肿瘤	肺楔形切除术
GS011	肺良性肿瘤	经胸腔镜肺楔形切除术
GS012	肺良性肿瘤	肺叶切除术
GS013	肺良性肿瘤	经胸腔镜肺叶切除术
GS014	肺良性肿瘤	肺段切除术
GS015	肺良性肿瘤	经胸腔镜肺段切除术
GS016	支气管扩张	肺叶切除术
GS017	支气管扩张	右侧双肺叶切除术
GS018	支气管扩张	胸膜肺叶切除术
GS019	支气管扩张	经胸腔镜肺叶切除术
GS020	支气管扩张	肺段切除术
GS021	支气管扩张	经胸腔镜肺段切除术
GS022	支气管扩张	全肺切除术
GS023	自发性气胸	肺大泡切除修补术
GS024	自发性气胸	经胸腔镜肺大泡切除胸膜固定术
GS025	自发性气胸	胸膜固定术
GS026	自发性气胸	经胸腔镜胸膜固定术
GS027	纵隔恶性肿瘤	前纵隔肿物切除术
GS028	纵隔恶性肿瘤	后纵隔肿物切除术
GS029	纵膈良性肿瘤(包括纵膈囊肿)	前纵隔肿物切除术
GS030	纵膈良性肿瘤(包括纵膈囊肿)	后纵隔肿物切除术
GS031	原发性支气管肺癌	肺叶切除术

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
GS032	原发性支气管肺癌	全肺切除术
GS033	原发性支气管肺癌	袖状肺叶切除术
GS034	原发性支气管肺癌	肺楔形切除术
GS035	漏斗胸	经胸腔镜小儿漏斗胸胸骨抬举内固定术(NUSS手术)

非小细胞肺癌
术后辅助化疗

适用对象：	病种编码：	GM001			
	主要诊断：	非小细胞肺癌	ICD - 10码：	Z51.102+C34	
	主要操作/主要治疗方式：	术后辅助化疗	CCHI码：		
入院标准：		1. 第一诊断必须符合ICD-10:Z51.102+C34非小细胞肺癌根治术后辅助化疗疾病编码。 2. 年龄<75 岁。 3. 术后体力状况基本恢复正常，Karnofsky≥80分。 4. 无全身化疗禁忌症。 5. 评估肿瘤需要接受化疗者可以进入路径。 6. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要 特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
出院标准：		1. 化疗结束，无明显副反应。 2. 没有需要住院处理的并发症。			
最短住院日参考值：	2-10天	1. 化疗期间的合并症和/或并发症，需要进行相关的诊断和治疗，导致住院时间延长、费用增加。 2. 肿瘤的复发或转移、病情进展退出临床路径。 3化疗后出现骨髓抑制，需要对症处理，导致治疗时延长、费用增加，退出临床路径。			
变异条件：		4. 药物不良反应需要特殊处理，如过敏反应、神经毒性心脏毒性等。 5. 出现影响肺癌治疗的合并症，需要进行相关的治疗。 6. 医师认可的变异原因分析，如药物减量使用。 7. 其他患者方面的原因等。			
再入院间隔时间：					

检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		护理		药物	
II 级护理	ACAB0001	I 级护理	ACAC0001	抗肿瘤化学药物	
检查				抗菌药物	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			止吐药物	
尿常规化学分析	CCAA2000				
粪便常规检查	CCCA3000				
生化常规检查	葡萄糖 (Glu)测定CEFA8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000和无机磷 (P) 测定CEKA8000和钾 (K) 测定CEJA8000和钠 (Na)测定CEJB8000和氯 (Cl)测定CEJC8000和镁 (Mg) 测定CEJE8000和总二氧化碳 (TCO2)测定CEJD1000				

检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
电解质测定	钾（K）测定 CEJA8000和钠（Na） 测定CEJB8000和氯 （Cl）测定CEJC8000 和总二氧化碳 （TCO2）测定 CEJD1000和总钙 （Ca）测定CEJF8000				
胸部X线计算机体层 (CT) 平扫	EBAJT001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703				
肿瘤标志物检查	癌胚抗原 (CEA) 测定 CGRA1000和甲胎蛋白 (AFP) 测定CGRB8000 和糖类抗原CA-125测定 CGRP1000和糖类抗原 CA-153测定 CGRR1000和糖类抗原 CA-199测定CGRS1000 和神经元特异性烯醇 化酶 (NSE) 测定 CGRH1000和肿瘤坏死 因子 α (TNF- α) 测定 CGRY1000和糖类抗原 CA-724测定CGRV1000				
腹部彩超检查	胃肠充盈造影B超检查 EDBPA002和肝胆胰 脾彩色多普勒超声检查 EDCQT001				
选择项目				化疗药物	
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		治疗			
纤维支气管镜检查	FJD01601				
普通二维超声心动图	EDFKA005				
肺功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活 量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403或最大 通气量功能检查 FJE01404				
PET/CT肿瘤局部显像	EEFZX001				
PET/CT肿瘤全身显像	EEFZY001				
全身骨显像	EEAX6004				

检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
经外周静脉置入中心静脉导管术	ABDA0001				
隐血试验	CCCB8000				
胸部X线摄影	EABJT001				
上腹部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBQT001				
下腹部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBQT002				
颅脑磁共振成像	ECABA001				
头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001				
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702或三通道动态心电图检查 FKA03704或十二通道动态心电图检查 FKA03705				

原发性肺癌
术前新辅助治疗

适用对象：	病种编码：	GM002			
	主要诊断：	原发性肺癌	ICD - 10码：	Z51.100，C34	
	主要操作/主要治疗方式：	术前新辅助治疗	CCHI码：		
	入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10：Z51.100伴C34原发性肺癌疾病编码。 2. 无放疗禁忌症。 3. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 完成全部放射治疗计划，或因客观原因不能继续放射治疗。 2. 无严重毒性反应需要住院处理。 3. 无需要住院处理的其他合并症/并发症。			
	最短住院日参考值：	<=54天			
	变异条件：				
	再入院间隔时间：				

检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		药物		药物	
II级护理	ACAB0001	静脉补液		抗菌药物	
检查					
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000				
尿常规化学分析	CCAA2000				
粪便常规检查	CCCA3000				
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000				
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000				

检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
电解质测定	钾（K）测定 CEJA8000和钠（Na） 测定CEJB8000和氯 （Cl）测定CEJC8000 和总二氧化碳 （TCO2）测定 CEJD1000和总钙 （Ca）测定CEJF8000				
肺功能	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活 量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403或最大 通气量功能检查 FJE01404				
常规心电图检查	单通通常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703				
血气分析	CEJM1000				
痰液常规检查	CCEK5000			化疗药物	
纤维支气管镜检查	FJD01601				
胸部X线摄影	EABJT001				
胸部CT（平扫+增强 扫描）	胸部X线计算机体层 (CT)平扫EBAJT001和 胸部X线计算机体层 (CT)增强扫描 EBBJT001				
上腹部X线计算机体 层(CT)增强扫描	EBBQT001				
下腹部X线计算机体 层(CT)增强扫描	EBBQT002				
SPECT/CT骨断层显像	EEDX6001				
颅脑磁共振成像	ECABA001				
头部X线计算机体层 (CT)平扫	EBABP001				
PET/CT肿瘤显像	PET/CT肿瘤局部显像 EEFZX001或PET/CT肿 瘤全身显像EEFZY001				
普通病理会诊	疑难病理读片会诊 AADC0001或同步远程 病理会诊AADD0001或 非同步远程病理会诊 AADD0002				
选择项目					

检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
因病情需要而选择的其他项目：					
检验		治疗		药物	
超声支气管镜检查	FJD01603				
经皮脾穿刺活检术	FNB07101				
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702或三通道动态心电图检查 FKA03704或十二通道动态心电图检查 FKA03705				

原发性肺癌
术后辅助治疗

适用对象：病种编码：GM003
主要诊断：原发性肺癌 ICD - 10码：Z51.100，C34
主要操作/主要治疗方式：术后辅助治疗 CCHI码：
1. 第一诊断符合ICD-10：Z51.100伴C34原发性肺癌疾病编码。
2. 无放疗禁忌症。
入院标准：3. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。
出院标准：1. 完成全部放射治疗计划，或因客观原因不能继续放射治疗。
2. 无严重毒性反应需要住院处理。
3. 无需要住院处理的其他合并症/并发症。
最短住院日参考值：≤54天
变异条件：
再入院间隔时间：

检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		药物		药物	
II级护理	ACAB0001	静脉补液		抗菌药物	
检查					
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000				
尿常规化学分析	CCAA2000				
粪便常规检查	CCCA3000				
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000				
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEE8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000				
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO ₂)测定CEJD1000和总钙(Ca)测定CEJF8000				

检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肺功能	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活 量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403或最大 通气量功能检查 FJE01404				
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703				
血气分析	CEJM1000				
痰液常规检查	CCEK5000			化疗药物	
纤维支气管镜检查	FJD01601				
胸部X线摄影	EABJT001				
胸部CT（平扫+增强 扫描）	胸部X线计算机体层 (CT)平扫EBAJT001和 胸部X线计算机体层 (CT)增强扫描 EBBJT001				
上腹部X线计算机体 层(CT)增强扫描	EBBQT001				
下腹部X线计算机体 层(CT)增强扫描	EBBQT002				
SPECT/CT骨断层显像	EEDX6001				
颅脑磁共振成像	ECABA001				
头部X线计算机体层 (CT)平扫	EBABP001				
PET/CT肿瘤显像	PET/CT肿瘤局部显像 EEFZX001或PET/CT肿 瘤全身显像EEFZY001				
普通病理会诊	疑难病理读片会诊 AADC0001或同步远程 病理会诊AADD0001或 非同步远程病理会诊 AADD0002				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检验		治疗		药物	
超声支气管镜检查	FJD01603				
经皮脾穿刺活检术	FNB07101				

检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702或三通道动态心电图检查FKA03704或十二通道动态心电图检查FKA03705				

原发性肺癌
姑息治疗

适用对象：	病种编码：	GM004			
	主要诊断：	原发性肺癌		ICD - 10码：	Z51.100，C34
	主要操作/主要治疗方式：	姑息治疗		CCHI码：	
	入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10：Z51.100伴C34原发性肺癌疾病编码。 2. 无放疗禁忌症。 3. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 完成全部放射治疗计划，或因客观原因不能继续放射治疗。 2. 无严重毒性反应需要住院处理。 3. 无需要住院处理的其他合并症/并发症。			
	最短住院日参考值：	<=54天			
	变异条件：				
	再入院间隔时间：				

检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		药物		药物	
II级护理	ACAB0001	静脉补液		抗菌药物	
检查				化疗药物	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000				
尿常规化学分析	CCAA2000				
粪便常规检查	CCCA3000				
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000				

检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000				
电解质测定	钾(K)测定 CEJA8000和钠(Na) 测定CEJB8000和氯 (Cl)测定CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO ₂)测定 CEJD1000和总钙 (Ca)测定CEJE8000				
肺功能	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活 量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403或最大 通气量功能检查 FJE01404				
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703				
血气分析	CEJM1000				
痰液常规检查	CCEK5000				
纤维支气管镜检查	FJD01601				
胸部X线摄影	EABJT001				
胸部CT(平扫+增强 扫描)	胸部X线计算机体层 (CT)平扫EBAJT001和 胸部X线计算机体层 (CT)增强扫描 EBBJT001				
上腹部X线计算机体 层(CT)增强扫描	EBBQT001				
下腹部X线计算机体 层(CT)增强扫描	EBBQT002				
SPECT/CT骨断层显像	EEDX6001				
颅脑磁共振成像	ECABA001				
头部X线计算机体层 (CT)增强扫描	EBBBP001				
PET/CT肿瘤显像	PET/CT肿瘤局部显像 EEFZX001或PET/CT肿 瘤全身显像EEFZY001				
普通病理会诊	疑难病理读片会诊 AADCO001或同步远程 病理会诊AADD0001或 非同步远程病理会诊 AADD0002				

检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		治疗		药物	
超声支气管镜检查	FJD01603				
经皮脾穿刺活检术	FNB07101				
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702或三通道动态心电图检查 FKA03704或十二通道动态心电图检查 FKA03705				
血脂四项	甘油三酯(TG)测定 CEHB1000 和总胆固醇(TC)测定 CEHA1000 和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定 CEHC1000 和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定 CEHD1000				
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000				

肺血栓栓塞症

适用对象：	病种编码：GM005	
	主要诊断：肺血栓栓塞症（中低危）	ICD-10码：I26.0, I26.9
	主要操作/主要治疗方式：	CCHI码：
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：I26.0, I26.9肺血栓栓塞症疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。 3. 有明显影响肺血栓栓塞症常规治疗的情况，不进入肺血栓栓塞症临床路径。	
出院标准：	1. 生命体征平稳。 2. 调节国际标准化比值达标（2.0-3.0）。 3. 没有需要继续住院处理的并发症。	
最短住院日参考值：	7天	
变异条件：	1. 治疗过程中出现并发症。 2. 伴有其他疾病，需要相关诊断治疗。 3. 大面积肺栓塞。 4. 有抗凝治疗或溶栓治疗相对禁忌症。 5. 先天性高凝状态。 6. 需使用无创机械通气者。 7. 明显低氧血症者。 8. 血液动力学不稳定。 9. 治疗后病情继续发展。	
再入院时间间隔：	7天	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		治疗		药物	
特级护理	ACAD0001	氧气吸入	ABJA0001	抗凝血药	
I 级护理	ACAC0001	无创呼吸机辅助通气	KJA21401	抗凝药物	
/ II 级护理	ACAB0001	静脉采血	ABBB0001	化疗药物	
检查		监测			
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710		
尿常规化学分析	CCAA2000				
粪便常规检查	CCCA3000				
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (Alb) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000				
心肌酶测定	乳酸脱氢酶 (LD) 测定 CECW1000和肌酸激酶-MB同工酶活性 (CK-MB) 测定CECT1000和肌酸激酶 (CK) 测定 CECS1000				
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000或肌酐 (Cr) 测定CEEB8000或尿酸 (UA) 测定CEEE8000				
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测定 CEJC8000和总二氧化碳 (TCO ₂) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测定 CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000				
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000				
血气分析	CEJM1000				
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间 (APTT) 测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间 (PT) 测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000				
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs) 测定	乙型肝炎表面抗原定性 (HBsAg) 测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量 (HBsAg) 测定 CGLH1000				
丙型肝炎抗体 (抗HCV) 测定	CGMA1000				
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV) 测定	CGMF1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
肌钙蛋白T(TnT)测定	CEAX1000				
/肌钙蛋白 I (TnI)测定	CEAY1000				
血浆D-二聚体(D-Dimer)测定	CAJY1000				
胸部X线摄影	EABJT001				
肺动脉CT三维成像	EBCLA001				
/肺动脉磁共振血管增强成像	ECBLA001				
双下肢血管彩色超声	下肢动脉彩色多普勒超声检查EDCL5001或下肢深静脉彩色多普勒超声检查EDCM1001或下肢浅静脉彩色多普勒超声检查EDCM4001				
普通二维超声心动图	EDFKA005				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或常规心电图检查FKA03703				
肌钙蛋白T(TnT)测定	CEAX1000				
肌钙蛋白 I (TnI)测定	CEAY1000				
普通二维超声心动图	EDFKA005				
血浆蛋白C活性(pc)测定	CAJG1000				
血浆蛋白C抗原(PC:Ag)测定	CAJH1000				
血浆蛋白S含量(PS:Ag)测定	CAJK1000				
血浆蛋白S活性(PS:A)测定	CAJL1000				
B型钠尿肽(BNP)测定	CESS1000				
下肢深静脉显像	EEAM1001				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目:					
检查		治疗		药物	
血气分析	CEJM1000	经皮穿刺肺动脉内溶栓术	HLA72201	抗凝血药	
肺动脉CT三维成像	EBCLA001	经皮肺动脉内血栓碎栓术	HLA72202	链激酶	
肺动脉磁共振血管增强成像	ECBLA001	经皮肺动脉内血栓抽吸术	HLA65201	重组组织型纤溶酶原激活剂	
下肢深静脉彩色多普勒超声检查	EDCM1001	人工血管切开取栓术	HL965301	血管活性药物	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
免疫球蛋白测定	免疫球蛋白G(IgG)定量测定CGAT1000或免疫球蛋白M(IgM)定量测定CGAU1000或免疫球蛋白D(IgD)定量测定CGAV1000或免疫球蛋白E(IgE)定量测定CGAW1000或分泌型免疫球蛋白A测定CGAX1000或免疫球蛋白亚类定量测定CGBA1000或免疫球蛋白轻链测定CGBB8000或免疫球蛋白游离轻链测定CIBC8000或B细胞膜表面免疫球蛋白测定CGBH1000或脱敏免疫球蛋白IgG测定CGUU1000或脱敏免疫球蛋白IgG4测定CGUV1000	经皮穿刺上腔静脉滤器置入术	HMB62201	溶栓药物	
抗凝血酶原抗体测定	CGKH1000	经皮穿刺下腔静脉滤器置入术	HML62201		
抗心磷脂抗体(ACA)测定	CGEL1000				
肺动脉造影	肺动脉CT三维成像EBCLA001肺动脉磁共振血管增强成像ECBLA001				
狼疮抗凝物质检测	CAJM1000				
监测					
院内遥测心电监护	KKA28701				

社区获得性肺炎

适用对象：	病种编码：GM006	
	主要诊断：社区获得性肺炎	ICD-10码：J15.902/J15.903
	主要操作/主要治疗方式：	CCHI码：
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：J15.902/J15.903社区获得性肺炎疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在治疗期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。	
出院标准：	1. 症状好转，体温正常超过72小时。 2. 影像学提示肺部病灶明显吸收。	
最短住院日参考值：	7天	
变异条件：	1. 伴有影响本病治疗效果的合并症，需要进行相关诊断和治疗，导致住院时间延长。 2. 病情较重，符合重症肺炎标准，转入相应路径。 3. 常规治疗无效或加重，转入相应路径。 4. 年龄大于65岁。 5. 有免疫功能低下者（脾切除、应用糖皮质激素、应用免疫抑制剂、放化疗等）。 6. 基础心肺肝肾脑肾病者。 7. 耐药病原所致者。	

再入院时间间隔：14天

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		治疗		药物	
I 级护理	ACAC0001	擦浴降温	ABLA0001	抗菌药物	
II 级护理	ACAB0001	贴敷降温	ABLB0001	祛痰剂	
				解热镇痛剂	
检查				镇咳药物	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000				
尿常规化学分析	CCAA2000				
粪便常规检查	CCCA3000				
红细胞沉降率 (ESR) 测定	CAAJ1000				
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000				

肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000或肌酐 (Cr) 测定CEEB8000或尿酸 (UA) 测定CEEE8000				
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定 CAGA1000和活化部分 凝血活酶时间 (APTT) 测定CAGB1000和血浆 凝血酶原时间 (PT) 测 定CAGC1000和血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000和纤维蛋白 (原) 降解产物 (FDP) 测定CAJX1000和凝血 酶原活动度 (PA) 和 凝血酶原比值 (R) 和凝血酶原INR值 (INR) 和血浆D-二 聚体 (D-Dimer) 测定 CAJY1000				
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测定CEJC8000和总二 氧化碳 (TCO ₂) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测 定CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000			化疗药物	
心肌酶测定	乳酸脱氢酶 (LD) 测定 CECW1000和肌酸激酶 -MB同工酶活性 (CK- MB) 测定CECT1000和 肌酸激酶 (CK) 测定 CECS1000				
降钙素原 (PCT) 检测	CEQT1000				
厌氧菌培养+鉴定	CJAW8000				
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000				
C-反应蛋白 (CRP) 测定	CGCA1000				
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定 性 (HBsAg) 测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg) 测定 CGLH1000				
丙型肝炎抗体 (抗 HCV) 测定	CGMA1000				
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV) 测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体 (抗 TP) 测定	CGPP1000				
胸部X线摄影	EABJT001				
胸部X线计算机体层 (CT) 平扫	EBAJT001				

胸腔B超检查	EDBJT001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或常规心电图检查FKA03703				
血气分析	CEJM1000				
一般细菌培养+鉴定	CJAP8000				
普通细菌药敏定性试验	CJBX9000				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		治疗		药物	
血浆D-二聚体(D-Dimer)测定	CAJY1000	双侧岩下窦静脉采血比较垂体激素水平	FDB06201		
胸部X线摄影	EABJT001	氧气吸入	ABJA0001		
胸部CT（平扫+增强扫描）	胸部X线计算机体层(CT)平扫EBAJT001和胸部X线计算机体层(CT)增强扫描EBBJT001				
胸腔B超检查	EDBJT001				
支气管镜检查	电子支气管镜检查FJD01602或超声支气管镜检查FJD01603或纤维支气管镜检查FJD01601				
经支气管镜支气管肺泡灌洗术	HJE48601				
保护性采样刷	经纤维支气管镜防污染采样刷采样FJD06603或经电子支气管镜防污染采样刷采样FJD06604				
经支气管内镜活检术	FJD07602				
经支气管内镜肺活检	经支气管内镜活检术FJD07602或经支气管内镜透支气管壁肺活检术FJD07603				
呼吸道标本涂片革兰染色镜检查细菌	CJAE8000				
直接涂片抗酸染色镜检查	CJAF8000				

痰培养+药敏	一般细菌培养+鉴定+药敏CJAR8000或厌氧菌培养+鉴定+药敏CJAX8000或分枝杆菌培养+鉴定+药敏CJBB8000或真菌培养+鉴定+药敏CJHM8000				
军团菌抗体检测	军团菌培养+鉴定CJBV5000				
甲型流感病毒抗原检测	CGLB1000				
支原体抗体	支原体培养+鉴定CJFA8000				
肺炎衣原体抗体检测	CGPM1000				
EB病毒抗体测定	CGMS1000				
腺病毒抗体测定	CGNB1000				
结核分枝杆菌抗体测定	CGPA1000				
真菌D-葡聚糖检测	CJHR8000				
半乳甘露聚糖检测	CJHS8000				
痰肺孢子菌监测/肺孢子菌PCR	孢子丝菌免疫学试验CGPZ1000或球孢子菌免疫学试验CGQA1000				
胸水常规	胸腹水常规检查CCDA4000				
胸水生化	胸腹水细胞学检查CCDB4000				
胸水涂片革兰染色	直接涂片革兰染色镜检查细菌CJAB8000				
胸水涂片抗酸染色	直接涂片抗酸染色镜检查CJAF8000				
经皮穿刺肺活检术	FJE07101				
细菌抗体测定	CGNY8000				
细菌抗原检测	CGNZ8000				
腺病毒脱氧核糖核酸扩增定量检测	CLBM8000				
监测					
无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710				

慢性阻塞性肺疾病急性加重期

适用对象：	病种编码：	GM007			
	主要诊断：	慢性阻塞性肺疾病急性加重期	ICD-10码：	J44.100/J44.101	
	主要操作/主要治疗方式：		CCHI码：		
		1. 第一诊断必须符合ICD-10：J44.100/J44.101慢性阻塞性肺疾病急性加重期疾病编码。			
	入院标准：	2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。 3. 进行介入治疗者不进入此路径。			
	出院标准：	1. 症状明显缓解。 2. 临床稳定24小时以上。			
	最短住院日参考值：	10			
	变异条件：	1. 存在并发症，需要进行相关的诊断和治疗，延长住院时间。 2. 病情严重，需要呼吸支持者，归入其他路径。 3. 合并严重心脑血管肝肾血管病的患者。 4. 已有或发展为呼吸衰竭者。			
	再入院时间间隔：	14天			

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		治疗		药物	
I 级护理	ACAC0001	氧气吸入	ABJA0001	抗菌药物	
II 级护理	ACAB0001	雾化吸入	超声雾化吸入 ABKA0001 或氧气雾化吸入 ABKB0001 或空气压缩泵雾化吸入 ABKC0001	祛痰剂	
III级护理	ACAA0001			糖皮质激素	
检查				支气管舒张剂	
血常规	全血细胞计数+3分群 检测CAAA1000或全血 细胞计数+5分类检测 CAAB1000			戒烟药	
尿常规化学分析	CCAA2000			戒烟技术支持	
粪便常规检查	CCCA3000				
红细胞沉降率(ESR) 测定	CAAJ1000				
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000和活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000和血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000和血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000和纤维蛋白 (原)降解产物(FDP) 测定CAJX1000和凝血 酶原活动度(PA)和 凝血酶原比值(R) 和凝血酶原INR值 (INR)和血浆D-二 聚体(D-Dimer)测定 CAJY1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
乙肝五项	乙型肝炎表面抗原定性 (HBsAg) 测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量 (HBsAg) 测定 CGLH1000或乙型肝炎表面抗体定性 (抗HBs) 测定 CGLK1000或乙型肝炎表面抗体定量 (抗HBs) 测定 CGLL1000或乙型肝炎e抗原定性 (HBeAg) 测定 CGLM1000或乙型肝炎e抗原定量 (HBeAg) 测定 CGLN1000或乙型肝炎e抗体 (HBeAb) 测定 CGLP1000或乙型肝炎核心抗原 (HBcAg) 测定 CGLQ6000或乙型肝炎核心抗原定量 (HBcAg) 测定 CGLR6000				
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000或肌酐(Cr)测定 CEEB8000或尿酸(UA)测定 CEEE8000				
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳(TCO ₂)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙(Ca)测定 CEJF8000			化疗药物	
血气分析	CEJM1000				
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000				
C-反应蛋白(CRP)测定	CGCA1000				
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性 (HBsAg) 测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量 (HBsAg) 测定 CGLH1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000				
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
胸部X线摄影	EABJT001				
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001				
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401和用力肺活量功能检查FJE01402和肺每分通气量功能检查FJE01403和最大通气量功能检查FJE01404和肺弥散功能检查—一口气法FJE01405和流速容量曲线(V-V曲线)测定FJE02401和残气容积测定—体描箱法FJE02402				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或常规心电图检查FKA03703				
胸腔B超检查	EDBJT001				
肺弥散功能检查—重复呼吸法	FJE01406				
气道阻力测定	FJB02401				
支气管舒张试验	FJD04402				
一般细菌培养	CJAN8000				
心脏超声	右心超声造影EDFKA001或左心超声造影EDFKA002或普通心脏M型超声检查EDFKA003或全方位心脏M型超声检查EDFKA004或普通二维超声心动图EDFKA005或心脏彩色多普勒超声EDFKA007				
心肌酶测定	乳酸脱氢酶(LD)测定CECW1000和肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定CECT1000和肌酸激酶(CK)测定CECS1000				
降钙素原(PCT)检测	CEQT1000				
病理					

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
痰液常规检查	CCEK5000				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		护理		药物	
血气分析	CEJM1000	吸痰护理	ACBJ0004	胃粘膜保护剂	
双下肢血管彩色超声检查	下肢动脉彩色多普勒超声检查EDCL5001或下肢深静脉彩色多普勒超声检查EDCM1001或下肢浅静脉彩色多普勒超声检查EDCM4001	治疗		抗酸药	
下肢深静脉彩色多普勒超声检查	EDCM1001	静脉采血	ABBB0001	止咳药	
肺功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404			化痰药物	
胸部CT（平扫+增强扫描）	胸部X线计算机体层(CT)平扫EBAJT001和胸部X线计算机体层(CT)增强扫描EBBJT001			抗过敏药物	
普通二维超声心动图	EDFKA005				
肺每分通气量功能检查	FJE01403				
肺弥散功能检查-重复呼吸法	FJE01406				
胸腔B超检查	EDBJT001				
免疫球蛋白E(IgE)定量测定	CGAW1000				
一氧化碳(CO)测定	CEZJ1000				
监测					
心电监测	心电监测远程传输FKA05704或无创心电监测FKA05705				
无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710				

支气管哮喘发作

适用对象：	病种编码：GM008	ICD-10码：J45.0 J45.1 J45.8 J45.9 J46x00
	主要诊断：支气管哮喘发作	
	主要操作/主要治疗方式：	CCHI码：
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：J45.0, J45.1, J45.8, J45.9, J46x00支气管哮喘疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。	
出院标准：	1. 症状缓解。 2. 病情稳定。 3. 没有需要住院治疗的合并症和/或并发症。	
最短住院日参考值：	7天 1. 治疗期间出现并发症，需特殊诊断和治疗，导致住院时间延长。 2. 严重哮喘发作需行气管插管和机械通气维持者，退出本路径。 3. 常规治疗效果不佳，需特殊诊断和治疗，导致住院时间延长。	
变异条件：	4. 出现呼吸衰竭者 5. 合并其它严重基础疾病或年龄大于65岁。	
再入院时间间隔：	14天	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		治疗		药物	
I 级护理	ACAC0001	静脉采血	ABBB0001	支气管扩张剂	
II 级护理	ACAB0001	雾化吸入	超声雾化吸入 ABKA0001 或I氧气雾化吸入 ABKB000 或空气压缩泵雾化吸入 ABKC0001	抗炎药物（糖皮质激素、抗白三烯药物）	
III级护理	ACAA0001	氧气吸入	ABJA0001	抗过敏药物	
检查				化痰药物	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000				
尿常规化学分析	CCAA2000				
粪便常规检查	CCCA3000				
红细胞沉降率(ESR)测定	CAAJ1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000和活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000和血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000和血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000和纤维蛋白 (原)降解产物(FDP) 测定CAJX1000和凝血 酶原活动度(PA)和 凝血酶原比值(R) 和凝血酶原INR值 (INR)和血浆D-二 聚体(D-Dimer)测定 CAJY1000				
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000和乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000 和乙肝病 毒表面抗原确认试验 (HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000和乙型肝炎 表面抗体定性(抗 HBs)测定CGLK1000和 乙型肝炎表面抗体定 量(抗HBs)测定 CGLL1000				
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000或肌酐(Cr) 测定CEEB8000或尿酸 (UA)测定CEEE8000				
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO ₂)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000			化疗药物	
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000				
血气分析	CEJM1000				
C-反应蛋白(CRP)测 定	CGCA1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
心肌酶测定	乳酸脱氢酶(LD)测定 CECW1000和肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定 CECT1000和肌酸激酶(CK)测定 CECS1000				
肝脏功能测定	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定 CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000和碱性磷酸酶(ALP)测定 CECD8000和总胆红素(T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定 CECC8000和总蛋白(TP)测定 CEAA8000和白蛋白(A1b)测定 CEAE8000				
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000				
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
胸部X线摄影	EABJT001				
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001				
普通二维超声心动图	EDFKA005				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道常规心电图检查 FKA03702或常规心电图检查 FKA03703				
总IgE测定	CGAZ1000				
嗜酸细胞阳离子蛋白(ECP)测定	CGUN1000				
痰液常规检查	CCEK5000				
呼出气一氧化氮测定	FJE02407				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401和用力肺活量功能检查FJE01402和肺每分通气量功能检查FJE01403和最大通气量功能检查FJE01404和肺弥散功能检查-一口气法 FJE01405和流速容量曲线(V-V曲线)测定 FJE02401和残气容积测定-体描箱法 FJE02402				
支气管舒张试验	FJD04402				
肺弥散功能检查-重复呼吸法	FJE01406				
气道阻力测定	FJB02401				
痰液常规检查	CCEK5000				
血清过敏原特异IgE测定	CGUA1000				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		治疗		药物	
支气管舒张试验	FJD04402			胃粘膜保护剂	
肺弥散功能检查-重复呼吸法	FJE01406			抗菌药物	
气道阻力测定	FJB02401			戒烟药	
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401和用力肺活量功能检查FJE01402和肺每分通气量功能检查FJE01403和最大通气量功能检查FJE01404和肺弥散功能检查-一口气法 FJE01405和流速容量曲线(V-V曲线)测定 FJE02401和残气容积测定-体描箱法 FJE02402			戒烟技术支持	
血清过敏原特异IgE测定	CGUA1000				
血清过敏原特异IgG测定	CGUB1000				
胸部CT（平扫+增强扫描）	胸部X线计算机体层(CT)平扫EBAJT001和胸部X线计算机体层(CT)增强扫描EBBJT001				
普通二维超声心动图	EDFKA005				
经支气管内镜活检术	FJD07602				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
支气管镜检查	电子支气管镜检查 FJD01602或超声支气管镜检查FJD01603或 纤维支气管镜检查 FJD01601				
经支气管镜支气管肺 泡灌洗术	HJE48601				
一般细菌培养+鉴定+ 药敏	CJAR8000				
真菌培养+鉴定+药敏	CJHM8000				

初治菌阳肺结核

适用对象：	病种编码：GM009	
	主要诊断：初治菌阳肺结核	ICD-10码：A15.0
	主要操作/主要治疗方式：	CCHI码：
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：A15.0初治菌阳肺结核疾病编码。 2. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。	
出院标准：	1. 临床症状好转。 2. 患者可耐受制定的抗结核治疗方案。	
最短住院日参考值：	21-28天	
变异条件：	1. 出现严重的抗结核药物不良反应。 2. 治疗过程中出现严重并发症或合并症，如肺外结核、咯血、气胸、呼吸衰竭等，需要进一步诊疗，或需要转入其他路径。 3. 进一步诊断为耐多药结核病。 4. 原有病情明显加重，导致住院时间延长。 5. 基础病加重，造成疾病控制困难。 6. 免疫功能减退（HIV、长期糖皮质激素治疗、免疫抑制剂治疗、严重控制不良糖尿病及其它免疫功能严重受损。 7. 继发细菌感染者。	
再入院时间间隔：	2周	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		治疗		药物	
I级护理	ACAC0001	静脉采血	ABBB0001	抗结核药物	
II级护理	ACAB0001	擦浴降温	ABLA0001	化痰药物	
III级护理	ACAA0001	贴敷降温	ABLB0001	退热药	
检查				清脏腑热药	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000			维生素类药	
尿常规化学分析	CCAA2000			止咳药	
粪便常规检查	CCCA3000				
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
心肌酶测定	乳酸脱氢酶(LD)测定 CECW1000和肌酸激酶- MB同工酶活性(CK- MB)测定CECT1000和 肌酸激酶(CK)测定 CECS1000				
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000和 β 2微球蛋白(β 2- MG)测定CEAS8000				
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000和活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000和血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000和血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000和纤维蛋白 (原)降解产物(FDP) 测定CAJX1000和凝血 酶原活动度(PA)和 凝血酶原比值(R) 和凝血酶原INR值 (INR)和血浆D-二 聚体(D-Dimer)测定 CAJY1000				
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO ₂)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000和 磷脂测定CEHE1000			化疗药物	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000 和乙肝病毒表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定 CGLL1000				
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000				
丙型肝炎核心抗原测定	CGLY1000				
人免疫缺陷病毒检查	人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定 CGMF1000或艾滋病联合试验(HIVcombin)CGMG1000或人免疫缺陷病毒P24抗原测定 CGMH1000或人免疫缺陷病毒抗体确认试验 CGMJ1000				
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000				
红细胞沉降率(ESR)测定	CAAJ1000				
C-反应蛋白(CRP)测定	CGCA1000				
尿酸(UA)测定	CEEE8000				
分枝杆菌培养+鉴定+药敏	CJBB8000				
结核分枝杆菌药敏定量试验	CJCB9000				
胸部X光片	胸部X线透视 EAAJT001或胸部X线摄影EABJT001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703				
一般细菌培养+鉴定+药敏	CJAR8000				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		治疗		药物	
普通近视力检查	FEA01702				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
普通视野计检查	FEA01709				
腹膜后彩色多普勒超声检查	EDCQT003				
支气管镜检查	纤维支气管镜检查 FJD01601或电子支气管镜检查FJD01602				
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001				
胸腔彩色多普勒超声检查	EDCJT001				
尿常规目测检查	CCBM2000				
细胞免疫功能检查	免疫球蛋白G(IgG)定量测定CGAT1000；免疫球蛋白M(IgM)定量测定CGAU1000；免疫球蛋白D(IgD)定量测定CGAV1000；免疫球蛋白E(IgE)定量测定CGAW1000				
癌胚抗原(CEA)测定	CGRA1000				
肺功能检查	床边简易肺功能测定FJE01408或运动心肺功能检查FJE01702或脉冲振荡肺功能检查FJE01407				
结核分枝杆菌药敏定性试验	CJCA9000				
结核分枝杆菌药敏定量试验	CJCB9000				

原发性肺脓肿

适用对象：	病种编码：	GM010	ICD-10码：	
	主要诊断：	原发性肺脓肿	J85. 100, J85. 200	
	主要操作/主要治疗方式：		CCHI码：	
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：J85. 100, J85. 200肺脓肿疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断时，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
出院标准：	1. 症状缓解，体温正常超过72小时。 2. 病情稳定。 3. 没有需要住院治疗的合并症和/或并发症。			
最短住院日参考值：	3-8周			
变异条件：	1. 治疗无效或者病情进展，需复查病原学检查并调整抗菌药物，导致住院时间延长。 2. 伴有影响本病治疗效果的合并症和/或并发症，需要进行相关检查及治疗，导致住院时间延长。 3. 有手术治疗指征需外科治疗者，转入外科治疗路径。 4. 经检查确认为非一般细菌引起者，包括结核、真菌等。 5. 发现存在原发因素，例如气道狭窄，免疫功能严重低下及其他感染播散所致。 6. 慢性肺脓肿。			

再入院时间间隔：

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		治疗		药物	
I 级护理	ACAC0001	静脉采血	ABBB0001	抗菌药物	
II 级护理	ACAB0001	雾化吸入	超声雾化吸入 ABKA0001 或1氧气雾化吸入 ABKB000 或空气压缩泵雾化吸入 ABKC0001	祛痰剂	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
III级护理	ACAA0001	支气管镜大治疗	经电子支气管镜高频电凝治疗HJD72601和经电子支气管镜微波治疗HJD72602和经电子支气管镜激光治疗HJD72603和经电子支气管镜氩离子凝固治疗HJD72604和经电子支气管镜冷冻治疗HJD72605和经电子支气管镜电套圈治疗HJD72606和经纤维支气管镜高频电凝治疗HJD72607和经纤维支气管镜微波治疗HJD72608和经纤维支气管镜激光治疗HJD72609和经纤维支气管镜氩离子凝固治疗HJD72610和经纤维支气管镜冷冻治疗HJD72611和经纤维支气管镜电套圈治疗HJD72612	退热药	
检查		擦浴降温	ABLA0001		
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000	贴敷降温	ABLB0001		
尿常规化学分析	CCAA2000				
粪便常规检查	CCCA3000				
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000				
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000和β2微球蛋白(β2-MG)测定CEAS8000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
心肌酶测定	乳酸脱氢酶(LD)测定 CECW1000和肌酸激酶- MB同工酶活性(CK- MB)测定CECT1000和 肌酸激酶(CK)测定 CECS1000				
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO ₂)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000和 磷脂测定CEHE1000				
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000			化疗药物	
红细胞沉降率(ESR) 测定	CAAJ1000				
C-反应蛋白(CRP)测 定	CGCA1000				
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000和活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000和血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000和血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000和纤维蛋白 (原)降解产物(FDP) 测定CAJX1000和凝血 酶原活动度(PA)和 凝血酶原比值(R) 和凝血酶原INR值 (INR)和血浆D-二 聚体(D-Dimer)测定 CAJY1000				
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000和乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000 和乙肝病 毒表面抗原确认试验 (HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000和乙型肝炎 表面抗体定性(抗 HBs)测定CGLK1000和 乙型肝炎表面抗体定 量(抗HBs)测定 CGLL1000				
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
人免疫缺陷病毒检查	人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定 CGMF1000或艾滋病联合试验 (HIVcombin)CGMG1000 或人免疫缺陷病毒P24抗原测定 CGMH1000或人免疫缺陷病毒抗体确认试验 CGMJ1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
血气分析	CEJM1000				
痰液常规检查	CCEK5000				
普通细菌药敏定性试验	CJBX9000				
普通细菌药敏定量试验	CJBY9000				
降钙素原(PCT)检测	CEQT1000				
一般细菌培养	CJAN8000				
厌氧菌培养	CJAV8000				
胸部X光片	胸部X线透视 EAAJT001或胸部X线摄影EABJT001				
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001				
支气管镜检查	纤维支气管镜检查 FJD01601或电子支气管镜检查FJD01602				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道常规心电图检查 FKA03702或十二通道常规心电图检查 FKA03703				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		治疗		药物	
		经胸壁穿刺	胸腔穿刺术HJM48101 或胸腔穿刺置管引流术HJM45101		
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEE8000和肌酐(Cr)测定 CEEB8000和尿酸(UA)测定 CEEE8000和β2微球蛋白(β2-MG)测定 CEAS8000	经电子支气管镜滴药治疗	HJD48601		
糖化血红蛋白(HbA1c)测定	CEBD1000				
电子支气管镜检查	FJD01602				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
一般细菌培养+鉴定+药敏	CJAR8000				
厌氧菌培养+鉴定+药敏	CJAX8000				

结核性胸膜炎

适用对象：	病种编码：	GM011			
	主要诊断：	结核性胸膜炎	ICD-10码：	A15.6, A16.5	
	主要操作/主要治疗方式：		CCHI码：		
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD - 10：A15.6, A16.5结核性胸膜炎疾病编码。 2. 当患者合并其他疾病，但在住院期间不需特殊处理，也不影响第一诊断的临床路径实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 症状好转，体温正常。 2. 胸部X线提示胸液明显吸收。 3. 胸部B超提示胸液基本吸收或液性暗区<2cm，或不能定位抽液。 4. 可耐受抗结核治疗，治疗后未观察到严重副作用。			
	最短住院日参考值：	10 - 14天			
	变异条件：	1. 伴有影响本病治疗效果的合并症，需要进行相关诊断和治疗，导致住院时间延长。			
	再入院时间间隔：	2周			

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		治疗		药物	
I 级护理	ACAC0001	胸腔穿刺术	HJM48101	糖皮质激素	
II 级护理	ACAB0001	擦浴降温	ABLA0001	抗结核药物	
III级护理	ACAA0001	贴敷降温	ABLB0001	清脏腑热药	
检查				退热药	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000			化痰药物	
尿常规化学分析	CCAA2000			止咳药	
粪便常规检查	CCCA3000			维生素类药	
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)测定CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (A1b) 测定CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定CECD8000				
心肌酶测定	乳酸脱氢酶 (LD) 测定CECW1000和肌酸激酶-MB同工酶活性 (CK-MB) 测定CECT1000和肌酸激酶 (CK) 测定CECS1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000和 β 2微球蛋白(β 2- MG)测定CEAS8000				
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO ₂)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000和 磷脂测定CEHE1000				
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000			化疗药物	
红细胞沉降率(ESR) 测定	CAAJ1000				
C-反应蛋白(CRP)测 定	CGCA1000				
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000和活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000和血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000和血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000和纤维蛋白 (原)降解产物(FDP) 测定CAJX1000和凝血 酶原活动度(PA)和 凝血酶原比值(R) 和凝血酶原INR值 (INR)和血浆D-二 聚体(D-Dimer)测定 CAJY1000				
血浆D-二聚体(D- Dimer)测定	CAJY1000				
结核分枝杆菌抗体测 定	CGPA1000				
腺苷脱氨酶(ADA)测 定	CECL8000				
血气分析	CEJM1000				
癌胚抗原(CEA)测定	CGRA1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000 和乙肝病毒表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定 CGLL1000				
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000				
人免疫缺陷病毒检查	人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定 CGMF1000或艾滋病联合试验(HIVcombin)CGMG1000或人免疫缺陷病毒P24抗原测定 CGMH1000或人免疫缺陷病毒抗体确认试验 CGMJ1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
直接涂片抗酸染色镜检	CJAF8000				
分枝杆菌培养	CJAY8000				
胸部X光片	胸部X线透视 EAAJT001或胸部X线摄影EABJT001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查 FKA03702或十二通道常规心电图检查 FKA03703				
胸腔B超检查	EDBJT001				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
生化常规检查	葡萄糖(Glu)测定 CEFA8000和总钙(Ca) 测定CEJF8000和无机 磷(P)测定CEKA8000 和钾(K)测定 CEJA8000和钠(Na)测 定CEJB8000和氯(Cl) 测定CEJC8000和镁 (Mg)测定CEJE8000和 总二氧化碳(TCO ₂)测 定CEJD1000				
乳糜定性试验	CCAT8000				
一般细菌培养+鉴定+ 药敏	CJAR8000				
肿瘤标志物检查	癌胚抗原(CEA)测定 CGRA1000和甲胎蛋白 (AFP)测定CGRB8000 和糖类抗原CA-125测 定CGRP1000和糖类抗 原CA-153测定 CGRR1000和糖类抗原 CA-199测定CGRS1000 和神经元特异性烯醇 化酶(NSE)测定 CGRH1000和肿瘤坏死 因子 α (TNF- α)测定 CGRY1000和糖类抗原 CA-724测定CGRV1000				
胸腹水常规检查	CCDA4000				
胸腹水细胞学检查	CCDB4000				
普通视力检查	普通远视力检查 FEA01701或普通近视 力检查FEA01702				
普通视野计检查	FEA01709				
前置镜眼底检查	FES01706				
电测听	脑干听觉诱发电位检 查FBF03701				
选择项目					

支原体肺炎

适用对象：	病种编码：GM012	
	主要诊断：支原体肺炎	ICD-10码：J15.7
	主要操作/主要治疗方式：	CCHI码：
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：J15.7支原体肺炎疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，只要住院期间不需要特殊处理，也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。	
出院标准：	1. 咳嗽明显减轻，一般状况良好。 2. 连续3天腋温<37.5℃。 3. X线胸片显示炎症吸收好转。	
最短住院日参考值：	5-14天	
变异条件：	1. 难治性支原体肺炎，即对大环内酯类抗生素反应不佳的支原体肺炎，包括三方面： （1）病情较重，有肺外并发症，单用大环内酯类抗生素不能控制病情； （2）大环内酯类抗生素治疗2周，仍有咳嗽，肺部阴影持续无吸收好转； （3）混合其他病原体感染，需要延长住院治疗时间。 2. 对于难治性支原体肺炎患儿，若病情重，可在炎症反应的极期加用肾上腺皮质激素或静注丙种球蛋白，亦可合用利福平。导致住院时间延长，医疗费用增加。	
	再入院时间间隔：	7天

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	雾化吸入	超声雾化吸入ABKA0001 或1氧气雾化吸入ABKB000 或空气压缩泵雾化吸入ABKC0001	抗菌药物	
尿常规化学分析	CCAA2000	静脉输液	ABCA0001	止咳祛痰剂	
粪便常规检查	CCCA3000	吸痰护理	ACBJ0004	止喘药	
肌酸激酶(CK)测定	CECS1000			退热药	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000				
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000				
C-反应蛋白(CRP)测定	CGCA1000				
胸部X线摄影	EABJT001				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳(TCO ₂)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000				
肺炎支原体免疫学试验	CGPJ8000				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703				
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001				
肌酸激酶-MB同工酶 活性(CK-MB)测定	CECT1000				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
血气分析	CEJM1000	氧气吸入	ABJA0001	糖皮质激素	
一般细菌培养	CJAN8000	胸腔穿刺术	HJM48101	免疫调节剂	
肺炎细菌检测	CJCT8000	经纤维支气管镜吸痰	HJD65603	营养心肌药	
电子支气管镜检查	FJD01602			营养清脏腑热药	
肺通气功能检查（>6岁适用）	肺活量功能检查 FJE01401和用力肺活 量功能检查FJE01402 和肺每分通气量功能 检查FJE01403和最大 通气量功能检查 FJE01404和肺弥散功 能检查-一口气法 FJE01405和流速容量 曲线(V-V曲线)测定 FJE02401和残气容积 测定-体描箱法 FJE02402				
痰液常规检查	CCEK5000				
胸部X线计算机体层 (CT)平扫	EBAJT001				
呼吸道病毒测定	呼吸道合胞病毒抗体 测定CGMW1000呼吸道 合胞病毒抗原测定 CGMX5000				
冷凝集试验	CGNT1000				
纤维支气管镜检查	FJD01601				
经纤维支气管镜防污 染保护性灌洗采样	FJD06605				
经电子支气管镜防污 染保护性灌洗采样	FJD06606				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
经支气管内镜活检术	FJD07602				
胸部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBJT001				
胸腔B超检查	EDBJT001				
胸腔彩色多普勒超声检查	EDCJT001				

支气管肺癌
全肺切除术

适用对象：	病种编码：	GS001	
	主要诊断：	支气管肺癌	ICD-10码：C34.0-C34.3, C34.8, C34.9
	主要操作/主要治疗方式：	全肺切除术	CCHI码：HJE75301
入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10：C34.0-C34.3, C34.8, C34.9支气管肺癌疾病编码。 2. 临床分期（UICC2009）为I期、II期、和IIIA期及孤立性脑或肾上腺转移的非小细胞肺癌。 3. 临床分期（UICC2009）为T1-2，N0的小细胞肺癌。 4. 心、肺、肝、肾等器官功能可以耐受全麻开胸手术。 5. 当患者同时具有其他疾病诊断，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可进入此路径。		
出院标准：	1. 切口愈合良好，或门诊可处理的愈合不良切口。 2. 体温正常，胸片提示无明显感染征象。		
最短住院日参考值：	12天		
变异条件：	1. 有影响手术的合并症，术前需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、呼吸功能衰竭、心脏功能衰竭、支气管胸膜瘘等并发症，需要延长治疗时间。		
再入院间隔时间：	1周		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	特级护理	ACAD0001	特级护理	ACAD0001
检查		/ I级护理	ACAC0001	/ I级护理	ACAC0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查		/ II级护理	ACAB0001
尿常规化学分析	CCAA2000	常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	检查	
粪便常规检查	CCCA3000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (Alb) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000和乳酸脱氢酶 (LD) 测定CECW1000和尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000和肌酸激酶 (CK) 测定 CECS1000和肌酸激酶-MB同工酶活性 (CK-MB) 测定CECT1000和甘油三酯 (TG) 测定 CEHB1000和总胆固醇 (TC) 测定CEHA1000和高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C) 测定 CEHC1000和低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C) 测定CEHD1000和葡萄糖 (Glu) 测定 CEFA8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000和无机磷 (P) 测定CEKA8000和钾 (K) 测定 CEJA8000和钠 (Na) 测定CEJB8000和氯 (Cl) 测定CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000	导尿管留置	ABHA0002	生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (Alb) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000和乳酸脱氢酶 (LD) 测定CECW1000和尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000和肌酸激酶 (CK) 测定 CECS1000和肌酸激酶-MB同工酶活性 (CK-MB) 测定CECT1000和甘油三酯 (TG) 测定 CEHB1000和总胆固醇 (TC) 测定CEHA1000和高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C) 测定 CEHC1000和低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C) 测定CEHD1000和葡萄糖 (Glu) 测定 CEFA8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000和无机磷 (P) 测定CEKA8000和钾 (K) 测定 CEJA8000和钠 (Na) 测定CEJB8000和氯 (Cl) 测定CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000
血型鉴定	ABO血型鉴定 (正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定 (反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定 (正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定 (反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	氧气吸入	ABJA0001	血气分析	CEJM1000
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间 (APTT) 测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间 (PT) 测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	氧气雾化吸入	ABKB0001	胸部X线摄影	EABJT001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
乙型肝炎表面抗体(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定 CGLK1000或乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	监测		治疗	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	术中体温监测	HAN05702	换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	动态血压监测	FKA05708	化疗药物	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902	手术标本病理诊断	BCAD0001
肺癌标志物检查	癌胚抗原(CEA)测定 CGRA1000和神经元特异性烯醇化酶(NSE)测定CGRH1000和鳞状细胞癌相关抗原(SCC)测定CGRW1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710		
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404	麻醉			
弥散功能检查	肺弥散功能检查—一口气法FJE01405或肺弥散功能检查—重复呼吸法FJE01406	全身麻醉	HAA42901		
气道阻力测定	FJB02401	手术			
血气分析	CEJM1000	全肺切除术	HJE75301		
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	病理			
普通二维超声心动图	EDFKA005	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001		
纤维支气管镜检查	FJD01601	药物			
经支气管内镜活检术	FJD07602	抗菌药物			
痰液常规检查	CCEK5000	镇痛药物			
胸部X线摄影	EABJT001	抗肿瘤药物			
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
/胸部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBJT001				
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001				
全身骨显像	EEAX6004				
头部磁共振增强成像	ECBBP001				
/头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001				
治疗					
氧气雾化吸入	ABKB0001				
一般灌肠	ABGE0001				
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
PET肿瘤局部断层显像	EEEZX001			胸椎X线摄影	EABVN001
/PET/CT肿瘤显像	PET/CT肿瘤局部显像EEFZX001或PET/CT肿瘤全身显像EEFZY001	治疗		治疗	
/SPECT/CT肺断层显像	EEDJE001				
食管镜检查	硬式食管镜检查FPC01601或纤维食管镜检查FPC01602或电子食管镜检查FPC01603	药物		药物	
经纤维支气管镜吸痰	HJD65603				
穿刺液及引流液常规检查	CCDH8000				
胸椎X线摄影	EABVN001				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
动态心电图检查	三通道动态心电图检查FKA03704或十二通道动态心电图检查FKA03705				
治疗					
药物					

支气管肺癌
肺段切除术

适用对象：	病种编码：	GS002			
	主要诊断：	支气管肺癌	ICD-10码：	C34. 0-C34. 3, C34. 8, C34. 9	
	主要操作/主要治疗方式：	肺段切除术	CCHI码：	HJG73301	
入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10：C34. 0-C34. 3, C34. 8, C34. 9支气管肺癌疾病编码。 2. 临床分期（UICC2009）为I期、II期、和IIIA期及孤立性脑或肾上腺转移的非小细胞肺癌。 3. 临床分期（UICC2009）为T1-2，N0的小细胞肺癌。 4. 心、肺、肝、肾等器官功能可以耐受全麻开胸手术。 5. 当患者同时具有其他疾病诊断，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可进入此路径。				
出院标准：	1. 切口愈合良好，或门诊可处理的愈合不良切口。 2. 体温正常，胸片提示无明显感染征象。				
最短住院日参考值：	12天				
变异条件：	1. 有影响手术的合并症，术前需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、呼吸功能衰竭、心脏功能衰竭、支气管胸膜瘘等并发症，需要延长治疗时间。				
再入院间隔时间：	1周				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	特级护理	ACAD0001	特级护理	ACAD0001
检查		/ I级护理	ACAC0001	/ I级护理	ACAC0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查		/ II级护理	ACAB0001
尿常规化学分析	CCAA2000	常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	检查	
粪便常规检查	CCCA3000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定 CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和 白蛋白(Alb)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定 CECD8000和乳酸脱氢酶(LD)测定CECW1000 和尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr)测定 CEEB8000和尿酸(UA)测定 CEE8000和肌酸激酶(CK)测定 CECS1000和肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB) 测定CECT1000和甘油三酯(TG)测定 CEHB1000和总胆固醇(TC)测定 CEHA1000和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定 CEHC1000和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) 测定CEHD1000和葡萄糖(Glu)测定 CEFA8000和总钙(Ca)测定 CEJF8000和无机磷(P)测定 CEKA8000和钾(K)测定 CEJA8000和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定 CEJD1000	导尿管留置	ABHA0002	生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定 CECC8000和总蛋白(TP)测定 CEAA8000和白蛋白(Alb)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定 CECD8000和乳酸脱氢酶(LD)测定 CECW1000和尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr)测定 CEEB8000和尿酸(UA)测定 CEE8000和肌酸激酶(CK)测定 CECS1000和肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB) 测定CECT1000和甘油三酯(TG)测定 CEHB1000和总胆固醇(TC)测定 CEHA1000和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定 CEHC1000和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) 测定CEHD1000和葡萄糖(Glu)测定 CEFA8000和总钙(Ca)测定 CEJF8000和无机磷(P)测定 CEKA8000和钾(K)测定 CEJA8000和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定 CEJD1000
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型) CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型) CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型) CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型) CAME1000或RhD血型鉴定 CAMF1000	氧气吸入	ABJA0001	血气分析	CEJM1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	氧气雾化吸入	ABKB0001	胸部X线摄影	EABJT001
乙型肝炎表面抗体 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗体定 性(抗HBs)测定 CGLK1000或乙型肝炎 表面抗体定量(抗 HBs)测定CGLL1000	监测		治疗	
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	术中体温监测	HAN05702	换药	换药(小)ABFA0001或 换药(中)ABFA0002或 换药(大)ABFA0003或 换药(特大)ABFA0004
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	动态血压监测	FKA05708	化疗药物	
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000	全身麻醉下呼吸功能 监测	HAN05902	手术标本病理诊断	BCAD0001
肺癌标志物检查	癌胚抗原(CEA)测定 CGRA1000和神经元特 异性烯醇化酶(NSE) 测定CGRH1000和鳞状 细胞癌相关抗原 (SCC)测定CGRW1000	无创指脉血氧饱和度 监测	FKA05710		
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活 量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403或最大 通气量功能检查 FJE01404	麻醉			
弥散功能检查	肺弥散功能检查—一 口气法FJE01405或肺 弥散功能检查—重复 呼吸法FJE01406	全身麻醉	HAA42901		
气道阻力测定	FJB02401	手术			
血气分析	CEJM1000	肺段切除术	HJG73301		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
常规心电图检查	单通通常规心电图检查 FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703	病理			
普通二维超声心动图	EDFKA005	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001		
纤维支气管镜检查	FJD01601	药物			
经支气管内镜活检术	FJD07602	抗菌药物			
痰液常规检查	CCEK5000	镇痛药物			
胸部X线摄影	EABJT001	抗肿瘤药物			
胸部X线计算机体层 (CT)平扫	EBAJT001				
/胸部X线计算机体层 (CT)增强扫描	EBBJT001				
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001				
全身骨显像	EEAX6004				
头部磁共振增强成像	ECBBP001				
/头部X线计算机体层 (CT)平扫	EBABP001				
治疗					
氧气雾化吸入	ABKB0001				
一般灌肠	ABGE0001				
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
PET肿瘤局部断层显像	EEEZX001			胸椎X线摄影	EABVN001
/PET/CT肿瘤显像	PET/CT肿瘤局部显像 EEFZX001或PET/CT肿瘤 全身显像EEFZY001	治疗		治疗	
/SPECT/CT肺断层显像	EEDJE001				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
食管镜检查	硬式食管镜检查 FPC01601或纤维食管 镜检查FPC01602或电 子食管镜检查 FPC01603	药物		药物	
穿刺液及引流液常规 检查	CCDH8000				
胸椎X线摄影	EABVN001				
动态心电图检查	三通道动态心电图检 查FKA03704或十二通 道动态心电图检查 FKA03705				
治疗					
经纤维支气管镜吸痰	HJD65603				
药物					

支气管肺癌

经胸腔镜肺段切除术

适用对象：	病种编码：	GS003			
	主要诊断：	支气管肺癌		ICD-10码：	C34.0-C34.3, C34.8, C34.9
	主要操作/主要治疗方式：	经胸腔镜肺段切除术		CCHI码：	HJG73501
入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10：C34.0-C34.3, C34.8, C34.9支气管肺癌疾病编码。 2. 临床分期（UICC2009）为I期、II期、和IIIA期及孤立性脑或肾上腺转移的非小细胞肺癌。 3. 临床分期（UICC2009）为T1-2，N0的小细胞肺癌。 4. 心、肺、肝、肾等器官功能可以耐受全麻开胸手术。 5. 当患者同时具有其他疾病诊断，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可进入此路径。				
出院标准：	1. 切口愈合良好，或门诊可处理的愈合不良切口。 2. 体温正常，胸片提示无明显感染征象。				
最短住院日参考值：	12天				
变异条件：	1. 有影响手术的合并症，术前需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、呼吸功能衰竭、心脏功能衰竭、支气管胸膜瘘等并发症，需要延长治疗时间。				
再入院间隔时间：	1周				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	特级护理	ACAD0001	特级护理	ACAD0001
检查		/ I级护理	ACAC0001	/ I级护理	ACAC0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查		/ II级护理	ACAB0001
尿常规化学分析	CCAA2000	常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	检查	
粪便常规检查	CCCA3000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT)测定 CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和白蛋白 (A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP)测定 CECD8000和乳酸脱氢酶 (LD)测定CECW1000和尿素 (Urea)测定 CEEA8000和肌酐 (Cr)测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000和肌酸激酶 (CK)测定 CECS1000和肌酸激酶-MB同工酶活性 (CK-MB)测定CECT1000和甘油三酯 (TG)测定 CEHB1000和总胆固醇 (TC)测定CEHA1000和高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)测定 CEHC1000和低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)测定 CEHD1000和葡萄糖 (Glu)测定 CEFA8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000和无机磷 (P)测定CEKA8000和钾 (K)测定 CEJA8000和钠 (Na)测定CEJB8000和氯 (Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2)测定 CEJD1000	导尿管留置	ABHA0002	生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT)测定 CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和白蛋白 (A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP)测定 CECD8000和乳酸脱氢酶 (LD)测定CECW1000和尿素 (Urea)测定 CEEA8000和肌酐 (Cr)测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000和肌酸激酶 (CK)测定 CECS1000和肌酸激酶-MB同工酶活性 (CK-MB)测定CECT1000和甘油三酯 (TG)测定 CEHB1000和总胆固醇 (TC)测定CEHA1000和高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)测定 CEHC1000和低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)测定 CEHD1000和葡萄糖 (Glu)测定 CEFA8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000和无机磷 (P)测定CEKA8000和钾 (K)测定 CEJA8000和钠 (Na)测定CEJB8000和氯 (Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2)测定 CEJD1000
血型鉴定	ABO血型鉴定 (正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定 (反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定 (正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定 (反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	氧气吸入	ABJA0001	血气分析	CEJM1000
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间 (APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间 (PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	氧气雾化吸入	ABKB0001	胸部X线摄影	EABJT001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
乙型肝炎表面抗体(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定 CGLK1000或乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	治疗		治疗	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	术中体温监测	HAN05702	换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	动态血压监测	FKA05708	化疗药物	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902	手术标本病理诊断	BCAD0001
肺癌标志物检查	癌胚抗原(CEA)测定 CGR A1000和神经元特异性烯醇化酶(NSE)测定 CGRH1000和鳞状细胞癌相关抗原(SCC)测定 CGRW1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710		
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活量功能检查 FJE01402或肺每分通气量功能检查 FJE01403或最大通气量功能检查 FJE01404	麻醉			
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一口气法 FJE01405或肺弥散功能检查-重复呼吸法 FJE01406	全身麻醉	HAA42901		
气道阻力测定	FJB02401	手术			
血气分析	CEJM1000	经胸腔镜肺段切除术	HJG73501		
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道常规心电图检查 FKA03702或十二通道常规心电图检查 FKA03703	病理			
普通二维超声心动图	EDFKA005	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001		
纤维支气管镜检查	FJD01601	药物			
经支气管内镜活检术	FJD07602	抗菌药物			
痰液常规检查	CCEK5000	镇痛药物			
胸部X线摄影	EABJT001	抗肿瘤药物			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001				
/胸部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBJT001				
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001				
全身骨显像	EEAX6004				
头部磁共振增强成像	ECBBP001				
/头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001				
治疗					
氧气雾化吸入	ABKB0001				
一般灌肠	ABGE0001				
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
PET肿瘤局部断层显像	EEEZX001			胸椎X线摄影	EABVN001
/PET/CT肿瘤显像	PET/CT肿瘤局部显像EEFZX001或PET/CT肿瘤全身显像EEFZY001	治疗		治疗	
/SPECT/CT肺断层显像	EEDJE001				
食管镜检查	硬式食管镜检查FPC01601或纤维食管镜检查FPC01602或电子食管镜检查FPC01603	药物		药物	
穿刺液及引流液常规检查	CCDH8000				
胸椎X线摄影	EABVN001				
动态心电图检查	三通道动态心电图检查FKA03704或十二通道动态心电图检查FKA03705				
治疗					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
经纤维支气管镜吸痰	HJD65603				
药物					

支气管肺癌

肺叶切除术

适用对象：	病种编码：	GS004			
	主要诊断：	支气管肺癌		ICD-10码：	C34.0-C34.3, C34.8, C34.9
	主要操作/主要治疗方式：	肺叶切除术		CCHI码：	HJF73301
	入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10：C34.0-C34.3, C34.8, C34.9支气管肺癌疾病编码。 2. 临床分期（UICC2009）为I期、II期、和IIIA期及孤立性脑或肾上腺转移的非小细胞肺癌。 3. 临床分期（UICC2009）为T1-2，N0的小细胞肺癌。 4. 心、肺、肝、肾等器官功能可以耐受全麻开胸手术。 5. 当患者同时具有其他疾病诊断，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可进入此路径。			
	出院标准：	1. 切口愈合良好，或门诊可处理的愈合不良切口。 2. 体温正常，胸片提示无明显感染征象。			
	最短住院日参考值：	12天			
	变异条件：	1. 有影响手术的合并症，术前需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、呼吸功能衰竭、心脏功能衰竭、支气管胸膜瘘等并发症，需要延长治疗时间。			
	再入院间隔时间：	1周			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	特级护理	ACAD0001	特级护理	ACAD0001
检查		/ I级护理	ACAC0001	/ I级护理	ACAC0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查		/ II级护理	ACAB0001
尿常规化学分析	CCAA2000	常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	检查	
粪便常规检查	CCCA3000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定 CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和 白蛋白(Alb)测定CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定CECD8000和乳酸脱氢 酶(LD)测定CECW1000和尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000和肌酸激酶(CK)测定 CECS1000和肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB) 测定CECT1000和甘油三酯(TG)测定 CEHB1000和总胆固醇(TC)测定CEHA1000和 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定 CEHC1000和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) 测定CEHD1000和葡萄糖(Glu)测定 CEFA8000和总钙(Ca)测定CEJF8000和无机 磷(P)测定CEKA8000和钾(K)测定 CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl) 测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定 CEJD1000	导尿管留置	ABHA0002	生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定 CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和 白蛋白(Alb)测定CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定CECD8000和乳酸脱氢 酶(LD)测定CECW1000和尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000和肌酸激酶(CK)测定 CECS1000和肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB) 测定CECT1000和甘油三酯(TG)测定 CEHB1000和总胆固醇(TC)测定CEHA1000和 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定 CEHC1000和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) 测定CEHD1000和葡萄糖(Glu)测定 CEFA8000和总钙(Ca)测定CEJF8000和无机 磷(P)测定CEKA8000和钾(K)测定 CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl) 测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定 CEJD1000
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血 型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000	氧气吸入	ABJA0001	血气分析	CEJM1000
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定CAGD1000	氧气雾化吸入	ABKB0001	胸部X线摄影	EABJT001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
乙型肝炎表面抗体(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定 CGLK1000或乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	监测		治疗	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	术中体温监测	HAN05702	换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	动态血压监测	FKA05708	化疗药物	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902	手术标本病理诊断	BCAD0001
肺癌标志物检查	癌胚抗原(CEA)测定 CGRA1000和神经元特异性烯醇化酶(NSE)测定CGRH1000和鳞状细胞癌相关抗原(SCC)测定CGRW1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710		
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404	麻醉			
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一口气法FJE01405或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	全身麻醉	HAA42901		
气道阻力测定	FJB02401	手术			
血气分析	CEJM1000	肺叶切除术	HJF73301		
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	病理			
普通二维超声心动图	EDFKA005	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001		
纤维支气管镜检查	FJD01601	药物			
经支气管内镜活检术	FJD07602	抗菌药物			
痰液常规检查	CCEK5000	镇痛药物			
胸部X线摄影	EABJT001	抗肿瘤药物			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001				
/胸部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBJT001				
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001				
全身骨显像	EEAX6004				
头部磁共振增强成像	ECBBP001				
/头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001				
治疗					
氧气雾化吸入	ABKB0001				
一般灌肠	ABGE0001				
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
PET肿瘤局部断层显像	EEEZX001			胸椎X线摄影	EABVN001
/PET/CT肿瘤显像	PET/CT肿瘤局部显像EEFZX001或PET/CT肿瘤全身显像EEFZY001	治疗		治疗	
/SPECT/CT肺断层显像	EEDJE001				
食管镜检查	硬式食管镜检查FPC01601或纤维食管镜检查FPC01602或电子食管镜检查FPC01603	药物		药物	
穿刺液及引流液常规检查	CCDH8000				
胸椎X线摄影	EABVN001				
动态心电图检查	三通道动态心电图检查FKA03704或十二通道动态心电图检查FKA03705				
治疗					
经纤维支气管镜吸痰	HJD65603				
药物					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码

支气管肺癌

经胸腔镜肺叶切除术

适用对象：	病种编码：	GS005			
	主要诊断：	支气管肺癌		ICD-10码：	C34.0-C34.3, C34.8, C34.9
	主要操作/主要治疗方式：	经胸腔镜肺叶切除术		CCHI码：	HJF73501
入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10：C34.0-C34.3, C34.8, C34.9支气管肺癌疾病编码。 2. 临床分期（UICC2009）为I期、II期、和IIIA期及孤立性脑或肾上腺转移的非小细胞肺癌。 3. 临床分期（UICC2009）为T1-2，N0的小细胞肺癌。 4. 心、肺、肝、肾等器官功能可以耐受全麻开胸手术。 5. 当患者同时具有其他疾病诊断，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可进入此路径。				
出院标准：	1. 切口愈合良好，或门诊可处理的愈合不良切口。 2. 体温正常，胸片提示无明显感染征象。				
最短住院日参考值：	12天				
变异条件：	1. 有影响手术的合并症，术前需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、呼吸功能衰竭、心脏功能衰竭、支气管胸膜瘘等并发症，需要延长治疗时间。				
再入院间隔时间：	1周				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	特级护理	ACAD0001	特级护理	ACAD0001
检查		/ I级护理	ACAC0001	/ I级护理	ACAC0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查		/ II级护理	ACAB0001
尿常规化学分析	CCAA2000	常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	检查	
粪便常规检查	CCCA3000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000和乳酸脱氢酶(LD)测定CECW1000和尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000和肌酸激酶(CK)测定CECS1000和肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定CECT1000和甘油三酯(TG)测定CEHB1000和总胆固醇(TC)测定CEHA1000和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定CEHC1000和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定CEHD1000和葡萄糖(Glu)测定CEFA8000和总钙(Ca)测定CEJF8000和无机磷(P)测定CEKA8000和钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定	导尿管留置	ABHA0002	生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000和乳酸脱氢酶(LD)测定CECW1000和尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000和肌酸激酶(CK)测定CECS1000和肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定CECT1000和甘油三酯(TG)测定CEHB1000和总胆固醇(TC)测定CEHA1000和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定CEHC1000和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定CEHD1000和葡萄糖(Glu)测定CEFA8000和总钙(Ca)测定CEJF8000和无机磷(P)测定CEKA8000和钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	氧气吸入	ABJA0001	血气分析	CEJM1000
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	氧气雾化吸入	ABKB0001	胸部X线摄影	EABJT001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
乙型肝炎表面抗体(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定 CGLK1000或乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	监测		治疗	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	术中体温监测	HAN05702	换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	动态血压监测	FKA05708	化疗药物	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902	手术标本病理诊断	BCAD0001
肺癌标志物检查	癌胚抗原(CEA)测定 CGRA1000和神经元特异性烯醇化酶(NSE)测定CGRH1000和鳞状细胞癌相关抗原(SCC)测定CGRW1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710		
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404	麻醉			
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一口气法FJE01405或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	全身麻醉	HAA42901		
气道阻力测定	FJB02401	手术			
血气分析	CEJM1000	经胸腔镜肺叶切除术	HJF73501		
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	病理			
普通二维超声心动图	EDFKA005	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001		
纤维支气管镜检查	FJD01601	药物			
经支气管内镜活检术	FJD07602	抗菌药物			
痰液常规检查	CCEK5000	镇痛药物			
胸部X线摄影	EABJT001	抗肿瘤药物			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001				
/胸部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBJT001				
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001				
全身骨显像	EEAX6004				
头部磁共振增强成像	ECBBP001				
/头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001				
治疗					
氧气雾化吸入	ABKB0001				
一般灌肠	ABGE0001				
经纤维支气管镜吸痰	HJD65603				
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
PET肿瘤局部断层显像	EEEZX001			胸椎X线摄影	EABVN001
/PET/CT肿瘤显像	PET/CT肿瘤局部显像EEFZX001或PET/CT肿瘤全身显像EEFZY001	治疗		治疗	
/SPECT/CT肺断层显像	EEDJE001				
食管镜检查	硬式食管镜检查FPC01601或纤维食管镜检查FPC01602或电子食管镜检查FPC01603	药物		药物	
穿刺液及引流液常规检查	CCDH8000				
胸椎X线摄影	EABVN001				
动态心电图检查	三通道动态心电图检查FKA03704或十二通道动态心电图检查FKA03705				
治疗					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
药物					

肋骨骨折合并血气胸

经肋间胸腔闭式引流术

适用对象：	病种编码：	GS006			
	主要诊断：	肋骨骨折合并血气胸	ICD-10码：	S22.3+S27.2	
	主要操作/主要治疗方式：	经肋间胸腔闭式引流术	CCHI码：	HJM45301	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：S22.3+S27.2，伴S27.200肋骨骨折或多发性肋骨骨折，其他诊断有创伤性血气胸，行胸腔闭式引流术的。 2. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 病人病情稳定，体温正常，手术切口愈合良好，生命体征平稳。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。			
	住院日参考值：	≤10天			
	变异条件：	1. 需要开胸手术，接受全麻手术的张力性气胸和进行性血胸。 2. 术后出现肺部感染、呼吸功能衰竭、心脏功能衰竭、肝肾功能衰竭等并发症，需要延长治疗时间。			
	再入院间隔时间：	无需			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001
检查		检查		/ II 级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			检查	
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (Alb) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000 和肌酐(Cr)测定 CEEB8000 和尿酸(UA)测定 CEEE8000	氧气吸入	ABJA0001	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000 和氯(Cl)测定 CEJC8000 和总二氧化碳(TCO2) 测定CEJD1000 和镁(Mg)测定 CEJE8000 和总钙(Ca)测定 CEJF8000	静脉输液	ABCA0001	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000 和肌酐(Cr)测定 CEEB8000 和尿酸(UA)测定 CEEE8000
胸部X线摄影	EABJT001	心电监护	院内遥测心电监护 KKA28701 或无创心电监测 FKA05705	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000 和氯(Cl)测定 CEJC8000 和总二氧化碳(TCO2) 测定CEJD1000 和镁(Mg)测定 CEJE8000 和总钙(Ca)测定 CEJF8000
多通道常规心电图检 查	FKA03702	监测		胸部X线摄影	EABJT001
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000 或活化部分凝血活酶 时间(APTT)测定 CAGB1000 或血浆凝血酶原时间 (PT)测定CAGC1000 或血浆纤维蛋白原测 定CAGD1000			治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000 或RhD血型鉴定CAMF1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710		
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	术中体温监测	HAN05702	药物	
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000 和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000 和乙肝病毒表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定CGLJ1000 和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000 和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	无创血压监测	FKA05709	化疗药物	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	麻醉		祛痰药物	
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	局部静脉内麻醉	HAB42201		
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	手术			
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001	经肋间胸腔闭式引流术	HJM45301		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
胸部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBJT001	病理			
治疗					
氧气吸入	ABJA0001	药物			
药物		抗菌药物			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
血气分析	CEJM1000			院内会诊	AADB0001
骨密度测定	EEAX6002	治疗		腹腔积液B超检查	EDBQT002
尿本-周蛋白定性试验	CCAG2000	导尿管留置	ABHA0002	胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001
腹腔积液B超检查	EDBQT002	静脉输血	ABCD0001	治疗	
治疗		加压快速输血	ABCE0001	外固定架使用	PBBA0801
无创呼吸机辅助通气	KJA21401	药物		外固定架调整术	PBBA1001
监测				静脉输血	ABCD0001
院内遥测心电监护	KKA28701			加压快速输血	ABCE0001
药物				药物	

肋骨骨折合并血气胸

经肋床胸腔闭式引流术

适用对象：	病种编码：	GS007			
	主要诊断：	肋骨骨折合并血气胸	ICD-10码：	S22.3+S27.2	
	主要操作/主要治疗方式：	经肋床胸腔闭式引流术	CCHI码：	HJM45302	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：S22.3+S27.2，伴S27.200肋骨骨折或多发性肋骨骨折，其他诊断有创伤性血气胸，行胸腔闭式引流术的。 2. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 病人病情稳定，体温正常，手术切口愈合良好，生命体征平稳。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。			
	住院日参考值：	≤10天			
	变异条件：	1. 需要开胸手术，接受全麻手术的张力性气胸和进行性血胸。 2. 术后出现肺部感染、呼吸功能衰竭、心脏功能衰竭、肝肾功能衰竭等并发症，需要延长治疗时间。			
	再入院间隔时间：	无需			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001
检查		检查		/ II 级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			检查	
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000 和肌酐(Cr)测定 CEEB8000 和尿酸(UA)测定 CEEE8000	氧气吸入	ABJA0001	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000 和氯(Cl)测定 CEJC8000 和总二氧化碳(TCO2) 测定CEJD1000 和镁(Mg)测定 CEJE8000 和总钙(Ca)测定 CEJF8000	静脉输液	ABCA0001	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000 和肌酐(Cr)测定 CEEB8000 和尿酸(UA)测定 CEEE8000
胸部X线摄影	EABJT001	监测		电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000 和氯(Cl)测定 CEJC8000 和总二氧化碳(TCO2) 测定CEJD1000 和镁(Mg)测定 CEJE8000 和总钙(Ca)测定 CEJF8000
多通道常规心电图检 查	FKA03702	心电监护	院内遥测心电监护 KKA28701 或无创心电监测 FKA05705	胸部X线摄影	EABJT001
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000 或活化部分凝血活酶 时间(APTT)测定 CAGB1000 或血浆凝血酶原时间 (PT)测定CAGC1000 或血浆纤维蛋白原测 定CAGD1000	无创指脉血氧饱和度 监测	FKA05710	治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000 或RhD血型鉴定CAMF1000	术中体温监测	HAN05702		
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	无创血压监测	FKA05709	药物	
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000 和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000 和乙肝病毒表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定CGLJ1000 和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000 和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	麻醉		化疗药物	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	局部静脉内麻醉	HAB42201	祛痰药物	
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	手术			
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	经肋床胸腔闭式引流术	HJM45302		
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001	病理			
胸部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBJT001				
治疗		药物			
氧气吸入	ABJA0001	抗菌药物			
药物					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
血气分析	CEJM1000			院内会诊	AADB0001
骨密度测定	EEAX6002	治疗		腹腔积液B超检查	EDBQT002
尿本-周蛋白定性试验	CCAG2000	导尿管留置	ABHA0002	胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001
腹腔积液B超检查	EDBQT002	静脉输血	ABCD0001	治疗	
治疗		加压快速输血	ABCE0001	外固定架使用	PBBA0801
无创呼吸机辅助通气	KJA21401	药物		外固定架调整术	PBBA1001
院内遥测心电监护	KKA28701			静脉输血	ABCD0001
监测				加压快速输血	ABCE0001
				药物	
药物					

非侵袭性胸腺瘤

胸腺切除术

适用对象：	病种编码：	GS008			
	主要诊断：	非侵袭性胸腺瘤	ICD-10码：	D15.0	
	主要操作/主要治疗方式：	胸腺切除术	CCHI码：	HNE75301	
入院标准：		1. 第一诊断必须符合ICD-10:D15.0胸腺良性肿瘤，拟行胸腺肿瘤切除术。 2. 有适应证，无手术禁忌证。 3. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在门诊治疗期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
出院标准：		1. 病人病情稳定，体温正常，手术切口愈合良好；生命体征平稳。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。			
住院日参考值：		≤12天			
变异条件：		1. 有影响手术的合并症，术前需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、呼吸功能衰竭、心脏功能衰竭、肝肾功能衰竭等并发症，需要延长治疗时间。 3. 术中快速冰冻病理检查为侵袭性或其它恶性肿瘤，需扩大切除。			
再入院间隔时间：		无需			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001	特级护理	ACAD0001
检查		/特级护理	ACAD0001	/ I 级护理	ACAC0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查		/ II 级护理	ACAB0001
尿常规化学分析	CCAA2000			检查	
粪便常规检查	CCCA3000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
隐血试验	CCCB8000	导尿管留置	ABHA0002	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000 和总胆红素 (T-Bil) 测定CELA1000 和直接胆红素 (D-Bil) 测定CELBI000 和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000 和总蛋白 (TP) 测定 CEAA8000 和白蛋白 (A1b)测定 CEAE8000 和碱性磷酸酶 (ALP) 测定CECD8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000 和总胆红素 (T-Bil) 测定CELA1000 和直接胆红素 (D-Bil) 测定CELBI000 和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000 和总蛋白 (TP) 测定 CEAA8000 和白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000 和碱性磷酸酶 (ALP) 测定CECD8000	氧气吸入	ABJA0001	肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000 和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000 和尿酸 (UA) 测定 CEEE8000
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000 和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000 和尿酸 (UA) 测定 CEEE8000	静脉输液	ABCA0001	电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000 和氯 (Cl) 测定 CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2) 测定CEJD1000 和镁 (Mg) 测定 CEJE8000 和总钙 (Ca) 测定 CEJF8000
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000 和氯 (Cl) 测定 CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2) 测定CEJD1000 和镁 (Mg) 测定 CEJE8000	氧气雾化吸入	ABKB0001	胸部X线摄影	EABJT001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000 或活化部分凝血活酶 时间(APTT)测定 CAGB1000 或血浆凝血酶原时间 (PT)测定CAGC1000 或血浆纤维蛋白原测 定CAGD1000	监测		治疗	
胸部X线摄影	EABJT001	术中体温监测	HAN05702	换药	换药(小)ABFA0001 或换药(中)ABFA0002 或换药(大)ABFA0003
胸部X线计算机体层 (CT)平扫	EBAJT001	心电监护	院内遥测心电监护 KKA28701 或无创心电监测 FKA05705	化疗药物	
胸部X线计算机体层 (CT)增强扫描	EBBJT001	无创血压监测	FKA05709	手术标本病理诊断	BCAD0001
多通道常规心电图检 查	FKA03702	全身麻醉下呼吸功能 监测	HAN05902		
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定 型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定 型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定 型)CAME1000 或RhD血型鉴定 CAMF1000	无创指脉血氧饱和度 监测	FKA05710	抗菌药物	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定 CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定 CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴 定CAML1000	麻醉深度电生理监测	HAP05902		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000和乙肝病毒表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定 CGLK1000和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定 CGLL1000	麻醉恢复室监护	HAP28901		
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	麻醉			
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	全身麻醉	HAA42901		
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	手术			
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401 或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403 或最大通气量功能检查FJE01404	胸腺切除术	HNE75301		
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一口气法FJE01405或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	病理			
气道阻力测定	FJB02401	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001		
血气分析	CEJM1000	药物			
肝胆胰脾彩色多普勒超声检查	EDCQT001	抗菌药物			
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	镇痛药物			
治疗					
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
普通二维超声心动图	EDFKA005			院内会诊	AADB0001
肺动脉CT三维成像	EBCLA001	治疗		治疗	
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702 或三通道动态心电图检查FKA03704 或十二通道动态心电图检查FKA03705	静脉输血	ABCD0001	静脉输血	ABCD0001
淋巴细胞亚群绝对计数	CGBY1000	加压快速输血	ABCE0001	加压快速输血	ABCE0001
淋巴细胞亚类检测	CGCV8000	药物		药物	
肺癌标志物检查	癌胚抗原(CEA)测定CGRA1000和神经元特异性烯醇化酶(NSE)测定CGRH1000和鳞状细胞癌相关抗原(SCC)测定CGRW1000				
治疗					
监测					
动态血压监测	FKA05708				
药物					

非侵袭性胸腺瘤

经胸腔镜胸腺切除术

适用对象：	病种编码：	GS009			
	主要诊断：	非侵袭性胸腺瘤		ICD-10码：	D15.0
	主要操作/主要治疗方式：	经胸腔镜胸腺切除术		CCHI码：	HNE75501
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10:D15.0胸腺良性肿瘤，拟行胸腺肿瘤切除术。 2. 有适应证，无手术禁忌证。 3. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在门诊治疗期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 病人病情稳定，体温正常，手术切口愈合良好；生命体征平稳。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。			
	住院日参考值：	≤12天			
	变异条件：	1. 有影响手术的合并症，术前需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、呼吸功能衰竭、心脏功能衰竭、肝肾功能衰竭等并发症，需要延长治疗时间。 3. 术中快速冰冻病理检查为侵袭性或其它恶性肿瘤，需扩大切除。			
	再入院间隔时间：	无需			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001	特级护理	ACAD0001
检查		/特级护理	ACAD0001	/ I 级护理	ACAC0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查		/ II 级护理	ACAB0001
尿常规化学分析	CCAA2000			检查	
粪便常规检查	CCCA3000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
隐血试验	CCCB8000	导尿管留置	ABHA0002	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000 和总胆红素 (T-Bil) 测定CELA1000 和直接胆红素 (D-Bil) 测定CELB1000 和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000 和总蛋白 (TP) 测定 CEAA8000 和白蛋白 (A1b)测定 CEAE8000 和碱性磷酸酶 (ALP) 测定CECD8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)测定 CECB1000 和总胆红素 (T-Bil) 测定CELA1000 和直接胆红素 (D-Bil) 测定CELB1000 和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000 和总蛋白 (TP) 测定 CEAA8000 和白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000 和碱性磷酸酶 (ALP) 测定CECD8000	氧气吸入	ABJA0001	肾脏功能检查	尿素 (Urea)测定 CEEA8000 和肌酐 (Cr)测定 CEEB8000 和尿酸 (UA) 测定 CEEE8000
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000 和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000 和尿酸 (UA) 测定 CEEE8000	静脉输液	ABCA0001	电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000 和氯 (Cl) 测定 CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2) 测定CEJD1000 和镁 (Mg) 测定 CEJE8000 和总钙 (Ca) 测定 CEJF8000
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000 和氯 (Cl) 测定 CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2) 测定CEJD1000 和镁 (Mg) 测定 CEJE8000 和总钙 (Ca) 测定 CEJF8000	氧气雾化吸入	ABKB0001	胸部X线摄影	EABJT001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000 或活化部分凝血活酶 时间(APTT)测定 CAGB1000 或血浆凝血酶原时间 (PT)测定CAGC1000 或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000	监测		治疗	
胸部X线摄影	EABJT001	术中体温监测	HAN05702	换药	换药(小)ABFA0001 或换药(中)ABFA0002 或换药(大)ABFA0003
胸部X线计算机体层 (CT)平扫	EBAJT001	心电监护	院内遥测心电监护 KKA28701 或无创心电监测 FKA05705	化疗药物	
胸部X线计算机体层 (CT)增强扫描	EBBJT001	无创血压监测	FKA05709	手术标本病理诊断	BCAD0001
多通道常规心电图检查	FKA03702	全身麻醉下呼吸功能 监测	HAN05902		
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定 型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定 型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定 型)CAME1000 或RhD血型鉴定 CAMF1000	无创指脉血氧饱和度 监测	FKA05710	抗菌药物	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定 CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定 CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴 定CAML1000	麻醉深度电生理监测	HAP05902		
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000和乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000和乙肝病毒 表面抗原确认试验 (HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000和乙型肝炎 表面抗体定性(抗 HBs)测定CGLK1000和 乙型肝炎表面抗体定 量(抗HBs)测定 CGLL1000	麻醉恢复室监护	HAP28901		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	麻醉			
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	全身麻醉	HAA42901		
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	手术			
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401 或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403 或最大通气量功能检查FJE01404	经胸腔镜胸腺切除术	HNE75501		
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一口气法FJE01405或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	病理			
气道阻力测定	FJB02401	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001		
血气分析	CEJM1000	药物			
肝胆胰脾彩色多普勒超声检查	EDCQT001	抗菌药物			
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	镇痛药物			
治疗					
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
普通二维超声心动图	EDFKA005			院内会诊	AADB0001
肺动脉CT三维成像	EBCLA001	治疗		治疗	
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702 或三通道动态心电图检查FKA03704 或十二通道动态心电图检查FKA03705	静脉输血	ABCD0001	静脉输血	ABCD0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
淋巴细胞亚群绝对计数	CGBY1000	加压快速输血	ABCE0001	加压快速输血	ABCE0001
淋巴细胞亚类检测	CGCV8000	药物		药物	
肺癌标志物检查	癌胚抗原(CEA)测定 CGRA1000和神经元特异性烯醇化酶(NSE) 测定CGRH1000和鳞状细胞癌相关抗原(SCC)测定CGRW1000				
治疗					
监测					
动态血压监测	FKA05708				
药物					

肺良性肿瘤

肺楔形切除术

适用对象：	病种编码：	GS010
主要诊断：	肺良性肿瘤	ICD-10码：D14.3
主要操作/主要治疗方式：	肺楔形切除术	CCHI码：HJE73304
入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10:D14.3肺良性肿瘤疾病编码。拟行肿瘤摘除术、肺局部切除术或肺叶切除术。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在门诊治疗期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。	
出院标准：	1. 病人病情稳定，体温正常，手术切口愈合良好；生命体征平稳。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。	
住院日参考值：	≤17天	
变异条件：	1. 有影响手术的合并症，需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、呼吸功能衰竭、心脏功能衰竭、支气管胸膜瘘等并发症，需要延长治疗时间。 3. 术中快速冰冻病理诊断为恶性肿瘤，应转为肺癌相关手术操作。	
再入院间隔时间：	无需	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001	特级护理	ACAD0001
/II 级护理	ACAB0001	/特级护理	ACAD0001	/I 级护理	ACAC0001
检查		检查		/II 级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
粪便常规检查	CCCA3000	导尿管留置	ABHA0002	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000 和总胆红素 (T-Bil) 测定CELA1000 和直接胆红素 (D-Bil) 测定CELB1000 和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000 和总蛋白 (TP) 测定 CEAA8000 和白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000 和碱性磷酸酶 (ALP) 测定CECD8000
隐血试验	CCCB8000	氧气吸入	ABJA0001	肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000 和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000 和尿酸 (UA) 测定 CEEE8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000 和总胆红素 (T-Bil) 测定CELA1000 和直接胆红素 (D-Bil) 测定CELB1000 和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000 和总蛋白 (TP) 测定 CEAA8000 和白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000 和碱性磷酸酶 (ALP) 测定CECD8000	静脉输液	ABCA0001	电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000 和氯 (Cl) 测定 CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2) 测定CEJD1000 和镁 (Mg) 测定 CEJE8000 和总钙 (Ca) 测定 CEJF8000
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000 和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000 和尿酸 (UA) 测定 CEEE8000	氧气雾化吸入	ABKB0001	胸部X线摄影	EABJT001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000 和氯(Cl)测定 CEJC8000 和总二氧化碳(TCO2) 测定CEJD1000 和镁(Mg)测定 CEJE8000 和总钙(Ca)测定 CEJF8000	监测		葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000 或活化部分凝血活酶 时间(APTT)测定 CAGB1000 或血浆凝血酶原时间 (PT)测定CAGC1000 或血浆纤维蛋白原测 定CAGD1000	术中体温监测	HAN05702	化疗药物	
胸部X线摄影	EABJT001	心电监护	院内遥测心电监护 KKA28701 或无创心电监测 FKA05705	换药	换药(小)ABFA0001 或换药(中)ABFA0002 或换药(大)ABFA0003
胸部X线计算机体层 (CT)平扫	EBAJT001	无创血压监测	FKA05709		ABKB0001
胸部X线计算机体层 (CT)增强扫描	EBBJT001	全身麻醉下呼吸功能 监测	HAN05902	静脉输液	ABCA0001
多通道常规心电图检 查	FKA03702	无创指脉血氧饱和度 监测	FKA05710	监测	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定 型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定 型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定 型)CAME1000 或RhD血型鉴定 CAMF1000	麻醉深度电生理监测	HAP05902	有创连续动脉血压监 测	HAN05201
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定 CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定 CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴 定CAML1000	麻醉恢复室监护	HAP28901	无创血压监测	FKA05709

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000 和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000 和乙肝病毒表面抗原确认试验 (HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000 和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定 CGLK1000 和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定 CGLL1000	麻醉		无创心电监测	FKA05705
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	全身麻醉	HAA42901	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	手术		病理	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	肺楔形切除术	HJE73304	手术标本病理诊断	BCAD0001
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401 或用力肺活量功能检查 FJE01402 或肺每分通气量功能检查 FJE01403 或最大通气量功能检查 FJE01404	病理		药物	
弥散功能检查	肺弥散功能检查—一口气法 FJE01405 或肺弥散功能检查—重复呼吸法 FJE01406	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001	抗菌药物	
气道阻力测定	FJB02401	药物			
血气分析	CEJM1000	抗菌药物			
肺癌标志物检查	癌胚抗原(CEA)测定 CGRA1000 和神经元特异性烯醇化酶(NSE)测定 CGRH1000 和鳞状细胞癌相关抗原(SCC)测定 CGRW1000	镇痛药物			
肝胆胰脾彩色多普勒超声检查	EDCQT001				
纤维支气管镜检查	FJD01601				
经支气管内镜活检术	FJD07602				
痰液常规检查	CCEK5000				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000				
全身骨显像	EEAX6004				
头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001				
治疗					
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
普通二维超声心动图	EDFKA005				
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702 或三通道动态心电图检查FKA03704 或十二通道动态心电图检查FKA03705	治疗		治疗	
经皮穿刺肺活检术	FJE07101	静脉输血	ABCD0001	静脉输血	ABCD0001
经胸腔镜胸腔病变活检术	FJT07501	加压快速输血	ABCE0001	加压快速输血	ABCE0001
静息心肌灌注显像	EEAKC001	药物		药物	
急性心肌梗死灶静态显像	EEAKC002				
运动试验法负荷心肌灌注显像	EEAKC003				
药物法负荷心肌灌注显像	EEAKC004				
治疗					
药物					

肺良性肿瘤

经胸腔镜肺楔形切除术

适用对象：	病种编码：	GS011	
	主要诊断：	肺良性肿瘤	ICD-10码：D14.3
	主要操作/主要治疗方式：	经胸腔镜肺楔形切除术	CCHI码：HJE73501
	入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10:D14.3肺良性肿瘤疾病编码。拟行肿瘤摘除术、肺局部切除术或肺叶切除术。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在门诊治疗期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。	
	出院标准：	1. 病人病情稳定，体温正常，手术切口愈合良好；生命体征平稳。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合症。	
	住院日参考值：	≤17天	
	变异条件：	1. 有影响手术的合并症，需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、呼吸功能衰竭、心脏功能衰竭、支气管胸膜瘘等并发症，需要延长治疗时间。 3. 术中快速冰冻病理诊断为恶性肿瘤，应转为肺癌相关手术操作。	
	再入院间隔时间：	无需	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
I 级护理	ACAC0001	特级护理	ACAD0001	特级护理	ACAD0001
/ II 级护理	ACAB0001	/ I 级护理	ACAC0001	/ I 级护理	ACAC0001
检查		检查		/ II 级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
粪便常规检查	CCCA3000	导尿管留置	ABHA0002	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定CECB1000 和总胆红素 (T-Bil) 测定CELA1000 和直接胆红素 (D-Bil)测定CELB1000 和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定CECC8000 和总蛋白 (TP)测定CEAA8000 和白蛋白 (A1b)测定CEAE8000 和碱性磷酸酶 (ALP) 测定CECD8000
隐血试验	CCCB8000	氧气吸入	ABJA0001	肾脏功能检查	尿素 (Urea)测定CEEA8000 和肌酐 (Cr)测定CEEB8000 和尿酸 (UA)测定CEEE8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)测定CECB1000 和总胆红素 (T-Bil) 测定CELA1000 和直接胆红素 (D-Bil)测定CELB1000 和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT)测定CECC8000 和总蛋白 (TP)测定CEAA8000 和白蛋白 (A1b)测定CEAE8000 和碱性磷酸酶 (ALP)测定CECD8000	静脉输液	ABCA0001	电解质测定	钾 (K)测定CEJA8000 和钠 (Na)测定CEJB8000 和氯 (Cl)测定CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2)测定CEJD1000 和镁 (Mg)测定CEJE8000 和总钙 (Ca)测定CEJF8000
肾脏功能检查	尿素 (Urea)测定CEEA8000 和肌酐 (Cr)测定CEEB8000 和尿酸 (UA)测定CEEE8000	氧气雾化吸入	ABKB0001	胸部X线摄影	EABJT001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000 和氯(Cl)测定 CEJC8000 和总二氧化碳(TCO2) 测定CEJD1000 和镁(Mg)测定 CEJE8000 和总钙(Ca)测定 CEJF8000	监测		葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000 或活化部分凝血活酶 时间(APTT)测定 CAGB1000 或血浆凝血酶原时间 (PT)测定CAGC1000 或血浆纤维蛋白原测 定CAGD1000	术中体温监测	HAN05702	治疗	
胸部X线摄影	EABJT001	心电监护	院内遥测心电监护 KKA28701 或无创心电监测 FKA05705	化疗药物	换药(小)ABFA0001 或换药(中)ABFA0002 或换药(大)ABFA0003
胸部X线计算机体层 (CT)平扫	EBAJT001	无创血压监测	FKA05709	氧气雾化吸入	ABKB0001
胸部X线计算机体层 (CT)增强扫描	EBBJT001	全身麻醉下呼吸功能 监测	HAN05902		ABCA0001
多通道常规心电图检 查	FKA03702	无创指脉血氧饱和度 监测	FKA05710	监测	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定 型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定 型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定 型)CAME1000 或RhD血型鉴定 CAMF1000	麻醉深度电生理监测	HAP05902	有创连续动脉血压监 测	HAN05201
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定 CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定 CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴 定CAML1000	麻醉恢复室监护	HAP28901	无创血压监测	FKA05709

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000 和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000 和乙肝病毒表面抗原确认试验 (HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000 和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定 CGLK1000 和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定 CGLL1000	麻醉		无创心电监测	FKA05705
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	全身麻醉	HAA42901	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	手术		病理	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	经胸腔镜肺楔形切除术	HJE73501	手术标本病理诊断	BCAD0001
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401 或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403 或最大通气量功能检查FJE01404	病理		药物	
弥散功能检查	肺弥散功能检查—一口气法FJE01405 或肺弥散功能检查—重复呼吸法FJE01406	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001	抗菌药物	
气道阻力测定	FJB02401	药物			
血气分析	CEJM1000	抗菌药物			
肺癌标志物检查	癌胚抗原(CEA)测定 CGRA1000 和神经元特异性烯醇化酶(NSE)测定 CGRH1000 和鳞状细胞癌相关抗原(SCC)测定 CGRW1000	镇痛药物			
肝胆胰脾彩色多普勒超声检查	EDCQT001				
纤维支气管镜检查	FJD01601				
经支气管内镜活检术	FJD07602				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
痰液常规检查	CCEK5000				
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000				
全身骨显像	EEAX6004				
头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001				
治疗					
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
普通二维超声心动图	EDFKA005				
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702 或三通道动态心电图检查FKA03704 或十二通道动态心电图检查FKA03705	治疗		治疗	
经皮穿刺肺活检术	FJE07101	静脉输血	ABCD0001	静脉输血	ABCD0001
经胸腔镜胸腔病变活检术	FJT07501	加压快速输血	ABCE0001	加压快速输血	ABCE0001
静息心肌灌注显像	EEAKC001	药物		药物	
急性心肌梗死灶静态显像	EEAKC002				
运动试验法负荷心肌灌注显像	EEAKC003				
药物法负荷心肌灌注显像	EEAKC004				
治疗					
药物					

肺良性肿瘤

肺叶切除术

适用对象：	病种编码：	GS012
主要诊断：	肺良性肿瘤	ICD-10码：D14.3
主要操作/主要治疗方式：	肺叶切除术	CCHI码：HJF73301
入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10:D14.3肺良性肿瘤疾病编码。拟行肿瘤摘除术、肺局部切除术或肺叶切除术。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在门诊治疗期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。	
出院标准：	1. 病人病情稳定，体温正常，手术切口愈合良好；生命体征平稳。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。	
住院日参考值：	≤17天	
变异条件：	1. 有影响手术的合并症，需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、呼吸功能衰竭、心脏功能衰竭、支气管胸膜瘘等并发症，需要延长治疗时间。 3. 术中快速冰冻病理诊断为恶性肿瘤，应转为肺癌相关手术操作。	
再入院间隔时间：	无需	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
I 级护理	ACAC0001	特级护理	ACAD0001	特级护理	ACAD0001
/ II 级护理	ACAB0001	/ I 级护理	ACAC0001	/ I 级护理	ACAC0001
检查		检查		/ II 级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
粪便常规检查	CCCA3000	导尿管留置	ABHA0002	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000 和总胆红素 (T-Bil) 测定CELA1000 和直接胆红素 (D-Bil)测定CELB1000 和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000 和总蛋白 (TP) 测定 CEAA8000 和白蛋白 (A1b)测定 CEAE8000 和碱性磷酸酶 (ALP) 测定CECD8000
隐血试验	CCCB8000	氧气吸入	ABJA0001	肾脏功能检查	尿素 (Urea)测定 CEEA8000 和肌酐 (Cr)测定 CEEB8000 和尿酸 (UA)测定 CEEE8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)测定 CECB1000 和总胆红素 (T-Bil) 测定CELA1000 和直接胆红素 (D-Bil)测定CELB1000 和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000 和总蛋白 (TP)测定 CEAA8000 和白蛋白 (A1b)测定 CEAE8000 和碱性磷酸酶 (ALP) 测定CECD8000	静脉输液	ABCA0001	电解质测定	钾 (K)测定CEJA8000 和钠 (Na)测定 CEJB8000 和氯 (Cl)测定 CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2) 测定CEJD1000 和镁 (Mg)测定 CEJE8000 和总钙 (Ca)测定 CEJF8000
肾脏功能检查	尿素 (Urea)测定 CEEA8000 和肌酐 (Cr)测定 CEEB8000 和尿酸 (UA)测定 CEEE8000	氧气雾化吸入	ABKB0001	胸部X线摄影	EABJT001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000 和氯(Cl)测定 CEJC8000 和总二氧化碳(TC02) 测定CEJD1000 和镁(Mg)测定 CEJE8000 和总钙(Ca)测定 CEJF8000	监测		治疗	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000 或活化部分凝血活酶 时间(APTT)测定 CAGB1000 或血浆凝血酶原时间 (PT)测定CAGC1000 或血浆纤维蛋白原测 定CAGD1000	术中体温监测	HAN05702	化疗药物	换药(小)ABFA0001 或换药(中)ABFA0002 或换药(大)ABFA0003
胸部X线摄影	EABJT001	心电监护	院内遥测心电监护 KKA28701 或无创心电监测 FKA05705	氧气雾化吸入	ABKB0001
胸部X线计算机体层 (CT)平扫	EBAJT001	无创血压监测	FKA05709		ABCA0001
胸部X线计算机体层 (CT)增强扫描	EBBJT001	全身麻醉下呼吸功能 监测	HAN05902	监测	
多通道常规心电图检 查	FKA03702	无创指脉血氧饱和度 监测	FKA05710	有创连续动脉血压监 测	HAN05201
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定 型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定 型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定 型)CAME1000 或RhD血型鉴定 CAMF1000	麻醉深度电生理监测	HAP05902	无创血压监测	FKA05709
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定 CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定 CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴 定CAML1000	麻醉恢复室监护	HAP28901	无创心电监测	FKA05705

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000 和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000 和乙肝病毒表面抗原确认试验 (HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000 和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定 CGLK1000 和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定 CGLL1000	麻醉		无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	全身麻醉	HAA42901	病理	
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	手术		手术标本病理诊断	BCAD0001
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	肺叶切除术	HJF73301	药物	
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401 或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403 或最大通气量功能检查FJE01404	病理		抗菌药物	
弥散功能检查	肺弥散功能检查—一口气法FJE01405 或肺弥散功能检查—重复呼吸法FJE01406	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001		
气道阻力测定	FJB02401	药物			
血气分析	CEJM1000	抗菌药物			
肺癌标志物检查	癌胚抗原(CEA)测定 CGRA1000 和神经元特异性烯醇化酶(NSE)测定 CGRH1000 和鳞状细胞癌相关抗原(SCC)测定 CGRW1000	镇痛药物			
肝胆胰脾彩色多普勒超声检查	EDCQT001				
纤维支气管镜检查	FJD01601				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
经支气管内镜活检术	FJD07602				
痰液常规检查	CCEK5000				
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000				
全身骨显像	EEAX6004				
头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001				
治疗					
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
普通二维超声心动图	EDFKA005				
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702 或三通道动态心电图检查FKA03704 或十二通道动态心电图检查FKA03705	治疗		治疗	
经皮穿刺肺活检术	FJE07101	静脉输血	ABCD0001	静脉输血	ABCD0001
经胸腔镜胸腔病变活检术	FJT07501	加压快速输血	ABCE0001	加压快速输血	ABCE0001
静息心肌灌注显像	EEAKC001	药物		药物	
急性心肌梗死灶静态显像	EEAKC002				
运动试验法负荷心肌灌注显像	EEAKC003				
药物法负荷心肌灌注显像	EEAKC004				
治疗					
药物					

肺良性肿瘤

经胸腔镜肺叶切除术

适用对象：	病种编码：	GS013			
	主要诊断：	肺良性肿瘤		ICD-10码：	D14.3
	主要操作/主要治疗方式：	经胸腔镜肺叶切除术		CCHI码：	HJF73501
	入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10:D14.3肺良性肿瘤疾病编码。拟行肿瘤摘除术、肺局部切除术或肺叶切除术。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在门诊治疗期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 病人病情稳定，体温正常，手术切口愈合良好；生命体征平稳。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。			
	住院日参考值：	≤17天			
	变异条件：	1. 有影响手术的合并症，需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、呼吸功能衰竭、心脏功能衰竭、支气管胸膜瘘等并发症，需要延长治疗时间。 3. 术中快速冰冻病理诊断为恶性肿瘤，应转为肺癌相关手术操作。			
	再入院间隔时间：	无需			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
I 级护理	ACAC0001	特级护理	ACAD0001	特级护理	ACAD0001
/ II 级护理	ACAB0001	/ I 级护理	ACAC0001	/ I 级护理	ACAC0001
检查		检查		/ II 级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
粪便常规检查	CCCA3000	导尿管留置	ABHA0002	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000 和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000 和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000 和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000 和总蛋白(TP)测定CEAA8000 和白蛋白(A1b)测定CEAE8000 和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
隐血试验	CCCB8000	氧气吸入	ABJA0001	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000 和肌酐(Cr)测定CEEB8000 和尿酸(UA)测定CEEE8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000 和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000 和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000 和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000 和总蛋白(TP)测定CEAA8000 和白蛋白(A1b)测定CEAE8000 和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	静脉输液	ABCA0001	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定CEJB8000 和氯(Cl)测定CEJC8000 和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000 和镁(Mg)测定CEJE8000 和总钙(Ca)测定CEJF8000
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000 和肌酐(Cr)测定CEEB8000 和尿酸(UA)测定CEEE8000	氧气雾化吸入	ABKB0001	胸部X线摄影	EABJT001
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定CEJB8000 和氯(Cl)测定CEJC8000 和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000 和镁(Mg)测定CEJE8000 和总钙(Ca)测定CEJF8000	监测		葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000 或活化部分凝血活酶 时间(APTT)测定 CAGB1000 或血浆凝血酶原时间 (PT)测定CAGC1000 或血浆纤维蛋白原测 定CAGD1000	术中体温监测	HAN05702	化疗药物	
胸部X线摄影	EABJT001	心电监护	院内遥测心电监护 KKA28701 或无创心电监测 FKA05705	换药	换药(小)ABFA0001 或换药(中)ABFA0002 或换药(大)ABFA0003
胸部X线计算机体层 (CT)平扫	EBAJT001	无创血压监测	FKA05709		ABKB0001
胸部X线计算机体层 (CT)增强扫描	EBBJT001	全身麻醉下呼吸功能 监测	HAN05902	静脉输液	ABCA0001
多通道常规心电图检 查	FKA03702	无创指脉血氧饱和度 监测	FKA05710	监测	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定 型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定 型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定 型)CAME1000 或RhD血型鉴定 CAMF1000	麻醉深度电生理监测	HAP05902	有创连续动脉血压监 测	HAN05201
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定 CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定 CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴 定CAML1000	麻醉恢复室监护	HAP28901	无创血压监测	FKA05709

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000 和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000 和乙肝病毒表面抗原确认试验 (HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000 和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定 CGLK1000 和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定 CGLL1000	麻醉		无创心电监测	FKA05705
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	全身麻醉	HAA42901	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	手术		病理	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	经胸腔镜肺叶切除术	HJF73501	手术标本病理诊断	BCAD0001
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401 或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403 或最大通气量功能检查FJE01404	病理		药物	
弥散功能检查	肺弥散功能检查—一口气法FJE01405 或肺弥散功能检查—重复呼吸法FJE01406	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001	抗菌药物	
气道阻力测定	FJB02401	药物			
血气分析	CEJM1000	抗菌药物			
肺癌标志物检查	癌胚抗原(CEA)测定 CGRA1000 和神经元特异性烯醇化酶(NSE)测定 CGRH1000 和鳞状细胞癌相关抗原(SCC)测定 CGRW1000	镇痛药物			
肝胆胰脾彩色多普勒超声检查	EDCQT001				
纤维支气管镜检查	FJD01601				
经支气管内镜活检术	FJD07602				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
痰液常规检查	CCEK5000				
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000				
全身骨显像	EEAX6004				
头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001				
治疗					
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
普通二维超声心动图	EDFKA005				
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702 或三通道动态心电图检查FKA03704 或十二通道动态心电图检查FKA03705	治疗		治疗	
经皮穿刺肺活检术	FJE07101	静脉输血	ABCD0001	静脉输血	ABCD0001
经胸腔镜胸腔病变活检术	FJT07501	加压快速输血	ABCE0001	加压快速输血	ABCE0001
静息心肌灌注显像	EEAKC001	药物		药物	
急性心肌梗死灶静态显像	EEAKC002				
运动试验法负荷心肌灌注显像	EEAKC003				
药物法负荷心肌灌注显像	EEAKC004				
治疗					
药物					

肺良性肿瘤

肺段切除术

适用对象：	病种编码：	GS014	
	主要诊断：	肺良性肿瘤	ICD-10码：D14.3
	主要操作/主要治疗方式：	肺段切除术	CCHI码：HJG73301
	入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10:D14.3肺良性肿瘤疾病编码。拟行肿瘤摘除术、肺局部切除术或肺叶切除术。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在门诊治疗期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。	
	出院标准：	1. 病人病情稳定，体温正常，手术切口愈合良好；生命体征平稳。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。	
	住院日参考值：	≤17天	
	变异条件：	1. 有影响手术的合并症，需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、呼吸功能衰竭、心脏功能衰竭、支气管胸膜瘘等并发症，需要延长治疗3. 术中快速冰冻病理诊断为恶性肿瘤，应转为肺癌相关手术操作。	
	再入院间隔时间：	无需	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
I 级护理	ACAC0001	特级护理	ACAD0001	特级护理	ACAD0001
/ II 级护理	ACAB0001	/ I 级护理	ACAC0001	/ I 级护理	ACAC0001
检查		检查		/ II 级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
粪便常规检查	CCCA3000	导尿管留置	ABHA0002	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)测定 CECB1000 和总胆红素 (T-Bil)测定CELA1000 和直接胆红素 (D-Bil)测定CELB1000 和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT)测定 CECC8000 和总蛋白 (TP)测定 CEAA8000 和白蛋白 (A1b)测定 CEAE8000 和碱性磷酸酶 (ALP)测定 CECD8000
隐血试验	CCCB8000	氧气吸入	ABJA0001	肾脏功能检查	尿素 (Urea)测定 CEEA8000 和肌酐 (Cr)测定 CEEB8000 和尿酸 (UA)测定 CEEE8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)测定 CECB1000 和总胆红素 (T-Bil)测定CELA1000 和直接胆红素 (D-Bil)测定CELB1000 和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT)测定 CECC8000 和总蛋白 (TP)测定 CEAA8000 和白蛋白 (A1b)测定 CEAE8000 和碱性磷酸酶 (ALP)测定 CECD8000	静脉输液	ABCA0001	电解质测定	钾 (K)测定CEJA8000 和钠 (Na)测定 CEJB8000 和氯 (Cl)测定 CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2)测定CEJD1000 和镁 (Mg)测定 CEJE8000 和总钙 (Ca)测定 CEJF8000
肾脏功能检查	尿素 (Urea)测定 CEEA8000 和肌酐 (Cr)测定 CEEB8000 和尿酸 (UA)测定 CEEE8000	氧气雾化吸入	ABKB0001	胸部X线摄影	EABJT001
电解质测定	钾 (K)测定CEJA8000 和钠 (Na)测定 CEJB8000 和氯 (Cl)测定 CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2)测定CEJD1000 和镁 (Mg)测定 CEJE8000 和总钙 (Ca)测定 CEJF8000	监测		葡萄糖 (Glu)测定	CEFA8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000 或活化部分凝血活酶 时间(APTT)测定 CAGB1000 或血浆凝血酶原时间 (PT)测定CAGC1000 或血浆纤维蛋白原测 定CAGD1000	术中体温监测	HAN05702	治疗	
胸部X线摄影	EABJT001	心电监护	院内遥测心电监护 KKA28701 或无创心电监测 FKA05705	化疗药物	换药(小)ABFA0001 或换药(中)ABFA0002 或换药(大)ABFA0003
胸部X线计算机体层 (CT)平扫	EBAJT001	无创血压监测	FKA05709	氧气雾化吸入	ABKB0001
胸部X线计算机体层 (CT)增强扫描	EBBJT001	全身麻醉下呼吸功能 监测	HAN05902		ABCA0001
多通道常规心电图检 查	FKA03702	无创指脉血氧饱和度 监测	FKA05710	监测	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定 型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定 型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定 型)CAME1000 或RhD血型鉴定 CAMF1000	麻醉深度电生理监测	HAP05902	有创连续动脉血压监 测	HAN05201
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定 CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定 CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴 定CAML1000	麻醉恢复室监护	HAP28901	无创血压监测	FKA05709

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000 和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000 和乙肝病毒表面抗原确认试验 (HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000 和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定 CGLK1000 和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定 CGLL1000	麻醉		无创心电图监测	FKA05705
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	全身麻醉	HAA42901	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	手术		病理	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	肺段切除术	HJG73301	手术标本病理诊断	BCAD0001
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401 或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403 或最大通气量功能检查FJE01404	病理		药物	
弥散功能检查	肺弥散功能检查—一口气法FJE01405 或肺弥散功能检查—重复呼吸法FJE01406	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001	抗菌药物	
气道阻力测定	FJB02401	药物			
血气分析	CEJM1000	抗菌药物			
肺癌标志物检查	癌胚抗原(CEA)测定 CGRA1000 和神经元特异性烯醇化酶(NSE)测定 CGRH1000 和鳞状细胞癌相关抗原(SCC)测定 CGRW1000	镇痛药物			
肝胆胰脾彩色多普勒超声检查	EDCQT001				
纤维支气管镜检查	FJD01601				
经支气管内镜活检术	FJD07602				
痰液常规检查	CCEK5000				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000				
全身骨显像	EEAX6004				
头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001				
治疗					
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
普通二维超声心动图	EDFKA005				
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702 或三通道动态心电图检查FKA03704 或十二通道动态心电图检查FKA03705	治疗		治疗	
经皮穿刺肺活检术	FJE07101	静脉输血	ABCD0001	静脉输血	ABCD0001
经胸腔镜胸腔病变活检术	FJT07501	加压快速输血	ABCE0001	加压快速输血	ABCE0001
静息心肌灌注显像	EEAKC001	药物		药物	
急性心肌梗死灶静态显像	EEAKC002				
运动试验法负荷心肌灌注显像	EEAKC003				
药物法负荷心肌灌注显像	EEAKC004				
治疗					
药物					

肺良性肿瘤

经胸腔镜肺段切除术

适用对象：	病种编码：	GS015			
	主要诊断：	肺良性肿瘤	ICD-10码：	D14.3	
	主要操作/主要治疗方式：	经胸腔镜肺段切除术	CCHI码：	HJG73501	
	入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10:D14.3肺良性肿瘤疾病编码。拟行肿瘤摘除术、肺局部切除术或肺叶切除术。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在门诊治疗期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 病人病情稳定，体温正常，手术切口愈合良好；生命体征平稳。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。			
	住院日参考值：	≤17天			
	变异条件：	1. 有影响手术的合并症，需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、呼吸功能衰竭、心脏功能衰竭、支气管胸膜瘘等并发症，需要延长治疗时间。 3. 术中快速冰冻病理诊断为恶性肿瘤，应转为肺癌相关手术操作。			
	再入院间隔时间：	无需			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
I 级护理	ACAC0001	特级护理	ACAD0001	特级护理	ACAD0001
/ II 级护理	ACAB0001	/ I 级护理	ACAC0001	/ I 级护理	ACAC0001
检查		检查		/ II 级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
粪便常规检查	CCCA3000	导尿管留置	ABHA0002	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000 和总胆红素 (T-Bil) 测定CELA1000 和直接胆红素 (D-Bil) 测定CELB1000 和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000 和总蛋白 (TP) 测定 CEAA8000 和白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000 和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000
隐血试验	CCCB8000	氧气吸入	ABJA0001	肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000 和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000 和尿酸 (UA) 测定 CEEE8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000 和总胆红素 (T-Bil) 测定CELA1000 和直接胆红素 (D-Bil) 测定CELB1000 和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000 和总蛋白 (TP) 测定 CEAA8000 和白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000 和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000	静脉输液	ABCA0001	电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000 和氯 (Cl) 测定 CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2) 测定CEJD1000 和镁 (Mg) 测定 CEJE8000 和总钙 (Ca) 测定 CEJF8000
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000 和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000 和尿酸 (UA) 测定 CEEE8000	氧气雾化吸入	ABKB0001	胸部X线摄影	EABJT001
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000 和氯 (Cl) 测定 CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2) 测定CEJD1000 和镁 (Mg) 测定 CEJE8000 和总钙 (Ca) 测定 CEJF8000	监测		治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000 或活化部分凝血活酶 时间(APTT)测定 CAGB1000 或血浆凝血酶原时间 (PT)测定CAGC1000 或血浆纤维蛋白原测 定CAGD1000	术中体温监测	HAN05702	换药	换药(小)ABFA0001 或换药(中)ABFA0002 或换药(大)ABFA0003
胸部X线摄影	EABJT001	心电监护	院内遥测心电监护 KKA28701 或无创心电监测 FKA05705	化疗药物	ABKB0001
胸部X线计算机体层 (CT)平扫	EBAJT001	无创血压监测	FKA05709	静脉输液	ABCA0001
胸部X线计算机体层 (CT)增强扫描	EBBJT001	全身麻醉下呼吸功能 监测	HAN05902		
多通道常规心电图检 查	FKA03702	无创指脉血氧饱和度 监测	FKA05710	有创连续动脉血压监 测	HAN05201
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定 型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定 型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定 型)CAME1000 或RhD血型鉴定 CAMF1000	麻醉深度电生理监测	HAP05902	无创血压监测	FKA05709
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定 CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定 CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴 定CAML1000	麻醉恢复室监护	HAP28901	无创心电监测	FKA05705

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000 和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000 和乙肝病毒表面抗原确认试验 (HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000 和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定 CGLK1000 和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定 CGLL1000	麻醉		无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	全身麻醉	HAA42901	病理	
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	手术		手术标本病理诊断	BCAD0001
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	经胸腔镜肺段切除术	HJG73501	药物	
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401 或用力肺活量功能检查 FJE01402 或肺每分通气量功能检查 FJE01403 或最大通气量功能检查 FJE01404	病理		抗菌药物	
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一口气法 FJE01405 或肺弥散功能检查-重复呼吸法 FJE01406	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001		
气道阻力测定	FJB02401	药物			
血气分析	CEJM1000	抗菌药物			
肺癌标志物检查	癌胚抗原(CEA)测定 CGRA1000 和神经元特异性烯醇化酶(NSE)测定 CGRH1000 和鳞状细胞癌相关抗原(SCC)测定 CGRW1000	镇痛药物			
肝胆胰脾彩色多普勒超声检查	EDCQT001				
纤维支气管镜检查	FJD01601				
经支气管内镜活检术	FJD07602				
痰液常规检查	CCEK5000				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000				
全身骨显像	EEAX6004				
头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001				
治疗					
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
普通二维超声心动图	EDFKA005				
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702 或三通道动态心电图检查FKA03704 或十二通道动态心电图检查FKA03705	治疗		治疗	
经皮穿刺肺活检术	FJE07101	静脉输血	ABCD0001	静脉输血	ABCD0001
经胸腔镜胸腔病变活检术	FJT07501	加压快速输血	ABCE0001	加压快速输血	ABCE0001
静息心肌灌注显像	EEAKC001	药物		药物	
急性心肌梗死灶静态显像	EEAKC002				
运动试验法负荷心肌灌注显像	EEAKC003				
药物法负荷心肌灌注显像	EEAKC004				
治疗					
药物					

支气管扩张

肺叶切除术

适用对象：	病种编码：	GS016	
	主要诊断：	支气管扩张	ICD-10码：J47
	主要操作/主要治疗方式：	肺叶切除术	CCHI码：HJF73301
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：J47支气管扩张症疾病编码，拟行肺段切除术/肺叶切除术/复合肺叶切除术/全肺切除术的。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在门诊治疗期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 病人病情稳定，体温正常，手术切口愈合良好，生命体征平稳。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。		
住院日参考值：	≤18天		
变异条件：	1. 存在影响手术的合并症，需进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、呼吸功能衰竭、心脏功能衰竭、肝肾功能衰竭、支气管胸膜瘘等并发症，需要延长治疗时间。		
再入院间隔时间：	无需		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	特级护理	ACAD0001	特级护理	ACAD0001
检查		/ I级护理	ACAC0001	/ I级护理	ACAC0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查		/ II级护理	ACAB0001
尿常规化学分析	CCAA2000	开胸探查术	FJT09301	检查	
粪便常规检查	CCCA3000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
隐血试验	CCCB8000	导尿管留置	ABHA0002	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和白蛋白 (A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000	氧气吸入	ABJA0001	肾脏功能检查	尿素 (Urea)测定 CEEA8000 和肌酐 (Cr)测定 CEEB8000 和尿酸 (UA)测定 CEEE8000
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000 和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000 和尿酸 (UA) 测定 CEEE8000	静脉输液	ABCA0001	电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000 和氯 (Cl) 测定 CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2) 测定CEJD1000 和镁 (Mg) 测定 CEJE8000 和总钙 (Ca) 测定 CEJF8000
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na)测定 CEJB8000 和氯 (Cl) 测定 CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2) 测定CEJD1000 和镁 (Mg) 测定 CEJE8000 和总钙 (Ca) 测定 CEJF8000	氧气雾化吸入	ABKB0001	胸部X线摄影	EABJT001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	监测		葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定 型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定 型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定 型)CAME1000 或RhD血型鉴定 CAMF1000	术中体温监测	HAN05702	治疗	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定 CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定 CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴 定CAML1000	心电监护	院内遥测心电监护 KKA28701 或无创心电监测 FKA05705	化疗药物	换药(小)ABFA0001 或换药(中)ABFA0002 或换药(大)ABFA0003
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000和乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000和乙肝病毒 表面抗原确认试验 (HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000和乙型肝炎 表面抗体定性(抗 HBs)测定CGLK1000和 乙型肝炎表面抗体定 量(抗HBs)测定 CGLL1000	无创血压监测	FKA05709	氧气雾化吸入	ABKB0001
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	全身麻醉下呼吸功能 监测	HAN05902		ABCA0001
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	无创指脉血氧饱和度 监测	FKA05710	监测	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	麻醉深度电生理监测	HAP05902	有创连续动脉血压监测	HAN05201
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401 或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403 或最大通气量功能检查FJE01404	麻醉恢复室监护	HAP28901	无创血压监测	FKA05709
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一口气法FJE01405 或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	麻醉		无创心电监测	FKA05705
气道阻力测定	FJB02401	全身麻醉	HAA42901	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710
血气分析	CEJM1000	手术		病理	
多通道常规心电图检查	FKA03702	肺叶切除术	HJF73301	手术标本病理诊断	BCAD0001
痰液常规检查	CCEK5000	病理		药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
药敏试验	普通细菌药敏定性试验CJBX9000或普通细菌药敏定量试验CJBY9000或厌氧菌药敏试验CJBZ9000或结核分枝杆菌药敏定性试验CJCA9000或结核分枝杆菌药敏定量试验CJCB9000或耐甲氧西林葡萄球菌药敏定性试验CJCC9000或耐甲氧西林葡萄球菌检测(定量试验)CJCD9000或β-内酰胺类抗生素耐药检测CJCE9000或碳青霉烯类抗生素耐药检测CJCF9000或大环内酯类抗生素耐药检测CJCG9000或氟喹诺酮类抗生素耐药检测CJCH9000或氨基糖苷类抗生素耐药检测CJCJ9000或磺胺类药物耐药检测CJCK9000或淋病奈瑟菌药敏试验CJCL9000	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001	抗菌药物	
胸部X线摄影	EABJT001	药物			
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001	抗菌药物			
胸部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBJT001	镇痛药物			
纤维支气管镜检查	FJD01601				
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000				
治疗					
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
普通二维超声心动图	EDFKA005				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702或三通道动态心电图检查FKA03704或十二通道动态心电图检查FKA03705	治疗		治疗	
心脏彩色多普勒超声	EDFKA007	静脉输血	ABCD0001	经纤维支气管镜吸痰	HJD65603
气管树CT三维成像	EBCJC001	加压快速输血	ABCE0001	经电子支气管镜吸痰	HJD65601
心肌核素扫描	SPECT/CT静息心肌灌注断层显像EEDKC001或运动法SPECT/CT负荷心肌灌注断层显像EEDKC002或药物法SPECT/CT负荷心肌灌注断层显像EEDKC003	胃管置管术	ABGB0001	静脉输血	ABCD0001
痰病原学检查	直接涂片革兰染色镜检查细菌CJAB8000或浓缩集菌涂片革兰染色镜检查细菌CJAC8000或呼吸道标本涂片革兰染色镜检查细菌CJAE8000或一般细菌革兰染色+培养+鉴定CJAQ8000或直接涂片抗酸染色镜检查CJAF8000或浓缩集菌涂片抗酸染色镜检查CJAG8000或直接涂片荧光染色镜检查CJAH8000或培养细菌菌落计数CJAM2000或一般细菌培养CJAN8000或一般细菌培养+鉴定CJAP8000或一般细菌培养+鉴定+药敏CJAR8000或厌氧菌培养CJAV8000或厌氧菌培养+鉴定CJAW8000或厌氧菌培养+鉴定+药敏CJAX8000或分枝杆菌培养CJAY8000或分枝杆菌培养+鉴定CJBA8000或分枝杆菌培养+鉴定+药敏CTBB8000	药物		加压快速输血	ABCE0001
经支气管内镜活检术	FJD07602	术前镇静药		药物	
治疗					
监测					
动态血压监测	FKA05708				
药物					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
祛痰剂					
支气管舒张剂					
止血药物					

支气管扩张

右侧双肺叶切除术

适用对象：	病种编码：	GS017	
	主要诊断：	支气管扩张	ICD-10码：J47
	主要操作/主要治疗方式：	右侧双肺叶切除术	CCHI码：HJF73302
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：J47支气管扩张症疾病编码，拟行肺段切除术/肺叶切除术/复合肺叶切除术/全肺切除术的。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在门诊治疗期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 病人病情稳定，体温正常，手术切口愈合良好，生命体征平稳。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。		
住院日参考值：	≤18天		
变异条件：	1. 存在影响手术的合并症，需进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、呼吸功能衰竭、心脏功能衰竭、肝肾功能衰竭、支气管胸膜瘘等并发症，需要延长治疗时间。		
再入院间隔时间：	无需		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	特级护理	ACAD0001	特级护理	ACAD0001
检查		/ I级护理	ACAC0001	/ I级护理	ACAC0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查		/ II级护理	ACAB0001
尿常规化学分析	CCAA2000	开胸探查术	FJT09301	检查	
粪便常规检查	CCCA3000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
隐血试验	CCCB8000	导尿管留置	ABHA0002	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT)测定 CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和白蛋白 (Alb)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP)测定 CECD8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT)测定 CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和白蛋白 (Alb)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP)测定 CECD8000	氧气吸入	ABJA0001	肾脏功能检查	尿素 (Urea)测定 CEEA8000 和肌酐 (Cr)测定 CEEB8000 和尿酸 (UA)测定 CEEE8000
肾脏功能检查	尿素 (Urea)测定 CEEA8000 和肌酐 (Cr)测定 CEEB8000 和尿酸 (UA)测定 CEEE8000	静脉输液	ABCA0001	电解质测定	钾 (K)测定CEJA8000 和钠 (Na)测定 CEJB8000 和氯 (Cl)测定 CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2)测定CEJD1000 和镁 (Mg)测定 CEJE8000 和总钙 (Ca)测定 CEJF8000
电解质测定	钾 (K)测定CEJA8000 和钠 (Na)测定 CEJB8000 和氯 (Cl)测定 CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2)测定CEJD1000 和镁 (Mg)测定 CEJE8000 和总钙 (Ca)测定 CEJF8000	氧气雾化吸入	ABKB0001	胸部X线摄影	EABJT001
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT)测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间 (APTT)测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间 (PT)测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000	监测		治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000 或RhD血型鉴定CAMF1000	术中体温监测	HAN05702	换药	换药(小)ABFA0001 或换药(中)ABFA0002 或换药(大)ABFA0003
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	心电监护	院内遥测心电监护KKA28701 或无创心电监测FKA05705	化疗药物	ABKB0001
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000和乙型肝炎表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定CGLJ1000和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	无创血压监测	FKA05709	静脉输液	ABCA0001
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902		
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710	有创连续动脉血压监测	HAN05201
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	麻醉深度电生理监测	HAP05902	无创血压监测	FKA05709
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401 或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403 或最大通气量功能检查FJE01404	麻醉恢复室监护	HAP28901	无创心电监测	FKA05705

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一口气法FJE01405 或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	麻醉		无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710
气道阻力测定	FJB02401	全身麻醉	HAA42901	病理	
血气分析	CEJM1000	手术		手术标本病理诊断	BCAD0001
多通道常规心电图检查	FKA03702	右侧双肺叶切除术	HJF73302	药物	
痰液常规检查	CCEK5000	病理		抗菌药物	
药敏试验	普通细菌药敏定性试验CJBX9000或普通细菌药敏定量试验CJBY9000或厌氧菌药敏试验CJBZ9000或结核分枝杆菌药敏定性试验CJCA9000或结核分枝杆菌药敏定量试验CJCB9000或耐甲氧西林葡萄球菌药敏定性试验CJCC9000或耐甲氧西林葡萄球菌检测(定量试验)CJCD9000或β-内酰胺类抗生素耐药检测CJCE9000或碳青霉烯类抗生素耐药检测CJCF9000或大环内酯类抗生素耐药检测CJCG9000或氟喹诺酮类抗生素耐药检测CJCH9000或氨基糖苷类抗生素耐药检测CJCJ9000或磺胺类药物耐药检测CJCK9000或淋病奈瑟菌药敏试验CJCL9000	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001		
胸部X线摄影	EABJT001	药物			
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001	抗菌药物			
胸部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBJT001	镇痛药物			
纤维支气管镜检查	FJD01601				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000				
治疗					
药物					
抗菌药物					

选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
普通二维超声心动图	EDFKA005				
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702或三通道动态心电图检查FKA03704或十二通道动态心电图检查FKA03705	治疗		治疗	
心脏彩色多普勒超声	EDFKA007	静脉输血	ABCD0001	经纤维支气管镜吸痰	HJD65603
气管树CT三维成像	EBCJC001	加压快速输血	ABCE0001	经电子支气管镜吸痰	HJD65601
心肌核素扫描	SPECT/CT静息心肌灌注断层显像EEDKC001或运动法SPECT/CT负荷心肌灌注断层显像EEDKC002或药物法SPECT/CT负荷心肌灌注断层显像EEDKC003	胃管置管术	ABGB0001	静脉输血	ABCD0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
痰病原学检查	直接涂片革兰染色镜 检查细菌CJAB8000或 浓缩集菌涂片革兰染 色镜检查细菌 CJAC8000或呼吸道标 本涂片革兰染色镜检 查细菌CJAE8000或一 般细菌革兰染色+培 养+鉴定CJAQ8000或 直接涂片抗酸染色镜 检CJAF8000或浓缩集 菌涂片抗酸染色镜检 CJAG8000或直接涂片 荧光染色镜检 CJAH8000或培养细菌 菌落计数CJAM2000或 一般细菌培养 CJAN8000或一般细菌 培养+鉴定CJAP8000 或一般细菌培养+鉴 定+药敏CJAR8000或 厌氧菌培养CJAV8000 或厌氧菌培养+鉴定 CJAW8000或厌氧菌培 养+鉴定+药敏 CJAX8000或分枝杆菌 培养CJAY8000或分枝 杆菌培养+鉴定 CJBA8000或分枝杆菌 培养+鉴定+药敏 CJBB8000	药物		加压快速输血	ABCE0001
经支气管内镜活检术	FJD07602	术前镇静药		药物	
治疗					
监测					
动态血压监测	FKA05708				
药物					
祛痰剂					
支气管舒张剂					
止血药物					

支气管扩张

胸膜肺叶切除术

适用对象：	病种编码：	GS018			
	主要诊断：	支气管扩张	ICD-10码：	J47	
	主要操作/主要治疗方式：	胸膜肺叶切除术	CCHI码：	HJF73304	
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：J47支气管扩张症疾病编码，拟行肺段切除术/肺叶切除术/复合肺叶切除术/全肺切除术的。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在门诊治疗期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。				
出院标准：	1. 病人病情稳定，体温正常，手术切口愈合良好，生命体征平稳。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。				
住院日参考值：	≤18天				
变异条件：	1. 存在影响手术的合并症，需进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、呼吸功能衰竭、心脏功能衰竭、肝肾功能衰竭、支气管胸膜瘘等并发症，需要延长治疗时间。				
再入院间隔时间：	无需				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	特级护理	ACAD0001	特级护理	ACAD0001
检查		/ I级护理	ACAC0001	/ I级护理	ACAC0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查		/ II级护理	ACAB0001
尿常规化学分析	CCAA2000	开胸探查术	FJT09301	检查	
粪便常规检查	CCCA3000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
隐血试验	CCCB8000	导尿管留置	ABHA0002	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (Alb) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (Alb) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000	氧气吸入	ABJA0001	肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000 和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000 和尿酸 (UA) 测定 CEEE8000
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000 和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000 和尿酸 (UA) 测定 CEEE8000	静脉输液	ABCA0001	电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000 和氯 (Cl) 测定 CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2) 测定CEJD1000 和镁 (Mg) 测定 CEJE8000 和总钙 (Ca) 测定
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000 和氯 (Cl) 测定 CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2) 测定CEJD1000 和镁 (Mg) 测定 CEJE8000 和总钙 (Ca) 测定 CEJE8000	氧气雾化吸入	ABKB0001	胸部X线摄影	EABJT001
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间 (APTT) 测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间 (PT) 测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000	监测		治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000 或RhD血型鉴定CAMF1000	术中体温监测	HAN05702	换药	换药(小)ABFA0001 或换药(中)ABFA0002 或换药(大)ABFA0003
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	心电监护	院内遥测心电监护KKA28701 或无创心电监测FKA05705	化疗药物	ABKB0001
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000和乙型肝炎表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定CGLJ1000和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	无创血压监测	FKA05709	静脉输液	ABCA0001
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902		
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710	有创连续动脉血压监测	HAN05201
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	麻醉深度电生理监测	HAP05902	无创血压监测	FKA05709
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401 或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403 或最大通气量功能检查FJE01404	麻醉恢复室监护	HAP28901	无创心电监测	FKA05705

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
弥散功能检查	肺弥散功能检查—一口气法FJE01405 或肺弥散功能检查—重复呼吸法FJE01406	麻醉		无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710
气道阻力测定	FJB02401	全身麻醉	HAA42901	病理	
血气分析	CEJM1000	手术		手术标本病理诊断	BCAD0001
多通道常规心电图检查	FKA03702	胸膜肺叶切除术	HJF73304	药物	
痰液常规检查	CCEK5000	病理		抗菌药物	
药敏试验	普通细菌药敏定性试验CJBX9000或普通细菌药敏定量试验CJBY9000或厌氧菌药敏试验CJBZ9000或结核分枝杆菌药敏定性试验CJCA9000或结核分枝杆菌药敏定量试验CJCB9000或耐甲氧西林葡萄球菌药敏定性试验CJCC9000或耐甲氧西林葡萄球菌检测(定量试验)CJCD9000或β-内酰胺类抗生素耐药检测CJCE9000或碳青霉烯类抗生素耐药检测CJCF9000或大环内酯类抗生素耐药检测CJCG9000或氟喹诺酮类抗生素耐药检测CJCH9000或氨基糖苷类抗生素耐药检测CJCJ9000或磺胺类药物耐药检测CJCK9000或淋病奈瑟菌药敏试验CJCL9000	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001		
胸部X线摄影	EABJT001	药物			
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001	抗菌药物			
胸部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBJT001	镇痛药物			
纤维支气管镜检查	FJD01601				
经支气管内镜活检术	FJD07602				
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000				
治疗					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
普通二维超声心动图	EDFKA005				
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702或三通道动态心电图检查FKA03704或十二通道动态心电图检查FKA03705	治疗		治疗	
心脏彩色多普勒超声	EDFKA007	静脉输血	ABCD0001	经纤维支气管镜吸痰	HJD65603
气管树CT三维成像	EBCJC001	加压快速输血	ABCE0001	经电子支气管镜吸痰	HJD65601
心肌核素扫描	SPECT/CT静息心肌灌注断层显像EEDKC001或运动法SPECT/CT负荷心肌灌注断层显像EEDKC002或药物法SPECT/CT负荷心肌灌注断层显像EEDKC003	胃管置管术	ABGB0001	静脉输血	ABCD0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
痰病原学检查	直接涂片革兰染色镜 检查细菌CJAB8000或 浓缩集菌涂片革兰染 色镜检查细菌 CJAC8000或呼吸道标 本涂片革兰染色镜检 查细菌CJAE8000或一 般细菌革兰染色+培 养+鉴定CJAQ8000或 直接涂片抗酸染色镜 检CJAF8000或浓缩集 菌涂片抗酸染色镜检 CJAG8000或直接涂片 荧光染色镜检 CJAH8000或培养细菌 菌落计数CJAM2000或 一般细菌培养 CJAN8000或一般细菌 培养+鉴定CJAP8000 或一般细菌培养+鉴 定+药敏CJAR8000或 厌氧菌培养CJAV8000 或厌氧菌培养+鉴定 CJAW8000或厌氧菌培 养+鉴定+药敏 CJAX8000或分枝杆菌 培养CJAY8000或分枝 杆菌培养+鉴定 CJBA8000或分枝杆菌 培养+鉴定+药敏 CJBB8000	药物		加压快速输血	ABCE0001
治疗		术前镇静药			
				药物	
监测					
动态血压监测	FKA05708				
药物					
祛痰剂					
支气管舒张剂					
止血药物					

支气管扩张

经胸腔镜肺叶切除术

适用对象：	病种编码：	GS019			
	主要诊断：	支气管扩张		ICD-10码：	J47
	主要操作/主要治疗方式：	经胸腔镜肺叶切除术		CCHI码：	HJF73501
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：J47支气管扩张症疾病编码，拟行肺段切除术/肺叶切除术/复合肺叶切除术/全肺切除术的。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在门诊治疗期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 病人病情稳定，体温正常，手术切口愈合良好，生命体征平稳。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。			
	住院日参考值：	≤18天			
	变异条件：	1. 存在影响手术的合并症，需进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、呼吸功能衰竭、心脏功能衰竭、肝肾功能衰竭、支气管胸膜瘘等并发症，需要延长治疗时间。			
	再入院间隔时间：	无需			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	特级护理	ACAD0001	特级护理	ACAD0001
检查		/ I级护理	ACAC0001	/ I级护理	ACAC0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查		/ II级护理	ACAB0001
尿常规化学分析	CCAA2000	开胸探查术	FJT09301	检查	
粪便常规检查	CCCA3000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
隐血试验	CCCB8000	导尿管留置	ABHA0002	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT)测定 CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和白蛋白 (Alb)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP)测定 CECD8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT)测定 CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和白蛋白 (Alb)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP)测定 CECD8000	氧气吸入	ABJA0001	肾脏功能检查	尿素 (Urea)测定 CEEA8000 和肌酐 (Cr)测定 CEEB8000 和尿酸 (UA)测定 CEEE8000
肾脏功能检查	尿素 (Urea)测定 CEEA8000 和肌酐 (Cr)测定 CEEB8000 和尿酸 (UA)测定 CEEE8000	静脉输液	ABCA0001	电解质测定	钾 (K)测定CEJA8000 和钠 (Na)测定 CEJB8000 和氯 (Cl)测定 CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2)测定CEJD1000 和镁 (Mg)测定 CEJE8000 和总钙 (Ca)测定 CEJF8000
电解质测定	钾 (K)测定CEJA8000 和钠 (Na)测定 CEJB8000 和氯 (Cl)测定 CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2)测定CEJD1000 和镁 (Mg)测定 CEJE8000 和总钙 (Ca)测定 CEJF8000	氧气雾化吸入	ABKB0001	胸部X线摄影	EABJT001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	监测		葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定 型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定 型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定 型)CAME1000 或RhD血型鉴定 CAMF1000	术中体温监测	HAN05702	治疗	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定 CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定 CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴 定CAML1000	心电监护	院内遥测心电监护 KKA28701 或无创心电监测 FKA05705	化疗药物	换药(小)ABFA0001 或换药(中)ABFA0002 或换药(大)ABFA0003
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000和乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000和乙肝病毒 表面抗原确认试验 (HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000和乙型肝炎 表面抗体定性(抗 HBs)测定CGLK1000和 乙型肝炎表面抗体定 量(抗HBs)测定 CGLL1000	无创血压监测	FKA05709	氧气雾化吸入	ABKB0001
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	全身麻醉下呼吸功能 监测	HAN05902		ABCA0001
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	无创指脉血氧饱和度 监测	FKA05710	监测	
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000	麻醉深度电生理监测	HAP05902	有创连续动脉血压监 测	HAN05201

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401 或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403 或最大通气量功能检查FJE01404	麻醉恢复室监护	HAP28901	无创血压监测	FKA05709
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一口气法FJE01405 或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	麻醉		无创心电监测	FKA05705
气道阻力测定	FJB02401	全身麻醉	HAA42901	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710
血气分析	CEJM1000	手术		病理	
多通道常规心电图检查	FKA03702	经胸腔镜肺叶切除术	HJF73501	手术标本病理诊断	BCAD0001
痰液常规检查	CCEK5000	病理		药物	
痰病原学检查	直接涂片革兰染色镜检查细菌CJAB8000或浓缩集菌涂片革兰染色镜检查细菌CJAC8000或呼吸道标本涂片革兰染色镜检查细菌CJAE8000或一般细菌革兰染色+培养+鉴定CJAQ8000或 直接涂片抗酸染色镜检查CJAF8000或浓缩集菌涂片抗酸染色镜检查CJAG8000或 直接涂片荧光染色镜检查CJAH8000或培养细菌菌落计数CJAM2000或一般细菌培养CJAN8000或一般细菌培养+鉴定CJAP8000或一般细菌培养+鉴定+药敏CJAR8000或厌氧菌培养CJAV8000或厌氧菌培养+鉴定CJAW8000或厌氧菌培养+鉴定+药敏CJAX8000或分枝杆菌培养CJAY8000或分枝杆菌培养+鉴定CJBA8000或分枝杆菌培养+鉴定+药敏CJBB8000			抗菌药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
药敏试验	普通细菌药敏定性试验CJBX9000或普通细菌药敏定量试验CJBY9000或厌氧菌药敏试验CJBZ9000或结核分枝杆菌药敏定性试验CJCA9000或结核分枝杆菌药敏定量试验CJCB9000或耐甲氧西林葡萄球菌药敏定性试验CJCC9000或耐甲氧西林葡萄球菌检测(定量试验)CJCD9000或β-内酰胺类抗生素耐药检测CJCE9000或碳青霉烯类抗生素耐药检测CJCF9000或大环内酯类抗生素耐药检测CJCG9000或氟喹诺酮类抗生素耐药检测CJCH9000或氨基糖苷类抗生素耐药检测CJCJ9000或磺胺类药物耐药检测CJCK9000或淋病奈瑟菌药敏试验CJCL9000	药物			
胸部X线摄影	EABJT001	抗菌药物			
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001	镇痛药物			
胸部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBJT001				
纤维支气管镜检查	FJD01601				
经支气管内镜活检术	FJD07602				
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000				
治疗					
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
普通二维超声心动图	EDFKA005				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702或三通道动态心电图检查FKA03704或十二通道动态心电图检查FKA03705	治疗		治疗	
心脏彩色多普勒超声	EDFKA007	静脉输血	ABCD0001	经纤维支气管镜吸痰	HJD65603
气管树CT三维成像	EBCJC001	加压快速输血	ABCE0001	经电子支气管镜吸痰	HJD65601
心肌核素扫描	SPECT/CT静息心肌灌注断层显像EEDKC001或运动法SPECT/CT负荷心肌灌注断层显像EEDKC002或药物法SPECT/CT负荷心肌灌注断层显像EEDKC003	胃管置管术	ABGB0001	静脉输血	ABCD0001
治疗		病理		加压快速输血	ABCE0001
		快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001	药物	
监测		药物			
动态血压监测	FKA05708				
药物		术前镇静药			
祛痰剂					
支气管舒张剂					
止血药物					

支气管扩张
肺段切除术

适用对象：	病种编码：	GS020			
	主要诊断：	支气管扩张		ICD-10码：	J47
	主要操作/主要治疗方式：	肺段切除术		CCHI码：	HJG73301
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：J47支气管扩张症疾病编码，拟行肺段切除术/肺叶切除术/复合肺叶切除术/全肺切除术的。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在门诊治疗期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 病人病情稳定，体温正常，手术切口愈合良好，生命体征平稳。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。			
	住院日参考值：	≤18天			
	变异条件：	1. 存在影响手术的合并症，需进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、呼吸功能衰竭、心脏功能衰竭、肝肾功能衰竭、支气管胸膜瘘等并发症，需要延长治疗时间。			
	再入院间隔时间：	无需			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	特级护理	ACAD0001	特级护理	ACAD0001
检查		/ I级护理	ACAC0001	/ I级护理	ACAC0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查		/ II级护理	ACAB0001
尿常规化学分析	CCAA2000	开胸探查术	FJT09301	检查	
粪便常规检查	CCCA3000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
隐血试验	CCCB8000	导尿管留置	ABHA0002	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (Alb) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (Alb) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000	氧气吸入	ABJA0001	肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000 和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000 和尿酸 (UA) 测定 CEEE8000
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000 和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000 和尿酸 (UA) 测定 CEEE8000	静脉输液	ABCA0001	电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000 和氯 (Cl) 测定 CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2) 测定CEJD1000 和镁 (Mg) 测定 CEJE8000 和总钙 (Ca) 测定 CEJF8000
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000 和氯 (Cl) 测定 CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2) 测定CEJD1000 和镁 (Mg) 测定 CEJE8000 和总钙 (Ca) 测定 CEJF8000	氧气雾化吸入	ABKB0001	胸部X线摄影	EABJT001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	监测		葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定 型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定 型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定 型)CAME1000 或RhD血型鉴定 CAMF1000	术中体温监测	HAN05702	治疗	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定 CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定 CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴 定CAML1000	心电监护	院内遥测心电监护 KKA28701 或无创心电监测 FKA05705	化疗药物	换药(小)ABFA0001 或换药(中)ABFA0002 或换药(大)ABFA0003
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000和乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000和乙肝病毒 表面抗原确认试验 (HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000和乙型肝炎 表面抗体定性(抗 HBs)测定CGLK1000和 乙型肝炎表面抗体定 量(抗HBs)测定 CGLL1000	无创血压监测	FKA05709	氧气雾化吸入	ABKB0001
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	全身麻醉下呼吸功能 监测	HAN05902		ABCA0001
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	无创指脉血氧饱和度 监测	FKA05710	监测	
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000	麻醉深度电生理监测	HAP05902	有创连续动脉血压监 测	HAN05201

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401 或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403 或最大通气量功能检查FJE01404	麻醉恢复室监护	HAP28901	无创血压监测	FKA05709
弥散功能检查	肺弥散功能检查—一口气法FJE01405 或肺弥散功能检查—重复呼吸法FJE01406	麻醉		无创心电监测	FKA05705
气道阻力测定	FJB02401	全身麻醉	HAA42901	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710
血气分析	CEJM1000	手术		病理	
多通道常规心电图检查	FKA03702	肺段切除术	HJG73301	手术标本病理诊断	BCAD0001
痰液常规检查	CCEK5000	病理		药物	
痰病原学检查	直接涂片革兰染色镜检查细菌CJAB8000或浓缩集菌涂片革兰染色镜检查细菌CJAC8000或呼吸道标本涂片革兰染色镜检查细菌CJAE8000或一般细菌革兰染色+培养+鉴定CJAG8000或一般细菌革兰染色+培养+鉴定CJAP8000或一般细菌革兰染色+培养+鉴定CJAR8000或厌氧菌培养CJAV8000或厌氧菌培养+鉴定CJAW8000或厌氧菌培养+鉴定+药敏CJAX8000或分枝杆菌培养CJAY8000或分枝杆菌培养+鉴定CJBA8000或分枝杆菌培养+鉴定+药敏CJBB8000			抗菌药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
药敏试验	普通细菌药敏定性试验CJBX9000或普通细菌药敏定量试验CJBY9000或厌氧菌药敏试验CJBZ9000或结核分枝杆菌药敏定性试验CJCA9000或结核分枝杆菌药敏定量试验CJCB9000或耐甲氧西林葡萄球菌药敏定性试验CJCC9000或耐甲氧西林葡萄球菌检测(定量试验)CJCD9000或β-内酰胺类抗生素耐药检测CJCE9000或碳青霉烯类抗生素耐药检测CJCF9000或大环内酯类抗生素耐药检测CJCG9000或氟喹诺酮类抗生素耐药检测CJCH9000或氨基糖苷类抗生素耐药检测CJCJ9000或磺胺类药物耐药检测CJCK9000或淋病奈瑟菌药敏试验CJCL9000	药物			
胸部X线摄影	EABJT001	抗菌药物			
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001	镇痛药物			
胸部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBJT001				
纤维支气管镜检查	FJD01601				
经支气管内镜活检术	FJD07602				
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000				
治疗					
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
普通二维超声心动图	EDFKA005				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702或三通道动态心电图检查FKA03704或十二通道动态心电图检查FKA03705	治疗		治疗	
心脏彩色多普勒超声	EDFKA007	静脉输血	ABCD0001	经纤维支气管镜吸痰	HJD65603
气管树CT三维成像	EBCJC001	加压快速输血	ABCE0001	经电子支气管镜吸痰	HJD65601
心肌核素扫描	SPECT/CT静息心肌灌注断层显像EEDKC001或运动法SPECT/CT负荷心肌灌注断层显像EEDKC002或药物法SPECT/CT负荷心肌灌注断层显像EEDKC003	胃管置管术	ABGB0001	静脉输血	ABCD0001
治疗		药物		加压快速输血	ABCE0001
		术前镇静药		药物	
监测		病理			
动态血压监测	FKA05708				
药物		快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001		
祛痰剂					
支气管舒张剂					
止血药物					

支气管扩张

经胸腔镜肺段切除术

适用对象：	病种编码：	GS021			
	主要诊断：	支气管扩张	ICD-10码：	J47	
	主要操作/主要治疗方式：	经胸腔镜肺段切除术	CCHI码：	HJG73501	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：J47支气管扩张症疾病编码，拟行肺段切除术/肺叶切除术/复合肺叶切除术/全肺切除术的。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在门诊治疗期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 病人病情稳定，体温正常，手术切口愈合良好，生命体征平稳。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。			
	住院日参考值：	≤18天			
	变异条件：	1. 存在影响手术的合并症，需进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、呼吸功能衰竭、心脏功能衰竭、肝肾功能衰竭、支气管胸膜瘘等并发症，需要延长治疗时间。			
	再入院间隔时间：	无需			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	特级护理	ACAD0001	特级护理	ACAD0001
检查		/ I级护理	ACAC0001	/ I级护理	ACAC0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查		/ II级护理	ACAB0001
尿常规化学分析	CCAA2000	开胸探查术	FJT09301	检查	
粪便常规检查	CCCA3000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
隐血试验	CCCB8000	导尿管留置	ABHA0002	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (Alb) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (Alb) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000	氧气吸入	ABJA0001	肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000 和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000 和尿酸 (UA) 测定 CEEE8000
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000 和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000 和尿酸 (UA) 测定 CEEE8000	静脉输液	ABCA0001	电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000 和氯 (Cl) 测定 CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2) 测定CEJD1000 和镁 (Mg) 测定 CEJE8000 和总钙 (Ca) 测定 CEJF8000
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000 和氯 (Cl) 测定 CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2) 测定CEJD1000 和镁 (Mg) 测定 CEJE8000 和总钙 (Ca) 测定 CEJF8000	氧气雾化吸入	ABKB0001	胸部X线摄影	EABJT001
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间 (APTT) 测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间 (PT) 测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000	监测		葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000 或RhD血型鉴定CAMF1000	术中体温监测	HAN05702	治疗	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	心电监护	院内遥测心电监护KKA28701 或无创心电监测FKA05705	化疗药物	换药(小)ABFA0001 或换药(中)ABFA0002 或换药(大)ABFA0003
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000和乙型肝炎表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定CGLJ1000和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	无创血压监测	FKA05709	氧气雾化吸入	ABKB0001
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902		ABCA0001
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710	监测	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	麻醉深度电生理监测	HAP05902	有创连续动脉血压监测	HAN05201
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401 或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403 或最大通气量功能检查FJE01404	麻醉恢复室监护	HAP28901	无创血压监测	FKA05709

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
弥散功能检查	肺弥散功能检查—一口气法FJE01405 或肺弥散功能检查—重复呼吸法FJE01406	麻醉		无创心电监测	FKA05705
气道阻力测定	FJB02401	全身麻醉	HAA42901	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710
血气分析	CEJM1000	手术		病理	
多通道常规心电图检查	FKA03702	经胸腔镜肺段切除术	HJG73501	手术标本病理诊断	BCAD0001
痰液常规检查	CCEK5000	病理		药物	
痰病原学检查	直接涂片革兰染色镜检 检查细菌CJAB8000或浓缩集菌涂片革兰染色镜检 检查细菌CJAC8000或呼吸道标本涂片革兰染色镜检 检查细菌CJAE8000或一般细菌革兰染色+培养+鉴定CJAQ8000或 直接涂片抗酸染色镜检CJAF8000或浓缩集菌涂片抗酸染色镜检 CJAG8000或直接涂片荧光染色镜检 CJAH8000或培养细菌菌落计数CJAM2000或一般细菌培养 CJAN8000或一般细菌培养+鉴定CJAP8000或一般细菌培养+鉴定+药敏 CJAR8000或厌氧菌培养CJAV8000或厌氧菌培养+鉴定CJAW8000或厌氧菌培养+鉴定+药敏 CJAX8000或分枝杆菌培养CJAY8000或分枝杆菌培养+鉴定 CJBA8000或分枝杆菌培养+鉴定+药敏 CJBB8000			抗菌药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
药敏试验	普通细菌药敏定性试验CJBX9000或普通细菌药敏定量试验CJBY9000或厌氧菌药敏试验CJBZ9000或结核分枝杆菌药敏定性试验CJCA9000或结核分枝杆菌药敏定量试验CJCB9000或耐甲氧西林葡萄球菌药敏定性试验CJCC9000或耐甲氧西林葡萄球菌检测(定量试验)CJCD9000或β-内酰胺类抗生素耐药检测CJCE9000或碳青霉烯类抗生素耐药检测CJCF9000或大环内酯类抗生素耐药检测CJCG9000或氟喹诺酮类抗生素耐药检测CJCH9000或氨基糖苷类抗生素耐药检测CJCJ9000或磺胺类药物耐药检测CJCK9000或淋病奈瑟菌药敏试验CJCL9000	药物			
胸部X线摄影	EABJT001	抗菌药物			
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001	镇痛药物			
胸部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBJT001				
纤维支气管镜检查	FJD01601				
经支气管内镜活检术	FJD07602				
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000				
治疗					
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
普通二维超声心动图	EDFKA005				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702或三通道动态心电图检查FKA03704或十二通道动态心电图检查FKA03705	治疗		治疗	
心脏彩色多普勒超声	EDFKA007	静脉输血	ABCD0001	经纤维支气管镜吸痰	HJD65603
气管树CT三维成像	EBCJC001	加压快速输血	ABCE0001	经电子支气管镜吸痰	HJD65601
心肌核素扫描	SPECT/CT静息心肌灌注断层显像EEDKC001或运动法SPECT/CT负荷心肌灌注断层显像EEDKC002或药物法SPECT/CT负荷心肌灌注断层显像EEDKC003	胃管置管术	ABGB0001	静脉输血	ABCD0001
治疗		药物		加压快速输血	ABCE0001
		术前镇静药		药物	
监测		病理			
动态血压监测	FKA05708				
药物		快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001		
祛痰剂					
支气管舒张剂					
止血药物					

支气管扩张
全肺切除术

适用对象：	病种编码：	GS022			
	主要诊断：	支气管扩张		ICD-10码：	J47
	主要操作/主要治疗方式：	全肺切除术		CCHI码：	HJE75301
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：J47支气管扩张症疾病编码，拟行肺段切除术/肺叶切除术/复合肺叶切除术/全肺切除术的。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在门诊治疗期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 病人病情稳定，体温正常，手术切口愈合良好，生命体征平稳。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。			
	住院日参考值：	≤18天			
	变异条件：	1. 存在影响手术的合并症，需进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、呼吸功能衰竭、心脏功能衰竭、肝肾功能衰竭、支气管胸膜瘘等并发症，需要延长治疗时间。			
	再入院间隔时间：	无			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	特级护理	ACAD0001	特级护理	ACAD0001
检查		/ I级护理	ACAC0001	/ I级护理	ACAC0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查		/ II级护理	ACAB0001
尿常规化学分析	CCAA2000	开胸探查术	FJT09301	检查	
粪便常规检查	CCCA3000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
隐血试验	CCCB8000	导尿管留置	ABHA0002	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT)测定 CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和白蛋白 (Alb)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT)测定 CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和白蛋白 (Alb)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP)测定 CECD8000	氧气吸入	ABJA0001	肾脏功能检查	尿素 (Urea)测定 CEEA8000 和肌酐 (Cr)测定 CEEB8000 和尿酸 (UA)测定 CEEE8000
肾脏功能检查	尿素 (Urea)测定 CEEA8000 和肌酐 (Cr)测定 CEEB8000 和尿酸 (UA)测定 CEEE8000	静脉输液	ABCA0001	电解质测定	钾 (K)测定CEJA8000 和钠 (Na)测定 CEJB8000 和氯 (Cl)测定 CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2)测定CEJD1000 和镁 (Mg)测定 CEJE8000 和总钙 (Ca)测定 CEJF8000
电解质测定	钾 (K)测定CEJA8000 和钠 (Na)测定 CEJB8000 和氯 (Cl)测定 CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2)测定CEJD1000 和镁 (Mg)测定 CEJE8000 和总钙 (Ca)测定 CEJF8000	氧气雾化吸入	ABKB0001	胸部X线摄影	EABJT001
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT)测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间 (APTT) 测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间 (PT)测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000	监测		葡萄糖 (Glu)测定	CEFA8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000 或RhD血型鉴定CAMF1000	术中体温监测	HAN05702	治疗	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	心电监护	院内遥测心电监护KKA28701 或无创心电监测FKA05705	化疗药物	换药(小)ABFA0001 或换药(中)ABFA0002 或换药(大)ABFA0003
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000和乙型肝炎表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定CGLJ1000和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	无创血压监测	FKA05709	氧气雾化吸入	ABKB0001
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902		ABCA0001
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710	监测	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	麻醉深度电生理监测	HAP05902	有创连续动脉血压监测	HAN05201
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401 或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403 或最大通气量功能检查FJE01404	麻醉恢复室监护	HAP28901	无创血压监测	FKA05709

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
弥散功能检查	肺弥散功能检查— 一口气法FJE01405 或肺弥散功能检查— 重复呼吸法FJE01406	麻醉		无创心电监测	FKA05705
气道阻力测定	FJB02401	全身麻醉	HAA42901	无创指脉血氧饱和度 监测	FKA05710
血气分析	CEJM1000	手术		病理	
多通道常规心电图检查	FKA03702	全肺切除术	HJE75301	手术标本病理诊断	BCAD0001
痰液常规检查	CCEK5000	病理		药物	
痰病原学检查	直接涂片革兰染色镜 检查细菌CJAB8000或 浓缩集菌涂片革兰染 色镜检查细菌 CJAC8000或呼吸道标 本涂片革兰染色镜检 查细菌CJAE8000或一 般细菌革兰染色+培 养+鉴定CJAQ8000或 直接涂片抗酸染色镜 检CJAF8000或浓缩集 菌涂片抗酸染色镜检 CJAG8000或直接涂片 荧光染色镜检 CJAH8000或培养细菌 菌落计数CJAM2000或 一般细菌培养 CJAN8000或一般细菌 培养+鉴定CJAP8000 或一般细菌培养+鉴 定+药敏CJAR8000或 厌氧菌培养CJAV8000 或厌氧菌培养+鉴定 CJAW8000或厌氧菌培 养+鉴定+药敏 CJAX8000或分枝杆菌 培养CJAY8000或分枝 杆菌培养+鉴定 CJBA8000或分枝杆菌 培养+鉴定+药敏 CJBB8000			抗菌药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
药敏试验	普通细菌药敏定性试验CJBX9000或普通细菌药敏定量试验CJBY9000或厌氧菌药敏试验CJBZ9000或结核分枝杆菌药敏定性试验CJCA9000或结核分枝杆菌药敏定量试验CJCB9000或耐甲氧西林葡萄球菌药敏定性试验CJCC9000或耐甲氧西林葡萄球菌检测(定量试验)CJCD9000或β-内酰胺类抗生素耐药检测CJCE9000或碳青霉烯类抗生素耐药检测CJCF9000或大环内酯类抗生素耐药检测CJCG9000或氟喹诺酮类抗生素耐药检测CJCH9000或氨基糖苷类抗生素耐药检测CJCJ9000或磺胺类药物耐药检测CJCK9000或淋病奈瑟菌药敏试验CJCL9000	药物			
胸部X线摄影	EABJT001	抗菌药物			
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001	镇痛药物			
胸部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBJT001				
纤维支气管镜检查	FJD01601				
经支气管内镜活检术	FJD07602				
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000				
治疗					
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
普通二维超声心动图	EDFKA005				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702或三通道动态心电图检查FKA03704或十二通道动态心电图检查FKA03705	治疗		治疗	
心脏彩色多普勒超声	EDFKA007	静脉输血	ABCD0001	经纤维支气管镜吸痰	HJD65603
气管树CT三维成像	EBCJC001	加压快速输血	ABCE0001	经电子支气管镜吸痰	HJD65601
心肌核素扫描	SPECT/CT静息心肌灌注断层显像EEDKC001或运动法SPECT/CT负荷心肌灌注断层显像EEDKC002或药物法SPECT/CT负荷心肌灌注断层显像EEDKC003	胃管置管术	ABGB0001	静脉输血	ABCD0001
治疗		病理		加压快速输血	ABCE0001
		快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001	药物	
监测		药物			
动态血压监测	FKA05708				
药物		术前镇静药			
祛痰剂					
支气管舒张剂					
止血药物					

自发性气胸

肺大泡切除修补术

适用对象：	病种编码：	GS023			
	主要诊断：	自发性气胸	ICD-10码：	J93.0/J93.1	
	主要操作/主要治疗方式：	肺大泡切除修补术	CCHI码：	HJE73305	
入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10：J93.0/J93.1自发性气胸疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入此路径。				
出院标准：	1. 体温正常，无呼吸困难。 2. 拔除引流管，切口无感染。 3. 复查化验结果无明显异常，胸片示肺复张良好等。				
住院日参考值：	≤13天				
变异条件：	1. 患者伴有可能影响手术的合并疾病，需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后发生并发症需要进行相应的临床诊治，延长住院时间。				
再入院间隔时间：	无需				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	特级护理	ACAD0001	特级护理	ACAD0001
检查		/ I级护理	ACAC0001	/ I级护理	ACAC0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查		/ II级护理	ACAB0001
尿常规化学分析	CCAA2000			检查	
隐血试验	CCCB8000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (Alb) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000	氧气吸入	ABJA0001	胸部X线摄影	EABJT001
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000 和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000 和尿酸 (UA) 测定 CEEE8000	静脉输液	ABCA0001	治疗	
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000 和氯 (Cl) 测定 CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2) 测定CEJD1000 和镁 (Mg) 测定 CEJE8000 和总钙 (Ca) 测定 CEJF8000	氧气雾化吸入	ABKB0001	换药	换药 (小) ABFA0001 或换药 (中) ABFA0002 或换药 (大) ABFA0003
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间 (APTT) 测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间 (PT) 测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000	监测		氧气雾化吸入	ABKB0001
胸部X线摄影	EABJT001	术中体温监测	HAN05702	静脉输液	ABCA0001
多通道常规心电图检查	FKA03702	心电监护	院内遥测心电监护 KKA28701 或无创心电监测 FKA05705	监测	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000 或RhD血型鉴定CAMF1000	无创血压监测	FKA05709	化疗药物	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902	病理	
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000和乙肝病毒表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定CGLJ1000和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710		BCAD0001
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	麻醉深度电生理监测	HAP05902	药物	
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	麻醉恢复室监护	HAP28901	抗菌药物	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	麻醉			
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001	全身麻醉	HAA42901		
胸部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBJT001	手术			
血气分析	CEJM1000	肺大泡切除修补术	HJE73305		
治疗		病理			
		快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001		
药物		药物			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
		抗菌药物			
		镇痛药物			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401 或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403 或最大通气量功能检查FJE01404			血气分析	CEJM1000
弥散功能检查	肺弥散功能检查—一口气法FJE01405 或肺弥散功能检查—重复呼吸法FJE01406	治疗		治疗	
气道阻力测定	FJB02401	导尿管留置	ABHA0002	静脉输血	ABCD0001
普通二维超声心动图	EDFKA005	静脉输血	ABCD0001	加压快速输血	ABCE0001
治疗		加压快速输血	ABCE0001	药物	
		药物			
药物		抗胆碱能药物			

自发性气胸

经胸腔镜肺大泡切除胸膜固定术

适用对象：	病种编码：	GS024			
	主要诊断：	自发性气胸	ICD-10码：	J93.0/J93.1	
	主要操作/主要治疗方式：	经胸腔镜肺大泡切除胸膜固定术	CCHI码：	HJG73502	
入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10：J93.0/J93.1自发性气胸疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入此路径。				
出院标准：	1. 体温正常，无呼吸困难。 2. 拔除引流管，切口无感染。 3. 复查化验结果无明显异常，胸片示肺复张良好等。				
住院日参考值：	≤13天				
变异条件：	1. 患者伴有可能会影响手术的合并疾病，需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后发生并发症需要进行相应的临床诊治，延长住院时间。				
再入院间隔时间：	无需				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	特级护理	ACAD0001	特级护理	ACAD0001
检查		/I级护理	ACAC0001	/I级护理	ACAC0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查		/II级护理	ACAB0001
尿常规化学分析	CCAA2000			检查	
隐血试验	CCCB8000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT)测定 CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和白蛋白 (A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP)测定 CECD8000	氧气吸入	ABJA0001	胸部X线摄影	EABJT001
肾脏功能检查	尿素 (Urea)测定 CEEA8000 和肌酐 (Cr)测定 CEEB8000 和尿酸 (UA)测定 CEEE8000	静脉输液	ABCA0001	治疗	
电解质测定	钾 (K)测定CEJA8000 和钠 (Na)测定 CEJB8000 和氯 (Cl)测定 CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2)测定CEJD1000 和镁 (Mg)测定 CEJE8000 和总钙 (Ca)测定 CEJF8000	氧气雾化吸入	ABKB0001	换药	换药 (小) ABFA0001 或换药 (中) ABFA0002 或换药 (大) ABFA0003
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT)测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间 (APTT) 测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间 (PT)测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000	监测		氧气雾化吸入	ABKB0001
胸部X线摄影	EABJT001	术中体温监测	HAN05702	静脉输液	ABCA0001
多通道常规心电图检查	FKA03702	心电监护	院内遥测心电监护 KKA28701 或无创心电监测 FKA05705	监测	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000 或RhD血型鉴定CAMF1000	无创血压监测	FKA05709	化疗药物	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902	病理	
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000和乙肝病毒表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定 CGLK1000和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定 CGLL1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710		BCAD0001
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	麻醉深度电生理监测	HAP05902	药物	
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	麻醉恢复室监护	HAP28901	抗菌药物	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	麻醉			
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001	全身麻醉	HAA42901		
胸部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBJT001	手术			
血气分析	CEJM1000	经胸腔镜肺大泡切除 胸膜固定术	HJG73502		
治疗		病理			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
		快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001		
药物		药物			
		抗菌药物			
		镇痛药物			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401 或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403 或最大通气量功能检查FJE01404			血气分析	CEJM1000
弥散功能检查	肺弥散功能检查—一口气法FJE01405 或肺弥散功能检查—重复呼吸法FJE01406	治疗		治疗	
气道阻力测定	FJB02401	导尿管留置	ABHA0002	静脉输血	ABCD0001
普通二维超声心动图	EDFKA005	静脉输血	ABCD0001	加压快速输血	ABCE0001
治疗		加压快速输血	ABCE0001	药物	
		药物			
药物		抗胆碱能药物			

自发性气胸

胸膜固定术

适用对象：	病种编码：	GS025			
	主要诊断：	自发性气胸	ICD-10码：	J93.0/J93.1	
	主要操作/主要治疗方式：	胸膜固定术	CCHI码：	HJM71301	
入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10：J93.0/J93.1自发性气胸疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入此路径。				
出院标准：	1. 体温正常，无呼吸困难。 2. 拔除引流管，切口无感染。 3. 复查化验结果无明显异常，胸片示肺复张良好等。				
住院日参考值：	≤13天				
变异条件：	1. 患者伴有可能影响手术的合并疾病，需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后发生并发症需要进行相应的临床诊治，延长住院时间。				
再入院间隔时间：	无需				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	特级护理	ACAD0001	特级护理	ACAD0001
检查		/I级护理	ACAC0001	/I级护理	ACAC0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查		/II级护理	ACAB0001
尿常规化学分析	CCAA2000			检查	
隐血试验	CCCB8000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT)测定 CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和白蛋白 (A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP)测定 CECD8000	氧气吸入	ABJA0001	胸部X线摄影	EABJT001
肾脏功能检查	尿素 (Urea)测定 CEEA8000 和肌酐 (Cr)测定 CEEB8000 和尿酸 (UA)测定 CEEE8000	静脉输液	ABCA0001	治疗	
电解质测定	钾 (K)测定CEJA8000 和钠 (Na)测定 CEJB8000 和氯 (Cl)测定 CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2)测定 CEJD1000 和镁 (Mg)测定 CEJE8000 和总钙 (Ca)测定 CEJF8000	氧气雾化吸入	ABKB0001	换药	换药 (小)ABFA0001 或换药 (中)ABFA0002 或换药 (大)ABFA0003
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT)测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间 (APTT) 测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间 (PT)测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000	监测		氧气雾化吸入	ABKB0001
胸部X线摄影	EABJT001	术中体温监测	HAN05702	静脉输液	ABCA0001
多通道常规心电图检查	FKA03702	心电监护	院内遥测心电监护 KKA28701 或无创心电监测 FKA05705	监测	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000 或RhD血型鉴定CAMF1000	无创血压监测	FKA05709	化疗药物	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902	病理	
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000和乙肝病毒表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定CGLJ1000和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710		BCAD0001
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	麻醉深度电生理监测	HAP05902	药物	
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	麻醉恢复室监护	HAP28901	抗菌药物	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	麻醉			
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001	全身麻醉	HAA42901		
胸部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBJT001	手术			
血气分析	CEJM1000	胸膜固定术	HJM71301		
治疗		病理			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
药物		药物			
		抗菌药物			
		镇痛药物			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401 或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403 或最大通气量功能检查FJE01404			血气分析	CEJM1000
弥散功能检查	肺弥散功能检查—一口气法FJE01405 或肺弥散功能检查—重复呼吸法FJE01406	治疗		治疗	
气道阻力测定	FJB02401	导尿管留置	ABHA0002	静脉输血	ABCD0001
普通二维超声心动图	EDFKA005	静脉输血	ABCD0001	加压快速输血	ABCE0001
治疗		加压快速输血	ABCE0001	药物	
		药物			
药物		抗胆碱能药物			

自发性气胸

经胸腔镜胸膜固定术

适用对象：	病种编码：	GS026			
	主要诊断：	自发性气胸	ICD-10码：	J93.0/J93.1	
	主要操作/主要治疗方式：	经胸腔镜胸膜固定术	CCHI码：	HJM71501	
	入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10：J93.0/J93.1自发性气胸疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入此路径。			
	出院标准：	1. 体温正常，无呼吸困难。 2. 拔除引流管，切口无感染。 3. 复查化验结果无明显异常，胸片示肺复张良好等。			
	住院日参考值：	≤13天			
	变异条件：	1. 患者伴有可能影响手术的合并疾病，需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后发生并发症需要进行相应的临床诊治，延长住院时间。			
	再入院间隔时间：	无需			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	特级护理	ACAD0001	特级护理	ACAD0001
检查		/ I级护理	ACAC0001	/ I级护理	ACAC0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查		/ II级护理	ACAB0001
尿常规化学分析	CCAA2000			检查	
隐血试验	CCCB8000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定 CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定 CECD8000	氧气吸入	ABJA0001	胸部X线摄影	EABJT001
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEE8000 和肌酐(Cr)测定CEEB8000 和尿酸(UA)测定CEEE8000	静脉输液	ABCA0001	治疗	
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000 和氯(Cl)测定CEJC8000 和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000 和镁(Mg)测定CEJE8000 和总钙(Ca)测定CEJF8000	氧气雾化吸入	ABKB0001	换药	换药(小)ABFA0001 或换药(中)ABFA0002 或换药(大)ABFA0003
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	监测		氧气雾化吸入	ABKB0001
胸部X线摄影	EABJT001	术中体温监测	HAN05702	静脉输液	ABCA0001
多通道常规心电图检查	FKA03702	心电监护	院内遥测心电监护KKA28701 或无创心电监测FKA05705	监测	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000 或RhD血型鉴定CAMF1000	无创血压监测	FKA05709	化疗药物	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902	病理	
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000和乙肝病毒表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定CGLJ1000和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710		BCAD0001
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	麻醉深度电生理监测	HAP05902	药物	
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	麻醉恢复室监护	HAP28901	抗菌药物	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	麻醉			
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001	全身麻醉	HAA42901		
胸部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBJT001	手术			
血气分析	CEJM1000	经胸腔镜胸膜固定术	HJM71501		
治疗		病理			
药物		药物			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
		抗菌药物			
		镇痛药物			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401 或用力肺活量功能检查 FJE01402 或肺每分通气量功能检查 FJE01403 或最大通气量功能检查 FJE01404			血气分析	CEJM1000
弥散功能检查	肺弥散功能检查— 一口气法FJE01405 或肺弥散功能检查— 重复呼吸法FJE01406	治疗		治疗	
气道阻力测定	FJB02401	导尿管留置	ABHA0002	静脉输血	ABCD0001
普通二维超声心动图	EDFKA005	静脉输血	ABCD0001	加压快速输血	ABCE0001
治疗		加压快速输血	ABCE0001	药物	
		药物			
药物		抗胆碱能药物			

纵膈恶性肿瘤

前纵膈肿物切除术

适用对象：	病种编码：	GS027
	主要诊断：	纵膈恶性肿瘤
	主要操作/主要治疗方式：	前纵膈肿物切除术
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：C38.100纵膈恶性肿瘤 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在门诊或急诊的临床路径流程实施时，可以进入路径。	
出院标准：	1. 病人病情稳定，体温正常，手术切口愈合 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。	
最短住院日参考值：	≤18天	
变异条件：	1. 有影响手术的合并症，术前需要进行相关检查 2. 术后出现肺部感染、呼吸功能衰竭、心脏衰竭等延长治疗时间。	
再入院间隔时间：	无需	

术前	CCHI	术中	CCHI
基本项目			
护理		护理	
II级护理	ACAB0001	特级护理	ACAD0001
检查		/ I级护理	ACAC0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查	
尿常规化学分析	CCAA2000		
粪便常规检查	CCCA3000	治疗	
隐血试验	CCCB8000	导尿管留置	ABHA0002

术前	CCHI	术中	CCHI
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	氧气吸入	ABJA0001
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	静脉输液	ABCA0001
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000 和肌酐(Cr)测定CEEB8000 和尿酸(UA)测定CEEE8000	氧气雾化吸入	ABKB0001
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定CEJB8000 和氯(Cl)测定CEJC8000 和总二氧化碳(TCO ₂)测定CEJD1000 和镁(Mg)测定CEJE8000 和总钙(Ca)测定CEJF8000	监测	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000 或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000 或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000 或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	术中体温监测	HAN05702
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	心电监护	院内遥测心电监护 KKA28701 或无创心电监测 FKA05705

术前	CCHI	术中	CCHI
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000 或RhD血型鉴定CAMF1000	无创血压监测	FKA05709
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000 和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000 和乙肝病毒表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定CGLJ1000 和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000 和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	麻醉深度电生理监测	HAP05902
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	麻醉恢复室监护	HAP28901
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	麻醉	
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401 或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403 或最大通气量功能检查FJE01404	全身麻醉	HAA42901

术前	CCHI	术中	CCHI
胸部X线摄影	EABJT001	手术	
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001	前纵隔肿物切除术	HJN73301
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一口气法FJE01405 或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	病理	
气道阻力测定	FJB02401	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001
肝胆胰脾彩色多普勒超声检查	EDCQT001	药物	
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	抗菌药物	
治疗		镇痛药物	
一般灌肠	ABGE0001	止血药物	
导尿管留置	ABHA0002		
药物			

选择项目

因病情需要而选择的其他项目：

检查		检查	
血气分析	CEJM1000		
纤维支气管镜检查	FJD01601	治疗	
经支气管内镜活检术	FJD07602	静脉输血	ABCD0001
食管镜检查	硬式食管镜检查FPC01601 或纤维食管镜检查FPC01602 或电子食管镜检查FPC01603	加压快速输血	ABCE0001
全身骨显像	EEAX6004	胃管置管术	ABGB0001
头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001	药物	

术前	CCHI	术中	CCHI
头部磁共振增强成像	ECBBP001		
临床操作数字减影(DSA)引导	EAZZZ003		
经纵隔镜纵隔病变活检术	FJN07501		
甲胎蛋白(AFP)测定	CGRB8000		
绒毛膜促性腺激素(HCG)	人绒毛膜促性腺激素(HCG)测定CERR8000或β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定CERS1000或β人游离绒毛膜促性腺激素(free β-HCG)测定CERT1000		
乳酸脱氢酶(LD)测定	CECW1000		
胸内大血管CT三维成像	肺动脉CT三维成像EBCLA001或主动脉CT三维成像EBCLB001或颈动脉CT三维成像EBCLF001或肺静脉CT三维成像EBCMA001		
胸部磁共振成像	ECAJT001		
心脏彩色多普勒超声	EDFKA007		
治疗			
胃管置管术	ABGB0001		
药物			
镇静药物			
胆碱酯酶抑制剂			
抗菌药物			

ICD-10码：C38.100

CCHI码：HJN73301

恶性肿瘤疾病编码。
治疗期间不需要特殊处理也不影响第一诊断

良好。

的诊断和治疗。
功能衰竭、肝肾功能衰竭等并发症，需要延

术后	CCHI
护理	
特级护理	ACAD0001
/ I 级护理	ACAC0001
/ II 级护理	ACAB0001
检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000

术后	CCHI
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEE8000 和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000 和尿酸 (UA) 测定 CEEE8000
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000 和氯 (Cl) 测定 CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2) 测定CEJD1000 和镁 (Mg) 测定 CEJE8000 和总钙 (Ca) 测定 CEJF8000
胸部X线摄影	EABJT001
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000
治疗	
化疗药物	换药 (小) ABFA0001或 换药 (中) ABFA0002或 换药 (大) ABFA0003或 换药 (特大) ABFA0004

术后	CCHI
氧气雾化吸入	ABKB0001
	ABCA0001
监测	
病理	
手术标本病理诊断	BCAD0001
药物	

[illegible]

纵隔恶性肿瘤
后纵隔肿物切除术

适用对象：	病种编码：	GS028			
	主要诊断：	纵隔恶性肿瘤	ICD-10码：	C38.100	
	主要操作/主要治疗方式：	后纵隔肿物切除术	CCHI码：	HJN73302	
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：C38.100纵隔恶性肿瘤疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在门诊治疗期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。				
出院标准：	1. 病人病情稳定，体温正常，手术切口愈合良好。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。				
最短住院日参考值：	≤18天				
变异条件：	1. 有影响手术的合并症，术前需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、呼吸功能衰竭、心脏功能衰竭、肝肾功能衰竭等并发症，需要延长治疗时间。				
再入院间隔时间：	无需				

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	特级护理	ACAD0001	特级护理	ACAD0001
检查		/ I级护理	ACAC0001	/ I级护理	ACAC0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查		/ II级护理	ACAB0001
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000			检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000
粪便常规检查	CCCA3000	导尿管留置	ABHA0002	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
隐血试验	CCCB8000	氧气吸入	ABJA0001	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (Alb) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (Alb) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000	静脉输液	ABCA0001	肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000 和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000 和尿酸 (UA) 测定 CEEE8000
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000 和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000 和尿酸 (UA) 测定 CEEE8000	氧气雾化吸入	ABKB0001	电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000 和氯 (Cl) 测定 CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2) 测定CEJD1000 和镁 (Mg) 测定 CEJE8000 和总钙 (Ca) 测定 CEJF8000
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000 和氯 (Cl) 测定 CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2) 测定CEJD1000 和镁 (Mg) 测定 CEJE8000 和总钙 (Ca) 测定 CEJF8000	监测		胸部X线摄影	EABJT001

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000 或活化部分凝血活酶 时间(APTT)测定 CAGB1000 或血浆凝血酶原时间 (PT)测定CAGC1000 或血浆纤维蛋白原测 定CAGD1000	术中体温监测	HAN05702	治疗	
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703	心电监护	院内遥测心电监护 KKA28701 或无创心电监测 FKA05705	化疗药物	换药(小)ABFA0001或 换药(中)ABFA0002或 换药(大)ABFA0003或 换药(特大)ABFA0004
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定 型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定 型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定 型)CAME1000 或RhD血型鉴定 CAMF1000	无创血压监测	FKA05709	氧气雾化吸入	ABKB0001
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定 CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定 CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴 定CAML1000	全身麻醉下呼吸功能 监测	HAN05902		ABCA0001
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000 和乙型肝炎表面抗原 定量(HBsAg)测定 CGLH1000 和乙肝病毒表面抗原 确认试验 (HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000 和乙型肝炎表面抗体 定性(抗HBs)测定 CGLK1000 和乙型肝炎表面抗体 定量(抗HBs)测定 CGLL1000	无创指脉血氧饱和度 监测	FKA05710	监测	
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	麻醉深度电生理监测	HAP05902		

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	麻醉恢复室监护	HAP28901	病理	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	麻醉		手术标本病理诊断	BCAD0001
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401 或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403 或最大通气量功能检查FJE01404	全身麻醉	HAA42901	药物	
胸部X线摄影	EABJT001	手术		抗菌药物	
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001	后纵隔肿物切除术	HJN73302	止血药物	
弥散功能检查	肺弥散功能检查—一口气法FJE01405 或肺弥散功能检查—重复呼吸法FJE01406	病理		止痛药物	
气道阻力测定	FJB02401	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001	化痰药物	
肝胆胰脾彩色多普勒超声检查	EDCQT001	药物			
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	抗菌药物			
心脏彩色多普勒超声	EDFKA007	镇痛药物			
治疗					
一般灌肠	ABGE0001				
胃管置管术	ABGB0001				
导尿管留置	ABHA0002				
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
血气分析	CEJM1000			胸部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBJT001
纤维支气管镜检查	FJD01601	治疗		临床操作数字减影(DSA)引导	EAZZ003
经支气管内镜活检术	FJD07602	静脉输血	ABCD0001	治疗	
食管镜检查	硬式食管镜检查 FPC01601 或纤维食管镜检查 FPC01602 或电子食管镜检查 FPC01603	加压快速输血	ABCE0001	静脉输血	ABCD0001
全身骨显像	EEAX6004	胃管置管术	ABGB0001	加压快速输血	ABCE0001
头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001	药物		药物	
头部磁共振增强成像	ECBBP001	止血药物			
临床操作数字减影(DSA)引导	EAZZ003				
经纵隔镜纵隔病变活检术	FJN07501				
甲胎蛋白(AFP)测定	CGRB8000				
绒毛膜促性腺激素(HCG)	人绒毛膜促性腺激素(HCG)测定CERR8000 或β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定CERS1000或β人游离绒毛膜促性腺激素(free β-HCG)测定CERT1000				
乳酸脱氢酶(LD)测定	CECW1000				
胸内大血管CT三维成像	肺动脉CT三维成像EBCLA001或主动脉CT三维成像EBCLB001或颈动脉CT三维成像EBCLF001或肺静脉CT三维成像EBCMA001				
胸部磁共振成像	ECAJT001				
药物					

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
镇静药物					
胆碱酯酶抑制剂					
镇静药物					
胆碱酯酶抑制剂					
抗菌药物					

纵膈良性肿瘤（包括纵膈囊肿）
前纵膈肿物切除术

适用对象：	病种编码：	GS029			
	主要诊断：	纵膈良性肿瘤(包括纵膈囊肿)	ICD-10码：	D15.2/J98.505	
	主要操作/主要治疗方式：	前纵膈肿物切除术	CCHI码：	HJN73301	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10:D15.2/J98.505纵膈良性肿瘤疾病编码。 2. 有适应证，无手术禁忌证。 3. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在门诊治疗期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 病人病情稳定，体温正常，手术切口愈合良好，生命体征平稳。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。			
	最短住院日参考值：	≤12天			
	变异条件：	1. 有影响手术的合并症，术前需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、呼吸功能衰竭、心脏功能衰竭、肝肾功能衰竭等并发症，需要延长治疗时间。			
	再入院间隔时间：	无需			

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
基本项目					
护理		护理		护理	
I 级护理	ACAC0001	特级护理	ACAD0001	特级护理	ACAD0001
/ II 级护理	ACAB0001	/ I 级护理	ACAC0001	/ I 级护理	ACAC0001
检查		检查		/ II 级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
粪便常规检查	CCCA3000	导尿管留置	ABHA0002	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定CECB1000 和总胆红素 (T-Bil) 测定CELA1000 和直接胆红素 (D-Bil) 测定CELB1000 和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定CECC8000 和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000 和白蛋白 (A1b) 测定CEAE8000 和碱性磷酸酶 (ALP) 测定CECD8000
隐血试验	CCCB8000	氧气吸入	ABJA0001	肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定CEEA8000 和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000 和尿酸 (UA) 测定CEEE8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定CECB1000 和总胆红素 (T-Bil) 测定CELA1000 和直接胆红素 (D-Bil) 测定CELB1000 和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定CECC8000 和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000 和白蛋白 (A1b) 测定CEAE8000 和碱性磷酸酶 (ALP) 测定CECD8000	静脉输液	ABCA0001	电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定CEJB8000 和氯 (Cl) 测定CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2) 测定CEJD1000 和镁 (Mg) 测定CEJE8000 和总钙 (Ca) 测定CEJF8000
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定CEEA8000 和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000 和尿酸 (UA) 测定CEEE8000	氧气雾化吸入	ABKB0001	胸部X线摄影	EABJT001
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定CEJB8000 和氯 (Cl) 测定CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2) 测定CEJD1000 和镁 (Mg) 测定CEJE8000 和总钙 (Ca) 测定CEJF8000	监测		生化常规检查	葡萄糖 (Glu) 测定CEFA8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000和无机磷 (P) 测定CEKA8000 和钾 (K) 测定CEJA8000和钠 (Na) 测定CEJB8000和氯 (Cl) 测定CEJC8000和镁 (Mg) 测定CEJE8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定CEJD1000

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000 或活化部分凝血活酶 时间(APTT)测定 CAGB1000 或血浆凝血酶原时间 (PT)测定CAGC1000 或血浆纤维蛋白原测 定CAGD1000	术中体温监测	HAN05702	治疗	
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703	心电监护	院内遥测心电监护 KKA28701或无创心电 监测FKA05705	化疗药物	换药(小)ABFA0001或 换药(中)ABFA0002或 换药(大)ABFA0003或 换药(特大)ABFA0004
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定 型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定 型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定 型)CAME1000 或RhD血型鉴定 CAMF1000	无创血压监测	FKA05709	氧气雾化吸入	ABKB0001
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定 CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定 CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴 定CAML1000	全身麻醉下呼吸功能 监测	HAN05902		ABCA0001
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000 和乙型肝炎表面抗原 定量(HBsAg)测定 CGLH1000 和乙肝病毒表面抗原 确认试验 (HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000 和乙型肝炎表面抗体 定性(抗HBs)测定 CGLK1000 和乙型肝炎表面抗体 定量(抗HBs)测定 CGLL1000	无创指脉血氧饱和度 监测	FKA05710	监测	
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	麻醉深度电生理监测	HAP05902		
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	麻醉恢复室监护	HAP28901	病理	

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	麻醉		手术标本病理诊断	BCAD0001
胸部X线摄影	EABJT001	全身麻醉	HAA42901	药物	
胸部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBJT001	手术		抗菌药物	
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	前纵隔肿物切除术	HJN73301	镇痛药物	
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401 或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403 或最大通气量功能检查FJE01404	病理			
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一口气法FJE01405 或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001		
气道阻力测定	FJB02401	药物			
血气分析	CEJM1000	镇痛药物			
治疗					
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000				

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
胸内大血管CT三维成像	肺动脉CT三维成像EBCLA001或主动脉CT三维成像EBCLB001或颈动脉CT三维成像EBCLF001或肺静脉CT三维成像EBCMA001	治疗		治疗	
普通二维超声心动图	EDFKA005	静脉输血	ABCD0001	静脉输血	ABCD0001
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702或三通道动态心电图检查FKA03704或十二通道动态心电图检查FKA03705	加压快速输血	ABCE0001	加压快速输血	ABCE0001
肺动脉CT三维成像	EBCLA001	药物		药物	
心肌核素扫描	SPECT/CT静息心肌灌注断层显像EEDKC001或运动法SPECT/CT负荷心肌灌注断层显像EEDKC002或药物法SPECT/CT负荷心肌灌注断层显像EEDKC003	止血药物			
治疗					
监测					
动态血压监测	FKA05708				
药物					

纵隔良性肿瘤（包括纵膈囊肿）
后纵隔肿物切除术

适用对象：	病种编码：	GS030			
	主要诊断：	纵膈良性肿瘤(包括纵膈囊肿)	ICD-10码：	D15.2/J98.505	
	主要操作/主要治疗方式：	后纵隔肿物切除术	CCHI码：	HJN73302	
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10:D15.2/J98.505纵膈良性肿瘤疾病编码。 2. 有适应证，无手术禁忌证。 3. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在门诊治疗期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。				
出院标准：	1. 病人病情稳定，体温正常，手术切口愈合良好，生命体征平稳。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。				
最短住院日参考值：	≤12天				
变异条件：	1. 有影响手术的合并症，术前需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、呼吸功能衰竭、心脏功能衰竭、肝肾功能衰竭等并发症，需要延长治疗时间。				
再入院间隔时间：	无需				

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
基本项目					
护理		护理		护理	
I 级护理	ACAC0001	特级护理	ACAD0001	特级护理	ACAD0001
/ II 级护理	ACAB0001	/ I 级护理	ACAC0001	/ I 级护理	ACAC0001
检查		检查		/ II 级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
粪便常规检查	CCCA3000	导尿管留置	ABHA0002	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000 和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000 和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000 和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000 和总蛋白(TP)测定CEAA8000 和白蛋白(A1b)测定CEAE8000 和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
隐血试验	CCCB8000	氧气吸入	ABJA0001	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEE8000 和肌酐(Cr)测定 CEEB8000 和尿酸(UA)测定 CEEE8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000 和总胆红素(T-Bil) 测定CELA1000 和直接胆红素(D- Bil)测定CELB1000 和γ-谷氨酰基转移 酶(GGT)测定 CECC8000 和总蛋白(TP)测定 CEAA8000 和白蛋白(A1b)测定 CEAE8000 和碱性磷酸酶(ALP) 测定CECD8000	静脉输液	ABCA0001	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000 和氯(Cl)测定 CEJC8000 和总二氧化碳(TCO2) 测定CEJD1000 和镁(Mg)测定 CEJE8000 和总钙(Ca)测定 CEJF8000
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEE8000 和肌酐(Cr)测定 CEEB8000 和尿酸(UA)测定 CEEE8000	氧气雾化吸入	ABKB0001	胸部X线摄影	EABJT001
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000 和氯(Cl)测定 CEJC8000 和总二氧化碳(TCO2) 测定CEJD1000 和镁(Mg)测定 CEJE8000 和总钙(Ca)测定 CEJF8000	监测		生化常规检查	葡萄糖(Glu)测定 CEFA8000和总钙(Ca) 测定CEJF8000和无机 磷(P)测定CEKA8000 和钾(K)测定 CEJA8000和钠(Na)测 定CEJB8000和氯(Cl) 测定CEJC8000和镁 (Mg)测定CEJE8000和 总二氧化碳(TCO2)测 定CEJD1000
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000 或活化部分凝血活酶 时间(APTT)测定 CAGB1000 或血浆凝血酶原时间 (PT)测定CAGC1000 或血浆纤维蛋白原测 定CAGD1000	术中体温监测	HAN05702	治疗	
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703	心电监护	院内遥测心电监护 KKA28701或无创心电 监测FKA05705	化疗药物	换药(小)ABFA0001或 换药(中)ABFA0002或 换药(大)ABFA0003或 换药(特大)ABFA0004

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000 或RhD血型鉴定CAMF1000	无创血压监测	FKA05709	氧气雾化吸入	ABKB0001
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902		ABCA0001
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000 和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000 和乙型肝炎病毒表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定CGLJ1000 和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000 和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710	监测	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	麻醉深度电生理监测	HAP05902		
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	麻醉恢复室监护	HAP28901	病理	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	麻醉		手术标本病理诊断	BCAD0001
胸部X线摄影	EABJT001	全身麻醉	HAA42901	药物	
胸部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBJT001	手术		抗菌药物	
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	后纵隔肿物切除术	HJN73302		

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401 或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403 或最大通气量功能检查FJE01404	病理			
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一口气法FJE01405 或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001		
气道阻力测定	FJB02401	药物			
血气分析	CEJM1000	镇痛药物			
治疗					
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000				
胸内大血管CT三维成像	肺动脉CT三维成像EBCLA001或主动脉CT三维成像EBCLB001或颈动脉CT三维成像EBCLF001或肺静脉CT三维成像EBCMA001	治疗		治疗	
普通二维超声心动图	EDFKA005	静脉输血	ABCD0001	静脉输血	ABCD0001

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702 或三通道动态心电图检查FKA03704 或十二通道动态心电图检查FKA03705	加压快速输血	ABCE0001	加压快速输血	ABCE0001
肺动脉CT三维成像	EBCLA001	药物		药物	
心肌核素扫描	SPECT/CT静息心肌灌注断层显像EEDKC001 或运动法SPECT/CT负荷心肌灌注断层显像EEDKC002 或药物法SPECT/CT负荷心肌灌注断层显像EEDKC003	止血药物		抗菌药物	
治疗				止血镇痛药物	
监测					
动态血压监测	FKA05708				
药物					

原发性支气管肺癌
肺叶切除术

适用对象：	病种编码：	GS031			
	主要诊断：	原发性支气管肺癌	ICD - 10码：	C34	
	主要操作/主要治疗方式：	肺叶切除术	CCHI码：	HJF73301	
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD - 10：C34原发性支气管肺癌疾病编码。 2. 有手术治疗指征需外科治疗者，转入外科治疗路径。 3. 如患者一般情况较差，KPS评分<60（或ZPS评分>2），不进入该临床路径。 4. 有明显影响原发性支气管肺癌常规治疗的情况，不进入该临床路径。 5. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。				
出院标准：	1. 伤口愈合好。 2. 没有需要住院处理的并发症。				
最短住院日参考值：	14天				
变异条件：	1. 有影响肺癌治疗的合并症，需要进行相关的诊断和治疗。 2. 出现手术并发症，需进一步诊断和治疗，导致住院时间延长，治疗费用增加。				
再入院间隔时间：	2周				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查		/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	开胸探查术	FJT09301	检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		监测	
粪便常规检查	CCCA3000	氧气吸入	ABJA0001	院内遥测心电监护	KKA28701
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	导尿管留置	ABHA0002	治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000	监测		换药	换药(小)ABFA0001或 换药(中)ABFA0002或 换药(大)ABFA0003或 换药(特大)ABFA0004
电解质测定	钾(K)测定 CEJA8000和钠(Na) 测定CEJB8000和氯 (Cl)测定CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2)测定 CEJD1000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	院内遥测心电监护	KKA28701	病理	
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	麻醉		冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感 染标本冷冻切片病理
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000或ABO血 型鉴定(反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定(正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定(反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000	全身麻醉	HAA42901	免疫组织化学染色诊 断	BEBA0001
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	手术		药物	
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	肺叶切除术	HJF73301	化疗药物	
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	病理		静脉补液	
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感 染标本冷冻切片病理 诊断BCBB0001		
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000	药物			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肿瘤标志物检查	癌胚抗原(CEA)测定 CGRA1000和甲胎蛋白 (AFP)测定CGRB8000 和糖类抗原CA-125测 定CGRP1000和糖类抗 原CA-153测定 CRRR1000和糖类抗原 CA-199测定CGRS1000 和神经元特异性烯醇 化酶(NSE)测定 CGRH1000	抗菌药物			
血气分析	CEJM1000	静脉补液			
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703				
普通二维超声心动图	EDFKA005				
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活 量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403或最大 通气量功能检查 FJE01404				
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一 口气法FJE01405或肺 弥散功能检查-重复 呼吸法FJE01406				
胸部X线摄影	EABJT001				
胸部CT(平扫+增强 扫描)	胸部X线计算机体层 (CT)平扫EABJT001和 胸部X线计算机体层 (CT)增强扫描 EBBJT001				
全身骨显像	EEAX6004				
腹部超声或CT	肝胆胰脾B超检查 EDBQT001或上腹部X 线计算机体层(CT)平 扫EBAQT001或下腹部 X线计算机体层(CT) 平扫EBAQT002				
颈部X线透视	EAAHY001				
头颅MRI或CT	颅脑磁共振成像 ECABA001或头部X线 计算机体层(CT)平扫 EBABP001				
治疗					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
病理					
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
纤维支气管镜检查	FJD01601			血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
经纤维支气管镜采样刷采样	FJD06601	治疗		肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
经纤维支气管镜防污染保护性灌洗采样	FJD06605			肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000
经支气管内镜针吸活检术	FJD07601	病理		电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和总钙(Ca)测定CEJF8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
经支气管内镜活检术	FJD07602	药物		葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000
经支气管内镜透支气管壁肺活检术	FJD07603			胸部X线摄影	EABJT001
PET/CT肿瘤显像	PET/CT肿瘤局部显像 EEFZX001或PET/CT肿瘤全身显像EEFZY001			离子钙 (Ca2+) 测定	CEJG1000
普通病理会诊	疑难病理读片会诊 AADC0001或同步远程 病理会诊AADD0001或 非同步远程病理会诊 AADD0002			无机磷 (P) 测定	CEKA8000
治疗				胸部X线计算机体层 (CT) 平扫	EBAJT001
				肿瘤标志物检查	癌胚抗原 (CEA) 测定 CGRA1000和甲胎蛋白 (AFP) 测定CGRB8000 和糖类抗原CA-125测定 CGRP1000和糖类抗原 CA-153测定 CGRR1000和糖类抗原 CA-199测定CGRS1000 和神经元特异性烯醇 化酶 (NSE) 测定 CGRH1000
药物				治疗	
				病理	
				药物	
				止痛药物	

原发性支气管肺癌
全肺切除术

适用对象：	病种编码：	GS032			
	主要诊断：	原发性支气管肺癌		ICD - 10码：C34	
	主要操作/主要治疗方式：	全肺切除术		CCHI码:HJE75301	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD - 10：C34原发性支气管肺癌疾病编码。 2. 有手术治疗指征需外科治疗者，转入外科治疗路径。 3. 如患者一般情况较差，KPS评分<60（或ZPS评分>2），不进入该临床路径。 4. 有明显影响原发性支气管肺癌常规治疗的情况，不进入该临床路径。 5. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 伤口愈合好。 2. 没有需要住院处理的并发症。			
	最短住院日参考值：	14天			
	变异条件：	2. 出现手术并发症，需进一步诊断和治疗，导致住院时间延长，治疗费用增加。			
	再入院间隔时间：	2周			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查		/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	开胸探查术	FJT09301	检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		监测	
粪便常规检查	CCCA3000	氧气吸入	ABJA0001	院内遥测心电监护	KKA28701
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	导尿管留置	ABHA0002	治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEE8000和肌酐(Cr) 测定CEE8000和尿酸 (UA)测定CEE8000	监测		换药	换药(小)ABFA0001或 换药(中)ABFA0002或 换药(大)ABFA0003或 换药(特大)ABFA0004
电解质测定	钾(K)测定 CEJA8000和钠(Na) 测定CEJB8000和氯 (Cl)测定CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2)测定 CEJD1000和总钙 (Ca)测定CEIF8000	院内遥测心电监护	KKA28701	病理	
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	麻醉		冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感 染标本冷冻切片病理
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000或ABO血 型鉴定(反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定(正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定(反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000	全身麻醉	HAA42901	免疫组织化学染色诊 断	BEBA0001
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	手术		药物	
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	全肺切除术	HJE75301	化疗药物	
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	病理		静脉补液	
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感 染标本冷冻切片病理		
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000	药物			
肿瘤标志物检查	癌胚抗原(CEA)测定 CGRA1000和甲胎蛋白 (AFP)测定CGRB8000 和糖类抗原CA-125测 定CGRP1000和糖类抗 原CA-153测定 CGRR1000和糖类抗原 CA-199测定CGRS1000 和神经元特异性烯醇 化酶(NSE)测定 CGRH1000	抗菌药物			
血气分析	CEJM1000	静脉补液			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703				
普通二维超声心动图	EDFKA005				
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404				
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一口气法FJE01405或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406				
胸部X线摄影	EABJT001				
胸部CT（平扫+增强扫描）	胸部X线计算机体层(CT)平扫EABJT001和胸部X线计算机体层(CT)增强扫描EBBJT001				
全身骨显像	EEAX6004				
腹部超声或CT	肝胆胰脾B超检查EDBQT001或上腹部X线计算机体层(CT)平扫EBAQT001或下腹部X线计算机体层(CT)平扫EBAQT002				
颈部X线透视	EAAHY001				
头颅MRI或CT	颅脑磁共振成像ECABA001或头部X线计算机体层(CT)平扫EBABP001				
纤维支气管镜检查	FJD01601				
经支气管内镜活检术	FJD07602				
治疗					
病理					
药物					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
经纤维支气管镜采样刷采样	FJD06601			血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
经纤维支气管镜防污染保护性灌洗采样	FJD06605	治疗		肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bi1)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bi1)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
经支气管内镜针吸活检术	FJD07601			肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000
心脏X线摄影	EABKA001	病理		电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和总钙(Ca)测定CEJF8000
动态心电图检查	24小时心率变异性分析 FKA05702 或三通道动态心电图检查 FKA03704 或十二通道动态心电图检查 FKA03705	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感染标本冷冻切片病理诊断BCBB0001	葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000
经支气管内镜透支气管壁肺活检术	FJD07603	药物		胸部X线摄影	EABJT001
PET/CT肿瘤显像	PET/CT肿瘤局部显像EEFZX001或PET/CT肿瘤全身显像EEFZY001			离子钙(Ca ²⁺)测定	CEJG1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
普通病理会诊	疑难病理读片会诊 AADC0001或同步远程 病理会诊AADD0001或 非同步远程病理会诊 AADD0002			无机磷(P)测定	CEKA8000
治疗				胸部X线计算机体层 (CT)平扫	EBAJT001
				治疗	
药物					
				病理	
				药物	
				止痛药物	

原发性支气管肺癌

袖状肺叶切除术

适用对象：	病种编码：	GS033			
	主要诊断：	原发性支气管肺癌	ICD-10码：	C34	
	主要操作/主要治疗方式：	袖状肺叶切除术	CCHI码：	HJF73303	
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD - 10：C34原发性支气管肺癌疾病编码。 2. 有手术治疗指征需外科治疗者，转入外科治疗路径。 3. 如患者一般情况较差，KPS评分<60（或ZPS评分≥2），不进入该临床路径。 4. 有明显影响原发性支气管肺癌常规治疗的情况，不进入该临床路径。 5. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。				
出院标准：	1. 伤口愈合好。 2. 没有需要住院处理的并发症。				
最短住院日参考值：	14天				
变异条件：	1. 有影响肺癌治疗的合并症，需要进行相关的诊断和治疗。 2. 出现手术并发症，需进一步诊断和治疗，导致住院时间延长，治疗费用增加。				
再入院间隔时间：	2周				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查		/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	开胸探查术	FJT09301	检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		监测	
粪便常规检查	CCCA3000	氧气吸入	ABJA0001	院内遥测心电监护	KKA28701
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	导尿管留置	ABHA0002	治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000	监测		换药	换药(小)ABFA0001或 换药(中)ABFA0002或 换药(大)ABFA0003或 换药(特大)ABFA0004
电解质测定	钾(K)测定 CEJA8000和钠(Na) 测定CEJB8000和氯 (Cl)测定CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2)测定 CEJD1000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	院内遥测心电监护	KKA28701	病理	
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	麻醉		免疫组织化学染色诊断	BEBA0001
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000或ABO血 型鉴定(反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定(正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定(反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000	全身麻醉	HAA42901	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	手术		药物	
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	袖状肺叶切除术	HJF73303	化疗药物	
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	病理		静脉补液	
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感 染标本冷冻切片病理 诊断BCBB0001		
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000	药物			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肿瘤标志物检查	癌胚抗原(CEA)测定 CGRA1000和甲胎蛋白 (AFP)测定CGRB8000 和糖类抗原CA-125测 定CGRP1000和糖类抗 原CA-153测定 CRRR1000和糖类抗原 CA-199测定CGRS1000 和神经元特异性烯醇 化酶(NSE)测定 CGRH1000	抗菌药物			
血气分析	CEJM1000	静脉补液			
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703				
普通二维超声心动图	EDFKA005				
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活 量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403或最大 通气量功能检查 FJE01404				
弥散功能检查	肺弥散功能检查--一 口气法FJE01405或肺 弥散功能检查-重复 呼吸法FJE01406				
胸部X线摄影	EABJT001				
胸部CT(平扫+增强 扫描)	胸部X线计算机体层 (CT)平扫EABJT001和 胸部X线计算机体层 (CT)增强扫描 EBBJT001				
全身骨显像	EEAX6004				
腹部超声或CT	肝胆胰脾B超检查 EDBQT001或上腹部X 线计算机体层(CT)平 扫EBAQT001或下腹部 X线计算机体层(CT) 平扫EBAQT002				
头颅MRI或CT	颅脑磁共振成像 ECABA001或头部X线 计算机体层(CT)平扫 EBABP001				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
纤维支气管镜检查	FJD01601				
经支气管内镜活检术	FJD07602				
颈部X线透视	EAAHY001				
治疗					
病理					
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
经纤维支气管镜采样刷采样	FJD06601			床旁彩色多普勒超声检查	EDCZZ001
经纤维支气管镜防污染保护性灌洗采样	FJD06605	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
经支气管内镜针吸活检术	FJD07601			肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
经支气管内镜透支气管壁肺活检术	FJD07603	病理		肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000
PET/CT肿瘤显像	PET/CT肿瘤局部显像EEFZX001或PET/CT肿瘤全身显像EEFZY001			电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和总钙(Ca)测定CEJF8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
普通病理会诊	疑难病理读片会诊 AADC0001或同步远程 病理会诊AADD0001或 非同步远程病理会诊 AADD0002	药物		葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000
治疗				胸部X线摄影	EABJT001
				离子钙 (Ca2+) 测定	CEJG1000
药物				无机磷 (P) 测定	CEKA8000
				胸部X线计算机体层 (CT) 平扫	EBAJT001
				肿瘤标志物检查	癌胚抗原 (CEA) 测定 CGRA1000和甲胎蛋白 (AFP) 测定CGRB8000 和糖类抗原CA-125测 定CGRP1000和糖类抗 原CA-153测定 CGRR1000和糖类抗原 CA-199测定CGRS1000 和神经元特异性烯醇 化酶 (NSE) 测定 CGRH1000
				治疗	
				病理	
				药物	
				止痛药物	

原发性支气管肺癌

肺楔形切除术

适用对象：	病种编码：	GS034			
	主要诊断：	原发性支气管肺癌		ICD - 10码：	C34
	主要操作/主要治疗方式：	肺楔形切除术		CCHI码：	HJE73304
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD - 10：C34原发性支气管肺癌疾病编码。 2. 有手术治疗指征需外科治疗者，转入外科治疗路径。 3. 如患者一般情况较差，KPS评分<60（或ZPS评分>2），不进入该临床路径。 4. 有明显影响原发性支气管肺癌常规治疗的情况，不进入该临床路径。 5. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 伤口愈合好。 2. 没有需要住院处理的并发症。			
	最短住院日参考值：	14天			
	变异条件：	1. 有影响肺癌治疗的合并症，需要进行相关的诊断和治疗。 2. 出现手术并发症，需进一步诊断和治疗，导致住院时间延长，治疗费用增加。			
	再入院间隔时间：	2周			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查		/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	开胸探查术	FJT09301	检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗			
粪便常规检查	CCCA3000	氧气吸入	ABJA0001	治疗	
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	导尿管留置	ABHA0002	换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000	监测		病理	
电解质测定	钾(K)测定 CEJA8000和钠(Na) 测定CEJB8000和氯 (Cl)测定CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2)测定 CEJD1000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	院内遥测心电监护	KKA28701	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感 染标本冷冻切片病理 诊断BCBB0001
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	麻醉		药物	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000或ABO血 型鉴定(反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定(正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定(反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000	全身麻醉	HAA42901	抗菌药物	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	手术		静脉补液	
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	肺楔形切除术	HJE73304	化疗药物	
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	病理			
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感 染标本冷冻切片病理 诊断BCBB0001		
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000	药物			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肿瘤标志物检查	癌胚抗原(CEA)测定 CGRA1000和甲胎蛋白(AFP)测定CGRB8000 和糖类抗原CA-125测定CGRP1000和糖类抗原CA-153测定CGRR1000和糖类抗原CA-199测定CGRS1000 和神经元特异性烯醇化酶(NSE)测定CGRH1000	抗菌药物			
血气分析	CEJM1000	静脉补液			
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703				
普通二维超声心动图	EDFKA005				
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404				
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一口气法FJE01405或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406				
胸部X线摄影	EABJT001				
胸部CT（平扫+增强扫描）	胸部X线计算机体层(CT)平扫EABJT001和胸部X线计算机体层(CT)增强扫描EBBJT001				
全身骨显像	EEAX6004				
腹部超声或CT	肝胆胰脾B超检查EDBQT001或上腹部X线计算机体层(CT)平扫EBAQT001或下腹部X线计算机体层(CT)平扫EBAQT002				
头颅MRI或CT	颅脑磁共振成像ECABA001或头部X线计算机体层(CT)平扫EBABP001				
纤维支气管镜检查	FJD01601				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
颈部X线透视	EAAHY001				
治疗					
病理					
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
经纤维支气管镜采样刷采样	FJD06601			血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
经纤维支气管镜防污染保护性灌洗采样	FJD06605	治疗		肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
经支气管内镜针吸活检术	FJD07601			肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
经支气管内镜活检术	FJD07602	病理		电解质测定	钾（K）测定 CEJA8000和钠（Na） 测定CEJB8000和氯 （Cl）测定CEJC8000 和总二氧化碳 （TCO2）测定 CEJD1000和总钙 （Ca）测定CEJF8000
经支气管内镜透支气管壁肺活检术	FJD07603			葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000
PET/CT肿瘤显像	PET/CT肿瘤局部显像 EEFZX001或PET/CT肿 瘤全身显像EEFZY001	药物		胸部X线摄影	EABJT001
普通病理会诊	疑难病理读片会诊 AADC0001或同步远程 病理会诊AADD0001或 非同步远程病理会诊 AADD0002			离子钙(Ca ²⁺)测定	CEJG1000
治疗				无机磷(P)测定	CEKA8000
				胸部X线计算机体层 (CT)平扫	EBAJT001
药物				治疗	
				院内遥测心电监护	KKA28701
				监测	
				病理	
				免疫组织化学染色诊 断	BEBA0001
				药物	
				止痛药物	

漏斗胸

经胸腔镜小儿漏斗胸胸骨抬举内固定术(NUSS手术)

适用对象：	病种编码：	GS035			
	主要诊断：	漏斗胸	ICD-10码：	M95.403/Q67.600	
	主要操作/主要治疗方式：	经胸腔镜小儿漏斗胸胸骨抬举内固定术(NUSS手术)	CCHI码：	HJK71501	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10码：M95.403/Q67.600漏斗胸疾病编码。 2. 胸部有明显畸形。 3. 年龄大于3岁。 4. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在门诊治疗期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 切口愈合良好，或门诊可处理的愈合不良切口。 2. 体温正常。 3. 胸片呈正常术后改变，无明显异常。 4. 没有需要住院处理的其他并发症或合并症。			
	住院日参考值：	≤10天			
	变异条件：	1. 存在影响手术的合并症，术前需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、置入物移位、切口愈合不良等并发症，需要延长治疗时间。 3. 如术中出现意外，需输血治疗。			
	再入院间隔时间：	无			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		/特级护理	ACAD0001	/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查		检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	胸部X线摄影	EABJT001	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000 和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000 和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000 和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000 和总蛋白(TP)测定CEAA8000 和白蛋白(A1b)测定CEAE8000 和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	治疗		肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000 和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000 和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000 和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000 和总蛋白(TP)测定CEAA8000 和白蛋白(A1b)测定CEAE8000 和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000 和肌酐(Cr)测定CEEB8000 和尿酸(UA)测定CEEE8000	导尿管留置	ABHA0002	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000 和肌酐(Cr)测定CEEB8000 和尿酸(UA)测定CEEE8000
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定CEJB8000 和氯(Cl)测定CEJC8000 和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000 和镁(Mg)测定CEJE8000 和总钙(Ca)测定CEJF8000	氧气吸入	ABJA0001	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定CEJB8000 和氯(Cl)测定CEJC8000 和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000 和镁(Mg)测定CEJE8000 和总钙(Ca)测定CEJF8000
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000 或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000 或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000 或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	静脉输液	ABCA0001	胸部X线摄影	EABJT001
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001	监测		治疗	
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701 或多通道常规心电图检查FKA03702 或十二通道常规心电图检查FKA03703	术中体温监测	HAN05702	换药	换药(小)ABFA0001 或换药(中)ABFA0002 或换药(大)ABFA0003
普通二维超声心动图	EDFKA005	心电监护	院内遥测心电监护KKA28701 或无创心电监测FKA05705	氧气雾化吸入	ABKB0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000 或RhD血型鉴定CAMF1000	无创血压监测	FKA05709	化疗药物	ABCA0001
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902	药物	
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000 和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000 和乙型肝炎病毒表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定CGLJ1000 和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000 和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710		
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	麻醉恢复室监护	HAP28901		
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	麻醉			
治疗		全身麻醉	HAA42901		
		手术			
药物		经胸腔镜小儿漏斗胸胸骨抬举内固定术(NUSS手术)	HJK71501		
抗菌药物		病理			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
		药物			
		抗菌药物			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		护理	
血气分析	CEJM1000			引流管护理	ACBK0001
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	治疗		检查	
治疗		静脉输血	ABCD0001		
		加压快速输血	ABCE0001	治疗	
药物		药物			
				药物	

八、循环系统疾病

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
HM001	急性左心功能衰竭	
HM002	原发性高血压（低、中危）	社区诊治管理
HM003	原发性高血压（高危）	社区诊治管理
HM004	高血压+2型糖尿病	社区诊治管理
HS001	动脉导管未闭	经皮穿刺动脉导管未闭封堵术
HS002	房间隔缺损	房间隔缺损缝合术
HS003	房间隔缺损	房间隔缺损补片修补术
HS004	室间隔缺损	室间隔缺损缝合术
HS005	室间隔缺损	室间隔缺损补片修补术
HS006	风湿性心脏病二尖瓣病变	二尖瓣置换术
HS007	法洛四联症	法洛氏四联症根治术-不切右室
HS008	法洛四联症	法洛氏四联症非跨环补片根治术-切右室
HS009	法洛四联症	法洛氏四联症跨环补片根治术-切右室
HS010	升主动脉瘤	升主动脉瘤切除升主动脉替换术
HS011	主动脉瓣病变	主动脉瓣置换术
HS012	不稳定性心绞痛	经皮冠状动脉支架置入术
HS013	慢性稳定性心绞痛	经皮冠状动脉支架置入术
HS014	急性非ST段抬高性心肌梗死	经皮冠状动脉支架置入术
HS015	急性ST段抬高心肌梗死	经皮冠状动脉支架置入术

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
HS016	病态窦房结综合征	单腔永久起搏器安置术
HS017	病态窦房结综合征	双腔永久起搏器安置术
HS018	阵发性室上性心动过速	普通室上性心动过速射频消融术
HS019	非阵发性室性心动过速	室速射频消融术
HS020	非阵发性室性心动过速	埋藏式单腔心脏复律除颤器安置术
HS021	非阵发性室性心动过速	埋藏式双腔心脏复律除颤器安置术

急性左心功能衰竭

适用对象：	病种编码	HM001		
适用对象：	主要诊断：	急性左心功能衰竭	ICD-10码： I50. 101	
	主要操作/主要治疗方式：	CCHI码：		
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10： I50. 101急性左心功能衰竭疾病编码。 2. 如患有其他非心血管疾病，但在住院期间不需特殊处理（检查和治疗）， 也不影响第一诊断时，可进入路径。			
出院标准：	1. 症状缓解，可平卧。 2. 生命体征稳定。 3. 胸片显示肺水肿、肺淤血征象明显改善或正常。 4. 原发病得到有效控制。			
最短住院日参考值：	7天			
变异条件：	1. 病情危重，需气管插管及人工呼吸机辅助呼吸。 2. 合并肾功能不全需血液超滤或血液透析。 3. 合并心肌缺血或心肌梗死需行冠脉造影和介入治疗。 4. 合并严重感染不易控制者。 5. 等待外科手术。			
再入院时间间隔要求：	14天			

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
护理		治疗		利尿剂	
I 级护理	ACAC0001	静脉采血	ABBB0001	调整血压药物	
II 级护理	ACAB0001	氧气吸入	ABJA0001	快速房颤者纠正心律失常药物	
特级护理	ACAD0001	心肺复苏术	HAR30901	麻醉药品	
检查		院内遥测心电监护	KKA28701	扩血管药	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	监测		正性肌力药	
尿常规化学分析	CCAA2000	生命体征监测	有创连续动脉血压监测HAN05201或有创血流动力学监测HAN05202或无创血流动力学监测HAN05701或全身麻醉下呼吸功能监测HAN05902		
粪便常规检查	CCCA3000	心电监测	心电监测远程传输FKA05704或无创心电监测FKA05705		
肌酸激酶(CK)测定	CECS1000	无创血压监测	FKA05709		
肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定	CECT1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710		
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	有创连续动脉血压监测	HAN05201		
血气分析	CEJM1000				
生化常规检查	葡萄糖(Glu)测定CEFA8000和总钙(Ca)测定CEJF8000和无机磷(P)测定CEKA8000和钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和镁(Mg)测定CEJE8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000				
血浆D-二聚体(D-Dimer)测定	CAJY1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红 素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶 (GGT) 测 定CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和 白蛋白 (Alb) 测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶 (ALP) 测定 CECD8000				
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000或肌酐 (Cr) 测定CEEB8000或尿酸 (UA) 测定CEEE8000				
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测 定CEJC8000和总二氧化 碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测 定CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000				
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000				
B型钠尿肽 (BNP) 测定	CESS1000				
/N端-B型钠尿肽前体 (NT-ProBNP) 测定	CEST1000				
肌钙蛋白T (TnT) 测定	CEAX1000				
肌钙蛋白 I (TnI) 测 定	CEAY1000				
肌红蛋白 (Mb) 测定	CEAZ8000				
胸部X线摄影	EABJT001				
普通二维超声心动图	EDFKA005				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或常规心电图检查FKA03703				
床旁X线摄影	EABZZ001				
甲状腺功能检查	甲状腺摄碘试验EEGDC001或甲状腺激素抑制试验EEGDC002				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		治疗		药物	
				升压药	
				抗心律失常药物	
				抗菌药物	
				β受体阻滞剂	
				ACEI或ARB	
				醛固酮受体拮抗剂	

原发性高血压（低、中危）

社区诊治管理

适用对象：	病种编码：	HM002			
	主要诊断：	原发性高血压	ICD-10码：	I10	
	主要操作/主要治疗方式：	社区诊治管理	CCHI码：		
	纳入标准：	第一诊断必须符合ICD-10码：I10的原发性高血压患者。			
	管理标准：	1. 每年测血压6-12次。 2. 每年肝肾功能、血糖、血脂、电解质、血常规检查分别1-2次。 3. 心电图检查2次、尿常规检查1次+尿微量白蛋白/肌酐比检查1次。			
	最短住院日：	按每年、每人头支付			
	变异条件：	1. 血压≥180/110mmhg，出现微量蛋白尿，糖尿病，心脑血管病。 2. 慢性肾病或肾功能不全。			
	再入院间隔时间：				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000或肌酐(Cr) 测定CEEB8000或尿酸 (UA)测定CEEE8000			钙拮抗剂	
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000			β受体拮抗剂	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000			降压药物	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			麻醉药品	
尿常规化学分析	CCAA2000			降脂药	
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703			抗血小板药物	
微量白蛋白(mA1b)测定	CEAC8000				
肌酐(Cr)测定	CEEB8000				
监测					
无创血压监测	FKA05709				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		治疗		药物	
胸部X光片	胸部X线透视EAAJT001或胸部X线摄影EABJT001				

原发性高血压（高危）

社区诊治管理

适用对象：	病种编码：	HM003			
	主要诊断：	原发性高血压	ICD-10码：	I10	
	主要操作/主要治疗方式：	社区诊治管理	CCHI码：		
	纳入标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10码：I10的原发性高血压患者。 2. 无合并症、并发症。			
	管理标准：	1. 基本项目： （1）每年测量血压6-12次、动态血压2次。 （2）每年肝肾功能、血糖、血脂、电解质、血常规检查各1-2次、尿常规检查2次、尿微量白蛋白/肌酐比检查2次。 （3）每年X光检查1次、心电图检查2次、心脏超声检查1次、PWV脉搏波传导速度检查1次、ABI踝臂血压比值检查1次、眼底检查检查1次、颈动脉超声检查1次。 2. 选择性项目（用于鉴别继发性高血压）： 每年肾动脉超声或CT检查1次、肾上腺超声或CT检查1次、甲状腺功能T3、T4、TSH检查各1次。			
	最短住院日：	按每年、每人头支付			
	变异条件：	出现肾功能不全，眼底视网膜病变，心脑血管病，心力衰竭。			
	再入院间隔时间：	无			

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000			钙拮抗剂	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000或肌酐 (Cr) 测定CEEB8000或尿酸 (UA) 测定CEEE8000			β 受体拮抗剂	
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000			降压药物	
血脂四项	甘油三酯 (TG) 测定 CEHB1000 和总胆固醇 (TC) 测定 CEHA1000 和高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C) 测定 CEHC1000 和低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C) 测定 CEHD1000			麻醉药品	
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测定 CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测定 CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000			降脂药	
血常规	全血细胞计数+3分群 检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分 类检测CAAB1000			抗血小板药物	
尿常规化学分析	CCAA2000				
微量白蛋白 (mAlb) 测定	CEAC8000				
尿蛋白定量	CCAF2000				
肌酐 (Cr) 测定	CEEB8000				
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703				
普通二维超声心动图	EDFKA005				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
多普勒踝臂指数测定	EDDL9001				
胸部X线摄影	EABJT001				
眼底检查	免散瞳眼底检查 FES01704或非散瞳直接检眼镜眼底检查 FES01705或前置镜眼底检查FES01706或间接眼底镜检查 FES01707或三面镜眼底检查FES01713				
尿酮体定性试验	CCAM2000				
糖化血红蛋白(HbA1c)测定	CEBD1000				
颈动脉彩色多普勒超声检查	EDCLF001				
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001				
监测					
无创血压监测	FKA05709				
动态血压监测	FKA05708				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		治疗		药物	
双肾动脉彩色多普勒超声检查	EDCLW001				
肾上腺彩色多普勒超声检查	EDCDF001				
肾上腺X线计算机体层(CT)平扫	EBADF001				
肾上腺X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBDF001				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肾上腺磁共振成像	ECADF001				
肾上腺磁共振增强成像	ECBDF001				
肾上腺B超检查	EDBDF001				
颈动脉CT三维成像	EBCLF001				
颈动脉磁共振血管增强成像	ECBLF001				
标准多导睡眠监测	FJZ05701				

高血压+2型糖尿病

社区诊治管理

适用对象：	病种编码：	HM004			
	主要诊断：	高血压+2型糖尿病	ICD-10码：	I10+E11.9	
	主要操作/主要治疗方式：	社区诊治管理	CCHI码：		
	纳入标准：	1. 第一诊断必须符合同时患有ICD-10码：I10高血压和E11.9 2型糖尿病的患者。			
	管理标准：	1. 基本项目： （1）每年量血压6-12次、动态血压测量2次。 （2）每年肝肾功能、血糖、血脂、血常规检查各1-2次、电解质检查4-6次、尿常规检查2次、尿微量白蛋白/肌酐比检查1次。 （3）每年X光检查1次、心电图检查2次、心脏超声检查1次、PWV脉搏波传导速度检查1次、ABI踝臂血压比值检查1次、眼底检查1次、颈动脉超声检查1次。 2. 选择性项目（用于鉴别继发性高血压）： 每年肾动脉超声或CT检查1次、肾上腺超声或CT检查1次、甲状腺功能T3、T4、TSH、检查1次。			
	最短住院日：	按每年、每人头支付			
	变异条件：	出现肾功能不全，眼底视网膜病变，心脑血管病，心力衰竭。			
	再入院间隔时间：				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(Alb)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	抗感染治疗		钙拮抗剂	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEE8000或肌酐 (Cr) 测定CEE8000或尿酸 (UA) 测定CEE8000	输液	静脉输液ABCA0001或 输液泵辅助静脉输液 ABCB0001或静脉输血 ABCD0001或全胃肠外 营养深静脉输注 ABCF0001或外周静脉 营养输注ABCG0001或 输液泵辅助全胃肠外 营养深静脉输注 ABCH0001或抗肿瘤化 疗药物/肠外营养液 集中配置ABCJ0001	β 受体拮抗剂	
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000			降压药物	
血脂四项	甘油三酯 (TG) 测定 CEHB1000 和总胆固醇 (TC) 测定 CEHA1000 和高密度脂蛋白胆固 醇 (HDL-C) 测定 CEHC1000 和低密度脂蛋白胆固 醇 (LDL-C) 测定 CEHD1000			麻醉药品	
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测 定CEJC8000和总二氧 化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测 定CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000			降脂药	
血常规	全血细胞计数+3分群 检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分 类检测CAAB1000			抗血小板药物	
尿常规化学分析	CCAA2000				
微量白蛋白 (mAlb) 测 定	CEAC8000				
尿蛋白定量	CCAF2000				
肌酐 (Cr) 测定	CEE8000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703				
普通二维超声心动图	EDFKA005				
多普勒踝臂指数测定	EDDL9001				
胸部X线摄影	EABJT001				
眼底检查	免散瞳眼底检查FES01704或非散瞳直接检眼镜眼底检查FES01705或前置镜眼底检查FES01706或间接眼底镜检查FES01707或三面镜眼底检查FES01713				
颈动脉CT三维成像	EBCLF001				
颈动脉磁共振血管增强成像	ECBLF001				
颈动脉彩色多普勒超声检查	EDCLF001				
监测					
无创血压监测	FKA05709				
动态血压监测	FKA05708				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		治疗		药物	
双肾动脉彩色多普勒超声检查	EDCLW001				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肾上腺彩色多普勒超声检查	EDCDF001				
肾上腺X线计算机体层(CT)平扫	EBADF001				
肾上腺X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBDF001				
肾上腺磁共振成像	ECADF001				
肾上腺磁共振增强成像	ECBDF001				
肾上腺B超检查	EDBDF001				
三碘甲状腺原氨酸(T3)抑制试验	FDC04401				
甲状腺素(T4)抑制试验	FDC04402				
促甲状腺激素(TSH)测定	CEQD1000				
标准多导睡眠监测	FJZ05701				

动脉导管未闭

经皮穿刺动脉导管未闭封堵术

适用对象：	病种编码：	HS001			
	主要诊断：	动脉导管未闭		ICD-10码：	Q25.0
	主要操作/主要治疗方式：	经皮穿刺动脉导管未闭封堵术		CCHI码：	HL959202
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：Q25.0动脉导管未闭疾病编码。 2. 有适应证，无禁忌证。 3. 年龄大于3岁或体重大于15千克。未合并重度肺动脉高压和/或心功能衰竭。未闭动脉导管直径小于1厘米的患者进入该路径。 4. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 病人一般情况良好，完成复查项目。 2. 穿刺部位无出血、感染。 3. 没有需要住院处理的并发症。			
	最短住院日参考值：	2天			
	变异条件：	1. 围手术期并发症等造成住院日延长和费用增加。 2. 手术耗材的选择：由于病情不同，使用不同的内植物和耗材，导致住院费用存在差异。 3. 医师认可的变异原因分析。 4. 其他患者方面的原因等。			
	再入院间隔时间：	1周			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
Ⅱ级护理	ACAB0001	特级护理	ACAD0001	I级护理	ACAC0001
				/Ⅱ级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血气分析	CEJM1000	麻醉药品	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		尿常规化学分析	CCAA2000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	静脉输液	ABCA0001	胸部X线摄影	EABJT001
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	氧气吸入	ABJA0001	常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	经外周静脉置入中心静脉导管术	ABDA0001	普通心脏M型超声检查	EDFKA003
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	外周动脉穿刺置管术	HL962202	普通二维超声心动图	EDFKA005
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	监测		治疗	
乙型肝炎表面抗体(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000或乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	有创连续动脉血压监测	HAN05201	氧气吸入	ABJA0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
/丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	/无创血压监测	FKA05709	换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
/人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	无创心电监测	FKA05705	静脉输液	ABCA0001
/梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710	监测	
肌酸激酶(CK)测定	CECS1000	麻醉		有创连续动脉血压监测	HAN05201
肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定	CECT1000	内脏神经丛连续阻滞麻醉	HAL42102	/无创血压监测	FKA05709
谷氨酸脱氢酶(GDH)测定	CECP1000	/全身麻醉	HAA42901	无创心电监测	FKA05705
乳酸脱氢酶(LD)测定	CECW1000	手术		无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710
胸部X线摄影	EABJT001	经皮穿刺动脉导管未闭封堵术	HL959202	药物	
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	药物		血管活性药物	
心脏彩色多普勒超声	EDFKA007	抗生素		麻醉镇痛药物	
普通心脏M型超声检查	EDFKA003	抗过敏药物		抗生素	
普通二维超声心动图	EDFKA005	造影剂			
心功能测定	左心室收缩功能超声测定EDFKJ001或左心室舒张功能超声测定EDFKJ002	麻醉镇痛药物			
血气分析	CEJM1000	血管活性药物			
治疗					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
药物					
抗生素					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
血管彩色多普勒超声检查	小儿颅脑彩色多普勒超声检查 EDCBH001或经颅彩色多普勒超声EDCBH002或经颅多普勒超声发泡试验EDCBJ001或经颅多普勒CO2吸入试验EDCBJ002或经颅多普勒卧立位试验EDCBJ003或经颅多普勒超声动脉压迫试验EDCBJ004或经颅多普勒超声动脉栓子监测EDCBJ005或甲状腺彩色多普勒超声检查EDCDC001	经皮穿刺插管冠状动脉造影术	EACKU001	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEFA8000和肌酐(Cr)
肝胆胰脾彩色多普勒超声检查	EDCQT001	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000
肺通气功能检查	肺活量功能检查FIE01401或用力肺活	葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	肌酸激酶(CK)测定	CECS1000
弥散功能检查	肺弥散功能检查--一口气法FJE01405或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	右心导管检查	FKA01203	肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定	CECT1000
气道阻力测定	FJB02401	左心导管检查	FKA01202	谷氨酸脱氢酶(GDH)测定	CECP1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000和乳酸脱氢酶(LD)测定CECW1000和尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定EEEE8000和肌酸激酶(CK)测定CECS1000和肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定CECT1000和甘油三酯(TG)测定CEHB1000和总胆固醇(TC)测定CEHA1000和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定CEHC1000和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定CEHD1000和葡萄糖(Glu)测定CEFA8000和总钙(Ca)测定CEJF8000和无机磷(P)测定CEKA8000和钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000	经皮选择性主动脉造影术	EACLB002	乳酸脱氢酶(LD)测定	CECW1000
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	治疗		治疗	
治疗		导尿	ABHA0001	导尿管留置	ABHA0002
		导尿管留置	ABHA0002	呼吸机辅助通气	无创呼吸机辅助通气KJA21401或有创呼吸机辅助通气KJA21402
药物		呼吸机辅助通气	无创呼吸机辅助通气KJA21401或有创呼吸机辅助通气KJA21402	药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
		药物			

房间隔缺损

房间隔缺损缝合术

适用对象：	病种编码：	HS002			
	主要诊断：	房间隔缺损		ICD-10码：	Q21.1
	主要操作/主要治疗方式：	房间隔缺损缝合术		CCHI码：	HKL83301
入院标准：		1. 第一诊断必须符合ICD-10：Q21.1房间隔缺损疾病编码。 2. 有适应证，无禁忌证。 3. 年龄大于3岁或体重大于15千克。未合并重度肺动脉高压和/或心功能衰竭。未闭动脉导管直径小于1厘米的患者进入该路径。 4. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
出院标准：		1. 病人一般情况良好，完成复查项目。 2. 穿刺部位无出血、感染。 3. 没有需要住院处理的并发症。			
最短住院日参考值：		6天（术后最短5天）			
变异条件：		1. 围手术期并发症等造成住院日延长和费用增加。 2. 手术耗材的选择：由于病情不同，使用不同的内植物和耗材，导致住院费用存在差异。 3. 医师认可的变异原因分析。 4. 其他患者方面的原因等。			
再入院间隔时间：		1周			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
I级护理	ACAC0001	特级护理	ACAD0001	特级护理	ACAD0001
/ II级护理	ACAB0001	气管插管护理	ACBJ0003	/I级护理	ACAC0001
检查		检查		/ II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	麻醉药品	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
尿常规化学分析	CCAA2000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
粪便常规检查	CCCA3000	血气分析	CEJM1000	尿常规化学分析	CCAA2000
	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	活化凝血时间(ACT)测定	CAHF1000	凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	治疗		电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	导尿	ABHA0001	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定 CEAA8000和白蛋白 (A1b) 测定CEAE8000 和碱性磷酸酶 (ALP) 测定CECD8000	外周动脉穿刺置管术	HL962202	肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000和尿酸 (UA) 测定 CEEE8000
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000 和尿酸 (UA) 测定 CEEE8000	经外周静脉置入中心 静脉导管术	ABDA0001	葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000
乙型肝炎表面抗体 (抗HBs) 测定	乙型肝炎表面抗体 定性 (抗HBs) 测定 CGLK1000或乙型肝炎 表面抗体定量 (抗 HBs) 测定CGLL1000	体外循环	HM941301	胸部X线摄影	EABJT001
丙型肝炎抗体 (抗 HCV) 测定	CGMA1000	经口气管插管术	HAM62401	常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道常规 心电图检查FKA03702或 十二通道常规心电图检 查FKA03703
/人免疫缺陷病毒抗 体 (抗HIV) 测定	CGMF1000	监测		普通心脏M型超声检 查	EDFKA003
/梅毒螺旋体抗体 (抗TP) 测定	CGPP1000	全身麻醉下呼吸功能 监测	HAN05902	普通二维超声心动图	EDFKA005
胸部X线摄影	EABJT001	检测仪中心静脉压测 定	FKA02203	心脏彩色多普勒超声	EDFKA007
常规心电图检查	单通道常规心电图 检查FKA03701或多 通道常规心电图检 查FKA03702或十二 通道常规心电图检 查FKA03703	无创心电监测	FKA05705	血气分析	CEJM1000
心脏彩色多普勒超 声	EDFKA007	有创连续动脉血压监 测	HAN05201	治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血气分析	CEJM1000	/无创血压监测	FKA05709	氧气吸入	ABJA0001
普通二维超声心动图	EDFKA005	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710	静脉输液	ABCA0001
心功能测定	左心室收缩功能超声测定EDFKJ001或左心室舒张功能超声测定 EDFKJ002	术中体温监测	HAN05702	换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	麻醉			
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000或 Rh血型c抗原鉴定CAMH1000或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	全身麻醉	HAA42901	监测	
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000	手术		有创连续动脉血压监测	HAN05201
治疗		房间隔缺损缝合术	HKL83301	/无创血压监测	FKA05709
一般灌肠	ABGE0001	药物		无创心电监测	FKA05705
		抗生素		无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710
		体外循环药物			
药物		血管活性药物		药物	
		麻醉药		抗生素	
				血管活性药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
				麻醉镇静、镇痛药物	
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000	尿沉渣镜检	尿沉渣镜检CCBB2000 或尿沉渣图像分析 CCBC2000或尿有形成 分分析CCBD2000	生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000和 天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定CECB1000和 总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定CELB1000 和γ-谷氨酰基转移酶
血脂四项	甘油三酯 (TG) 测定 CEHB1000和总胆固 醇 (TC) 测定 CEHA1000和高密度 脂蛋白胆固醇 (HDL- C) 测定CEHC1000和 低密度脂蛋白胆固 醇 (LDL-C) 测定	葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000	尿沉渣镜检	尿沉渣镜检CCBB2000或 尿沉渣图像分析 CCBC2000或尿有形成分 分析CCBD2000
肌酸激酶 (CK) 测定	CECS1000	治疗		血型鉴定	ABO血型鉴定 (正定 型)CAMA1000或ABO血型 鉴定 (反定型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定 (正定 型)CAMD1000或ABO亚型 鉴定 (反定型)CAME1000 或RhD血型鉴定 CAMF1000
肌酸激酶-MB同工酶 活性 (CK-MB) 测定	CECT1000	物理降温	擦浴降温ABLA0001或 贴敷降温ABLB0001或 冰帽降温ABLC0001或 冰毯降温ABLD0001	活化凝血时间 (ACT) 测定	CAHF1000
谷氨酸脱氢酶 (GDH) 测定	CECP1000	临时起搏器安置术	HKT62301	治疗	
乳酸脱氢酶 (LD) 测 定	CECW1000	术中经食管彩色超声 心动图监测	EDFKA016	临时起搏器安置术	HKT62301
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	监测		临时起搏器应用	KKA26701
/肝胆胰脾彩色多普 勒超声检查	EDCQT001	肺动脉漂浮导管置入 术	FKA05202	静脉输血	ABCD0001
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺 活量功能检查 FJE01402或肺每分 通气量功能检查 FJE01403或最大通 气量功能检查 FJE01404	有创血流动力学监测	HAN05202	加压快速输血	ABCE0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一口气法FJE01405或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	麻醉深度电生理监测	HAP05902	胃管置管术	ABGB0001
气道阻力测定	FJB02401	药物		物理降温	擦浴降温ABLA0001或贴敷降温ABLB0001或冰帽降温ABLC0001或冰毯降温ABLD0001
右心导管检查	FKA01203			导尿管留置	ABHA0002
经皮穿刺插管冠状动脉造影术	EACKU001			呼吸机辅助通气	无创呼吸机辅助通气KJA21401或有创呼吸机辅助通气KJA21402
治疗				监测	
药物				药物	

房间隔缺损

房间隔缺损补片修补术

适用对象：	病种编码：	HS003			
	主要诊断：	房间隔缺损		ICD-10码：	Q21.1
	主要操作/主要治疗方式：	房间隔缺损补片修补术		CCHI码：	HKL83302
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：Q21.1房间隔缺损疾病编码。 2. 有适应证，无禁忌证。 3. 年龄大于3岁或体重大于15千克。未合并重度肺动脉高压和/或心功能衰竭。未闭动脉导管直径小于1厘米的患者进入该路径。 4. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。				
出院标准：	1. 病人一般情况良好，完成复查项目。 2. 穿刺部位无出血、感染。 3. 没有需要住院处理的并发症。				
最短住院日参考值：	6天（术后最短5天）				
变异条件：	1. 围手术期并发症等造成住院日延长和费用增加。 2. 手术耗材的选择：由于病情不同，使用不同的内植物和耗材，导致住院费用存在差异。 3. 医师认可的变异原因分析。 4. 其他患者方面的原因等。				
再入院间隔时间：	1周				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
I级护理	ACAC0001	特级护理	ACAD0001	特级护理	ACAD0001
II级护理	ACAB0001	气管插管护理	ACBJ0003	I级护理	ACAC0001
检查		检查		II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	麻醉药品	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
尿常规化学分析	CCAA2000	活化凝血时间 (ACT) 测定	CAHF1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间 (APTT) 测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间 (PT) 测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000	电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测定 CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测定 CEJE8000和总钙 (Ca) 测定 CEJF8000	尿常规化学分析	CCAA2000
血型鉴定	ABO血型鉴定 (正定型) CAMA1000或ABO血型鉴定 (反定型) CAMB1000或ABO亚型鉴定 (正定型) CAMD1000或ABO亚型鉴定 (反定型) CAME1000或RhD血型鉴定 CAMF1000	血气分析	CEJM1000	活化凝血时间 (ACT) 测定	CAHF1000
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000或 Rh血型c抗原鉴定CAMH1000或Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000或Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000			肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定 CEAA8000和白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000
RhD血型鉴定	CAMF1000	治疗		肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000和尿酸 (UA) 测定 CEEE8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000	经口气管插管术	HAM62401	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	外周动脉穿刺置管术	HL962202	葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	静脉置管术	经外周静脉置入中心静脉导管术ABDA0001或新生儿脐血管置管术ABDB0001	血气分析	CEJM1000
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	导尿	ABHA0001	胸部X线摄影	EABJT001
乙型肝炎表面抗体(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000或乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	导尿管留置	ABHA0002	常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	体外循环	HM941301	普通心脏M型超声检查	EDFKA003
/人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	静脉输液	ABCA0001	全方位心脏M型超声检查	EDFKA004

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
/梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	呼吸机辅助通气	无创呼吸机辅助通气KJA21401或有创呼吸机辅助通气KJA21402	普通二维超声心动图	EDFKA005
胸部X线摄影	EABJT001	监测		心脏彩色多普勒超声	EDFKA007
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902	治疗	
血气分析	CEJM1000	检测仪中心静脉压测定	FKA02203	氧气吸入	ABJA0001
普通心脏M型超声检查	EDFKA003	麻醉深度电生理监测	HAP05902	静脉输液	ABCA0001
全方位心脏M型超声检查	EDFKA004	无创心电监测	FKA05705	换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
普通二维超声心动图	EDFKA005	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710	监测	
心脏彩色多普勒超声	EDFKA007	术中体温监测	HAN05702	无创血压监测	FKA05709
治疗		麻醉		无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710
一般灌肠	ABGE0001	全身麻醉	HAA42901	无创心电监测	FKA05705
药物		手术		药物	
		房间隔缺损补片修补术	HKL83302	预防性抗生素	
		药物		麻醉镇痛药物	
		预防性抗生素		血管活性药物	
		体外循环药物			
		血管活性药物			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
		麻醉镇痛药物			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
粪便常规检查	CCCA3000	尿沉渣镜检	尿沉渣镜检CCBB2000 或尿沉渣图像分析 CCBC2000或尿有形成 分分析CCBD2000	尿沉渣镜检	尿沉渣镜检CCBB2000或 尿沉渣图像分析 CCBC2000或尿有形成分 分析CCBD2000
尿沉渣镜检	尿沉渣镜检CCBB2000 或尿沉渣图像分析 CCBC2000或尿有形成 分分析CCBD2000	葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000	治疗	
特殊介质交叉配血	CAMX1000	术中经食管彩色超声 心动图监测	EDFKA016	临时起搏器应用	KKA26701
疑难交叉配血	CAMY1000	治疗		临时起搏器安置术	HKT62301
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000	静脉输血	ABCD0001	静脉输血	ABCD0001
肌酸激酶 (CK) 测定	CECS1000	胃管置管术	ABGB0001	加压快速输血	ABCE0001
肌酸激酶-MB同工酶 活性 (CK-MB) 测定	CECT1000	物理降温	擦浴降温ABLA0001或 贴敷降温ABLB0001或 冰帽降温ABLC0001或 冰毯降温ABLD0001	胃管置管术	ABGB0001
谷氨酸脱氢酶 (GDH) 测定	CECP1000	体外自动心脏除颤术	KKA32705	物理降温	擦浴降温ABLA0001或贴 敷降温ABLB0001或冰帽 降温ABLC0001或冰毯降 温ABLD0001
乳酸脱氢酶 (LD) 测 定	CECW1000	临时起搏器安置术	HKT62301	导尿管留置	ABHA0002
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	监测		呼吸机辅助通气	无创呼吸机辅助通气 KJA21401或有创呼吸机 辅助通气KJA21402
肝胆胰脾彩色多普 勒超声检查	EDCQT001	肺动脉漂浮导管置入 术	FKA05202		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血管彩色多普勒超声检查	小儿颅脑彩色多普勒超声检查 EDCBH001 或经颅彩色多普勒超声EDCBH002或经颅多普勒超声发泡试验EDCBJ001或经颅多普勒C02吸入试验EDCBJ002或经颅多普勒卧立位试验EDCBJ003或经颅多普勒超声动脉压迫试验EDCBJ004或经颅多普勒超声动脉栓子监测EDCBJ005或甲状腺彩色多普勒超声检查EDCDC001	有创血流动力学监测	HAN05202		
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404	药物		监测	
右心导管检查	FKA01203			有创连续动脉血压监测	HAN05201
经皮穿刺插管冠状动脉造影术	EACKU001			药物	
药物					

室间隔缺损

室间隔缺损缝合术

适用对象：	病种编码：	HS004			
	主要诊断：	室间隔缺损		ICD-10码：	Q21.0
	主要操作/主要治疗方式：	室间隔缺损缝合术		CCHI码：	HKM83301
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：Q21.0室间隔缺损疾病编码。 2. 有适应证，无禁忌证。 3. 年龄大于3岁或体重大于15千克。未合并重度肺动脉高压和/或心功能衰竭。未闭动脉导管直径小于1厘米的患者进入该路径。 4. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。				
出院标准：	1. 病人一般情况良好，完成复查项目。 2. 穿刺部位无出血、感染。 3. 没有需要住院处理的并发症。				
最短住院日参考值：	6天（术后最短5天）				
变异条件：	1. 围手术期并发症等造成住院日延长和费用增加。 2. 手术耗材的选择：由于病情不同，使用不同的内植物和耗材，导致住院费用存在差异。 3. 医师认可的变异原因分析。 4. 其他患者方面的原因等。				
再入院间隔时间：	1周				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
I级护理	ACAC0001	特级护理	ACAD0001	特级护理	ACAD0001
/ II级护理	ACAB0001	气管插管护理	ACBJ0003	/I级护理	ACAC0001
检查		检查		/ II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	麻醉药品	
尿常规化学分析	CCAA2000	尿常规化学分析	CCAA2000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
粪便常规检查	CCCA3000	凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	尿常规化学分析	CCAA2000
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000或ABO血 型鉴定(反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定(正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定(反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000	活化凝血时间(ACT) 测定	CAHF1000	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和γ-谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000
乙型肝炎表面抗体 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗体定 性(抗HBs)测定 CGLK1000或乙型肝炎 表面抗体定量(抗 HBs)测定CGLL1000	血气分析	CEJM1000	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000
/人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	治疗		胸部X线摄影	EABJT001
/梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	导尿	ABHA0001	常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703
胸部X线摄影	EABJT001	导尿管留置	ABHA0002	普通心脏M型超声检查	EDFKA003
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	体外循环	HM941301	普通二维超声心动图	EDFKA005
普通二维超声心动图	EDFKA005	静脉输液	ABCA0001	心脏彩色多普勒超声	EDFKA007
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(Alb)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	经口气管插管术	HAM62401	治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000	外周动脉穿刺置管术	HL962202	氧气吸入	ABJA0001
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	经外周静脉置入中心 静脉导管术	ABDA0001	换药(小)	ABFA0001
心脏彩色多普勒超声	EDFKA007	呼吸机辅助通气	无创呼吸机辅助通气 KJA21401或有创呼吸 机辅助通气KJA21402	/换药(大)	ABFA0003
普通心脏M型超声检 查	EDFKA003	监测		静脉输液	ABCA0001
心功能测定	左心室收缩功能超声 测定EDFKJ001或左心 室舒张功能超声测定 EDFKJ002	全身麻醉下呼吸功能 监测	HAN05902	监测	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000或ABO血 型鉴定(反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定(正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定(反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000	检测仪中心静脉压测 定	FKA02203	有创连续动脉血压监 测	HAN05201

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000	麻醉深度电生理监测	HAP05902	/无创血压监测	FKA05709
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000或 Rh血型c 抗原鉴定CAMH1000或 Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000或Rh血型e 抗原鉴定CAMK1000或 Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000	无创心电图监测	FKA05705	无创指脉血氧饱和度 监测	FKA05710
血气分析	CEJM1000	无创指脉血氧饱和度 监测	FKA05710	无创心电图监测	FKA05705
治疗		有创连续动脉血压监测	HAN05201	药物	
		/无创血压监测	FKA05709	抗生素	
一般灌肠	ABGE0001	术中体温监测	HAN05702	血管活性药物	
药物		麻醉		麻醉镇痛药物	
		全身麻醉	HAA42901		
		手术			
		室间隔缺损缝合术	HKM83301		
		药物			
		抗生素			
		体外循环药物			
		血管活性药物			
		麻醉镇痛药物			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
经皮穿刺插管冠状动脉造影术	EACKU001	尿沉渣镜检	尿沉渣镜检CCBB2000 或尿沉渣图像分析 CCBC2000或尿有形成分分析CCBD2000	血气分析	CEJM1000
肝胆胰脾彩色多普勒超声检查	EDCQT001	术中经食管彩色超声心动图监测	EDFKA016	尿沉渣镜检	尿沉渣镜检CCBB2000 或尿沉渣图像分析 CCBC2000或尿有形成分分析CCBD2000
右心导管检查	FKA01203	治疗		活化凝血时间(ACT)测定	CAHF1000
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404	物理降温	擦浴降温ABLA0001或贴敷降温ABLB0001或冰帽降温ABLC0001或冰毯降温ABLD0001	血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一口气法FJE01405或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	体外自动心脏除颤术	KKA32705	生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (Alb) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000和乳酸脱氢酶 (LD) 测定CECW1000 和尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA) 测定EEEE8000和肌酸激酶 (CK) 测定 CECS1000和肌酸激酶-MB同工酶活性 (CK-MB) 测定CECT1000和甘油三酯 (TG) 测定 CEHB1000和总胆固醇 (TC) 测定CEHA1000和高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C) 测定 CEHC1000和低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C) 测定CEHD1000和葡萄糖 (Glu) 测定 CEFA8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000和无机磷 (P) 测定CEKA8000 和钾 (K) 测定 CEJA8000和钠 (Na) 测定CEJB8000和氯 (Cl) 测定CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000
气道阻力测定	FJB02401	血细胞分离单采	干细胞分离单采治疗 KNA39201或血浆分离单采治疗KNC39201或粒细胞分离单采治疗KND39201或淋巴细胞分离单采治疗KND39202或红细胞分离单采治疗或KND39203或血小板分离单采治疗KND39701	治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肌酸激酶(CK)测定	CECS1000	临时起搏器安置术	HKT62301	临时起搏器应用	KKA26701
肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定	CECT1000	监测		临时起搏器安置术	HKT62301
谷氨酸脱氢酶(GDH)测定	CECP1000	肺动脉漂浮导管置入术	FKA05202	静脉输血	ABCD0001
乳酸脱氢酶(LD)测定	CECW1000	有创血流动力学监测	HAN05202	加压快速输血	ABCE0001
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	麻醉深度电生理监测	HAP05902	胃管置管术	ABGB0001
药物		药物		物理降温	擦浴降温ABLA0001或贴敷降温ABLB0001或冰帽降温ABLC0001或冰毯降温ABLD0001
				导尿管留置	ABHA0002
				呼吸机辅助通气	无创呼吸机辅助通气KJA21401或有创呼吸机辅助通气KJA21402
				监测	
				药物	

室间隔缺损

室间隔缺损补片修补术

适用对象：	病种编码：	HS005			
	主要诊断：	室间隔缺损		ICD-10码：	Q21.0
	主要操作/主要治疗方式：	室间隔缺损补片修补术		CCHI码：	HKM83302
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：Q21.0室间隔缺损疾病编码。 2. 有适应证，无禁忌证。 3. 年龄大于3岁或体重大于15千克。未合并重度肺动脉高压和/或心功能衰竭。未闭动脉导管直径小于1厘米的患者进入该路径。 4. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 病人一般情况良好，完成复查项目。 2. 穿刺部位无出血、感染。 3. 没有需要住院处理的并发症。			
	最短住院日参考值：	6天（术后最短5天）			
	变异条件：	1. 围手术期并发症等造成住院日延长和费用增加。 2. 手术耗材的选择：由于病情不同，使用不同的内植物和耗材，导致住院费用存在差异。 3. 医师认可的变异原因分析。 4. 其他患者方面的原因等。			
	再入院间隔时间：	1周			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
Ⅱ级护理	ACAB0001	特级护理	ACAD0001	特级护理	ACAD0001
检查		气管插管护理	ACBJ0003	/Ⅰ级护理	ACAC0001
尿常规化学分析	CCAA2000	检查		/Ⅱ级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	麻醉药品	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	尿常规化学分析	CCAA2000	尿常规化学分析	CCAA2000
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000或ABO血 型鉴定(反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定(正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定(反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	血常规	全血细胞计数+3分群 检测CAAA1000或全血 细胞计数+5分类检测 CAAB1000
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000或 Rh血型c 抗原鉴定CAMH1000或 Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000或Rh血型e 抗原鉴定CAMK1000或 Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000	血气分析	CEJM1000	血气分析	CEJM1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000和乳酸脱氢酶(LD)测定CECW1000和尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定EEEE8000和肌酸激酶(CK)测定CECS1000和肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定CECT1000和甘油三酯(TG)测定CEHB1000和总胆固醇(TC)测定CEHA1000和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定CEHC1000和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定CEHD1000和葡萄糖(Glu)测定CEFA8000和总钙(Ca)测定CEJF8000和无机磷(P)测定CEKA8000和钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000	活化凝血时间(ACT)测定	CAHF1000	常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000	治疗		胸部X线摄影	EABJT001
RhD血型鉴定	CAMF1000	静脉置管术	经外周静脉置入中心静脉导管术ABDA0001或新生儿脐血管置管术ABDB0001	普通二维超声心动图	EDFKA005
乙型肝炎表面抗体(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000或乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	经口气管插管术	HAM62401	心脏彩色多普勒超声	EDFKA007
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	导尿	ABHA0001	治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
/人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	导尿管留置	ABHA0002	氧气吸入	ABJA0001
/梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	体外循环	HM941301	静脉输液	ABCA0001
胸部X线摄影	EABJT001	静脉输液	ABCA0001	换药	换药(小)ABFA0001或 换药(中)ABFA0002或 换药(大)ABFA0003或 换药(特大)ABFA0004
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	呼吸机辅助通气	无创呼吸机辅助通气KJA21401或有创呼吸机辅助通气KJA21402	监测	
普通心脏M型超声检查	EDFKA003	监测		无创血压监测	FKA05709
全方位心脏M型超声检查	EDFKA004	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710
普通二维超声心动图	EDFKA005	检测仪中心静脉压测定	FKA02203	无创心电监测	FKA05705
心脏彩色多普勒超声	EDFKA007	麻醉深度电生理监测	HAP05902	药物	
治疗		无创心电监测	FKA05705	预防性抗生素	
一般灌肠	ABGE0001	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710	血管活性药物	
药物		术中体温监测	HAN05702	麻醉镇痛药物	
		麻醉			
		全身麻醉	HAA42901		
		手术			
		室间隔缺损补片修补术	HKM83302		
		药物			
		预防性抗生素			
		体外循环药物			
		血管活性药物			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
		麻醉镇痛药物			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红 素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶 (GGT) 测 定CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和 白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶 (ALP) 测定 CECD8000	尿沉渣镜检	尿沉渣镜检CCBB2000 或尿沉渣图像分析 CCBC2000或尿有形成 分分析CCBD2000	生化常规检查	内氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红 素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶 (GGT) 测 定CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和 白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶 (ALP) 测定 CECD8000和乳酸脱氢 酶 (LD) 测定CECW1000 和尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA) 测定EEEE8000和 肌酸激酶 (CK) 测定 CECS1000和肌酸激酶 -MB同工酶活性 (CK- MB) 测定CECT1000和 甘油三酯 (TG) 测定 CEHB1000和总胆固醇 (TC) 测定CEHA1000和 高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C) 测定 CEHC1000和低密度脂 蛋白胆固醇 (LDL-C) 测定CEHD1000和葡萄 糖 (Glu) 测定 CEFA8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000和无机 磷 (P) 测定CEKA8000 和钾 (K) 测定 CEJA8000和钠 (Na) 测 定CEJB8000和氯 (Cl) 测定CEJC8000和总二 氧化碳 (TCO2) 测定 CEID1000
粪便常规检查	CCCA3000	葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000	尿沉渣镜检	尿沉渣镜检CCBB2000 或尿沉渣图像分析 CCBC2000或尿有形成 分分析CCBD2000
血气分析	CEJM1000	术中经食管彩色超声 心动图监测	EDFKA016	活化凝血时间 (ACT) 测定	CAHF1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
尿沉渣镜检	尿沉渣镜检CCBB2000 或尿沉渣图像分析 CCBC2000或尿有形成 分分析CCBD2000	治疗		普通心脏M型超声检 查	EDFKA003
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000	静脉输血	ABCD0001	全方位心脏M型超声 检查	EDFKA004
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	胃管置管术	ABGB0001	治疗	
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	物理降温	擦浴降温ABLA0001或 贴敷降温ABLB0001或 冰帽降温ABLC0001或 冰毯降温ABLD0001	临时起搏器应用	KKA26701
肌酸激酶(CK)测定	CECS1000	体外自动心脏除颤术	KKA32705	临时起搏器安置术	HKT62301
肌酸激酶-MB同工酶 活性(CK-MB)测定	CECT1000	临时起搏器安置术	HKT62301	物理降温	擦浴降温ABLA0001或 贴敷降温ABLB0001或 冰帽降温ABLC0001或 冰毯降温ABLD0001
谷氨酸脱氢酶(GDH) 测定	CECP1000	监测		静脉输血	ABCD0001
乳酸脱氢酶(LD)测定	CECW1000	肺动脉漂浮导管置入 术	FKA05202	加压快速输血	ABCE0001
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	有创血流动力学监测	HAN05202	胃管置管术	ABGB0001
肝胆胰脾彩色多普勒 超声检查	EDCQT001	药物		导尿管留置	ABHA0002
右心导管检查	FKA01203			呼吸机辅助通气	无创呼吸机辅助通气 KJA21401或有创呼吸 机辅助通气KJA21402
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活 量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403或最大 通气量功能检查 FJE01404				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
经皮穿刺插管冠状动脉造影术	EACKU001			监测	
血管彩色多普勒超声检查	或经颅彩色多普勒超声EDCBH002或经颅多普勒超声发泡试验EDCBJ001或经颅多普勒C02吸入试验EDCBJ002或经颅多普勒卧立位试验EDCBJ003或经颅多普勒超声动脉压迫试验EDCBJ004或经颅多普勒超声动脉栓子监测EDCBJ005或甲状腺彩色多普勒超声检查EDCDC001			有创连续动脉血压监测	HAN05201
药物				药物	

风湿性心脏病二尖瓣病变

二尖瓣置换术

适用对象：	病种编码：	HS006			
	主要诊断：	风湿性心脏病二尖瓣病变	ICD-10码：	I05. 0-I05. 2, I05. 8, I05. 9	
	主要操作/主要治疗方式：	二尖瓣置换术	CCHI码：	HKQ66301	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：I05. 0-I05. 2, I05. 8, I05. 9风湿性心脏病二尖瓣病变疾病编码。 2. 有适应证，无禁忌证。 3. 年龄大于3岁或体重大于15千克。未合并重度肺动脉高压和/或心功能衰竭。未闭动脉导管直径小于1厘米的患者进入该路径。 4. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 病人一般情况良好，完成复查项目。 2. 穿刺部位无出血、感染。 3. 没有需要住院处理的并发症。			
	最短住院日参考值：	8天（术后最短7天）			
	变异条件：	1. 围手术期并发症等造成住院日延长和费用增加。 2. 手术耗材的选择：由于病情不同，使用不同的内植物和耗材，导致住院费用存在差异。 3. 医师认可的变异原因分析。 4. 其他患者方面的原因等。			
	再入院间隔时间：	1周			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
I级护理	ACAC0001	特级护理	ACAD0001	特级护理	ACAD0001
/ II级护理	ACAB0001	气管插管护理	ACBJ0003	/I级护理	ACAC0001
检查		检查		/ II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	麻醉药品	
尿常规化学分析	CCAA2000	尿常规化学分析	CCAA2000	尿常规化学分析	CCAA2000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	血常规	全血细胞计数+3分群 检测CAAA1000或全血 细胞计数+5分类检测 CAAB1000
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000或ABO血 型鉴定(反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定(正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定(反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000	活化凝血时间(ACT) 测定	CAHF1000	凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000
粪便常规检查	CCCA3000	葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000或 Rh血型c 抗原鉴定CAMH1000或 Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000或Rh血型e 抗原鉴定CAMK1000或 Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000	常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和γ-谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(Alb)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)测定CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素 (D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT)测定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和白蛋白 (Alb)测定CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP)测定CECD8000	电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000和钠 (Na) 测定CEJB8000和氯 (Cl) 测定CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2)测定CEJD1000和镁 (Mg) 测定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定CEEA8000和肌酐 (Cr)测定CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000
抗链球菌溶血素O (ASO) 测定	CGPB1000	血气分析	CEJM1000	葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000
C-反应蛋白 (CRP) 测定	CGCA1000	治疗		胸部X线摄影	EABJT001
红细胞沉降率 (ESR) 测定	CAAJ1000	导尿	ABHA0001	常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定CEEA8000和肌酐 (Cr)测定CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000	导尿管留置	ABHA0002	普通心脏M型超声检查	EDFKA003
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000和钠 (Na) 测定CEJB8000和氯 (Cl) 测定CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2)测定CEJD1000和镁 (Mg) 测定CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000	胃管置管术	ABGB0001	普通二维超声心动图	EDFKA005
乙型肝炎表面抗体 (抗HBs) 测定	乙型肝炎表面抗体定性 (抗HBs)测定CGLK1000或乙型肝炎表面抗体定量 (抗HBs) 测定CGLL1000	体外循环	HM941301	心脏彩色多普勒超声	EDFKA007

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	静脉输液	ABCA0001	血气分析	CEJM1000
/人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	经口气管插管术	HAM62401	治疗	
/梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	外周动脉穿刺置管术	HL962202	氧气吸入	ABJA0001
胸部X线摄影	EABJT001	静脉置管术	经外周静脉置入中心静脉导管术ABDA0001或新生儿脐血管置管术ABDB0001	静脉输液	ABCA0001
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	呼吸机辅助通气	无创呼吸机辅助通气KJA21401或有创呼吸机辅助通气KJA21402	换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
心脏彩色多普勒超声	EDFKA007	监测		监测	
普通心脏M型超声检查	EDFKA003	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902	有创连续动脉血压监测	HAN05201
普通二维超声心动图	EDFKA005	检测仪中心静脉压测定	FKA02203	/无创血压监测	FKA05709
心功能测定	左心室收缩功能超声测定EDFKJ001或左心室舒张功能超声测定EDFKJ002	有创连续动脉血压监测	HAN05201	无创心电监测	FKA05705
血气分析	CEJM1000	/无创血压监测	FKA05709	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710
治疗		无创心电监测	FKA05705	药物	
一般灌肠	ABGE0001	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710	抗生素	
药物		术中体温监测	HAN05702	血管活性药物	
强心利尿剂		麻醉		麻醉镇痛药物	
		全身麻醉	HAA42901	抗凝药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
		手术			
		二尖瓣置换术	HKQ66301		
		药物			
		抗生素			
		体外循环药物			
		血管活性药物			
		麻醉镇痛药物			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	术中经食管彩色超声心动图监测	EDFKA016	血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000
					丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
经皮穿刺插管冠状动脉造影术	EACKU001	治疗		生化常规检查	定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000和乳酸脱氢酶(LD)测定CECW1000和尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000和肌酸激酶(CK)测定CECS1000和肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定CECT1000和甘油三酯(TG)测定CEHB1000和总胆固醇(TC)测定CEHA1000和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定CEHC1000和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定CEHD1000和葡萄糖(Glu)测定CEFA8000和总钙(Ca)测定CEJF8000和无机磷(P)测定CEKA8000和钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000
肝胆胰脾彩色多普勒超声检查	EDCQT001	物理降温	擦浴降温ABLA0001或贴敷降温ABLB0001或冰帽降温ABLC0001或冰毯降温ABLD0001	活化凝血时间(ACT)测定	CAHF1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血管彩色多普勒超声检查	小儿颅脑彩色多普勒超声检查 EDCBH001或经颅彩色多普勒超声EDCBH002或经颅多普勒超声发泡试验EDCBJ001或经颅多普勒CO2吸入试验EDCBJ002或经颅多普勒卧立位试验EDCBJ003或经颅多普勒超声动脉压迫试验EDCBJ004或经颅多普勒超声动脉栓子监测EDCBJ005或甲状腺彩色多普勒超声检查EDCDC001	血细胞分离单采	干细胞分离单采治疗KNA39201或血浆分离单采治疗KNC39201或粒细胞分离单采治疗KND39201或淋巴细胞分离单采治疗KND39202或红细胞分离单采治疗或KND39203或血小板分离单采治疗KND39701	治疗	
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404	体外自动心脏除颤术	KKA32705	临时起搏器应用	KKA26701
弥散功能检查	肺弥散功能检查--一口气法FJE01405或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	临时起搏器安置术	HKT62301	临时起搏器安置术	HKT62301
气道阻力测定	FJB02401	监测		静脉输血	ABCD0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肌酸激酶(CK)测定	CECS1000	肺动脉漂浮导管置入术	FKA05202	加压快速输血	ABCE0001
肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定	CECT1000	有创血流动力学监测	HAN05202	胃管置管术	ABGB0001
谷氨酸脱氢酶(GDH)测定	CECP1000	麻醉深度电生理监测	HAP05902	物理降温	擦浴降温ABLA0001或贴敷降温ABLB0001或冰帽降温ABLC0001或冰毯降温ABLD0001
乳酸脱氢酶(LD)测定	CECW1000	药物		导尿管留置	ABHA0002
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000			呼吸机辅助通气	无创呼吸机辅助通气KJA21401或有创呼吸机辅助通气KJA21402
类风湿因子(RF)测定	CGFG1000			监测	
直接抗人球蛋白(Coombs')试验	CAFH1000				
药物				药物	

法洛四联症

法洛氏四联症根治术-不切右室

适用对象：	病种编码：	HS007			
	主要诊断：	法洛四联症	ICD-10码：	Q21.3	
	主要操作/主要治疗方式：	法洛氏四联症根治术-不切右室	CCHI码：	HKY89311	
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：Q21.3法洛四联症疾病编码。 2. 有适应证，无禁忌证。 3. 无肺动脉闭锁及严重的左、右肺动脉发育不良；无重要冠状动脉分支横跨，影响右心室流出道补片扩大；无异常粗大的体肺侧枝。 4. 年龄大于3岁或体重大于15千克。 5. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径实施时，可以进入路径。				
出院标准：	1. 患者一般情况良好，完成复查项目。 2. 引流管拔除，切口愈合无感染。 3. 没有需要住院处理的并发症。				
最短住院日参考值：	6天				
变异条件：	1. 围手术期并发症等造成住院日延长或费用增加。 2. 手术耗材的选择：由于病情不同，使用不同的内植物和耗材，导致住院费用存在差异。 3. 医师认可的变异原因分析。 4. 其他患者方面的原因等。				
再入院间隔时间：	14天				

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
基本项目					
护理		护理		护理	
Ⅱ级护理	ACAB0001	Ⅰ级护理	ACAC0001	特级护理	ACAD0001
检查		/特级护理	ACAD0001	/Ⅰ级护理	ACAC0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查		/Ⅱ级护理	ACAB0001

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
尿常规化学分析	CCAA2000	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳(TC02)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	麻醉药品	
无创血压监测	FKA05709	血常规	全血细胞计数+3分群 检测CAAA1000或全血 细胞计数+5分类检测 CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群 检测CAAA1000或全血 细胞计数+5分类检测 CAAB1000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000 和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000 和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000 和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定 CECC8000 和总蛋白(TP)测定 CEAA8000 和白蛋白(A1b)测定 CEAE8000 和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	血气分析	CEJM1000	普通二维超声心动图	EDFKA005
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000 和肌酐(Cr)测定 CEEB8000 和尿酸(UA)测定 CEEE8000	活化凝血时间(ACT)测定	CAHF1000	凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测定 CAGC1000或血浆纤维 蛋白原测定 CAGD1000
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000 和氯(Cl)测定 CEJC8000 和总二氧化碳(TC02)测定 CEJD1000 和镁(Mg)测定 CEJE8000 和总钙(Ca)测定 CEJF8000	床旁X线摄影	EABZZ001	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳(TC02)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000 或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定 CAGB1000 或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000 或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	治疗		肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定 CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定 CECD8000
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000 或RhD血型鉴定 CAMF1000	导尿管留置	ABHA0002	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr)测定 CEEB8000和尿酸(UA)测定 CEEE8000
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定 CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定 CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000	氧气吸入	ABJA0001	胸部X线摄影	EABJT001
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000	/氧气雾化吸入	ABKB0001	常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	静脉输液	ABCA0001	血气分析	CEJM1000
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	导尿	ABHA0001	治疗	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	外周动脉穿刺置管术	HL962202	重症监护	ABPB0001

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000	经外周静脉置入中心静脉导管术	ABDA0001	换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
胸部X线摄影	EABJT001	体外循环	HM941301	氧气雾化吸入	ABKB0001
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701 或多通道常规心电图检查FKA03702 或十二通道常规心电图检查FKA03703	经口气管插管术	HAM62401	静脉输液	ABCA0001
普通二维超声心动图	EDFKA005	无创呼吸机辅助通气	KJA21401	监测	
治疗		监测		无创血压监测	FKA05709
一般灌肠	ABGE0001	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902	/有创连续动脉血压监测	HAN05201
吸氧		检测仪中心静脉压测定	FKA02203	心电监护	院内遥测心电监护KKA28701 或无创心电监测FKA05705
监测		心电监护	院内遥测心电监护KKA28701 或无创心电监测FKA05705	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710
无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710	/有创连续动脉血压监测	HAN05201	药物	
药物		无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710	抗生素	
		术中体温监测	HAN05702	血管活性药物	
		麻醉恢复室监护	HAP28901	麻醉镇静、镇痛药物	
		麻醉深度电生理监测	HAP05902	强心药	
		麻醉		利尿剂	

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
		全身麻醉	HAA42901	补钾药	
		手术			
		法洛氏四联症根治术-不切右室	HKY89311		
		病理			
		药物			
		预防性抗菌药物			
		体外循环药物			
		血管活性药物			
		麻醉药			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
粪便常规检查	CCCA3000	尿沉渣镜检	尿沉渣镜检CCBB2000或尿沉渣图像分析CCBC2000或尿有形成分分析CCBD2000		
肺功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404	术中经食管彩色超声心动图监测	EDFKA016	治疗	

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401 或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403 或最大通气量功能检查FJE01404	葡萄糖 (Glu)测定	CEFA8000	临时起搏器安置术	HKT62301
弥散功能检查	肺弥散功能检查—一口气法FJE01405 或肺弥散功能检查—重复呼吸法FJE01406	治疗		静脉输血	ABCD0001
气道阻力测定	FJB02401	物理降温	擦浴降温ABLA0001或贴敷降温ABLB0001或冰帽降温ABLC0001或冰毯降温ABLD0001	加压快速输血	ABCE0001
经皮穿刺插管冠状动脉造影术	EACKU001	静脉输血	ABCD0001	胃管置管术	ABGB0001
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001	加压快速输血	ABCE0001	导尿管留置	ABHA0002
心肌酶	肌酸激酶(CK)测定 CECS1000 和肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定 CECT1000 和乳酸脱氢酶(LD)测定 CECW1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000 和α-羟基丁酸脱氢酶(α-HBD)测定 CECY1000	监测		呼吸机辅助通气	无创呼吸机辅助通气 KJA21401 或有创呼吸机辅助通气 KJA21402
心脏磁共振平扫成像	ECAKA001	肺动脉漂浮导管置入术	FKA05202	药物	
磁共振心脏功能评价	ECAKA002	有创血流动力学监测	HAN05202		

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702 或三通道动态心电图检查FKA03704 或十二通道动态心电图检查FKA03705	药物			
心功能测定	B型钠尿肽 (BNP) 测定CESS1000 和N端-B型钠尿肽前体 (NT-ProBNP) 测定CEST1000				
血气分析	CEJM1000				
治疗					
临时起搏器应用	KKA26701				
药物					
葡萄糖					
术前镇静药					

法洛四联症

法洛氏四联症非跨环补片根治术-切右室

适用对象：	病种编码：	HS008			
	主要诊断：	法洛四联症	ICD-10码：	Q21.3	
	主要操作/主要治疗方式：	法洛氏四联症非跨环补片根治术-切右室	CCHI码：	HKY89312	
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：Q21.3法洛四联症疾病编码。 2. 有适应证，无禁忌证。 3. 无肺动脉闭锁及严重的左、右肺动脉发育不良；无重要冠状动脉分支横跨，影响右心室流出道补片扩大；无异常粗大的体肺侧枝。 4. 年龄大于3岁或体重大于15千克。 5. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径实施时，可以进入路径。				
出院标准：	1. 患者一般情况良好，完成复查项目。 2. 引流管拔除，切口愈合无感染。 3. 没有需要住院处理的并发症。				
最短住院日参考值：	6天				
变异条件：	1. 围手术期并发症等造成住院日延长或费用增加。 2. 手术耗材的选择：由于病情不同，使用不同的内植物和耗材，导致住院费用存在差异。 3. 医师认可的变异原因分析。 4. 其他患者方面的原因等。				
再入院间隔时间：	14天				

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	特级护理	ACAD0001
检查		/特级护理	ACAD0001	/I级护理	ACAC0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查		/II级护理	ACAB0001

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
尿常规化学分析	CCAA2000	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳(TC02)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	麻醉药品	
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000 和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000 和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000 和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定 CECC8000 和总蛋白(TP)测定 CEAA8000 和白蛋白(A1b)测定 CEAE8000 和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEE8000 和肌酐(Cr)测定 CEEB8000 和尿酸(UA)测定 CEEE8000	血气分析	CEJM1000	普通二维超声心动图	EDFKA005
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000 和氯(Cl)测定 CEJC8000 和总二氧化碳(TC02)测定CEJD1000 和镁(Mg)测定 CEJE8000 和总钙(Ca)测定 CEJF8000	活化凝血时间(ACT)测定	CAHF1000	凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000 或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定 CAGB1000 或血浆凝血酶原时间(PT)测定 CAGC1000 或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000	床旁X线摄影	EABZZ001	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳(TC02)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000 或RhD血型鉴定CAMF1000	治疗		肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	导尿管留置	ABHA0002	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	氧气吸入	ABJA0001	胸部X线摄影	EABJT001
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	/氧气雾化吸入	ABKB0001	常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	静脉输液	ABCA0001	血气分析	CEJM1000
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	导尿	ABHA0001	治疗	
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000	外周动脉穿刺置管术	HL962202	重症监护	ABPB0001
胸部X线摄影	EABJT001	经外周静脉置入中心静脉导管术	ABDA0001	换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701 或多通道常规心电图检查FKA03702 或十二通道常规心电图检查FKA03703	体外循环	HM941301	氧气雾化吸入	ABKB0001
普通二维超声心动图	EDFKA005	经口气管插管术	HAM62401	静脉输液	ABCA0001
治疗		无创呼吸机辅助通气	KJA21401	监测	
一般灌肠	ABGE0001	监测		无创血压监测	FKA05709
监测		全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902	/有创连续动脉血压监测	HAN05201
无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710	检测仪中心静脉压测定	FKA02203	心电监护	院内遥测心电监护KKA28701 或无创心电监测FKA05705
无创血压监测	FKA05709	心电监护	院内遥测心电监护KKA28701 或无创心电监测FKA05705	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710
药物		/有创连续动脉血压监测	HAN05201	药物	
		无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710	抗生素	
		术中体温监测	HAN05702	血管活性药物	
		麻醉恢复室监护	HAP28901	麻醉镇静、镇痛药物	
		麻醉深度电生理监测	HAP05902	强心药	
		麻醉		利尿剂	
		全身麻醉	HAA42901	补钾药	
		手术			
		法洛氏四联症非跨环补片根治术-切右室	HKY89312		

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
		病理			
		药物			
		预防性抗菌药物			
		体外循环药物			
		血管活性药物			
		麻醉药			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
粪便常规检查	CCCA3000	尿沉渣镜检	尿沉渣镜检CCBB2000 或尿沉渣图像分析 CCBC2000或尿有形成 分分析CCBD2000		
肺功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活 量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403或最大 通气量功能检查 FJE01404	术中经食管彩色超声 心动图监测	EDFKA016	治疗	
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401 或用力肺活量功能检 查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403 或最大通气量功能检 查FJE01404	葡萄糖 (Glu)测定	CEFA8000	临时起搏器安置术	HKT62301

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
弥散功能检查	肺弥散功能检查--一口气法FJE01405 或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	治疗		静脉输血	ABCD0001
气道阻力测定	FJB02401	物理降温	擦浴降温ABLA0001或 贴敷降温ABLB0001或 冰帽降温ABLC0001或 冰毯降温ABLD0001	加压快速输血	ABCE0001
经皮穿刺插管冠状动脉造影术	EACKU001	静脉输血	ABCD0001	胃管置管术	ABGB0001
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001				
心肌酶	肌酸激酶(CK)测定 CECS1000 和肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定 CECT1000 和乳酸脱氢酶(LD)测定 CECW1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000 和α-羟基丁酸脱氢酶(α-HBD)测定 CECY1000	加压快速输血	ABCE0001	导尿管留置	ABHA0002
心脏磁共振平扫成像	ECAKA001	监测		呼吸机辅助通气	无创呼吸机辅助通气 KJA21401 或有创呼吸机辅助通气 KJA21402
磁共振心脏功能评价	ECAKA002	肺动脉漂浮导管置入术	FKA05202	药物	
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702 或三通道动态心电图检查FKA03704 或十二通道动态心电图检查FKA03705	有创血流动力学监测	HAN05202		
心功能测定	B型钠尿肽(BNP)测定 CESS1000 和N端-B型钠尿肽前体(NT-ProBNP)测定 CEST1000	药物			
血气分析	CEJM1000				

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
治疗					
临时起搏器应用	KKA26701				
药物					
葡萄糖					
术前镇静药					

法洛四联症

法洛氏四联症跨环补片根治术-切右室

适用对象：	病种编码：	HS009			
	主要诊断：	法洛四联症	ICD-10码：	Q21.3	
	主要操作/主要治疗方式：	法洛氏四联症跨环补片根治术-切右室	CCHI码：	HKY89313	
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：Q21.3法洛四联症疾病编码。 2. 有适应证，无禁忌证。 3. 无肺动脉闭锁及严重的左、右肺动脉发育不良；无重要冠状动脉分支横跨，影响右心室流出道补片扩大；无异常粗大的体肺侧枝。 4. 年龄大于3岁或体重大于15千克。 5. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径实施时，可以进入路径。				
出院标准：	1. 患者一般情况良好，完成复查项目。 2. 引流管拔除，切口愈合无感染。 3. 没有需要住院处理的并发症。				
最短住院日参考值：	6天				
变异条件：	1. 围手术期并发症等造成住院日延长或费用增加。 2. 手术耗材的选择：由于病情不同，使用不同的内植物和耗材，导致住院费用存在差异。 3. 医师认可的变异原因分析。 4. 其他患者方面的原因等。				
再入院间隔时间：	14天				

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
基本项目					
护理		护理		护理	
Ⅱ级护理	ACAB0001	Ⅰ级护理	ACAC0001	特级护理	ACAD0001
检查		/特级护理	ACAD0001	/Ⅰ级护理	ACAC0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查		/Ⅱ级护理	ACAB0001

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
尿常规化学分析	CCAA2000	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	麻醉药品	
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000 和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000 和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000 和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定 CECC8000 和总蛋白(TP)测定 CEAA8000 和白蛋白(A1b)测定 CEAE8000 和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	血常规	全血细胞计数+3分群 检测CAAA1000或全血 细胞计数+5分类检测 CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群 检测CAAA1000或全血 细胞计数+5分类检测 CAAB1000
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000 和肌酐(Cr)测定 CEEB8000 和尿酸(UA)测定 CEEE8000	血气分析	CEJM1000	普通二维超声心动图	EDFKA005
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000 和氯(Cl)测定 CEJC8000 和总二氧化碳(TCO2)测定 CEJD1000 和镁(Mg)测定 CEJE8000 和总钙(Ca)测定 CEJF8000	活化凝血时间(ACT)测定	CAHF1000	凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测定 CAGC1000或血浆纤维 蛋白原测定 CAGD1000
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000 或活化部分凝血活酶 时间(APTT)测定 CAGB1000 或血浆凝血酶原时间 (PT)测定CAGC1000 或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000	床旁X线摄影	EABZZ001	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000 或RhD血型鉴定CAMF1000	治疗		肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	导尿管留置	ABHA0002	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	氧气吸入	ABJA0001	胸部X线摄影	EABJT001
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	/氧气雾化吸入	ABKB0001	常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	静脉输液	ABCA0001	血气分析	CEJM1000
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	导尿	ABHA0001	治疗	
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000	外周动脉穿刺置管术	HL962202	重症监护	ABPB0001
胸部X线摄影	EABJT001	经外周静脉置入中心静脉导管术	ABDA0001	换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701 或多通道常规心电图检查FKA03702 或十二通道常规心电图检查FKA03703	体外循环	HM941301	氧气雾化吸入	ABKB0001
普通二维超声心动图	EDFKA005	经口气管插管术	HAM62401	静脉输液	ABCA0001
治疗		无创呼吸机辅助通气	KJA21401	监测	
一般灌肠	ABGE0001	监测		无创血压监测	FKA05709
监测		全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902	/有创连续动脉血压监测	HAN05201
无创血压监测	FKA05709	检测仪中心静脉压测定	FKA02203	心电监护	院内遥测心电监护KKA28701 或无创心电监测FKA05705
无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710	心电监护	院内遥测心电监护KKA28701 或无创心电监测FKA05705	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710
药物		/有创连续动脉血压监测	HAN05201	药物	
		无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710	抗生素	
		术中体温监测	HAN05702	血管活性药物	
		麻醉恢复室监护	HAP28901	麻醉镇静、镇痛药物	
		麻醉深度电生理监测	HAP05902	强心药	
		麻醉		利尿剂	
		全身麻醉	HAA42901	补钾药	
		手术			
		法洛氏四联症跨环补片根治术-切右室	HKY89313		
		病理			

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
		药物			
		预防性抗菌药物			
		体外循环药物			
		血管活性药物			
		麻醉药			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
粪便常规检查	CCCA3000	尿沉渣镜检	尿沉渣镜检CCBB2000 或尿沉渣图像分析 CCBC2000或尿有形成 分分析CCBD2000	经皮穿刺插管左心室 造影术	EACKJ001
肺功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活 量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403或最大 通气量功能检查 FJE01404	术中经食管彩色超声 心动图监测	EDFKA016	经皮穿刺插管右心室 造影术	EACKK001
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401 或用力肺活量功能检 查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403 或最大通气量功能检 查FJE01404	葡萄糖 (Glu)测定	CEFA8000	治疗	

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
弥散功能检查	肺弥散功能检查--一口气法FJE01405 或肺弥散功能检查--重复呼吸法FJE01406	治疗		临时起搏器安置术	HKT62301
气道阻力测定	FJB02401	物理降温	擦浴降温ABLA0001或 贴敷降温ABLB0001或 冰帽降温ABLC0001或 冰毯降温ABLD0001	静脉输血	ABCD0001
经皮穿刺插管冠状动脉造影术	EACKU001	静脉输血	ABCD0001	加压快速输血	ABCE0001
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001	加压快速输血	ABCE0001	胃管置管术	ABGB0001
心肌酶	肌酸激酶(CK)测定 CECS1000 和肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定 CECT1000 和乳酸脱氢酶(LD)测定 CECW1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000 和α-羟基丁酸脱氢酶(α-HBD)测定 CECY1000	监测			
心脏磁共振平扫成像	ECAKA001	肺动脉漂浮导管置入术	FKA05202	导尿管留置	ABHA0002
磁共振心脏功能评价	ECAKA002	有创血流动力学监测	HAN05202	呼吸机辅助通气	无创呼吸机辅助通气 KJA21401 或有创呼吸机辅助通气 KJA21402
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702 或三通道动态心电图检查FKA03704 或十二通道动态心电图检查FKA02705	药物		药物	
心功能测定	B型钠尿肽(BNP)测定 CESS1000 和N端-B型钠尿肽前体(NT-ProBNP)测定 CEST1000				

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
血气分析	CEJM1000				
治疗					
临时起搏器应用	KKA26701				
药物					
葡萄糖					
术前镇静药					

升主动脉瘤

升主动脉根部瘤切除主动脉根部替换术

适用对象：	病种编码：	HS010			
	主要诊断：	升主动脉瘤	ICD-10码：	I71.201	
	主要操作/主要治疗方式：	升主动脉瘤切除升主动脉替换术	CCHI码：	HLC66309	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10:I71.201升主动脉瘤/升主动脉夹层动脉瘤疾病编码。 2. 升主动脉瘤样扩张，直径大于5cm。 3. 主动脉窦部正常，主动脉弓部正常，主动脉瓣无明显病变。 4. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 体温正常，血常规、电解质检查无明显异常。 2. 引流管拔除、切口愈合无感染。 3. 没有需要住院处理的并发症和/或其他合并症。 5. 胸部X线平片、超声心动图、CT或MRI证实人工血管通畅，无相关并发症。			
	最短住院日参考值：	6天			
	变异条件：	1. 围手术期并发症：心功能不全、出血、感染性心内膜炎、术后伤口感染、重要脏器功能不全等造成住院日延长和费用增加。 2. 合并有其他系统疾病，可能出现合并疾病加重而需要治疗，从而延长治疗时间和增加住院费用。 3. 人工血管的选择：根据患者的病情，使用不同的人工血管，导致住院费用存在差异。 4. 其他因素：术前心功能及其他重要脏器功能不全需调整；特殊原因（如稀有血型短缺等）造成的住院时间延长费用增加。			
	再入院间隔时间：	14天			

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	特级护理	ACAD0001
检查		/特级护理	ACAD0001	/I级护理	ACAC0001

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查		/ II 级护理	ACAB0001
尿常规化学分析	CCAA2000	电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定CEJB8000 和氯 (Cl) 测定CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2) 测定CEJD1000 和镁 (Mg) 测定CEJE8000 和总钙 (Ca) 测定CEJF8000	麻醉药品	
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定CECB1000 和总胆红素 (T-Bil) 测定CELA1000 和直接胆红素 (D-Bil) 测定CELB1000 和 γ-谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定CECC8000 和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000 和白蛋白 (A1b) 测定CEAE8000 和碱性磷酸酶 (ALP) 测定CECD8000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定CEEA8000 和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000 和尿酸 (UA) 测定CEEE8000	血气分析	CEJM1000	尿常规化学分析	CCAA2000

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定CEJB8000 和氯(Cl)测定CEJC8000 和总二氧化碳(TC02)测定CEJD1000 和镁(Mg)测定CEJE8000 和总钙(Ca)测定CEJF8000	活化凝血时间(ACT)测定	CAHF1000	凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000 或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000 或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000 或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000 和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000 和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000 和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000 和总蛋白(TP)测定CEAA8000 和白蛋白(A1b)测定CEAE8000 和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TC02)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000 或RhD血型鉴定CAMF1000	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEE8000 和肌酐(Cr)测定CEEB8000 和尿酸(UA)测定CEEE8000	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定 CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定 CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000	床旁X线摄影	EABZZ001	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEE8000和肌酐(Cr) 测定CEE8000和尿酸 (UA)测定CEE8000
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000 和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000 和乙肝病毒表面抗原确认试验 (HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000 和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定 CGLK1000 和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定 CGLL1000	治疗		胸部X线摄影	EABJT001
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	导尿管留置	ABHA0002	常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	氧气吸入	ABJA0001	普通二维超声心动图	EDFKA005
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	/氧气雾化吸入	ABKB0001	血气分析	CEJM1000
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000	静脉输液	ABCA0001	胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001
胸部X线摄影	EABJT001	导尿	ABHA0001	/心脏磁共振平扫成像	ECAKA001

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701 或多通道常规心电图检查FKA03702 或十二通道常规心电图检查FKA03703	外周动脉穿刺置管术	HL962202	治疗	
普通二维超声心动图	EDFKA005	经外周静脉置入中心静脉导管术	ABDA0001	重症监护	ABPB0001
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	体外循环	HM941301	换药	换药(小)ABFA0001或 换药(中)ABFA0002或 换药(大)ABFA0003或 换药(特大)ABFA0004
粪便常规检查	CCCA3000	经口气管插管术	HAM62401	氧气雾化吸入	ABKB0001
隐血试验	CCCB8000	无创呼吸机辅助通气	KJA21401	静脉输液	ABCA0001
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001	监测		院内遥测心电监护	KKA28701
治疗		生命体征监测	有创连续动脉血压监测HAN05201或有创血流动力学监测 HAN05202或无创血流动力学监测HAN05701 或全身麻醉下呼吸功能监测HAN05902	监测	
一般灌肠	ABGE0001	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902	无创血压监测	FKA05709
药物		检测仪中心静脉压测定	FKA02203	/有创连续动脉血压监测	HAN05201
		无创心电监测	FKA05705	/无创心电监测	FKA05705
		/有创连续动脉血压监测	HAN05201	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710
		无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710	病理	
		术中体温监测	HAN05702	手术标本病理诊断	BCAD0001
		麻醉恢复室监护	HAP28901	药物	

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
		麻醉深度电生理监测	HAP05902	抗菌药物	
		麻醉		镇痛药物	
		全身麻醉	HAA42901	血管活性药物	
		手术			
		升主动脉瘤切除升主动脉替换术	HLC66309		
		病理			
		快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001		
		药物			
		抗菌药物			
		体外循环药物			
		麻醉药			
		血管活性药物			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
心脏磁共振平扫成像	ECAKA001	术中经食管彩色超声心动图监测	EDFKA016		
肺功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404	尿沉渣镜检	尿沉渣镜检CCBB2000或尿沉渣图像分析CCBC2000或尿有形成分分析CCBD2000	治疗	

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401 或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403 或最大通气量功能检查FJE01404	葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000	临时起搏器安置术	HKT62301
肺弥散功能检查	肺弥散功能检查--一口气法FJE01405 或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	治疗		临时起搏器应用	KKA26701
气道阻力测定	FJB02401	物理降温	擦浴降温ABLA0001或 贴敷降温ABLB0001或 冰帽降温ABLC0001或 冰毯降温ABLD0001	静脉输血	ABCD0001
血气分析	CEJM1000	静脉输血	ABCD0001	加压快速输血	ABCE0001
经皮穿刺插管冠状动脉造影术	EACKU001	加压快速输血	ABCE0001	胃管置管术	ABGB0001
头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001	监测		导尿管留置	ABHA0002
心肌酶	肌酸激酶(CK)测定 CECS1000 和肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定 CECT1000 和乳酸脱氢酶(LD)测定 CECW1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000 和α-羟基丁酸脱氢酶(α-HBD)测定 CECY1000	肺动脉漂浮导管置入术	FKA05202	呼吸机辅助通气	无创呼吸机辅助通气 KJA21401 或有创呼吸机辅助通气 KJA21402
脑血管检查		有创血流动力学监测	HAN05202	药物	

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702 或三通道动态心电图检查FKA03704 或十二通道动态心电图检查FKA03705	药物		强心利尿剂	
血管超声造影	EDCM9001	强心药		补钾药	
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	利尿剂			
治疗					
药物					

主动脉瓣病变

主动脉瓣置换术

适用对象：	病种编码：	HS011	ICD-10码：I06.0–I06.2, I06.8, I06.9, I35.0–I35.2, I35.8, I35.9, Q23.0–Q23.1, Q23.801+Q23.804, Q23.900
	主要诊断：	主动脉瓣病变	
	主要操作/主要治疗方式：	主动脉瓣置换术	CCHI码：HKR66301
入院标准：	1. 第一诊断必须符合心脏主动脉瓣病变ICD-10: I06.0–I06.2, I06.8, I06.9, I35.0–I35.2, I35.8, I35.9, Q23.0–Q23.1, Q23.801+Q23.804, Q23.900疾病编码。 2. 有适应证，无禁忌证。 3. 心功能≤III级或射血分数EF≥45%。 4. 主动脉瓣关闭不全患者，左室舒张末径≤75毫米。 5. 患者选择置换人工机械瓣。 6. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径实施时，可以进入路径。 7. 有主动脉瓣手术史，主动脉瓣直视成形术或主动脉瓣替换术后。		
出院标准：	1. 体温正常，血常规、电解质无明显异常。 2. 引流管拔除、切口愈合无感染。 3. 没有需要住院处理的并发症和/或其他合并症。 4. 抗凝基本稳定。 5. 胸部X线平片、超声心动图证实人工机械瓣功能良好，无相关并发症。		
最短住院日参考值：	7天（术后最短5天）		
变异条件：	1. 围手术期并发症：主动脉根部出血、人工瓣功能障碍、心功能不全、瓣周漏、与抗凝相关的血栓栓塞和出血、溶血、感染性心内膜炎、术后伤口感染、重要脏器功能不全等造成住院日延长和费用增加。 2. 合并有其他系统疾病加重而需要治疗，从而延长治疗时间和增加住院费用。 3. 人工机械瓣的选择：患者选择不同的机械瓣（国产和进口）导致住院费用存在差异。 4. 合并心房纤颤等严重心律失常者，住院日延长和费用增加。 5. 非常规路径(胸骨正中切口)的各类微创术式，导致住院费用存在差异。 6. 其他因素：术前心功能及其他重要脏器功能不全需调整，特殊原因（如稀有血型短缺等）造成的住院时间延长费用增加。		
再入院间隔时间：	14天		

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
基本项目					
护理		护理		护理	
Ⅱ级护理	ACAB0001	特级护理	ACAD0001	特级护理	ACAD0001
检查		/Ⅰ级护理	ACAC0001	/Ⅰ级护理	ACAC0001

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查		/ II 级护理	ACAB0001
尿常规化学分析	CCAA2000	电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测定CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定CEJD1000和镁 (Mg) 测定CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000	麻醉药品	
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定CECB1000 和总胆红素 (T-Bil) 测定CELA1000 和直接胆红素 (D-Bil) 测定CELB1000 和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定CECC8000 和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000 和白蛋白 (A1b) 测定CEAE8000 和碱性磷酸酶 (ALP) 测定CECD8000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定CEEA8000 和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000 和尿酸 (UA) 测定CEEE8000	血气分析	CEJM1000	尿常规化学分析	CCAA2000
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定CEJB8000 和氯 (Cl) 测定CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2) 测定CEJD1000 和镁 (Mg) 测定CEJE8000 和总钙 (Ca) 测定CEJF8000	凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定CAGA1000 或活化部分凝血活酶时间 (APTT) 测定CAGB1000 或血浆凝血酶原时间 (PT) 测定CAGC1000 或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间 (APTT) 测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间 (PT) 测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
		肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红 素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶 (GGT) 测 定CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和 白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶 (ALP) 测定 CECD8000	电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测 定CEJC8000和总二氧 化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测 定CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定 CAGA1000 或活化部分凝血活酶 时间 (APTT) 测定 CAGB1000 或血浆凝血酶原时间 (PT) 测定CAGC1000 或血浆纤维蛋白原测 定CAGD1000	肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红 素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶 (GGT) 测 定CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和 白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶 (ALP) 测定 CECD8000
血型鉴定	ABO血型鉴定 (正定 型) CAMA1000 或ABO血型鉴定 (反定 型) CAMB1000 或ABO亚型鉴定 (正定 型) CAMD1000 或ABO亚型鉴定 (反定 型) CAME1000 或RhD血型鉴定 CAMF1000	床旁X线摄影	EABZZ001	肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000
		治疗		胸部X线摄影	EABJT001

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定 CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定 CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000	导尿管留置	ABHA0002	常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000 和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000 和乙肝病毒表面抗原确认试验 (HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000 和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定 CGLK1000 和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定 CGLL1000	氧气吸入	ABJA0001	普通二维超声心动图	EDFKA005
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	/氧气雾化吸入	ABKB0001	心脏彩色多普勒超声	EDFKA007
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	静脉输液	ABCA0001	血气分析	CEJM1000
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	导尿	ABHA0001	治疗	
		换药	换药(小) ABFA0001或 换药(中) ABFA0002或 换药(大) ABFA0003或 换药(特大) ABFA0004		
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000	外周动脉穿刺置管术	HL962202	重症监护	ABPB0001
风湿活动筛查	红细胞沉降率(ESR)测定 CAAJ1000 或抗链球菌溶血素O(ASO)测定 CGPB1000 或类风湿因子(RF)测定 CGFG1000或超敏C反应蛋白(hs-CRP)测定 CEAU1000	经外周静脉置入中心静脉导管术	ABDA0001	换药	换药(小) ABFA0001或 换药(中) ABFA0002或 换药(大) ABFA0003或 换药(特大) ABFA0004

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
胸部X线摄影	EABJT001	/体外循环	HM941301	氧气雾化吸入	ABKB0001
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701 或多通道常规心电图检查FKA03702 或十二通道常规心电图检查FKA03703	经口气管插管术	HAM62401	静脉输液	ABCA0001
普通二维超声心动图	EDFKA005	无创呼吸机辅助通气	KJA21401	常规抗凝治疗	
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	监测		院内遥测心电监护	KKA28701
治疗		生命体征监测	有创连续动脉血压监测HAN05201或有创血流动力学监测HAN05202或无创血流动力学监测HAN05701或全身麻醉下呼吸功能监测HAN05902	监测	
		全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902	无创血压监测	FKA05709
一般灌肠	ABGE0001	检测仪中心静脉压测定	FKA02203	/有创连续动脉血压监测	HAN05201
药物		无创心电监测	FKA05705	/无创心电监测	FKA05705
		有创血流动力学监测	HAN05202	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710
		/有创连续动脉血压监测	HAN05201	抗凝监测	
		无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710	病理	
		术中体温监测	HAN05702	手术标本病理诊断	BCAD0001
		麻醉恢复室监护	HAP28901	药物	
		麻醉深度电生理监测	HAP05902	抗菌药物	
		麻醉		强心利尿剂	
		全身麻醉	HAA42901	镇痛药物	

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
		手术		血管活性药物	
		主动脉瓣置换术	HKR66301	抗凝治疗	
		病理			
		快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001		
		药物			
		抗菌药物			
		体外循环药物			
		强心药			
		利尿剂			
		胃粘膜保护剂			
		麻醉药			
		血管活性药物			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404	尿沉渣镜检	尿沉渣镜检CCBB2000或尿沉渣图像分析CCBC2000或尿有形成分分析CCBD2000		

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
弥散功能检查	肺弥散功能检查--一口气法FJE01405或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000	治疗	
气道阻力测定	FJB02401	术中经食管彩色超声心动图监测	EDFKA016	临时起搏器安置术	HKT62301
血气分析	CEJM1000	治疗		临时起搏器应用	KKA26701
经皮穿刺插管冠状动脉造影术	EACKU001	物理降温	擦浴降温ABLA0001或贴敷降温ABLB0001或冰帽降温ABLC0001或冰毯降温ABLD0001	静脉输血	ABCD0001
头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001	静脉输血	ABCD0001	加压快速输血	ABCE0001
心肌酶	肌酸激酶(CK)测定CECS1000和肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定CECT1000和乳酸脱氢酶(LD)测定CECW1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和α羟基丁酸脱氢酶(α-HBD)测定CECY1000	加压快速输血	ABCE0001	胃管置管术	ABGB0001
血管超声造影	EDCM9001	监测		导尿管留置	ABHA0002
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702或三通道动态心电图检查FKA03704或十二通道动态心电图检查FKA03705	肺动脉漂浮导管置入术	FKA05202	呼吸机辅助通气	无创呼吸机辅助通气KJA21401或有创呼吸机辅助通气KJA21402
粪便常规检查	CCCA3000	药物		药物	
冠状动脉CT三维成像	EBCKU002	镇痛药物			

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
肺功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活 量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403或最大 通气量功能检查 FJE01404				
脑血管检查					
治疗					
药物					
强心药物					
利尿剂物					

不稳定型心绞痛

经皮冠状动脉支架置入术

适用对象：	病种编码	HS012			
	主要诊断：	不稳定型心绞痛	ICD-10码：	I20.0	
	主要操作/主要治疗方式：	经皮冠状动脉支架置入术	CCHI码：	HKU80202	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：I20.0不稳定性心绞痛疾病编码。 2. 除外心肌梗死、主动脉夹层、急性肺栓塞、急性心包炎等疾病。 3. 如患有其他非心血管疾病，但在住院期间不需特殊处理（检查和治疗），也不影响第一诊断时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 生命体征平稳。 2. 血流动力学稳定。 3. 心肌缺血症状得到有效控制。 4. 无其他需要继续住院的并发症。			
	最短住院日参考值：	7天			
	变异条件：	1. 冠脉造影后转外科行急诊冠状动脉旁路移植术。 2. 等待二次PCI或择期冠状动脉旁路移植术。 3. 病情危重。 4. 出现严重并发症。			
	再入院时间间隔要求：	14天			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
特级护理	ACAD0001	I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001
检查		特级护理	ACAD0001	特级护理	ACAD0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查		检查	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
粪便常规检查	CCCA3000	经皮穿刺插管冠状动脉造影术	EACKU001	麻醉药品	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或常规心电图检查FKA03703
隐血试验	CCCB8000	监测		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000或血浆D-二聚体(D-Dimer)测定 CAJY1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710	尿常规化学分析	CCAA2000
尿常规化学分析	CCAA2000	无创血压监测	FKA05709	肌钙蛋白T(TnT)测定	CEAX1000
尿酮体定性试验	CCAM2000	心电监测	心电监测远程传输FKA05704或无创心电监测FKA05705	肌钙蛋白 I (TnI)测定	CEAY1000
肌酸激酶(CK)测定	CECS1000	麻醉		肌红蛋白(Mb)测定	CEAZ8000
肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定	CECT1000	局部麻醉	HAB	治疗	
肝功能检查	内氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定 CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定 CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定 CECD8000	手术			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEE8000或肌酐(Cr) 测定CEE8000或尿酸 (UA)测定CEE8000	经皮冠状动脉支架置 入术	HKU80202	监测	
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	药物		生命体征监测	有创连续动脉血压监 测HAN05201或有创血 流动力学监测 HAN05202或无创血流 动力学监测HAN05701 或全身麻醉下呼吸功 能监测HAN05902
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	抗血栓药物		心电监测	心电监测远程传输 FKA05704或无创心电 监测FKA05705
血脂四项	“甘油三酯(TG)测定 CEHB1000 和总胆固 醇(TC)测定CEHA1000 和高密度脂蛋白胆固 醇(HDL-C)测定 CEHC1000 和低密度 脂蛋白胆固醇(LDL- C)测定CEHD1000”	血管活性药物			
胸部X线摄影	EABJT001	抗心律失常药物			
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或常规心电 图检查FKA03703	钙拮抗剂			
普通二维超声心动图	EDFKA005	硝酸酯类			
肌钙蛋白T(TnT)测定	CEAX1000	β受体阻滞剂			
肌钙蛋白 I (TnI)测 定	CEAY1000	抗血小板药物			
肌红蛋白(Mb)测定	CEAZ8000	抗菌药物			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000				
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000				
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
治疗					
静脉采血	ABBB0001				
氧气吸入	ABJA0001				
监测					
无创血压监测	FKA05709				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
血气分析	CEJM1000			粪便常规检查	CCCA3000
B型钠尿肽(BNP)测定	CESS1000	治疗		隐血试验	CCCB8000
红细胞沉降率(ESR)测定	CAAJ1000			肝功能检查	内氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000
超敏C反应蛋白(hs-CRP)测定	CEAU1000	药物		肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEE8000或肌酐(Cr)测定 CEEB8000或尿酸(UA)测定 CEEE8000
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702或三通道动态心电图检查 FKA03704或十二通道动态心电图检查 FKA03705			电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙(Ca)测定 CEJE8000
心电图平板负荷试验	FKA04702			葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
负荷心肌灌注断层显像	运动法负荷心肌灌注断层显像EECKC002或药物法负荷心肌灌注断层显像EECKC003			凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000			普通二维超声心动图	EDFKA005
监测				胸部X线摄影	EABJT001
无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710			血气分析	CEJM1000
药物				治疗	
抗菌药物					
抗血小板药物				药物	
GPIIb/IIIa受体拮抗剂					
抗凝血药					
β受体阻滞剂					
硝酸酯类药物					
钙拮抗剂					
镇静止痛药					
抗心律失常药物					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
调脂药物（他汀类药物）					
血管紧张素转换酶抑制剂（ACEI）或血管紧张素转换酶受体拮抗剂（ARB）					

慢性稳定性心绞痛

经皮冠状动脉支架置入术

适用对象：	病种编码	HS013		
适用对象：	主要诊断：	慢性稳定性心绞痛	ICD-10码：I20.806	
	主要操作/主要治疗方式：	经皮冠状动脉支架置入术	CCHI码：HKU80202	
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：I20.806慢性稳定性心绞痛疾病编码。 2. 除外心肌梗塞、主动脉夹层、急性肺栓塞等疾病。 3. 如患有其他非心血管疾病，但在住院期间不需特殊处理（检查和治疗），也不影响第一诊断时，可以进入路径。 4. 适用于择期PCI者，不适用于STEMI发病<12小时患者。			
出院标准：	1. 生命体征稳定，无心肌缺血发作。 2. 穿刺部位愈合良好。 3. 无其他需要继续住院的并发症。			
最短住院日参考值：	≤6天			
变异条件：	1. 冠脉造影后转外科行急诊冠状动脉旁路移植术。 2. 等待二次PCI或择期冠状动脉旁路移植术。 3. PCI术中出现并发症转入CCU。 4. 造影冠脉正常，需进一步检查明确诊断。 5. 药物保守治疗，观察治疗效果。			
再入院时间间隔要求：	14天			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001
II 级护理	ACAB0001	/ II 级护理	ACAB0001	II 级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或常规心电图检查FKA03703	麻醉药品	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或常规心电图检查FKA03703

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
尿常规化学分析	CCAA2000	经皮穿刺插管冠状动脉造影术	EACKU001	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
尿酮体定性试验	CCAM2000	治疗		尿常规化学分析	CCAA2000
粪便常规检查	CCCA3000			肌钙蛋白T (TnT) 测定	CEAX1000
隐血试验	CCCB8000	监测		肌钙蛋白 I (TnI) 测定	CEAY1000
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间 (APTT) 测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间 (PT) 测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000或血浆D-二聚体 (D-Dimer) 测定 CAJY1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710	肌红蛋白 (Mb) 测定	CEAZ8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (Alb) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000	无创血压监测	FKA05709	监测	
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000或肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000或尿酸 (UA) 测定CEEE8000	心电监测	心电监测远程传输 FKA05704或无创心电监测FKA05705	生命体征监测	有创连续动脉血压监测HAN05201或有创血流动力学监测 HAN05202或无创血流动力学监测HAN05701或全身麻醉下呼吸功能监测HAN05902
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测定 CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测定 CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000	无创心电监测	FKA05705	心电监测	心电监测远程传输 FKA05704或无创心电监测FKA05705

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	麻醉		治疗	
肌钙蛋白T(TnT)测定	CEAX1000	局部麻醉	HAB		
肌钙蛋白 I (TnI)测定	CEAY1000	手术		药物	
肌红蛋白(Mb)测定	CEAZ8000	经皮冠状动脉支架置入术	HKU80202	他汀类药物	
肌酸激酶(CK)测定	CECS1000	药物		抗血小板药物	
肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定	CECT1000	β 受体阻滞剂		β 受体阻滞剂	
血脂四项	“甘油三酯(TG)测定CEHB1000 和总胆固醇(TC)测定CEHA1000 和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定CEHC1000 和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定CEHD1000”	硝酸酯类药物		ACEI或ARB	
胸部X线摄影	EABJT001	抗菌药、抗血小板聚集药		钙拮抗剂	
普通二维超声心动图	EDFKA005	他汀类药物		硝酸酯类药物	
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或常规心电图检查FKA03703	钙拮抗剂			
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	ACEI或ARB			
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000				
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		治疗		检查	
血气分析	CEJM1000			粪便常规检查	CCCA3000
B型钠尿肽 (BNP) 测定	CESS1000			隐血试验	CCCB8000
红细胞沉降率 (ESR) 测定	CAAJ1000			肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (Alb) 测定CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定CECD8000
C-反应蛋白 (CRP) 测定	CGCA1000			肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定CEEA8000或肌酐 (Cr) 测定CEEB8000或尿酸 (UA) 测定CEEE8000
/超敏C反应蛋白 (hs-CRP) 测定	CEAU1000			电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000和钠 (Na) 测定
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702或三通道动态心电图检查FKA03704或十二通道动态心电图检查FKA03705			葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000
心电图平板负荷试验	FKA04702			凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定CAGA1000或活化部分
负荷心肌灌注断层显像	运动法负荷心肌灌注断层显像EECKC002或药物法负荷心肌灌注断层显像EECKC003			普通二维超声心动图	EDFKA005

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血			胸部X线摄影	EABJT001
药物				血气分析	CEJM1000
β 受体阻滞剂					
硝酸酯类药物					
钙拮抗剂					
阿斯匹林					
抗血小板药物					
他汀类药物					
血管紧张素转换酶抑制剂（ACEI）或ARB					

抗凝血药

急性非ST段抬高性心肌梗死

冠状动脉内支架置入术

适用对象：	病种编码	HS014		
适用对象：	主要诊断：	急性非ST段抬高性心肌梗死	ICD-10码：I21.4	
	主要操作/主要治疗方式：	经皮冠状动脉支架置入术	CCHI码：HKU80202	
入院标准：	1. 第一诊断必须符合急性非ST段抬高性心肌梗死（ICD-10：I21.4）疾病编码。 2. 除外主动脉夹层、急性肺栓塞、心包炎等疾病。 3. 如患有其他非心血管疾病，但在住院期间不需特殊处理（检查和治疗），也不影响第一诊断时，可以进入路径。			
出院标准：	1. 生命体征平稳，心肌缺血症状得到有效控制，心功能稳定。 2. 血流动力学稳定。 3. 心电稳定。 4. 无其他需要继续住院处理的并发症。			
最短住院日参考值：	7天			
变异条件：	1. 冠脉造影后转外科行急诊冠状动脉旁路移植术。 2. 等待二次PCI或择期冠状动脉旁路移植术。 3. 病情危重。 4. 出现严重并发症。			
再入院时间间隔要求：	14天			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
特级护理	ACAD0001	特级护理	ACAD0001	II级护理	ACAB0001
检查		检查		特级护理	ACAD0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	经皮穿刺插管冠状动脉造影术	EACKU001	检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	监测		麻醉药品	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或常规心电图检查FKA03703

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
尿酮体定性试验	CCAM2000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
粪便常规检查	CCCA3000	无创血压监测	FKA05709	尿常规化学分析	CCAA2000
隐血试验	CCCB8000	心电监测	心电监测远程传输 FKA05704或无创心电监测FKA05705	肌钙蛋白T (TnT) 测定	CEAX1000
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间 (APTT) 测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间 (PT) 测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000或血浆D-二聚体 (D-Dimer) 测定 CAJY1000	麻醉		肌钙蛋白 I (TnI) 测定	CEAY1000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定 CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定 CEAA8000和白蛋白 (Alb) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000	局部麻醉	HAB	肌红蛋白 (Mb) 测定	CEAZ8000
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000或肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000或尿酸 (UA) 测定 CEEE8000	手术		粪便常规检查	CCCA3000
电解质测定	钾 (K) 测定 CEJA8000和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测定 CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测定 CEJE8000和总钙 (Ca) 测定 CEJF8000	经皮冠状动脉支架置入术	HKU80202	凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间 (APTT) 测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间 (PT) 测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000或血浆D-二聚体 (D-Dimer) 测定 CAJY1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000	药物		肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (Alb) 测定CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定CECD8000
肌酸激酶 (CK) 测定	CECS1000	抗血栓药物		肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定CEEA8000或肌酐 (Cr) 测定CEEB8000或尿酸 (UA) 测定CEEE8000
肌酸激酶-MB同工酶活性 (CK-MB) 测定	CECT1000	血管活性药物		普通二维超声心动图	EDFKA005
血脂四项	甘油三酯 (TG) 测定CEHB1000 和总胆固醇 (TC) 测定CEHA1000 和高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C) 测定CEHC1000 和低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C) 测定CEHD1000	抗心律失常药物		胸部X线摄影	EABJT001
胸部X线摄影	EABJT001			床旁X线摄影	EABZZ001
普通二维超声心动图	EDFKA005			治疗	
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或常规心电图检查FKA03703			氧气吸入	ABJA0001
肌钙蛋白T (TnT) 测定	CEAX1000			监测	
肌钙蛋白 I (TnI) 测定	CEAY1000			生命体征监测	有创连续动脉血压监测HAN05201或有创血流动力学监测HAN05202或无创血流动力学监测HAN05701或全身麻醉下呼吸功能监测HAN05902

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肌红蛋白(Mb)测定	CEAZ8000			心电监测	心电监测远程传输 FKA05704或无创心电 监测FKA05705
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000			药物	
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000			抗凝血药	
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000			硝酸酯类药物	
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000			他汀类药物	
治疗				β受体阻滞剂	
静脉采血	ABBB0001			ACEI或ARB	
院内遥测心电监护	KKA28701			钙拮抗剂	
监测				抗菌药、抗血小板聚 集药	
无创心电监测	FKA05705				
无创指脉血氧饱和度 监测	FKA05710				
药物					
抗血小板药物					
麻醉药品					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		治疗		检查	
血气分析	CEJM1000			隐血试验	CCCB8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
B型钠尿肽 (BNP) 测定	CESS1000			电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测定CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测定CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000
红细胞沉降率 (ESR) 测定	CAAJ1000			葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000
C-反应蛋白 (CRP) 测定	CGCA1000			血气分析	CEJM1000
/超敏C反应蛋白 (hs-CRP) 测定	CEAU1000			监测	
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702或三通道动态心电图检查 FKA03704或十二通道动态心电图检查 FKA03705			有创血流动力学监测	HAN05202
心电图平板负荷试验	FKA04702			/无创血流动力学监测	HAN05701
负荷心肌灌注断层显像	运动法负荷心肌灌注断层显像EECKC002或 药物法负荷心肌灌注断层显像EECKC003			主动脉内球囊反搏 (IABP) 运行监测	HLB05901
血型鉴定	ABO血型鉴定 (正定型) CAMA1000或ABO血型鉴定 (反定型) CAMB1000或ABO亚型鉴定 (正定型) CAMD1000或ABO亚型鉴定 (反定型) CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000			药物	
药物					
抗凝血药					
硝酸酯类药物					
钙拮抗剂					
抗菌药物					
抗血小板聚集药					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
GPIIb/IIIa受体拮抗剂					
他汀类药物					
血管紧张素转换酶抑制剂（ACEI）或ARB					
肝素或抗凝血药					

急性ST段抬高性心肌梗死

冠状动脉内支架置入术

适用对象：	病种编码	HS015		
适用对象：	主要诊断：	急性ST段抬高性心肌梗死	ICD-10码： I21. 3	
	主要操作/主要治疗方式：	经皮冠状动脉支架置入术	CCHI码： HKU80202	
入院标准：	1. 第一诊断必须符合急性ST段抬高性心肌梗死（ICD-10： I21.3）疾病编码。 2. 除外主动脉夹层、急性肺栓塞等疾病或严重机械性并发症者； 3. 当患者同时具有其他疾病诊断时，如在住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施，可以进入路径。			
出院标准：	1. 生命体征平稳，心肌缺血症状得到有效控制，心功能稳定。 2. 血流动力学稳定。 3. 心电稳定。 4. 心功能稳定； 5. 心肌缺血症状得到有效控制。			
最短住院日参考值：	7天			
变异条件：	1. 冠状动脉造影后转外科行急诊冠脉搭桥； 2. 等待二次择期PCI； 3. 有合并症、病情危重不能出CCU和出院； 4. 等待择期CABG； 5. 患者拒绝出院。			
再入院时间间隔要求：	14天			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
特级护理	ACAD0001	特级护理	ACAD0001	II级护理	ACAB0001
检查		检查		特级护理	ACAD0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			检查	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
隐血试验	CCCB8000	监测		麻醉药品	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或常规心电图检查FKA03703
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000或血浆D-二 聚体(D-Dimer)测定 CAJY1000	无创指脉血氧饱和度 监测	FKA05710	血常规	全血细胞计数+3分群 检测CAAA1000或全血 细胞计数+5分类检测 CAAB1000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000	无创血压监测	FKA05709	尿常规化学分析	CCAA2000
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000或肌酐(Cr) 测定CEEB8000或尿酸 (UA)测定CEEE8000	心电监测	心电监测远程传输 FKA05704或无创心电 监测FKA05705	肌钙蛋白T(TnT)测定	CEAX1000
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧化 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	麻醉		肌钙蛋白 I (TnI)测 定	CEAY1000
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	局部麻醉	HAB	肌红蛋白(Mb)测定	CEAZ8000
肌酸激酶(CK)测定	CECS1000	手术		粪便常规检查	CCCA3000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定	CECT1000	经皮冠状动脉支架置入术	HKU80202	凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000或血浆D-二聚体(D-Dimer)测定 CAJY1000
胸部X线摄影	EABJT001	药物		肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定 CECC8000和总蛋白(TP)测定 CEAA8000和白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定 CECD8000
普通二维超声心动图	EDFKA005	抗凝药物		肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000或肌酐(Cr)测定 CEEB8000或尿酸(UA)测定 CEEE8000
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或常规心电图检查FKA03703	抗血小板药物		普通二维超声心动图	EDFKA005
肌钙蛋白T(TnT)测定	CEAX1000	抗心律失常药物		胸部X线摄影	EABJT001
肌钙蛋白 I (TnI) 测定	CEAY1000	血管活性药物		床旁X线摄影	EABZZ001
肌红蛋白(Mb)测定	CEAZ8000			治疗	
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000			氧气吸入	ABJA0001
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000			监测	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000			生命体征监测	有创连续动脉血压监测HAN05201或有创血流动力学监测HAN05202或无创血流动力学监测HAN05701或全身麻醉下呼吸功能监测HAN05902
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000			心电监测	心电监测远程传输FKA05704或无创心电监测FKA05705
监测				药物	
无创心电监测	FKA05705			抗凝血药	
无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710			硝酸酯类药物	
治疗				他汀类药物	
静脉采血	ABBB0001			β受体阻滞剂	
院内遥测心电监护	KKA28701			ACEI或ARB	
药物				钙拮抗剂	
				抗菌药、抗血小板聚集药	
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		治疗		检查	
脑钠肽				隐血试验	CCCB8000
血气分析	CEJM1000			电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定
B型钠尿肽(BNP)测定	CESS1000			葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000
红细胞沉降率(ESR)测定	CAAJ1000			血气分析	CEJM1000
C-反应蛋白(CRP)测定	CGCA1000			监测	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
/超敏C反应蛋白(hs-CRP)测定	CEAU1000			有创血流动力学监测	HAN05202
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702或三通道动态心电图检查FKA03704或十二通道动态心电图检查FKA03705			/无创血流动力学监测	HAN05701
心电图平板负荷试验	FKA04702			主动脉内球囊反搏(IABP)运行监测	HLB05901
负荷心肌灌注断层显像	运动法负荷心肌灌注断层显像EECKC002或药物法负荷心肌灌注断层显像EECKC003			药物	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000				
尿常规化学分析	CCAA2000				
尿酮体定性试验	CCAM2000				
粪便常规检查	CCCA3000				
血脂四项	甘油三酯(TG)测定CEHB1000 和总胆固醇(TC)测定CEHA1000 和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定CEHC1000 和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定CEHD1000				
药物					
抗凝血药					
抗血小板药物					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
抗凝药物					
调脂药物					
镇静止痛药					
血管紧张素转换酶抑制剂（ACEI）或ARB					

病态窦房结综合征

单腔永久起搏器安置术

适用对象：	病种编码	HS016		
适用对象：	主要诊断：	病态窦房结综合征	ICD-10码：I49.5	
	主要操作/主要治疗方式：	单腔永久起搏器安置术	CCHI码：HKT62201	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：I49.5病态窦房结综合征疾病编码。 2. 除外药物、电解质紊乱等可逆因素影响。 3. 除外全身其他疾病，如甲状腺功能低下引起的心动过缓、合并全身急性感染性疾病等。 4. 除外心脏急性活动性病变，如急性心肌炎、心肌缺血或心肌梗死。 5. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
	出院标准：	1. 起搏器工作正常。 2. 生命体征稳定。 3. 手术切口愈合良好。		
	最短住院日参考值：	5天		
	变异条件：	1. 出现操作相关并发症，如血气胸、局部血肿、心脏压塞、导线脱位等。 2. 出现切口不愈合、感染等并发症。 3. 并发症（如高血压病、快速性心律失常）控制不佳。		
	再入院时间间隔要求：	14天		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	II级护理	ACAB0001	II级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或常规心电图检查FKA03703

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
尿常规化学分析	CCAA2000	监测		麻醉药品	EABJT001
粪便常规检查	CCCA3000	心电监测	心电监测远程传输 FKA05704或无创心电 监测FKA05705	起搏器程控功能检查	FKA03713
隐血试验	CCCB8000	麻醉		普通二维超声心动图	EDFKA005
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000	局部麻醉	HAB	动态心电图检查	24小时心率变异性分 析FKA05702或三通道 动态心电图检查 FKA03704或十二通道 动态心电图检查 FKA03705
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000或肌酐(Cr) 测定CEEB8000或尿酸 (UA)测定CEEE8000	手术		监测	
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	单腔永久起搏器安置 术	HKT62201	心电监测	心电监测远程传输 FKA05704或无创心电 监测FKA05705
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	药物		治疗	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	抗生素		换药	换药(小)ABFA0001或 换药(中)ABFA0002或 换药(大)ABFA0003或 换药(特大)ABFA0004
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	局部麻醉药		药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	镇静药物		抗菌药物	
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或常规心电图检查FKA03703				
胸部X线摄影	EABJT001				
普通二维超声心动图	EDFKA005				
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702或三通道动态心电图检查FKA03704或十二通道动态心电图检查FKA03705				
治疗					
静脉采血	ABBB0001				
监测					
无创心电监测	FKA05705				
药物					
抗生素					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000			24小时心率变异性分析	FKA05702
治疗		治疗		治疗	
药物		药物		药物	
抗菌药物					

病态窦房结综合征

双腔永久起搏器安置术

适用对象：	病种编码	HS017		
适用对象：	主要诊断：	病态窦房结综合征	ICD-10码：I49.5	
	主要操作/主要治疗方式：	双腔永久起搏器安置术	CCHI码：HKT62202	
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：I49.5病态窦房结综合征疾病编码。 2. 除外药物、电解质紊乱等可逆因素影响。 3. 除外全身其他疾病，如甲状腺功能低下引起的心动过缓、合并全身急性感染性疾病等。 4. 除外心脏急性活动性病变，如急性心肌炎、心肌缺血或心肌梗死。 5. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
出院标准：	1. 起搏器工作正常。 2. 生命体征稳定。 3. 手术切口愈合良好。			
最短住院日参考值：	5天			
变异条件：	1. 出现操作相关并发症，如血气胸、局部血肿、心脏压塞、导线脱位等。 2. 出现切口不愈合、感染等并发症。 3. 并发症（如高血压病、快速性心律失常）控制不佳。			
再入院时间间隔要求：	14天			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
Ⅱ级护理	ACAB0001	Ⅱ级护理	ACAB0001	Ⅱ级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或常规心电图检查FKA03703
尿常规化学分析	CCAA2000	监测		麻醉药品	EABJT001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
粪便常规检查	CCCA3000	心电监测	心电监测远程传输 FKA05704或无创心电 监测FKA05705	起搏器程控功能检查	FKA03713
隐血试验	CCCB8000	麻醉		普通二维超声心动图	EDFKA005
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000	局部麻醉	HAB	动态心电图检查	24小时心率变异性分 析FKA05702或三通道 动态心电图检查 FKA03704或十二通道 动态心电图检查 FKA03705
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000或肌酐(Cr) 测定CEEB8000或尿酸 (UA)测定CEEE8000	手术		监测	
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	双腔永久起搏器安置 术	HKT62202	心电监测	心电监测远程传输 FKA05704或无创心电 监测FKA05705
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	药物		治疗	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	抗生素		换药	换药(小)ABFA0001或 换药(中)ABFA0002或 换药(大)ABFA0003或 换药(特大)ABFA0004
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	局部麻醉药		药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	镇静药物		抗菌药物	
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或常规心电图检查FKA03703				
胸部X线摄影	EABJT001				
普通二维超声心动图	EDFKA005				
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702或三通道动态心电图检查FKA03704或十二通道动态心电图检查FKA03705				
治疗					
静脉采血	ABBB0001				
监测					
无创心电监测	FKA05705				
药物					
抗生素					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000			24小时心率变异性分析	FKA05702
治疗		治疗		治疗	
药物		药物		药物	
抗菌药物					

阵发性室上性心动过速

普通室上性心动过速射频消融术

适用对象：	病种编码	HS018		
适用对象：	主要诊断：	阵发性室上性心动过速	ICD-10： I47.102	
	主要操作/主要治疗方式：	普通室上性心动过速射频消融术	CCHI码： HKT72201	
入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10： I47.102阵发性室上性心动过速疾病编码。 2. 除外缺血（急性心肌梗死）、电解质紊乱和药物中毒等造成的可逆性室上速。 3. 如同时患有其他疾病，但在住院期间无需特殊处理（检查和治疗），也不影响第一诊断时，可以进入路径。			
出院标准：	1. 生命体征平稳。 2. 手术伤口愈合良好。			
最短住院日参考值：	3天			
变异条件：	1. 电生理检查发现不适于行经导管消融术的严重室上性心律失常。			
再入院时间间隔要求：	14天			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
特级护理	ACAD0001	II级护理	ACAB0001	II级护理	ACAB0001
II级护理	ACAB0001	检查		检查	
检查		动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702或三通道动态心电图检查FKA03704或十二通道动态心电图检查FKA03705	常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或常规心电图检查FKA03703
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或常规心电图检查FKA03703	麻醉药品	EABJT001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	有创性心内电生理检查	FKA01201	动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702或三通道动态心电图检查FKA03704或十二通道动态心电图检查FKA03705
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000或肌酐(Cr)测定CEEB8000或尿酸(UA)测定EEEE8000	治疗		起搏器程控功能检查	FKA03713
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	氧气吸入	ABJA0001	治疗	
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或常规心电图检查FKA03703	监测		换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702或三通道动态心电图检查FKA03704或十二通道动态心电图检查FKA03705	无创血压监测	FKA05709	监测	
尿常规化学分析	CCAA2000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710	心电监护	院内遥测心电监护KKA28701或无创心电监测FKA05705
粪便常规检查	CCCA3000	心电监护	院内遥测心电监护KKA28701或无创心电监测FKA05705	药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000	麻醉			
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间 (APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间 (PT) 测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	局部麻醉	HAB		
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs) 测定	乙型肝炎表面抗原定 性 (HBsAg) 测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg) 测定 CGLH1000	手术			
丙型肝炎抗体 (抗 HCV) 测定	CGMA1000	普通室上性心动过速 射频消融术	HKT72201		
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV) 测定	CGMF1000	药物			
梅毒螺旋体抗体 (抗 TP) 测定	CGPP1000	抗心律失常药物			
胸部X线摄影	EABJT001	镇静药物			
普通二维超声心动图	EDFKA005	诱导麻醉药			
治疗		局部麻醉药			
静脉采血	ABBB0001				
氧气吸入	ABJA0001				
监测					
院内遥测心电监护	KKA28701				
无创指脉血氧饱和度 监测	FKA05710				
无创血压监测	FKA05705				
药物					
抗心律失常药物					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
静脉抗心律失常药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
心脏磁共振平扫成像	ECAKA001				
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血	治疗		治疗	
血气分析	CEJM1000				
肌酸激酶(CK)测定	CECS1000	麻醉		药物	
肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定	CECT1000	/全身麻醉	HAA42901	抗心律失常药物	
肌钙蛋白T(TnT)测定	CEAX1000	药物		抗生素	
肌钙蛋白 I (TnI)测定	CEAY1000	抗生素		使用抗心律失常药物	
治疗					
药物					
抗菌药物					
直流电复律					

非阵发性室性心动过速

室性心动过速射频消融术

适用对象：	病种编码	HS019		
适用对象：	主要诊断：	非阵发性室性心动过速	ICD-10： I47.202	
	主要操作/主要治疗方式：	室速射频消融术	CCHI码： HKT72202	
	入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10： I47.202持续性室性心动过速疾病编码。 2. 除外缺血（急性心肌梗死）、电解质紊乱和药物中毒等造成的可逆性室速。 3. 如同时患有其他疾病，但在住院期间无需特殊处理（检查和治疗），也不影响第一诊断时，可以进入路径。		
	出院标准：	1. 生命体征平稳。 2. 手术伤口愈合良好。		
	最短住院日参考值：	6天		
	变异条件：	1. 电生理检查发现不适于行经导管消融术的严重室性心律失常，需要药物治疗及择期行ICD置入术。 2. 消融术部分成功，另需药物治疗及ICD置入术以确保患者长期的安全性。 3. 置入ICD的患者需要口服抗心律失常药物，服药期间出现血压、心率较大波动，需要延长观察时间调整用药。 4. 需要口服抗心律失常药物预防发作的患者，因药物导致心率降低而需行永久起搏器置入以保证远期预后。 5. 其他情况，包括手术并发症等。		
	再入院时间间隔要求：	14天		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
特级护理	ACAD0001	II级护理	ACAB0001	II级护理	ACAB0001
II级护理	ACAB0001	检查		检查	
检查		动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702或三通道动态心电图检查FKA03704或十二通道动态心电图检查FKA03705	常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或常规心电图检查FKA03703

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或常规心电图检查FKA03703	麻醉药品	EABJT001
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	治疗		动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702或三通道动态心电图检查FKA03704或十二通道动态心电图检查FKA03705
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000或肌酐(Cr)测定CEEB8000或尿酸(UA)测定CEEE8000	氧气吸入	ABJA0001	起搏器程控功能检查	FKA03713
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	监测		治疗	
血气分析	CEJM1000	心电监护	院内遥测心电监护KKA28701或无创心电监测FKA05705	换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
肌酸激酶(CK)测定	CECS1000	无创血压监测	FKA05709	监测	
肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定	CECT1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710	心电监护	院内遥测心电监护KKA28701或无创心电监测FKA05705

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或常规心电图检查FKA03703	麻醉		无创血压监测	FKA05709
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702或三通道动态心电图检查FKA03704或十二通道动态心电图检查FKA03705	局部麻醉	HAB	药物	
尿常规化学分析	CCAA2000	/全身麻醉	HAA42901	使用抗心律失常药物	
粪便常规检查	CCCA3000	手术			
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000	有创性心内电生理检查	FKA01201		
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	室速射频消融术	HKT72202		
肌钙蛋白T (TnT) 测定	CEAX1000	药物			
肌钙蛋白 I (TnI) 测定	CEAY1000	抗心律失常药物			
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs) 测定	乙型肝炎表面抗原定性 (HBsAg) 测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量 (HBsAg) 测定CGLH1000	抗生素			
丙型肝炎抗体 (抗HCV) 测定	CGMA1000	镇静药物			
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV) 测定	CGMF1000	诱导麻醉药			
梅毒螺旋体抗体 (抗TP) 测定	CGPP1000	局部麻醉药			
胸部X线摄影	EABJT001				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
普通二维超声心动图	EDFKA005				
治疗					
静脉采血	ABBB0001				
氧气吸入	ABJA0001				
院内遥测心电监护	KKA28701				
监测					
无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710				
无创血压监测	FKA05705				
药物					
抗心律失常药物					
静脉抗心律失常药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
心脏磁共振平扫成像	ECAKA001				
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	治疗		治疗	
治疗					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
		药物		药物	
药物				抗心律失常药物	
抗菌药物				抗生素	
直流电复律					

补钾药

非阵发性室性心动过速

埋藏式单腔心脏复律除颤器安置术

适用对象：	病种编码	HS020		
适用对象：	主要诊断：	非阵发性室性心动过速	ICD-10：I47.202	
	主要操作/主要治疗方式：	埋藏式单腔心脏复律除颤器安置术	CCHI码：HKT62204	
	入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10：I47.202持续性室性心动过速疾病编码。 2. 除外缺血（急性心肌梗死）、电解质紊乱和药物中毒等造成的可逆性室速。 3. 如同时患有其他疾病，但在住院期间无需特殊处理（检查和治疗），也不影响第一诊断时，可以进入路径。		
	出院标准：	1. 生命体征平稳。 2. 手术伤口愈合良好。 3. 置入的ICD工作正常。		
	最短住院日参考值：	6天		
	变异条件：	1. 电生理检查发现不适于行经导管消融术的严重室性心律失常，需要药物治疗及择期行ICD置入术。 2. 消融术部分成功，另需药物治疗及ICD置入术以确保患者长期的安全性。 3. 置入ICD的患者需要口服抗心律失常药物，服药期间出现血压、心率较大波动，需要延长时间观察调整用药。 4. 需要口服抗心律失常药物预防发作的患者，因药物导致心率降低而需行永久起搏器置入以保证远期预后。 5. 其他情况，包括手术并发症等。		
	再入院时间间隔要求：	14天		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
特级护理	ACAD0001	II级护理	ACAB0001	II级护理	ACAB0001
II级护理	ACAB0001	检查		检查	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
检查		动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702或三通道动态心电图检查FKA03704或十二通道动态心电图检查FKA03705	常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或常规心电图检查FKA03703
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或常规心电图检查FKA03703	麻醉药品	EABJT001
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	治疗		动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702或三通道动态心电图检查FKA03704或十二通道动态心电图检查FKA03705
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000或肌酐(Cr)测定CEEB8000或尿酸(UA)测定CEEE8000	氧气吸入	ABJA0001	起搏器程控功能检查	FKA03713
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	监测		治疗	
血气分析	CEJM1000	心电监护	院内遥测心电监护KKA28701或无创心电监测FKA05705	换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
肌酸激酶(CK)测定	CECS1000	无创血压监测	FKA05709	监测	
肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定	CECT1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710	无创血压监测	FKA05709

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或常规心电图检查FKA03703	麻醉		心电监护	院内遥测心电监护KKA28701或无创心电监测FKA05705
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702或三通道动态心电图检查FKA03704或十二通道动态心电图检查FKA03705	局部麻醉	HAB	药物	
尿常规化学分析	CCAA2000	/全身麻醉	HAA42901	抗生素	
粪便常规检查	CCCA3000	手术		使用抗心律失常药物	
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000	有创性心内电生理检查	FKA01201		
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	埋藏式单腔心脏复律除颤器安置术	HKT62204		
肌钙蛋白T (TnT) 测定	CEAX1000	药物			
肌钙蛋白 I (TnI) 测定	CEAY1000	抗心律失常药物			
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs) 测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	抗生素			
丙型肝炎抗体 (抗HCV) 测定	CGMA1000	镇静药物			
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV) 测定	CGMF1000	诱导麻醉药			
梅毒螺旋体抗体 (抗TP) 测定	CGPP1000	局部麻醉药			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
胸部X线摄影	EABJT001				
普通二维超声心动图	EDFKA005				
治疗					
静脉采血	ABBB0001				
氧气吸入	ABJA0001				
院内遥测心电监护	KKA28701				
监测					
无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710				
无创血压监测	FKA05705				
药物					
抗心律失常药物					
静脉抗心律失常药物					
抗菌药物					
直流电复律					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
心脏磁共振平扫成像	ECAKA001				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	治疗		治疗	
治疗					
		药物		药物	
药物				抗心律失常药物	

非阵发性室性心动过速

埋藏式双腔心脏复律除颤器安置术

适用对象：	病种编码	HS021		
适用对象：	主要诊断：	非阵发性室性心动过速	ICD-10： I47.202	
	主要操作/主要治疗方式：	埋藏式双腔心脏复律除颤器安置术	CCHI码： HKT62205	
	入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10： I47.202持续性室性心动过速疾病编码。 2. 除外缺血（急性心肌梗死）、电解质紊乱和药物中毒等造成的可逆性室速。 3. 如同时患有其他疾病，但在住院期间无需特殊处理（检查和治疗），也不影响第一诊断时，可以进入路径。		
	出院标准：	1. 生命体征平稳。 2. 手术伤口愈合良好。 3. 置入的ICD工作正常。		
	最短住院日参考值：	6天		
	变异条件：	1. 电生理检查发现不适于行经导管消融术的严重室性心律失常，需要药物治疗及择期行ICD置入术。 2. 消融术部分成功，另需药物治疗及ICD置入术以确保患者长期的安全性。 3. 置入ICD的患者需要口服抗心律失常药物，服药期间出现血压、心率较大波动，需要延长时间观察调整用药。 4. 需要口服抗心律失常药物预防发作的患者，因药物导致心率降低而需行永久起搏器置入以保证远期预后。 5. 其他情况，包括手术并发症等。		
	再入院时间间隔要求：	14天		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
特级护理	ACAD0001	II级护理	ACAB0001	II级护理	ACAB0001
II级护理	ACAB0001	检查		检查	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
检查		动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702或三通道动态心电图检查FKA03704或十二通道动态心电图检查FKA03705	常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或常规心电图检查FKA03703
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或常规心电图检查FKA03703	麻醉药品	EABJT001
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	治疗		动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702或三通道动态心电图检查FKA03704或十二通道动态心电图检查FKA03705
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000或肌酐(Cr)测定CEEB8000或尿酸(UA)测定CEEE8000	氧气吸入	ABJA0001	起搏器程控功能检查	FKA03713
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	监测		治疗	
血气分析	CEJM1000	心电监护	院内遥测心电监护KKA28701或无创心电监测FKA05705	换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
肌酸激酶(CK)测定	CECS1000	无创血压监测	FKA05709	监测	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定	CECT1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710	心电监护	院内遥测心电监护 KKA28701 或无创心电监测 FKA05705
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或常规心电图检查FKA03703	麻醉		无创血压监测	FKA05709
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702或三通道动态心电图检查FKA03704或十二通道动态心电图检查FKA03705	局部麻醉	HAB	药物	
尿常规化学分析	CCAA2000	/全身麻醉	HAA42901	抗生素	
粪便常规检查	CCCA3000	手术		使用抗心律失常药物	
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	有创性心内电生理检查	FKA01201		
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	埋藏式双腔心脏复律除颤器安置术	HKT62205		
肌钙蛋白T(TnT)测定	CEAX1000	药物			
肌钙蛋白 I (TnI)测定	CEAY1000	抗心律失常药物			
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	抗生素			
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	镇静药物			
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	诱导麻醉药			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	局部麻醉药			
胸部X线摄影	EABJT001				
普通二维超声心动图	EDFKA005				
治疗					
静脉采血	ABBB0001				
氧气吸入	ABJA0001				
院内遥测心电监护	KKA28701				
监测					
无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710				
无创血压监测	FKA05705				
药物					
抗心律失常药物					
静脉抗心律失常药物					
抗菌药物					
直流电复律					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
心脏磁共振平扫成像	ECAKA001			动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702或三通道动态心电图检查FKA03704或十二通道动态心电图检查FKA03705
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	治疗		治疗	
治疗					
		药物		药物	
药物				抗心律失常药物	

九、血液、造血器官、免疫系统疾病

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
IM001	儿童急性早幼粒细胞白血病（APL） - 初治患者	
IM002	儿童急性早幼粒细胞白血病（APL） - 诱导达完全缓解（CR）的患者	
IM003	儿童急性淋巴细胞白血病（ALL） - 初治患者	
IM004	儿童急性淋巴细胞白血病（ALL） - 诱导达完全缓解（CR）的患者	
IM005	慢性淋巴细胞白血病-初治CLL成人患者	
IM006	慢性髓细胞白血病（CML） — 初治CML成人患者	
IM007	自身免疫性溶血性贫血-初治AIHA成人患者	
IM008	特发性血小板减少性紫癜-初治ITP成人患者	
IM009	成人急性早幼粒细胞白血病-初治（APL）患者	
IM010	成人急性早幼粒细胞白血病（APL） - 诱导达完全缓解（CR）的患者	

儿童急性早幼粒细胞白血病（APL）-初治患者

适用对象：	病种编码：	IM001
	主要诊断：	儿童急性早幼粒细胞白血病（APL）-初治患者 ICD-10码：C92.400
	疾病状态：	初治APL儿童患者
	主要操作/主要治疗方式：	CCHI码：
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：C92.400急性早幼粒细胞白血病（APL）疾病编码，行诱导分化治疗。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断时，但在住院期间不需要特殊处理，也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。	
出院标准：	1. 一般情况良好。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。	
最短住院日参考值：	28天	
变异条件：	1. 治疗过程中出现感染、贫血、出血及其他合并症者，需进行相关的诊断和治疗，可适当延长住院时间。 2. 诱导分化治疗40天未达完全缓解者退出路径。 3. 若腰穿后脑脊液检查显示存在白血病神经系统侵犯，建议隔日腰穿鞘注化疗药物直至脑脊液检查正常，同时退出此路径，进入相关路径。	
再入院间隔时间：	1周	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		骨髓穿刺术	FNA06101	止吐药物	
I 级护理	ACAC0001	腰椎穿刺术	FVT06101	抗肿瘤药物	
检查				血液制品	
血常规(每天一次)	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			升血小板药	
尿常规化学分析	CCAA2000			清脏腑热药	
粪便常规检查	CCCA3000			保心药	
隐血试验	CCCB8000			化疗药物	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
细胞计数	白细胞(WBC)计数 CAAK1000和白细胞分类(DC)计数CAAL1000和嗜酸性粒细胞直接计数CAAM1000和嗜碱性粒细胞直接计数CAAN1000和淋巴细胞直接计数CAAP1000和单个核细胞直接计数CAAQ1000和血小板计数CAAR1000				
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000和ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000和ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000和ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000和RhD血型鉴定CAMF1000				
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000和 Rh血型c抗原鉴定CAMH1000和Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000和Rh血型e抗原鉴定CAMK1000和Rh血型其它抗原鉴定CAML1000				
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000和活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000和血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000和血浆纤维蛋白原测定CAGD1000				
血浆抗凝血酶活性(AT:A)测定	CAJC1000				
血浆鱼精蛋白副凝(3P)试验	CAHV1000				
纤维蛋白(原)降解产物(FDP)测定	CAJX1000				
血浆D-二聚体(D-Dimer)测定	CAJY1000				
骨髓涂片细胞学检验	CACA6000				
甲型肝炎抗体(抗HAV)测定	CGLE1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000和乳酸脱氢酶(LD)测定CECW1000和尿素(Urea)测定CEE8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000和肌酸激酶(CK)测定CECS1000和肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定CECT1000和甘油三酯(TG)测定CEHB1000和总胆固醇(TC)测定CEHA1000和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定CEHC1000和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定CEHD1000和葡萄糖(Glu)测定CEFA8000和总钙(Ca)测定CEJF8000和无机磷(P)测定CEKA8000和钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000				
乙型肝炎表面抗体(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000				
/丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000				
/人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
/梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
一般细菌培养	CJAN8000				
/一般细菌鉴定	CJAT8000				
普通细菌药敏试验	普通细菌药敏定性试验CJBX9000或普通细菌药敏定量试验CJBY9000				
真菌药敏试验	真菌药敏定性试验CJHT9000或真菌药敏定量试验CJHU9000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
染色体核型分析	染色体核型分析 CLDA8000或脆性X染色体 核型分析CLDB8000或高 分辨染色体核型分析 CLDC8000或姐妹染色体 互换分析CLDD8000				
免疫组织化学染色诊断	免疫组织化学染色诊断 BEBA0001或免疫荧光染 色诊断BEBB0001				
糖原染色检查	CACV8000				
过氧化物酶染色检查	CACN8000				
骨髓组织活检病理诊断	BCAC0001				
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001				
泌尿系B超检查	EDBRA001				
胸部X线摄影	EABJT001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道常规 心电图检查FKA03702或 十二通道常规心电图检 查FKA03703				
心脏彩色多普勒超声	EDFKA007				
眼底检查	免散瞳眼底检查 FES01704或非散瞳直接 检眼镜眼底检查 FES01705或前置镜眼底 检查FES01706或间接眼 底镜检查FES01707或三 面镜眼底检查FES01713				
白血病融合基因检测 （多种基因筛查× 10）	CLDS8000				
脑脊液检查	脑脊液（CSF）常规细胞计 数检查CCDC4000和脑脊 液糖定性测定CCDD4000 和脑脊液蛋白定性测定 CCDE4000				
脑脊液生化检查	葡萄糖（Glu）测定 CEFA8000和微量总蛋白 （mTP）测定CEAB8000和氯 （Cl）测定CEJC8000				
微量残留白血病细胞 检测	CADB8000				
头部X线计算机体层 （CT）平扫	EBABP001				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
普通二维超声心动图	EDFKA005				
染色体分析	染色体荧光原位杂交分析CLDN8000（×4）或羊水细胞染色体分析CLDP4000或绒毛组织染色体分析CLDQ6000或染色体分析CLDR8000或未经处理的羊水细胞荧光原位杂交分析CLDM4000或血细胞荧光原位杂交分析CLDL1000				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001	院内遥测心电监护	KKA28701	升白药	
上腹部X线计算机体层(CT)平扫	EBAQT001	静脉置管术	经外周静脉置入中心静脉导管术ABDA0001或新生儿脐血管置管术ABDB0001	降颅压药物	
下腹部X线计算机体层(CT)平扫	EBAQT002	白血病化疗药物鞘内注射	HNA48101	抑酸剂	
血细胞荧光原位杂交分析	CLDL1000	血气分析	CEJM1000	抗凝血药	
颅脑磁共振成像	ECABA001	换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004	碱化尿液类药物	
肺炎支原体免疫学试验	CGPJ8000			抗菌类药物（头孢菌素）	
呼吸道相关病毒检查	呼吸道合胞病毒抗体测定CGMW1000或呼吸道合胞病毒抗原测定CGMX5000				
腺病毒抗体测定	CGNB1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
EB病毒测定	EB病毒抗体测定 CGMS1000和EB病毒壳膜 抗原抗体(抗VCA)测定 CGMT1000和EB病毒早期 抗原抗体IgG(抗EAIgG) 测定CGMU1000和EB病毒 核抗原抗体IgG(抗 EBNAIgG)测定CGMV1000				
CMV抗体测定	风疹病毒抗体测定 CGMK1000或巨细胞病毒 抗原血症(CMVPP65)测定 CGML8000或巨细胞病毒 抗体测定CGMM1000				
真菌D-葡聚糖检测	CJHR8000				
真菌快速鉴定	CJHV9000				
吸氧	舱内直排吸氧KJA21403 或常压高流量吸氧 KJA21404				
血管超声造影	EDCM9001				
小儿颅脑B超检查	EDBBA001				
淋巴细胞亚类检测	CGCV8000				
免疫球蛋白测定	免疫球蛋白G(IgG)定量 测定CGAT1000或免疫球 蛋白M(IgM)定量测定 CGAU1000或免疫球蛋白 D(IgD)定量测定 CGAV1000或免疫球蛋白 E(IgE)定量测定 CGAW1000或分泌型免疫 球蛋白A测定CGAX1000或 免疫球蛋白亚类定量测 定CGBA1000或免疫球蛋 白轻链测定CGBB8000或 免疫球蛋白游离轻链测 定CGBC8000或细胞膜表 面免疫球蛋白测定 CGBH1000或脱敏免疫球 蛋白IgG测定CGUU1000或 脱敏免疫球蛋白IgG4测 定CGUV1000				

儿童急性早幼粒细胞白血病（APL）
-诱导达完全缓解（CR）的患者

适用对象：	病种编码：	IM002
主要诊断：	儿童急性早幼粒细胞白血病（APL）-诱导达完全缓解（CR）的患者	ICD-10码：C92.401
疾病状态：	诱导达完全缓解（CR）的儿童APL患者	
主要操作/主要治疗方式：	CCHI码：	
入院标准：	1. 第一诊断必须符合（ICD-10：C92.401）儿童急性早幼粒细胞白血病（APL）疾病编码。 2. 经诱导化疗达完全缓解（CR）。 3. 当患者同时具有其他疾病诊断时，但在住院期间不需要特殊处理，也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。	
出院标准：	1. 一般情况良好。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。	
最短住院日参考值：	14天	
变异条件：	1. 治疗中、后有感染、贫血、出血及其他合并症者，进行相关的诊断和治疗，可能延长住院时间并致费用增加。 2. 若腰穿后脑脊液检查显示存在白血病中枢神经系统侵犯，建议隔日腰穿鞘注化疗药物直至脑脊液检查正常，同时退出此途径，进入相关途径。 3. 当患者同时具有其他疾病诊断时，但在住院期间不需要特殊处理，也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。	
再入院间隔时间：	1周	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		骨髓穿刺术	FNA06101	保心肌药物	
I 级护理	ACAC0001	腰椎穿刺术	FVT06101	升血小板药	
检查		白血病化疗药物鞘内注射	HNA48101		
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000				
尿常规化学分析	CCAA2000				
粪便常规检查	CCCA3000				
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000和活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000和血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000和血浆纤维蛋白原测定CAGD1000			化疗药物	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
细胞计数	白细胞(WBC)计数 CAAK1000或白细胞分类(DC)计数CAAL1000或嗜酸性粒细胞直接计数CAAM1000或嗜碱性粒细胞直接计数CAAN1000或淋巴细胞直接计数CAAP1000或单个核细胞直接计数CAAQ1000或血小板计数CAAR1000				
骨髓涂片细胞学检验	CACA6000				
隐血试验	CCCB8000				
血浆抗凝血酶活性(AT:A)测定	CAJC1000				
血浆鱼精蛋白副凝(3P)试验	CAHV1000				
纤维蛋白(原)降解产物(FDP)测定	CAJX1000				
血浆D-二聚体(D-Dimer)测定	CAJY1000				
白血病融合基因检测	CLDS8000				
生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000和乳酸脱氢酶(LD)测定CECW1000和尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000和肌酸激酶(CK)测定CECS1000和肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定CECT1000和甘油三酯(TG)测定CEHB1000和总胆固醇(TC)测定CEHA1000和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定CEHC1000和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定CEHD1000和葡萄糖(Glu)测定CEFA8000和总钙(Ca)测定CEJF8000和无机磷(P)测定CEKA8000和钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
脑脊液检查	脑脊液(CSF)常规细胞计数检查CCDC4000和脑脊液糖定性测定CCDD4000和脑脊液蛋白定性测定CCDE4000				
脑脊液生化检查	脑脊液(CSF)常规细胞计数检查CCDC4000和脑脊液糖定性测定CCDD4000和脑脊液蛋白定性测定CCDE4000				
甲型肝炎抗体(抗HAV)测定	CGLE1000				
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000或乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000				
/丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000				
/人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
/梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
一般细菌培养	CJAN8000				
/一般细菌鉴定	CJAT8000				
普通细菌药敏试验	普通细菌药敏定性试验CJBX9000或普通细菌药敏定量试验CJBY9000				
真菌药敏试验	真菌药敏定性试验CJHT9000或真菌药敏定量试验CJHU9000				
胸部X线摄影	EABJT001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703				
普通二维超声心动图	EDFKA005				
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001				
泌尿系B超检查	EDBRA001				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
微量残留白血病细胞检测	CADB8000	院内遥测心电监护	KKA28701	血液制品	
染色体荧光原位杂交分析	CLDN8000	静脉输血	ABCD0001	抗菌类药物	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000和ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000和ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000和ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000和RhD血型鉴定CAMF1000	静脉置管术	免散瞳眼底检查FES01704或非散瞳直接检眼镜眼底检查FES01705或前置镜眼底检查FES01706或间接眼底镜检查FES01707或三面镜眼底检查FES01713	抗真菌药物	
头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001			心肌营养药	
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001			降颅压药物	
上腹部X线计算机体层(CT)平扫	EBAQT001			升白药	
下腹部X线计算机体层(CT)平扫	EBAQT002			抑酸剂	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000和Rh血型c抗原鉴定CAMH1000和Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000和Rh血型e抗原鉴定CAMK1000和Rh血型其它抗原鉴定CAML1000			止吐药物	
眼底检查	免散瞳眼底检查FES01704或非散瞳直接检眼镜眼底检查FES01705或前置镜眼底检查FES01706或间接眼底镜检查FES01707			碱化尿液类药物	
血管超声造影	EDCM9001				
小儿颅脑B超检查	EDBBA001				

儿童急性淋巴细胞白血病（ALL）-初治患者

适用对象：	病种编码：	IM003			
	主要诊断：	儿童急性淋巴细胞白血病（ALL）-初治患者	ICD-10码：	C91.0	
	疾病状态：	初治ALL儿童患者			
	主要操作/主要治疗方式：		CCHI码：		
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合儿童急性淋巴细胞白血病（ALL）疾病编码（ICD10：C91.0）的标危、中危组患者。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断时，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 一般情况良好。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。			
	最短住院日参考值：	30天			
	变异条件：	1. 治疗前、中、后有感染、贫血、出血及其他合并症者，需进行相关的诊断和治疗，可能延长住院时间并致费用增加。 2. 诱导缓解治疗未达完全缓解者退出路径。			
	再入院间隔时间：	1周			

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		白血病化疗药物鞘内注射	HNA48101	抑酸剂	
I 级护理	ACAC0001	骨髓穿刺术	FNA06101	抗生素	
检查		腰椎穿刺术	FVT06101	止吐药物	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	经外周静脉置入中心静脉导管术	ABDA0001	碱化尿液类药物	
尿常规化学分析	CCAA2000				
粪便常规检查	CCCA3000				
隐血试验	CCCB8000			化疗药物	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
细胞计数	白细胞(WBC)计数 CAAK1000或白细胞分类 (DC)计数CAAL1000或嗜 酸性粒细胞直接计数 CAAM1000或嗜碱性粒细 胞直接计数CAAN1000或 淋巴细胞直接计数 CAAP1000或单个核细胞 直接计数CAAQ1000或血 小板计数CAAR1000				
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000和ABO血型 鉴定(反定型)CAMB1000 和ABO亚型鉴定(正定 型)CAMD1000和ABO亚型 鉴定(反定型)CAME1000 或RhD血型鉴定CAMF1000				
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000和Rh血型c抗原 鉴定CAMH1000和Rh血型E 抗原鉴定CAMJ1000和Rh 血型e抗原鉴定CAMK1000 和Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000				
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000和活化部分凝 血活酶时间(APTT)测定 CAGB1000和血浆凝血酶 原时间(PT)测定 CAGC1000和血浆纤维蛋 白原测定CAGD1000				
血浆抗凝血酶活性 (AT:A)测定	CAJC1000				
血浆鱼精蛋白副凝 (3P) 试验	CAHV1000				
纤维蛋白(原)降解产 物(FDP)测定	CAJX1000				
血浆D-二聚体(D- Dimer)测定	CAJY1000				
骨髓涂片细胞学检验	CACA6000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000				
甲型肝炎抗体(抗HAV)测定	CGLE1000				
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000				
/丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000				
/人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
/梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
一般细菌培养	CJAN8000				
一般细菌鉴定	CJAT8000				
普通细菌药敏试验	普通细菌药敏定性试验CJBX9000或普通细菌药敏定量试验CJBY9000				
真菌药敏试验	真菌药敏定性试验CJHT9000或真菌药敏定量试验CJHU9000				
染色体核型分析	染色体核型分析CLDA8000或脆性X染色体核型分析CLDB8000或高分辨染色体核型分析CLDC8000或姐妹染色体互换分析CLDD8000				
酶组织化学染色及诊断	BEAB0001				
免疫组织化学染色诊断	BEBA0001				
普通二维超声心动图	EDFKA005				
头部磁共振增强成像	ECBBP001				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
微量残留白血病细胞检测	CADB8000				
染色体荧光原位杂交分析	CLDN8000				
头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001				
骨髓组织活检病理诊断	BCAC0001				
细胞膜分化抗原检测	CACH8000				
生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(Alb)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000和乳酸脱氢酶(LD)测定CECW1000和尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000和肌酸激酶(CK)测定CECS1000和肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定CECT1000和甘油三酯(TG)测定CEHB1000和总胆固醇(TC)测定CEHA1000和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定CEHC1000和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定CEHD1000和葡萄糖(Glu)测定CEFA8000和总钙(Ca)测定CEJF8000和无机磷(P)测定CEKA8000和钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000				
泌尿系B超检查	EDBRA001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
胸部X线摄影	EABJT001				
眼底检查	免散瞳眼底检查 FES01704或非散瞳直接 检眼镜眼底检查 FES01705或前置镜眼底 检查FES01706或间接眼 底镜检查FES01707或三 面镜眼底检查FES01713				
白血病融合基因检测	CLDS8000				
脑脊液检查	脑脊液 (CSF) 常规细胞计 数检查CCDC4000或脑脊 液糖定性测定CCDD4000 或脑脊液蛋白定性测定 CCDE4000				
脑脊液生化检查	脑脊液 (CSF) 常规细胞计 数检查CCDC4000和脑脊 液糖定性测定CCDD4000 和脑脊液蛋白定性测定 CCDE4000				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
血气分析	CEJM1000	院内遥测心电监护	KKA28701	升白药	
胸部X线计算机体层 (CT) 平扫	EBAJT001	静脉置管术	免散瞳眼底检查 FES01704或非散瞳直 接检眼镜眼底检查 FES01705或前置镜眼 底检查FES01706或间 接眼底镜检查 FES01707或三面镜眼 底检查FES01713	降颅压药物	
上腹部X线计算机体 层 (CT) 平扫	EBAQT001	静脉输血	ABCD0001	浓缩纤维蛋白原	血液制品
下腹部X线计算机体 层 (CT) 平扫	EBAQT002	自控静脉镇痛治疗	自控静脉镇痛治疗 HAZ48101或自控硬膜 外镇痛治疗HAZ48102	心肌营养药	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
胸部磁共振增强成像	ECBJT001			抗凝血药	
上腹部磁共振成像	ECAQT001			血液制品	
/下腹部磁共振成像	ECAQT002			抗菌药物	
全脊柱X线计算机体层(CT)平扫	EBAVE001			抗生素	
常规脑电图检查	16导常规脑电图检查 FBC03701或32导常规脑电图检查FBC03702				
病理					
骨髓组织活检病理诊断	BCAC0001				
颅脑磁共振成像	ECABA001				
肺炎支原体免疫学试验	CGPJ8000				
呼吸道相关病毒检查	呼吸道合胞病毒抗体测定CGMW1000或呼吸道合胞病毒抗原测定CGMX5000				
腺病毒抗体测定	CGNB1000				
EB病毒测定	EB病毒抗体测定CGMS1000和EB病毒壳膜抗原抗体(抗VCA)测定CGMT1000和EB病毒早期抗原抗体IgG(抗EA IgG)测定CGMU1000和EB病毒核抗原抗体IgG(抗EBNA IgG)测定CGMV1000				
CMV抗体测定	风疹病毒抗体测定CGMK1000或巨细胞病毒抗原血症(CMVPP65)测定CGML8000或巨细胞病毒抗体测定CGMM1000				
真菌D-葡聚糖检测	CJHR8000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
真菌快速鉴定	CJHV9000				
吸氧	舱内直排吸氧KJA21403 或常压高流量吸氧 KJA21404				
血管超声造影	EDCM9001				
小儿颅脑B超检查	EDBBA001				
醛固酮(ALD)测定	CEQW1000				
抗利尿激素(ADH)测定	CEQA1000				
促肾上腺皮质激素(ACTH)测定	CEQG1000				
淋巴细胞亚类检测	CGCV8000				
免疫球蛋白测定	免疫球蛋白G(IgG)定量测定CGAT1000或免疫球蛋白M(IgM)定量测定CGAU1000或免疫球蛋白D(IgD)定量测定CGAV1000或免疫球蛋白E(IgE)定量测定CGAW1000或分泌型免疫球蛋白A测定CGAX1000或免疫球蛋白亚类定量测定CGBA1000或免疫球蛋白轻链测定CGBB8000或免疫球蛋白游离轻链测定CGBC8000B或细胞膜表面免疫球蛋白测定CGBH1000或脱敏免疫球蛋白IgG测定CGUU1000或脱敏免疫球蛋白IgG4测定CGUV1000				

儿童急性淋巴细胞白血病（ALL）-诱导达完全缓解（CR）的患者

适用对象：	病种编码：	IM004
主要诊断：	儿童急性淋巴细胞白血病（ALL）-诱导达完全缓解（CR）的患者	ICD-10码：C91.0
疾病状态：	诱导达完全缓解（CR）的儿童ALL患者	
主要操作/主要治疗方式：	CCHI码：	
入院标准：	1. 第一诊断必须符合儿童急性淋巴细胞白血病（ALL）疾病编码（ICD10：C91.0）的标危、中危组患者。 2. 经诱导化疗达完全缓解（CR）。 3. 当患者同时具有其他疾病诊断时，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。	
出院标准：	1. 一般情况良好。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。	
最短住院日参考值：	4天	
变异条件：	1. 治疗中、后有感染、贫血、出血及其他合并症者，进行相关的诊断和治疗，可能延长住院时间并致费用增加。 2. 若治疗过程中出现CNSL，退出此路径，进入相关路径。	
再入院间隔时间：	1周	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		白血病化疗药物鞘内注射	HNA48101	心肌营养药	
I 级护理	ACAC0001	腰椎穿刺术	FVT06101	止吐药物	
检查		骨髓穿刺术	FNA06101	碱化尿液类药物	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			抑酸剂	
尿常规化学分析	CCAA2000			抗生素	
粪便常规检查	CCCA3000			血液制品	
隐血试验	CCCB8000			化疗药物	
心脏彩色多普勒超声	EDFKA007				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
细胞计数	白细胞(WBC)计数 CAAK1000或白细胞分类 (DC)计数CAAL1000或嗜 酸性粒细胞直接计数 CAAM1000或嗜碱性粒细 胞直接计数CAAN1000或 淋巴细胞直接计数 CAAP1000或单个核细胞 直接计数CAAQ1000或血 小板计数CAAR1000				
白血病融合基因检测	CLDS8000				
生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT) 测定CECA1000和天门冬 氨酸氨基转移酶(AST)测 定CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定CELA1000和 直接胆红素(D-Bil)测定 CELB1000和γ-谷氨酰基 转移酶(GGT)测定 CECC8000和总蛋白(TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (Alb)测定CEAE8000和碱 性磷酸酶(ALP)测定 CECD8000和乳酸脱氢酶 (LD)测定CECW1000和尿 素(Urea)测定CEEA8000 和肌酐(Cr)测定 CEEB8000和尿酸(UA)测 定CEEE8000和肌酸激酶 (CK)测定CECS1000和肌 酸激酶-MB同工酶活性 (CK-MB)测定CECT1000和 甘油三酯(TG)测定 CEHB1000和总胆固醇 (TC)测定CEHA1000和高 密度脂蛋白胆固醇(HDL- C)测定CEHC1000和低密 度脂蛋白胆固醇(LDL-C) 测定CEHD1000和葡萄糖 (Glu)测定CEFA8000和总 钙(Ca)测定CEJF8000和 无机磷(P)测定CEKA8000 和钾(K)测定CEJA8000和 钠(Na)测定CEJB8000和 氯(Cl)测定CEJC8000和 总二氧化碳(TCO2)测定 CEJD1000				
脑脊液检查	脑脊液(CSF)常规细胞计 数检查CCDC4000或脑脊 液糖定性测定CCDD4000 或脑脊液蛋白定性测定 CCDE4000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
脑脊液生化检查	脑脊液 (CSF) 常规细胞计数检查CCDC4000和脑脊液糖定性测定CCDD4000和脑脊液蛋白定性测定CCDE4000				
甲型肝炎抗体(抗HAV)测定	CGLE1000				
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000或乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000				
/丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000				
/人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
/梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
胸部X线摄影	EABJT001				
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001				
泌尿系B超检查	EDBRA001				
骨髓涂片细胞学检验	CACA6000				
微量残留白血病细胞检测	CADB8000				
染色体荧光原位杂交分析	CLDN8000				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703				
选择项目					

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
因病情需要而选择的其他项目：					
检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000和ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000和ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000和ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000和RhD血型鉴定CAMF1000	院内遥测心电图监护	KKA28701		
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000和 Rh血型c抗原鉴定CAMH1000和Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000和Rh血型e抗原鉴定CAMK1000和Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	静脉输血	ABCD0001	抗菌药物	
普通二维超声心动图	EDFKA005	自控静脉镇痛治疗	自控静脉镇痛治疗HAZ48101或自控硬膜外镇痛治疗HAZ48102	降颅压药物	
头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001			升白药	
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001			升血小板药	
上腹部X线计算机体层(CT)平扫	EBAQT001				
下腹部X线计算机体层(CT)平扫	EBAQT002				
血气分析	CEJM1000				
血浆抗凝血酶活性(AT:A)测定	CAJC1000				
血浆鱼精蛋白副凝(3P) 试验	CAHV1000				
纤维蛋白(原)降解产物(FDP)测定	CAJX1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
血浆D-二聚体(D-Dimer)测定	CAJY1000				
一般细菌培养	CJAN8000				
一般细菌鉴定	CJAT8000				
普通细菌药敏试验	普通细菌药敏定性试验 CJBX9000或普通细菌药敏定量试验CJBY9000				
真菌药敏试验	真菌药敏定性试验 CJHT9000或真菌药敏定量试验CJHU9000				
染色体核型分析	染色体核型分析 CLDA8000或脆性X染色体核型分析CLDB8000或高分辨染色体核型分析CLDC8000或姐妹染色体互换分析CLDD8000				
头部磁共振增强成像	ECBBP001				
胸部磁共振增强成像	ECBJT001				
上腹部磁共振成像	ECAQT001				
/下腹部磁共振成像	ECAQT002				
常规脑电图检查	16导常规脑电图检查 FBC03701或32导常规脑电图检查FBC03702				
全脊柱X线计算机体层(CT)平扫	EBAVE001				
病理					
骨髓组织活检病理诊断	BCAC0001				
治疗药物浓度测定	CENA1000				
颅底磁共振成像	ECABN002				
肺炎支原体免疫学试验	CGPJ8000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
呼吸道相关病毒检查	呼吸道合胞病毒抗体测定CGMW1000或呼吸道合胞病毒抗原测定CGMX5000				
EB病毒测定	EB病毒抗体测定CGMS1000和EB病毒壳膜抗原抗体(抗VCA)测定CGMT1000和EB病毒早期抗原抗体IgG(抗EA IgG)测定CGMU1000和EB病毒核抗原抗体IgG(抗EBNA IgG)测定CGMV1000				
EB病毒测定	EB病毒抗体测定CGMS1000和EB病毒壳膜抗原抗体(抗VCA)测定CGMT1000和EB病毒早期抗原抗体IgG(抗EA IgG)测定CGMU1000和EB病毒核抗原抗体IgG(抗EBNA IgG)测定CGMV1001				
EB病毒测定	EB病毒抗体测定CGMS1000和EB病毒壳膜抗原抗体(抗VCA)测定CGMT1000和EB病毒早期抗原抗体IgG(抗EA IgG)测定CGMU1000和EB病毒核抗原抗体IgG(抗EBNA IgG)测定CGMV1002				
真菌快速鉴定	CJHV9000				
吸氧	舱内直排吸氧KJA21403或常压高流量吸氧KJA21404				
血管超声造影	EDCM9001				
小儿颅脑B超检查	EDBBA001				

慢性淋巴细胞白血病-初治CLL成人患者

适用对象：	病种编码：	IM005			
	主要诊断：	慢性淋巴细胞白血病-初治CLL成人患者	ICD-10码：	C91.1	
	主要操作/主要治疗方式：		CCHI码：		
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：C91.1慢性淋巴细胞白血病（CLL）疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断时，但在住院期间不需要特殊处理，也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 一般情况良好。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。			
	最短住院日参考值：	7天			
	变异条件：	1. 治疗中或治疗后有感染、贫血、出血及其他合并症者，进行相关的诊断和治疗，并适当延长住院时间。 2. 病情进展或合并严重并发症需要进行其他诊断和治疗者退出路径。			
	再入院间隔时间：	1周			

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
I 级护理	ACAC0001	白血病化疗药物鞘内注射	HNA48101	化疗药物	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			血液制品	
外周血细胞形态学分析	CAAS1000			碱化尿液类药物	
骨髓穿刺术	FNA06101			免疫抑制剂	
骨髓涂片细胞学检验	CACA6000				
骨髓特殊染色及酶组织化学染色检查	特殊染色及诊断BEAB0001酶组织化学染色及诊断BEAB0001				
糖原染色检查	CACV8000				
过氧化物酶染色检查	CACN8000			化疗药物	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
染色体核型分析	染色体核型分析 CLDA8000或脆性X染色体 核型分析CLDB8000或高 分辨染色体核型分析 CLDC8000或姐妹染色体 互换分析CLDD8000				
血细胞荧光原位杂交 分析	CLDL1000				
白血病融合基因检测	CLDS8000				
细胞膜分化抗原检测	CACH8000				
骨髓组织活检病理诊 断	BCAC0001				
免疫组织化学染色诊 断	免疫组织化学染色诊断 BEBA0001或免疫荧光染 色诊断BEBB0001				
免疫固定电泳测定	CEAH8000				
直接抗人球蛋白 (Coombs') 试验	CAFH1000				
尿常规化学分析	CCAA2000				
粪便常规检查	CCCA3000				
隐血试验	CCCB8000				
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000和ABO血型 鉴定(反定型)CAMB1000 和ABO亚型鉴定(正定 型)CAMD1000和ABO亚型 鉴定(反定型)CAME1000 和RhD血型鉴定CAMF1000				
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000和 Rh血型c抗 原鉴定CAMH1000和Rh血 型E抗原鉴定CAMJ1000和 Rh血型e抗原鉴定 CAMK1000和Rh血型其它 抗原鉴定CAML1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (Alb) 测定CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定CECD8000和乳酸脱氢酶 (LD) 测定CECW1000和尿素 (Urea) 测定CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000和肌酸激酶 (CK) 测定CECS1000和肌酸激酶-MB同工酶活性 (CK-MB) 测定CECT1000和甘油三酯 (TG) 测定CEHB1000和总胆固醇 (TC) 测定CEHA1000和高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C) 测定CEHC1000和低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C) 测定CEHD1000和葡萄糖 (Glu) 测定CEFA8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000和无机磷 (P) 测定CEKA8000和钾 (K) 测定CEJA8000和钠 (Na) 测定CEJB8000和氯 (Cl) 测定CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定CEJD1000				
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定CAGA1000和活化部分凝血活酶时间 (APTT) 测定CAGB1000和血浆凝血酶原时间 (PT) 测定CAGC1000和血浆纤维蛋白原测定CAGD1000和纤维蛋白(原)降解产物 (FDP) 测定CAJX1000和凝血酶原活动度 (PA) 和凝血酶原比值 (R) 和凝血酶原INR值 (INR) 和血浆D-二聚体 (D-Dimer) 测定CAJY1000				
血浆D-二聚体 (D-Dimer) 测定	CAJY1000				
甲型肝炎抗体 (抗HAV) 测定	CGLE1000				
乙型肝炎表面抗原 (HBsAg) 测定	乙型肝炎表面抗原定性 (HBsAg) 测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量 (HBsAg) 测定CGLH1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定	CGLL1000				
乙型肝炎e抗原定性(HBeAg)测定	CGLM1000				
乙型肝炎e抗体(HBeAb)测定	CGLP1000				
乙型肝炎核心抗体(抗HBc)测定	CGLS1000				
/丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000				
/人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
/梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
抗核提取物抗体(抗ENA抗体)七项测定	CGDD1000				
抗核抗体(ANA)测定	CGDB1000				
抗双链DNA(抗dsDNA)测定	CGDT1000				
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001				
泌尿系B超检查	EDBRA001				
胸部X线摄影	EABJT001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道常规 心电图检查FKA03702或 十二通道常规心电图检 查FKA03703				
心脏彩色多普勒超声	EDFKA007				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (A1b) 测定CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定CECD8000				
细胞膜分化抗原检测 (x30)	CACH8000				
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000				
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000和钠 (Na) 测定CEJB8000和氯 (Cl) 测定CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定CEJD1000和镁 (Mg) 测定CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000无机磷 (P) 测定 CEKA8000				
胸部X光片	胸部X线透视EAAJT001或胸部X线摄影EABJT001				
腹膜后B超检查	EDBQT004				
染色体荧光原位杂交分析	CLDN8000				
血液病相关基因定性检测	CACK8000				
血液病相关基因定量检测	CACL8000				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
微量残留白血病细胞检测	CADB8000	骨髓穿刺术	FNA06101	抑酸剂	
红细胞沉降率(ESR)测定	CAAJ1000	院内遥测心电监护	舱内直排吸氧KJA21403或常压高流量吸氧KJA21404	升白药	
淋巴细胞亚类检测	CGCV8000	心电监测	心电监测远程传输FKA05704或无创心电监测FKA05705	降颅压药物	
免疫球蛋白测定	免疫球蛋白G(IgG)定量测定CGAT1000或免疫球蛋白M(IgM)定量测定CGAU1000或免疫球蛋白D(IgD)定量测定CGAV1000或免疫球蛋白E(IgE)定量测定CGAW1000或分泌型免疫球蛋白A测定CGAX1000或免疫球蛋白亚类定量测定CGBA1000或免疫球蛋白轻链测定CGBB8000或免疫球蛋白游离轻链测定CGBC8000或B细胞膜表面免疫球蛋白测定CGBH1000或脱敏免疫球蛋白IgG测定CGUU1000或脱敏免疫球蛋白IgG4测定CGUV1000				
脑脊液检查	脑脊液(CSF)常规细胞计数检查CCDC4000和脑脊液糖定性测定CCDD4000和脑脊液蛋白定性测定CCDE4000			升红细胞药	
脑脊液生化检查	葡萄糖(Glu)测定CEFA8000和微量总蛋白(mTP)测定CEAB8000和氯(Cl)测定CEJC8000			升血小板药	
一般细菌培养	CJAN8000			抗生素	
/一般细菌鉴定	CJAT8000			抗真菌治疗	
普通细菌药敏试验	普通细菌药敏定性试验CJBX9000或普通细菌药敏定量试验CJBY9000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
真菌药敏试验	真菌药敏定性试验 CJHT9000或真菌药敏定量试验CJHU9000				
呼吸道相关病毒检查	呼吸道合胞病毒抗体测定CGMW1000或呼吸道合胞病毒抗原测定CGMX5000				
腺病毒抗体测定	CGNB1000				
肺炎支原体免疫学试验	CGPJ8000				
EB病毒测定	EB病毒抗体测定 CGMS1000和EB病毒壳膜抗原抗体(抗VCA)测定 CGMT1000和EB病毒早期抗原抗体IgG(抗EA IgG)测定 CGMU1000和EB病毒核抗原抗体IgG(抗EBNA IgG)测定 CGMV1000				
CMV抗体测定	风疹病毒抗体测定 CGMK1000或巨细胞病毒抗原血症(CMVPP65)测定 CGML8000或巨细胞病毒抗体测定CGMM1000				
真菌D-葡聚糖检测	CJHR8000				
真菌快速鉴定	CJHV9000				
血气分析	CEJM1000				
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001				
上腹部X线计算机体层(CT)平扫	EBAQT001				
下腹部X线计算机体层(CT)平扫	EBAQT002				
头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001				
颅脑磁共振成像	ECABA001				
骨髓有核细胞计数	CACB6000				
骨髓巨核细胞计数	CACC6000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
骨髓造血祖细胞培养	CACG8000				
淋巴结穿刺组织活检术	FNQ07102				
淋巴结切取活检术	FNQ07301				

慢性髓细胞白血病（CML）—初治CML成人患者

适用对象：	病种编码：	IM006			
	主要诊断：	慢性髓细胞白血病（CML）—初治CML成人患者	ICD-10码：	C92.1	
	主要操作/主要治疗方式：		CCHI码：		
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：C92.1慢性髓细胞白血病（CML）疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断时，但在住院期间不需要特殊处理，也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 一般情况良好。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。			
	最短住院日参考值：	10天			
	变异条件：	1. 治疗中或治疗后有感染、贫血、出血及其他合并症者，进行相关的诊断和治疗，并适当延长住院时间或退出路径。 2. 干细胞移植的患者进入移植相关路径。 3. 疾病进展期的患者退出路径。			
	再入院间隔时间：	1周			

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
I 级护理	ACAC0001	骨髓穿刺术+骨髓活检术	FNA06101加FNA09102	化疗药物	
II 级护理	ACAB0001	心电监测	心电监测远程传输FKA05704或无创心电监测FKA05705	清脏腑热药	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	白血病化疗药物鞘内注射	HNA48101	止吐药物	
外周血细胞形态学分析	CAAS1000			静脉补液	
骨髓穿刺术	FNA06101			碱化尿液类药物	
骨髓涂片细胞学检验	CACA6000			治疗高尿酸血症	
骨髓特殊染色及酶组织化学染色检查	酶组织化学染色及诊断BEAB0001酶组织化学染色及诊断BEAB0001				
染色体核型分析	CLDA8000			化疗药物	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
染色体荧光原位杂交分析	CLDN8000				
白血病融合基因检测	CLDS8000				
白血病免疫分型	BBAG701或BBAG702或BBAG703				
免疫组织化学染色诊断	BEBA0001				
骨髓组织活检病理诊断	BCAC0001				
尿常规化学分析	CCAA2000				
粪便常规检查	CCCA3000				
隐血试验	CCCB8000				
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000				
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000				
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEE8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000				
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000				
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000				
血浆鱼精蛋白副凝(3P) 试验	CAHV1000				
血浆抗凝血酶活性(AT:A) 测定	CAJC1000				
纤维蛋白(原) 降解产物(FDP) 测定	CAJX1000				
血浆D-二聚体(D-Dimer) 测定	CAJY1000				
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000				
丙型肝炎抗体(抗HCV) 测定	CGMA1000				
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV) 测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
一般细菌培养	CJAN8000				
一般细菌鉴定	CJAT8000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
普通细菌药敏试验	普通细菌药敏定性试验 CJBX9000或普通细菌药 敏定量试验CJBY9000				
真菌药敏试验	真菌药敏定性试验 CJHT9000或真菌药敏定 量试验CJHU9000				
腰椎穿刺术	FVT06101				
脑脊液检查	脑脊液 (CSF) 常规细胞计 数检查CCDC4000和脑脊 液糖定性测定CCDD4000 和脑脊液蛋白定性测定 CCDE4000				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道常规 心电图检查FKA03702或 十二通道常规心电图检 查FKA03703				
胸部X光片	胸部x线透视EABJT001或 胸部x线摄影EABJT001				
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001				
泌尿系B超检查	EDBRA001				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000和乳酸脱氢酶(LD)测定CECW1000和尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000和肌酸激酶(CK)测定CECS1000和肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定CECT1000和甘油三酯(TG)测定CEHB1000和总胆固醇(TC)测定CEHA1000和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定CEHC1000和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定CEHD1000和葡萄糖(Glu)测定CEFA8000和总钙(Ca)测定CEJF8000和无机磷(P)测定CEKA8000和钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000				
腹膜后B超检查	EDBQT004				
骨髓有核细胞计数	CACB6000				
骨髓巨核细胞计数	CACC6000				
骨髓造血祖细胞培养	CACG8000				
血液病相关基因定性检测	CACK8000				
血液病相关基因定量检测	CACL8000				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
红细胞沉降率(ESR)测定	CAAJ1000	粒细胞分离单采治疗	KND39201	抑酸剂	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
淋巴细胞亚类检测	CGCV8000	院内遥测心电监护	KKA28701	降颅压药物	
免疫球蛋白测定	免疫球蛋白G(IgG)定量测定CGAT1000或免疫球蛋白M(IgM)定量测定CGAU1000或免疫球蛋白D(IgD)定量测定CGAV1000或免疫球蛋白E(IgE)定量测定CGAW1000或分泌型免疫球蛋白A测定CGAX1000或免疫球蛋白亚类定量测定CGBA1000或免疫球蛋白轻链测定CGBB8000或免疫球蛋白游离轻链测定CGBC8000或B细胞膜表面免疫球蛋白测定CGBH1000或脱敏免疫球蛋白IgG测定CGUU1000或脱敏免疫球蛋白IgG4测定CGUV1000	白血病化疗药物鞘内注射	HNA48101	抗凝血药	
脑脊液生化检查	葡萄糖(Glu)测定CEFA8000和微量总蛋白(mTP)测定CEAB8000和氯(Cl)测定CEJC8000	吸氧	舱内直排吸氧KJA21403或常压高流量吸氧KJA21404	血液制品	
一般细菌培养	CJAN8000			抗生素	
/一般细菌鉴定	CJAT8000				
呼吸道相关病毒检查	呼吸道合胞病毒抗体测定CGMW1000或呼吸道合胞病毒抗原测定CGMX5000				
腺病毒抗体测定	CGNB1000				
肺炎支原体免疫学试验	CGPJ8000				
EB病毒测定	EB病毒抗体测定CGMS1000和EB病毒壳膜抗原抗体(抗VCA)测定CGMT1000和EB病毒早期抗原抗体IgG(抗EA IgG)测定CGMU1000和EB病毒核抗原抗体IgG(抗EBNA IgG)测定CGMV1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
CMV抗体测定	风疹病毒抗体测定 CGMK1000或巨细胞病毒 抗原血症 (CMVPP65) 测定 CGML8000或巨细胞病毒 抗体测定CGMM1000				
真菌D-葡聚糖检测	CJHR8000				
真菌快速鉴定	CJHV9000				
血气分析	CEJM1000				
胸部X线计算机体层 (CT) 平扫	EBAJT001				
上腹部X线计算机体层 (CT) 平扫	EBAQT001				
下腹部X线计算机体层 (CT) 平扫	EBAQT002				
头部X线计算机体层 (CT) 平扫	EBABP001				
颅脑磁共振成像	ECABA001				

自身免疫性溶血性贫血
-初治AIHA成人患者

适用对象：	病种编码：	IM007
主要诊断：	自身免疫性溶血性贫血-初治AIHA成人患者 ICD-10码：D59.0, D59.1	
主要操作/主要治疗方式：	CCHI码：	
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：D59.0, D59.1自身免疫性溶血性贫血疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理，也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。	
出院标准：	1. 一般情况良好。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。	
最短住院日参考值：	14天	
变异条件：	溶血危象、常规治疗无效、发生严重并发症等，则退出该路径。	
再入院间隔时间：	1周	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
I 级护理	ACAC0001	单重血浆置换或双膜血浆置换	KNC66201或KNC66202	化疗药物	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	骨髓穿刺术+骨髓活检术	FNA06101和FNA09102	免疫抑制剂	
网织红细胞分析	CAAF1000			静脉补液	
外周血细胞形态学分析	CAAS1000			补钙药物	
骨髓涂片细胞学检验	CACA6000			清脏腑热药	
细胞膜分化抗原检测	CACH8000				
免疫组织化学染色诊断	免疫组织化学染色诊断BEBA0001或免疫荧光染色诊断BEBB0001				
骨髓组织活检病理诊断	BCAC0001			化疗药物	
尿常规化学分析	CCAA2000				
粪便常规检查	CCCA3000				
隐血试验	CCCB8000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000和乳酸脱氢酶(LD)测定CECW1000和尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000和肌酸激酶(CK)测定CECS1000和肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定CECT1000和甘油三酯(TG)测定CEHB1000和总胆固醇(TC)测定CEHA1000和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定CEHC1000和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定CEHD1000和葡萄糖(Glu)测定CEFA8000和总钙(Ca)测定CEJF8000和无机磷(P)测定CEKA8000和钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000				
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000和活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000和血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000和血浆纤维蛋白原测定CAGD1000				
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000和ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000和ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000和ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000和RhD血型鉴定CAMF1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000和 Rh血型c抗 原鉴定CAMH1000和Rh血 型E抗原鉴定CAMJ1000和 Rh血型e抗原鉴定 CAMK1000和Rh血型其它 抗原鉴定CAML1000				
直接抗人球蛋白 (Coombs') 试验	CAFH1000				
血清酸化溶血 (Ham) 试验	CAEM1000				
血浆游离血红蛋白测 定	CAEB1000				
甲型肝炎抗体 (抗 HAV) 测定	CGLE1000				
乙型肝炎表面抗原 (HBsAg) 测定	乙型肝炎表面抗原定性 (HBsAg) 测定CGLG1000或 乙型肝炎表面抗原定量 (HBsAg) 测定CGLH1000				
/乙型肝炎表面抗体 定量 (抗HBs) 测定	CGLL1000				
/乙型肝炎e抗原定性 (HBeAg) 测定	CGLM1000				
/乙型肝炎e抗体 (HBeAb) 测定	CGLP1000				
/乙型肝炎核心抗体 (抗HBc) 测定	CGLS1000				
/丙型肝炎抗体 (抗 HCV) 测定	CGMA1000				
/人免疫缺陷病毒抗 体 (抗HIV) 测定	CGMF1000				
/梅毒螺旋体抗体 (抗 TP) 测定	CGPP1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
红细胞沉降率(ESR)测定	CAAJ1000				
抗链球菌溶血素O(ASO)测定	CGPB1000				
类风湿因子(RF)测定	CGFG1000				
抗核抗体(ANA)测定	CGDB1000				
抗双链DNA(抗dsDNA)测定	CGDT1000				
抗核提取物抗体(抗ENA抗体)七项测定	CGDD1000				
抗心磷脂抗体(ACA)测定	CGEL1000				
抗中性粒细胞胞浆抗体(cANCA)测定	CGDS1000				
抗血小板膜糖蛋白自身抗体测定	CAGG1000				
C3测定	CGAF1000				
/C4测定	CGAG1000				
系统性红斑狼疮因子(LEF)试验	CGDA1000				
C-反应蛋白(CRP)测定	CGCA1000				
胸部X线摄影	EABJT001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道常规 心电图检查FKA03702或 十二通道常规心电图检 查FKA03703				
心脏彩色多普勒超声	EDFKA007				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001				
染色体核型分析 (x4)	CLDA8000				
细胞膜分化抗原检测	CACH8000				
细胞膜分化抗原检测 (x10)	CACH8000				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
尿血红蛋白定性试验	CCAJ2000	吸氧	舱内直排吸氧 KJA21403或常压高流量吸氧KJA21404		
热溶血试验	CAEJ1000	院内遥测心电监护	KKA28701		
血气分析	CEJM1000				
一般细菌培养	CJAN8000				
/一般细菌鉴定	CJAT8000				
普通细菌药敏试验	普通细菌药敏定性试验 CJBX9000或普通细菌药敏定量试验CJBY9000				
真菌药敏试验	真菌药敏定性试验 CJHT9000或真菌药敏定量试验CJHU9000				
肺炎支原体免疫学试验	CGPJ8000				
呼吸道相关病毒检查	呼吸道合胞病毒抗体测定CGMW1000或呼吸道合胞病毒抗原测定CGMX5000				
腺病毒抗体测定	CGNB1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
EB病毒测定	EB病毒抗体测定 CGMS1000和EB病毒壳膜 抗原抗体(抗VCA)测定 CGMT1000和EB病毒早期 抗原抗体IgG(抗EAIgG) 测定CGMU1000和EB病毒 核抗原抗体IgG(抗 EBNAIgG)测定CGMV1000				
CMV抗体测定	风疹病毒抗体测定 CGMK1000或巨细胞病毒 抗原血症(CMVPP65)测定 CGML8000或巨细胞病毒 抗体测定CGMM1000				
真菌D-葡聚糖检测	CJHR8000				
真菌快速鉴定	CJHV9000				
淋巴细胞亚类检测	CGCV8000				
抗血液细胞抗体测定	CGEB1000				
免疫球蛋白测定	免疫球蛋白G(IgG)定量 测定CGAT1000或免疫球 蛋白M(IgM)定量测定 CGAU1000或免疫球蛋白 D(IgD)定量测定 CGAV1000或免疫球蛋白 E(IgE)定量测定 CGAW1000或分泌型免疫 球蛋白A测定CGAX1000或 免疫球蛋白亚类定量测 定CGBA1000或免疫球蛋 白轻链测定CGBB8000或 免疫球蛋白游离轻链测 定CGBC8000或B细胞膜表 面免疫球蛋白测定 CGBH1000或脱敏免疫球 蛋白IgG测定CGUU1000或 脱敏免疫球蛋白IgG4测 定CGUV1000				
胸部X线计算机体层 (CT)平扫	EBAJT001				
上腹部X线计算机体 层(CT)平扫	EBAQT001				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
下腹部X线计算机体层(CT)平扫	EBAQT002				
头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001				
颅脑磁共振成像	ECABA001				
泌尿系B超检查	EDBRA001				

特发性血小板减少性紫癜
-初治ITP成人患者

适用对象：	病种编码：	IM008			
	主要诊断：	特发性血小板减少性紫癜-初治ITP成人患者	ICD-10码：	D69.3	
	主要操作/主要治疗方式：		CCHI码：		
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：D69.3特发性血小板减少性紫癜。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理，也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。				
出院标准：	1. 一般情况良好。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。				
最短住院日参考值：	14天				
变异条件：	1. 合并严重内脏出血、需要切脾治疗、发生严重并发症等，则退出该路径。 2. 上述治疗无效。				
再入院间隔时间：	1周				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
I 级护理	ACAC0001	骨髓穿刺术+骨髓活 检术	FNA06101和FNA09102	化疗药物	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞 计数+5分类检测 CAAB1000			免疫抑制剂	
网织红细胞分析	CAAF1000			静脉补液	
外周血细胞形态学分析	CAAS1000			止血药物	
骨髓涂片细胞学检验	CACA6000			清脏腑热药	
细胞膜分化抗原检测	CACH8000			补钙药物	
骨髓组织活检病理诊断	BCAC0001				
免疫组织化学染色诊断	免疫组织化学染色诊断 BEBA0001或免疫荧光染色 诊断BEBB0001			化疗药物	
尿常规化学分析	CCAA2000				
粪便常规检查	CCCA3000				
隐血试验	CCCB8000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000和ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000和ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000和ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000和RhD血型鉴定CAMF1000				
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000和Rh血型c抗原鉴定CAMH1000和Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000和Rh血型e抗原鉴定CAMK1000和Rh血型其它抗原鉴定CAML1000				
生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000和乳酸脱氢酶(LD)测定CECW1000和尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000和肌酸激酶(CK)测定CECS1000和肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定CECT1000和甘油三酯(TG)测定CEHB1000和总胆固醇(TC)测定CEHA1000和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定CEHC1000和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定CEHD1000和葡萄糖(Glu)测定CEFA8000和总钙(Ca)测定CEJF8000和无机磷(P)测定CEKA8000和钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000				
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000和活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000和血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000和血浆纤维蛋白原测定CAGD1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
红细胞沉降率(ESR)测定	CAAJ1000				
直接抗人球蛋白(Coombs')试验	CAFH1000				
类风湿因子(RF)测定	CGFG1000				
抗核抗体(ANA)测定	CGDB1000				
抗核提取物抗体(抗ENA抗体)七项测定	CGDD1000				
抗双链DNA(抗dsDNA)测定	CGDT1000				
C3测定	CGAF1000				
/C4测定	CGAG1000				
狼疮抗凝物质检测	CAJM1000				
抗心磷脂抗体(ACA)测定	CGEL1000				
抗β2-糖蛋白1抗体测定	CGFN1000				
系统性红斑狼疮因子(LEF)试验	CGDA1000				
抗链球菌溶血素O(ASO)测定	CGPB1000				
/C-反应蛋白(CRP)测定	CGCA1000				
甲型肝炎抗体(抗HAV)测定	CGLE1000				
乙型肝炎表面抗原(HBsAg)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000				
/乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定	CGLL1000				
/乙型肝炎e抗原定性(HBeAg)测定	CGLM1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
/乙型肝炎e抗体(HBeAb)测定	CGLP1000				
/乙型肝炎核心抗体(抗HBc)测定	CGLS1000				
/丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000				
/人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
/梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001				
胸部X线摄影	EABJT001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703				
心脏彩色多普勒超声	EDFKA007				
头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001				
染色体核型分析	CLDA8000				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
血气分析	CEJM1000	血气分析	CEJM1000	抗HP药物	
一般细菌培养	CJAN8000	骨髓穿刺术	FNA06101	升血小板药	
/一般细菌鉴定	CJAT8000	院内遥测心电监护	KKA28701		
普通细菌药敏试验	普通细菌药敏定性试验CJBX9000或普通细菌药敏定量试验CJBY9000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
真菌药敏试验	真菌药敏定性试验 CJHT9000或真菌药敏定量试验CJHU9000				
肺炎支原体免疫学试验	CGPJ8000				
呼吸道相关病毒检查	呼吸道合胞病毒抗体测定CGMW1000或呼吸道合胞病毒抗原测定CGMX5000				
腺病毒抗体测定	CGNB1000				
EB病毒测定	EB病毒抗体测定CGMS1000和EB病毒壳膜抗原抗体(抗VCA)测定CGMT1000和EB病毒早期抗原抗体IgG(抗EA IgG)测定CGMU1000和EB病毒核抗原抗体IgG(抗EBNA IgG)测定CGMV1000				
CMV抗体测定	风疹病毒抗体测定CGMK1000或巨细胞病毒抗原血症(CMVPP65)测定CGML8000或巨细胞病毒抗体测定CGMM1000				
真菌D-葡聚糖检测	CJHR8000				
真菌快速鉴定	CJHV9000				
淋巴细胞亚类检测	CGCV8000				
抗血液细胞抗体测定	CGEB1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
免疫球蛋白测定	免疫球蛋白G (IgG) 定量测定CGAT1000或免疫球蛋白M (IgM) 定量测定CGAU1000或免疫球蛋白D (IgD) 定量测定CGAV1000或免疫球蛋白E (IgE) 定量测定CGAW1000或分泌型免疫球蛋白A测定CGAX1000或免疫球蛋白亚类定量测定CGBA1000或免疫球蛋白轻链测定CGBB8000或免疫球蛋白游离轻链测定CIBC8000或B细胞膜表面免疫球蛋白测定CGBH1000或脱敏免疫球蛋白IgG测定CGUU1000或脱敏免疫球蛋白IgG4测定CGUV1000				
胸部X线计算机体层(CT) 平扫	EBAJT001				
上腹部X线计算机体层(CT) 平扫	EBAQT001				
下腹部X线计算机体层(CT) 平扫	EBAQT002				
颅脑磁共振成像	ECABA001				
泌尿系B超检查	EDBRA001				

成人急性早幼粒细胞白血病-初治（APL）患者

适用对象：	疾病编码：	IM009			
	主要诊断：	成人急性早幼粒细胞白血病-初治（APL）患者	ICD-10码：	C92.400	
	疾病状态：	初治APL成人患者			
	主要操作/主要治疗方式：		CCHI码：		
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合急性早幼粒细胞白血病（APL）疾病编码（ICD10：C92.400）； 2. 当患者同时具有其他疾病诊断时，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 一般情况良好； 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。			
	最短住院日参考值：	35-40天			
	变异条件：	1. 治疗前、中、后有感染、贫血、出血及其他合并症者，需进行相关的诊断和治疗，可适当延长住院时间。 2. 诱导分化治疗40天未达完全缓解者退出路径。 3. 若腰穿后脑脊液检查示存在脑白，建议隔日腰穿鞘注化疗药物直至脑脊液检查正常，同时退出此途径，进入相关途径。			
	再入院间隔时间：	14天			

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		骨髓穿刺术	FNA06101	化疗药物	
I 级护理	ACAC0001	腰椎穿刺术	FVT06101	抗肿瘤药物	
检查		经外周静脉置入中心静脉导管术	ABDA0001	血液制品	
血常规(每天一次)	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			升血小板药	
尿常规化学分析	CCAA2000			清脏腑热药	
粪便常规检查	CCCA3000			保心药	
隐血试验	CCCB8000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
细胞计数	白细胞(WBC)计数 CAAK1000和白细胞分类 (DC)计数CAAL1000和嗜 酸性粒细胞直接计数 CAAM1000和嗜碱性粒细 胞直接计数CAAN1000和 淋巴细胞直接计数 CAAP1000和单个核细胞 直接计数CAAQ1000和血 小板计数CAAR1000			化疗药物	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000和ABO血型 鉴定(反定型)CAMB1000 和ABO亚型鉴定(正定 型)CAMD1000和ABO亚型 鉴定(反定型)CAME1000 和RhD血型鉴定 CAMF1000				
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000和 Rh血型c抗 原鉴定CAMH1000和Rh血 型E抗原鉴定CAMJ1000 和Rh血型e抗原鉴定 CAMK1000和Rh血型其它 抗原鉴定CAML1000				
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000和活化部分凝 血活酶时间(APTT)测定 CAGB1000和血浆凝血酶 原时间(PT)测定 CAGC1000和血浆纤维蛋 白原测定CAGD1000				
血浆抗凝血酶活性 (AT:A)测定	CAJC1000				
血浆鱼精蛋白副凝 (3P) 试验	CAHV1000				
纤维蛋白(原)降解产 物(FDP)测定	CAJX1000				
血浆D-二聚体(D- Dimer)测定	CAJY1000				
骨髓涂片细胞学检验	CACA6000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
甲型肝炎抗体(抗HAV)测定	CGLE1000				
生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CED8000和乳酸脱氢酶(LD)测定CECW1000和尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000和肌酸激酶(CK)测定CECS1000和肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定CECT1000和甘油三酯(TG)测定CEHB1000和总胆固醇(TC)测定CEHA1000和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定CEHC1000和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定CEHD1000和葡萄糖(Glu)测定CEFA8000和总钙(Ca)测定CEJF8000和无机磷(P)测定CEKA8000和钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000				
乙型肝炎表面抗体(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000				
/丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000				
/人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
/梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
一般细菌培养	CJAN8000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
/一般细菌鉴定	CJAT8000				
普通细菌药敏试验	普通细菌药敏定性试验 CJBX9000或普通细菌药 敏定量试验CJBY9000				
真菌药敏试验	真菌药敏定性试验 CJHT9000或真菌药敏定 量试验CJHU9000				
染色体核型分析	染色体核型分析 CLDA8000或脆性X染色 体核型分析CLDB8000或 高分辨染色体核型分析 CLDC8000或姐妹染色体 互换分析CLDD8000				
免疫组织化学染色诊 断	免疫组织化学染色诊断 BEBA0001或免疫荧光染 色诊断BEBB0001				
糖原染色检查	CACV8000				
过氧化物酶染色检查	CACN8000				
骨髓组织活检病理诊 断	BCAC0001				
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001				
泌尿系B超检查	EDBRA001				
胸部X线摄影	EABJT001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道常规 心电图检查FKA03702或 十二通道常规心电图检 查FKA03703				
心脏彩色多普勒超声	EDFKA007				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
眼底检查	免散瞳眼底检查 FES01704或非散瞳直接 检眼镜眼底检查 FES01705或前置镜眼底 检查FES01706或间接眼 底镜检查FES01707或三 面镜眼底检查FES01713				
细胞膜分化抗原检测 (×30)	CACH8000				
白血病融合基因检测 (多种基因筛查× 10)	CLDS8000				
脑脊液检查	脑脊液(CSF)常规细胞计 数检查CCDC4000和脑脊 液糖定性测定CCDD4000 和脑脊液蛋白定性测定 CCDE4000				
脑脊液生化检查	葡萄糖(Glu)测定 CEFA8000和微量总蛋白 (mTP)测定CEAB8000和 氯(Cl)测定CEJC8000				
微量残留白血病细胞 检测	CADB8000				
头部X线计算机体层 (CT)平扫	EBABP001				
普通二维超声心动图	EDFKA005				
染色体分析	染色体荧光原位杂交分 析CLDN8000(×4)或 羊水细胞染色体分析 CLDP4000或绒毛组织染 色体分析CLDQ6000或染 色体分析CLDR8000或未 经处理的羊水细胞荧光 原位杂交分析CLDM4000 或血细胞荧光原位杂交 分析CLDL1000				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001	院内遥测心电监护	KKA28701	抗HP药物	
上腹部X线计算机体层(CT)平扫	EBAQT001	新生儿脐血管置管术	ABDB0001	降颅压药物	
下腹部X线计算机体层(CT)平扫	EBAQT002	白血病化疗药物鞘内注射	HNA48101	抑酸剂	
血细胞荧光原位杂交分析	CLDL1000	血气分析	CEJM1000	抗凝血药	
颅脑磁共振成像	ECABA001	换药	换药(小)ABFA0001或 换药(中)ABFA0002或 换药(大)ABFA0003或 换药(特大)ABFA0004	碱化尿液类药物	
肺炎支原体免疫学试验	CGPJ8000			抗生素	
呼吸道相关病毒检查	呼吸道合胞病毒抗体测定CGMW1000或呼吸道合胞病毒抗原测定CGMX5000			抗真菌治疗	
腺病毒抗体测定	CGNB1000				
EB病毒测定	EB病毒抗体测定CGMS1000和EB病毒壳膜抗原抗体(抗VCA)测定CGMT1000和EB病毒早期抗原抗体IgG(抗EA1IgG)测定CGMU1000和EB病毒核抗原抗体IgG(抗EBNA1IgG)测定CGMV1000				
CMV抗体测定	风疹病毒抗体测定CGMK1000或巨细胞病毒抗原血症(CMVPP65)测定CGML8000或巨细胞病毒抗体测定CGMM1000				
真菌D-葡聚糖检测	CJHR8000				
真菌快速鉴定	CJHV9000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
吸氧	舱内直排吸氧KJA21403 或常压高流量吸氧 KJA21404				
血管超声造影	EDCM9001				
小儿颅脑B超检查	EDBBA001				
淋巴细胞亚类检测	CGCV8000				
免疫球蛋白测定	免疫球蛋白G(IgG)定量 测定CGAT1000或免疫球 蛋白M(IgM)定量测定 CGAU1000或免疫球蛋白 D(IgD)定量测定 CGAV1000或免疫球蛋白 E(IgE)定量测定 CGAW1000或分泌型免疫 球蛋白A测定CGAX1000 或免疫球蛋白亚类定量 测定CGBA1000或免疫球 蛋白轻链测定CGBB8000 或免疫球蛋白游离轻链 测定CGBC8000或细胞膜 表面免疫球蛋白测定 CGBH1000或脱敏免疫球 蛋白IgG测定CGUU1000 或脱敏免疫球蛋白IgG4 测定CGUV1000				

成人急性早幼粒细胞白血病（APL）-诱导达完全缓解（CR）的患者

适用对象：	疾病编码：	IM010
主要诊断：	成人急性早幼粒细胞白血病（APL）-诱导达完全缓解（CR）的患者	ICD-10码：C92.401
疾病状态：	诱导达完全缓解（CR）的成人APL患者	
主要操作/主要治疗方式：		CCHI码：
入院标准：	1. 第一诊断必须符合急性早幼粒细胞白血病（APL） 疾病编码（ICD10：C92.401）； 2. 经诱导化疗达CR； 3. 当患者同时具有其他疾病诊断时，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。	
出院标准：	1. 一般情况良好； 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。	
最短住院日参考值：	14天	
变异条件：	1. 治疗中、后有感染、贫血、出血及其他合并症者进行相关的诊断和治疗，并适当延长住院时间。 2. 若腰穿后脑脊液检查示存在脑白，建议隔日腰穿鞘注化疗药物直至脑脊液检查正常，同时退出此途径，进入相关途径。	
再入院间隔时间：	14天	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
I 级护理	ACAC0001	静脉输液	ABCA0001	化疗药物	
II 级护理	ACAB0001	院内遥测心电监护	KKA28701	止吐药物	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	静脉置管护理	ACBG0002	抑酸剂	
外周血细胞形态学分析	CAAS1000	白血病化疗药物鞘内注射	HNA48101	清脏腑热药	
骨髓穿刺术	FNA06101	腰椎穿刺术	FVT06101	升血小板药	
骨髓涂片细胞学检验	CACA6000			保心肌药物	
骨髓特殊染色及酶组织化学染色检查	特殊染色及诊断BEAB0001酶组织化学染色及诊断BEAB0001				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
染色体核型分析	CLDA8000			化疗药物	
白血病融合基因检测	CLDS8000				
白血病免疫分型	BBAG701或BBAG702或BBAG703				
微量残留白血病细胞检测	CADB8000				
骨髓组织活检病理诊断	BCAC0001				
尿常规化学分析	CCAA2000				
粪便常规检查	CCCA3000				
隐血试验	CCCB8000				
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000				
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000				
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000				
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000				
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000				
血浆鱼精蛋白副凝(3P) 试验	CAHV1000				
血浆抗凝血酶活性(AT:A) 测定	CAJC1000				
纤维蛋白(原)降解产物(FDP)测定	CAJX1000				
血浆D-二聚体(D-Dimer)测定	CAJY1000				
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000				
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000				
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
一般细菌培养	CJAN8000				
一般细菌鉴定	CJAT8000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
普通细菌药敏试验	普通细菌药敏定性试验 CJBX9000或普通细菌药敏定量试验CJBY9000				
真菌药敏试验	真菌药敏定性试验 CJHT9000或真菌药敏定量试验CJHU9000				
脑脊液检查	脑脊液 (CSF) 常规细胞计数检查CCDC4000和脑脊液糖定性测定CCDD4000和脑脊液蛋白定性测定CCDE4000				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703				
胸部X线摄影	EABJT001				
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001				
泌尿系B超检查	EDBRA001				
染色体荧光原位杂交分析（2次）	CLDN8000				
血液病相关基因定量检测	CACL8000				
细胞计数	白细胞 (WBC) 计数 CAAK1000或白细胞分类 (DC) 计数CAAL1000或嗜酸性粒细胞直接计数 CAAM1000或嗜碱性粒细胞直接计数CAAN1000或淋巴细胞直接计数 CAAP1000或单个核细胞直接计数CAAQ1000或血小板计数CAAR1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000和乳酸脱氢酶(LD)测定CECW1000和尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000和肌酸激酶(CK)测定CECS1000和肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定CECT1000和甘油三酯(TG)测定CEHB1000和总胆固醇(TC)测定CEHA1000和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定CEHC1000和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定CEHD1000和葡萄糖(Glu)测定CEFA8000和总钙(Ca)测定CEJF8000和无机磷(P)测定CEKA8000和钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000				
脑脊液生化检查	脑脊液(CSF)常规细胞计数检查CCDC4000和脑脊液糖定性测定CCDD4000和脑脊液蛋白定性测定CCDE4000				
甲型肝炎抗体(抗HAV)测定	CGLE1000				
/丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
免疫组织化学染色诊断	BEBA0001	静脉输血	ABCD0001	降颅压药物	
血气分析	CEJM1000	自控静脉镇痛治疗	HAZ48101	抗凝血药	
头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001			升白药	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001			血液制品	
腹部X线计算机体层(CT)平扫	上腹部X线计算机体层(CT)平扫EBAQT001 下腹部X线计算机体层(CT)平扫EBAQT002			抗菌药物	
普通二维超声心动图	EDFKA005			抗生素	
三面镜眼底检查	FES01713			抗菌类药物（头孢菌素）	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000和 Rh血型c抗原鉴定CAMH1000和Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000和Rh血型e抗原鉴定CAMK1000和Rh血型其它抗原鉴定CAML1000				
眼底检查	免散瞳眼底检查FES01704或非散瞳直接检眼镜眼底检查FES01705或前置镜眼底检查FES01706或间接眼底镜检查FES01707				
血管超声造影	EDCM9001				

十、消化系统疾病

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
JM001	结肠癌	姑息治疗
JM002	结肠癌	术后辅助治疗
JM003	直肠癌	术后辅助治疗
JM004	直肠癌	术前新辅助治疗
JM005	直肠癌	姑息治疗
JM006	食管鳞癌	术前新辅助治疗
JM007	食管鳞癌	术后辅助治疗
JM008	食管鳞癌	姑息治疗
JM009	轻症急性胰腺炎	
JM010	胃十二指肠溃疡	
JM011	反流食管炎	
JM012	轮状病毒肠炎	
JM013	胃癌	姑息治疗
JM014	胃癌	术前新辅助治疗
JM015	胃癌	术后辅助化疗
JS001	胃癌	胃部分切除术
JS002	胃癌	根治性近端胃大部切除术
JS003	胃癌	根治性远端胃大部切除术
JS004	胃癌	扩大根治性近端胃大部切除术
JS005	胃癌	扩大根治性远端胃大部切除术

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
JS006	胃癌	根治性全胃切除术
JS007	胃十二指肠溃疡	远端胃大部切除术
JS008	胃十二指肠溃疡	经腹腔镜远端胃大部切除术
JS009	胃十二指肠溃疡	胃迷走神经干切断术
JS010	胃十二指肠溃疡	经腹腔镜胃迷走神经干切断术
JS011	急性单纯性阑尾炎	阑尾切除术
JS012	急性单纯性阑尾炎	经腹腔镜阑尾切除术
JS013	直肠息肉	经内镜直肠良性肿物切除术
JS014	腹股沟疝	腹股沟疝修补术
JS015	下肢静脉曲张	大隐静脉高位结扎+剥脱术
JS016	下肢静脉曲张	大隐静脉腔内激光闭合术
JS017	原发性甲状腺功能亢进	甲状腺次全切除术
JS018	胆管结石（无胆管炎或胆囊炎）	胆总管探查T管引流术
JS019	胆管结石（无胆管炎或胆囊炎）	胆总管切开取石+空肠Roux-y吻合术
JS020	胆管结石（无胆管炎或胆囊炎）	经腹腔镜胆管异物取出术
JS021	先天性胆管扩张症（胆总管囊肿）	先天性胆总管囊肿切除肝门空肠Roux-y成形术
JS022	腹股沟疝	无张力腹股沟疝修补术
JS023	血栓性外痔	血栓性外痔切除术
JS024	小肠间质瘤	肠切除肠吻合术
JS125	慢性胆囊炎或合并胆囊结石	经腹腔镜胆囊切除术
JS026	肛裂	肛裂切除术

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
JS027	食管癌	食管癌切除胃代食管胸内吻合术
JS028	食管癌	经胸腔镜食管癌切除术
JS029	贲门失弛缓症	经胸腔镜食管下段贲门肌层切开术
JS030	胃食管反流病	胃底折叠术
JS031	结肠癌	根治性结肠癌切除术
JS032	结肠癌	扩大根治性结肠癌切除术
JS033	结肠癌	经腹腔镜结肠癌根治术
JS034	食管平滑肌瘤	食管良性肿物切除术
JS035	胰腺癌	胰十二指肠切除术(Whipple手术)
JS036	胰腺癌	胰体尾切除术
JS037	直肠癌	超低位直肠癌根治术
JS038	直肠癌	经腹腔镜超低位直肠癌根治术
JS039	直肠癌	经腹会阴直肠癌根治术(Miles手术)
JS040	直肠癌	经腹腔镜会阴直肠癌根治术(Miles手术)
JS041	先天性巨结肠	经腹先天性巨结肠根治术
JS042	先天性巨结肠	经腹腔镜先天性巨结肠切除术
JS043	先天性幽门肥厚性狭窄	幽门环肌切开术
JS044	先天性幽门肥厚性狭窄	经腹腔镜幽门环肌切开术
JS045	急性肠套叠	肠扭转肠套叠复位术
JS046	急性化脓性阑尾炎	阑尾切除术
JS047	胆总管结石	经电子内镜胆管机械碎石取石术

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
JS048	胆总管结石	经电子内镜胆管结石激光碎石取石术
JS049	肝硬化腹水	经腹盆腹腔液性包块穿刺引流术
JS050	大肠息肉	经电子内镜结肠息肉激光切除术
JS051	大肠息肉	经电子内镜结肠息肉微波切除术

结肠癌

姑息治疗

适用对象：	病种编码：	JM001			
	主要诊断：	结肠癌		ICD-10：	
				Z51.104+C18.0-	
				C18.9	
	主要操作/主要治疗方式：	姑息治疗		CCHI码：	
入院标准：		1. 第一诊断必须符合ICD-10：Z51.104+C18.0-C18.9结肠癌疾病编码。 2. 符合治疗适应症、无治疗禁忌症。 3. 当患者合并其他疾病，但住院期间无需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可进入路径。			
出院标准：		1. 病人一般情况良好，体温正常。 2. 没有需要住院处理的并发症。			
最短住院日参考值：		5-8天			
变异条件：		1. 围治疗期有感染、贫血、出血及其他合并症者，需进行相关的诊断和治疗，可能延长住院时间并致费用增加。 2. 治疗后出现骨髓抑制，需要对症处理，导致治疗时间延长、费用增加。 3. 治疗晚期或转移性结肠癌可能使用靶向药物等，包括贝伐珠单抗和西妥昔单抗（推荐用于K-ras基因野生型患者），导致费用增加。 4. 医师认可的变异原因分析。 5. 其他患者方面的原因等。			
再入院间隔时间：					

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		治疗		药物	
II级护理	ACAB0001			止吐、保肝	
III级护理	ACAA0001			抑酸剂	
检查				止泻剂	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			促白细胞增生药	
尿常规化学分析	CCAA2000			抗肿瘤药物	
粪便常规检查	CCCA3000			抗肿瘤辅助用药	
隐血试验	CCCB8000			抗代谢药	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (Alb) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000、乳酸脱氢酶 (LD) 测定CECW1000				
肾脏功能检查	CAMA1000				
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测定 CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测定 CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000				
结肠CT三维成像	EBCPS001				
肿瘤标志物检查	癌胚抗原 (CEA) 测定 CGRA1000和甲胎蛋白 (AFP) 测定CGRB8000 和糖类抗原CA-125测定CGRP1000和糖类抗原CA-153测定 CGRR1000和糖类抗原CA-199测定CGRS1000 和神经元特异性烯醇化酶 (NSE) 测定 CGRH1000和肿瘤坏死因子 α (TNF- α) 测定 CGRY1000和糖类抗原CA-724测定CGRV1000				
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道 常规心电图检查FKA03702或十二通道 常规心电图检查FKA03703				
电子结肠镜检查	FPS01601				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
腹部B超	右下腹B超检查 EDBQT003				
盆腔B超	泌尿系B超检查 EDBRA001或经直肠B 超常规检查EDBQT005				
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
/胃肠排空试验-钡餐 透视法	EACPA001			抗菌药物	
经直肠B超常规检查	EDBQT005			雷替曲塞	
腹部磁共振检查	上腹部磁共振增强成 像ECBQT001和下腹部 磁共振增强成像 ECBQT002和盆腔磁共 振增强成像ECBQU001			靶向药物	
腹部CT检查	上腹部X线计算机体 层(CT)平扫EBAQT001 和上腹部X线计算机 体层(CT)增强扫描 EBBQT001或下腹部X 线计算机体层(CT)平 扫EBAQT002和下腹部 X线计算机体层(CT) 增强扫描EBBQT002				
心功能检查	普通二维超声心动图 EDFKA005或心电图踏 车负荷试验FKA04701 或冠状动脉CT三维成 像EBCKU002				
肺功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活 量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403或最大 通气量功能检查 FJE01404				
胸部CT	胸部X线计算机体层 (CT)平扫EBAJT001				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
盆腔CT（平扫+增强）	盆腔X线计算机体层 (CT) 平扫EBAQU001和 盆腔X线计算机体层 (CT) 增强扫描 EBBQU001				
腹部X线平片	腹部X线透视 EAAQT001或盆部X线 透视EAAQU001				
骨扫描	全身骨显像EEAX6004				

结肠癌

术后辅助治疗

适用对象：	病种编码：	JM002			
	主要诊断：	结肠癌		ICD-10：Z51.102+C18.0-C18.9	
	主要操作/主要治疗方式：	术后辅助治疗		CCHI码：	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：Z51.102+C18.0-C18.9结肠癌疾病编码。 2. 符合治疗适应症、无治疗禁忌症。 3. 当患者合并其他疾病，但住院期间无需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可进入路径。			
	出院标准：	1. 治疗结束，无明显副反应。 2. 没有需要住院处理的并发症。			
	最短住院日参考值：	3-10天			
	变异条件：	1. 治疗期间的合并症和/或并发症，需要进行相关的诊断和治疗，导致住院时间延长、费用增加。 2. 肿瘤的复发或转移、病情进展退出临床路径。 3. 治疗后出现骨髓抑制，需要对症处理，导致治疗时间延长、费用增加，退出临床路径。 4. 药物不良反应需要特殊处理，如过敏反应、神经毒性、心脏毒性等。 5. 出现影响结肠癌治疗的合并症，需要进行相关的治疗。 6. 医师认可的变异原因分析，如药物减量使用。 7. 其他患者方面的原因等。			
	再入院间隔时间：				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		药物		药物	
II级护理	ACAB0001	胃动力药		抗肿瘤药物	
/III级护理	ACAA0001	止吐药		抗代谢药	
检查				止泻药物	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			促白细胞增生药	
尿常规化学分析	CCAA2000			抑酸药物	
粪便常规检查	CCCA3000				
隐血试验	CCCB8000				
生化常规检查	葡萄糖(Glu)测定CEFA8000和总钙(Ca)测定CEJF8000和无机磷(P)测定CEKA8000和钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和镁(Mg)测定CEJE8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和乳酸脱氢酶(LD)测定CECW1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
电解质测定	CAMA1000				
/肿瘤标志物检查	癌胚抗原 (CEA) 测定 CGRA1000和甲胎蛋白 (AFP) 测定CGRB8000 和糖类抗原CA-125测定CGRP1000和糖类抗原CA-153测定 CGRR1000和糖类抗原CA-199测定CGRS1000 和神经元特异性烯醇化酶 (NSE) 测定 CGRH1000和肿瘤坏死因子 α (TNF- α) 测定 CGRY1000和糖类抗原CA-724测定CGRV1000				
盆腔X线计算机体层 (CT) 平扫	EBAQU001				
盆腔X线计算机体层 (CT) 增强扫描	EBBQU001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道常规心电图检查 FKA03702或十二通道常规心电图检查 FKA03703				
胸部X线计算机体层 (CT) 平扫	EBAJT001				
腹部CT检查	上腹部X线计算机体层 (CT) 平扫EBAQT001 和上腹部X线计算机体层 (CT) 增强扫描 EBBQT001或下腹部X线计算机体层 (CT) 平扫EBAQT002 和下腹部X线计算机体层 (CT) 增强扫描EBBQT002				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
电子结肠镜检查	FPS01601	静脉输液	ABCA0001	抗肿瘤辅助用药	
/胃肠排空试验-钡餐透视法	EACPA001				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
腹部磁共振检查	上腹部磁共振增强成像ECBQT001和下腹部磁共振增强成像ECBQT002和盆腔磁共振增强成像ECBQU001			其他对症治疗药物 (如抗过敏药物)	
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001			营养支持	
心功能检查	普通二维超声心动图EDFKA005或心电图踏车负荷试验FKA04701或冠状动脉CT三维成像EBCKU002			清脏腑热药	
肺功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404			利尿药	
腹部彩超检查	胃肠充盈造影B超检查EDBPA002和肝胆胰脾彩色多普勒超声检查EDCQT001				
PET/CT肿瘤全身显像	EEFZY001				
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702或三通道动态心电图检查FKA03704或十二通道动态心电图检查FKA03705				
普通二维超声心动图	EDFKA005				
病原体脱氧核糖核酸扩增定性检测	CLAA8000				
头颅MRI或CT	颅脑磁共振成像ECABA001或头部X线计算机体层(CT)平扫EBABP001				
腹部X线平片	腹部X线透视EAAQT001或盆部X线透视EAAQU001				

直肠癌
术后辅助治疗

适用对象：	病种编码：	JM003	
	主要诊断：	直肠癌	ICD-10：Z51.102+C20
	主要操作/主要治疗方式：	术后辅助治疗	CCHI码：
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：Z51.102+C20直肠癌疾病编码。 2. 符合治疗适应症、无治疗禁忌症。 3. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 病人一般情况良好，体温正常，完成复查项目。 2. 没有需要住院处理的并发症。		
最短住院日参考值：	8—12天		
变异条件：	1. 围治疗期有感染、贫血、出血及其他合并症者，需进行相关的诊断和治疗，可能延长住院时间并致费用增加。 2. 治疗后出现骨髓抑制，需要对症处理，导致治疗时间延长、费用增加。 3. 70岁以上的结肠癌患者根据个体化情况具体实施。 4. 治疗晚期或转移性直肠癌可能使用靶向药物等，包括贝伐珠单抗和西妥昔单抗（推荐用于K-ras基因野生型患者），导致费用增加。 5. 医师认可的变异原因分析。 6. 其他患者方面的原因等。		

再入院间隔时间：

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		治疗		药物	
I 级护理	ACAC0001			抗肿瘤辅助用药	
III级护理	ACAA0001			抗肿瘤药	
检查				抗代谢药	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			止吐、保肝	
尿常规化学分析	CCAA2000			抑酸剂	
粪便常规检查	CCCA3000			止泻剂	
隐血试验	CCCB8000			促白细胞增生药	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (Alb) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000、乳酸脱氢酶 (LD) 测定CECW1000				
肾脏功能检查	CAMA1000				
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测定 CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测定 CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000				
肿瘤标志物检查	癌胚抗原 (CEA) 测定 CGRA1000和甲胎蛋白 (AFP) 测定CGRB8000 和糖类抗原CA-125测定 CGRP1000和糖类抗原CA-153测定 CGRR1000和糖类抗原CA-199测定CGRS1000 和神经元特异性烯醇化酶 (NSE) 测定 CGRH1000和肿瘤坏死因子 α (TNF- α) 测定 CGRY1000和糖类抗原CA-724测定CGRV1000				
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703				
盆腔X线计算机体层 (CT) 平扫	EBAQU001				
盆腔X线计算机体层 (CT) 增强扫描	EBBQU001				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
腹部CT检查	上腹部X线计算机体层(CT)平扫EBAQT001和上腹部X线计算机体层(CT)增强扫描EBBQT001或下腹部X线计算机体层(CT)平扫EBAQT002和下腹部X线计算机体层(CT)增强扫描EBBQT002				
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001				
病理					
活检组织病理诊断	BCAB0001				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
胃肠排空试验-钡餐透视法	EACPA001	院内遥测心电监护	KKA28701	其他对症治疗药物（如：抗过敏药物）	
电子结肠镜检查	FPS01601				
直肠镜检查	FPU01601				
大肠灌肠造影B超检查	EDBPN001				
经直肠彩色多普勒超声检查	EDCQT004				
经直肠B超常规检查	EDBQT005				
腹部磁共振检查	上腹部磁共振增强成像ECBQT001和下腹部磁共振增强成像ECBQT002和盆腔磁共振增强成像ECBQU001				
心功能检查	普通二维超声心动图EDFKA005或心电图踏车负荷试验FKA04701或冠状动脉CT三维成像EBCKU002				
肺功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404				
头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001				
腹部X线平片	腹部X线透视EAAQT001或盆部X线透视EAAQU001				
监测					

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码

中、下段直肠癌
术前新辅助治疗

适用对象：

病种编码：JM004

主要诊断：

直肠癌

ICD-10：Z51.102+C20

主要操作/主要治疗方式：

术前新辅助治疗

CCHI码：

入院标准：

1. 第一诊断必须符合ICD-10：Z51.102+C20直肠癌疾病编码。
2. 无放疗禁忌症。
3. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。

出院标准：

1. 完成全部放射治疗计划。
2. 无严重毒性反应需要住院处理。
3. 无需要住院处理的其他合并症/并发症。
4. 可以适用于术前未进行新辅助放疗，而术后又需要补做辅助放疗者。

最短住院日参考值：

≤14天

变异条件：

再入院间隔时间：

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		治疗		药物	
II级护理	ACAB0001	三维适形放疗计划设计	LAAZZ003	抗肿瘤药	
III级护理	ACAA0001	CT简易模拟定位	LACZX003	抗代谢药	
检查		普通调强放疗	LADZX015		
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	不规则野大面积照射	LADZX012		
尿常规化学分析	CCAA2000	局部断层调强放疗	LADZX017		
粪便常规检查	CCCA3000	图像引导的三维立体定向放疗	LADZX013		

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和 白蛋白 (Alb) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000、乳酸脱氢酶 (LD) 测定CECW1000				
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000和尿酸 (UA) 测定 CEEE8000和 β 2微球蛋白 (β 2-MG) 测定CEAS8000				
肿瘤标志物检查	CAMA1000				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703				
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测定 CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测定 CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000				
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000				
胸部X线摄影	EABJT001				
盆腔磁共振成像	ECAQU001				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
盆腔X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBQU001				
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001				
上腹部磁共振增强成像	ECBQT001				
胃肠排空试验-钡餐透视法	EACPA001				
腹部彩超检查	胃肠充盈造影B超检查EDBPA002和肝胆胰脾彩色多普勒超声检查EDCQT001				
腹部CT检查	上腹部X线计算机体层(CT)平扫EBAQT001和上腹部X线计算机体层(CT)增强扫描EBBQT001或下腹部X线计算机体层(CT)平扫EBAQT002和下腹部X线计算机体层(CT)增强扫描EBBQT002				
肛门指诊	FPV01401				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
肺功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404				
普通二维超声心动图	EDFKA005				
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000				
SPECT/CT骨断层显像	EEDX6001				

姑息治疗

适用对象：	病种编码：	JM005			
	主要诊断：	直肠癌		ICD-10：Z51.102+C20	
	主要操作/主要治疗方式：	姑息放疗		CCHI码：	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：Z51.102+C20直肠癌疾病编码。 2. 无放疗禁忌症。 3. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 完成全部放射治疗计划。 2. 无严重毒性反应需要住院处理。 3. 无需要住院处理的其他合并症/并发症。			
	最短住院日参考值：	≤14天			
	变异条件：				
	再入院间隔时间：				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		治疗		药物	
II级护理	ACAB0001	三维适形放疗计划设计	LAAZZ003	抗肿瘤药	
III级护理	ACAA0001	CT简易模拟定位	LACZX003	抗代谢药	
检查		普通调强放疗	LADZX015		
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	不规则野大面积照射	LADZX012		
尿常规化学分析	CCAA2000	局部断层调强放疗	LADZX017		
粪便常规检查	CCCA3000	图像引导的三维立体定向放疗	LADZX013		
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000和 β 2微球蛋白 (β 2- MG) 测定CEAS8000				
肿瘤标志物检查	CAMA1000				
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703				
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测 定CEJC8000和总二氧 化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测 定CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000				
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000				
胸部X线摄影	EABJT001				
盆腔磁共振成像	ECAQU001				
盆腔X线计算机体层 (CT) 增强扫描	EBBQU001				
胸部X线计算机体层 (CT) 平扫	EBAJT001				
上腹部磁共振增强成 像	ECBQT001				
胃肠排空试验-钡餐 透视法	EACPA001				
腹部彩超检查	胃肠充盈造影B超检 查EDBPA002和肝胆胰 脾彩色多普勒超声检 查EDCQT001				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
腹部CT检查	上腹部X线计算机体层(CT)平扫EBAQT001和上腹部X线计算机体层(CT)增强扫描EBBQT001或下腹部X线计算机体层(CT)平扫EBAQT002和下腹部X线计算机体层(CT)增强扫描EBBQT002				
肛门指诊	FPV01401				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
肺功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404				
普通二维超声心动图	EDFKA005				
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000				
SPECT/CT骨断层显像	EEDX6001				
腹部X线平片	腹部X线透视EAAQT001或盆部X线透视EAAQU001				

食管鳞癌

术前新辅助治疗

适用对象：	病种编码：	JM006			
	主要诊断：	食管鳞癌		ICD-10码：	Z51.101，C15
	主要操作/主要治疗方式：	术前新辅助治疗		CCHI码：	
入院标准：		1. 第一诊断必须符合ICD-10：Z51.101，C15食管鳞癌疾病编码。 2. 符合治疗适应症、无治疗禁忌症。 3. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
出院标准：		1. 病人一般情况良好，体温正常，完成复查项目。 2. 没有需要住院处理的并发症。			
最短住院日参考值：	5-15天				
变异条件：		1. 治疗前、中、后有感染、贫血、出血及其他合并症者，需进行相关的诊断和治疗，可能延长住院时间并导致费用增加。 2. 治疗后出现骨髓抑制，需要对症处理，导致治疗时间延长、费用增加。 3. 根据腺癌患者HER2表达情况，可选用针对HER2受体的靶向治疗药物联合治疗方案。 4. 70岁以上的食管癌患者根据个体化情况具体实施。 5. 医师认可的变异原因分析。 6. 其他患者方面的原因等。			
再入院间隔时间：	2周				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		治疗		药物	
I 级护理	ACAC0001	普通病理诊断或会诊	疑难病理读片会诊 AADC0001或同步远程 病理会诊AADD0001或 非同步远程病理会诊 AADD0002	铂类	
II 级护理	ACAA0001	抗肿瘤治疗药物/肠 外营养液集中配置	ABCJ0001	水化、碱化	
检查				紫杉类药物	
血常规	全血细胞计数+3分群 检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分 类检测CAAB1000			止吐、保肝	
尿常规化学分析	CCAA2000			抑酸剂	
粪便常规检查	CCCA3000			止泻剂	
隐血试验	CCCB8000			抗代谢药	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000乳酸脱氢酶 (LD) 测定CECW1000				
肺功能检测	CAMA1000				
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000和尿酸 (UA) 测定 CEEE8000和 β 2微球蛋白 (β 2-MG) 测定 CEAS8000				
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测定 CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测定 CEJE8000和总钙 (Ca) 测定 CEJF8000				
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间 (APTT) 测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间 (PT) 测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000				
胃镜检查	电子胃镜检查 FPB01602和超声胃镜检查 FPB01604和消化道内镜活检术 FPA07601或消化内镜检查麻醉术 FPA42201				
食管X线造影	EACPC001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道常规心电图检查 FKA03702或十二通道常规心电图检查 FKA03703				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001				
胸部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBJT001				
腹部彩超检查	胃肠充盈造影B超检查EDBPA002和肝胆胰脾彩色多普勒超声检查EDCQT001				
颈部X线透视	EAAHY001				
颈部B超	甲状腺B超检查EDBDC001				
腹部B超	右下腹B超检查EDBQT003				
腹部CT检查	上腹部X线计算机体层(CT)平扫EBAQT001和上腹部X线计算机体层(CT)增强扫描EBBQT001或下腹部X线计算机体层(CT)平扫EBAQT002和下腹部X线计算机体层(CT)增强扫描EBBQT002				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
SPECT/CT骨断层显像	EEDX6001	院内遥测心电监护	KKA28701	抗菌药物	
心肌酶	肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定CECT1000、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000、乳酸脱氢酶同工酶测定CECX1000、肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定CECT1000、α-羟基丁酸脱氢酶(α-HBD)测定CECY1000			抗肿瘤药	
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001			植物来源的抗肿瘤药及其衍生物	
腹部磁共振检查	上腹部磁共振增强成像ECBQT001和下腹部磁共振增强成像ECBQT002和盆腔磁共振增强成像ECBQU001			营养支持	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702或三通道动态心电图检查FKA03704或十二通道动态心电图检查FKA03705			抗代谢药	
肺功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404				
心功能检查	普通二维超声心动图EDFKA005或心电图踏车负荷试验FKA04701或冠状动脉CT三维成像EBCKU002				
盆腔B超	泌尿系B超检查EDBRA001或经直肠B超常规检查EDBQT005		ABCD0001		
盆腔X线计算机体层(CT)平扫	EBAQU001				
盆腔X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBQU001				
头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001				
/头部磁共振成像	头颅非增强磁共振动脉血管成像ECABJ001或头颅非增强磁共振静脉血管成像ECABM001				
全身骨显像	EEAX6004				
监测					

食管鳞癌

术后辅助治疗

适用对象：	病种编码：	JM007			
	主要诊断：	食管鳞癌	ICD-10码：	Z51.102，C15	
	主要操作/主要治疗方式：	术后辅助治疗	CCHI码：		
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：Z51.102，C15 食管鳞癌疾病编码。 2. 符合治疗适应症、无治疗禁忌症。 3. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 病人一般情况良好，体温正常。 2. 没有需要住院处理的并发症。			
	最短住院日参考值：	5-15天			
	变异条件：	1. 治疗前、中、后有感染、贫血、出血及其他合并症者，需进行相关的诊断和治疗，可能延长住院时间并导致费用增加。 2. 治疗后出现骨髓抑制，需要对症处理，导致治疗时间延长、费用增加。 3. 根据腺癌患者HER2表达情况，可选用针对HER2受体的靶向治疗药物联合治疗方案。 4. 70岁以上的食管癌患者根据个体化情况具体实施。 5. 医师认可的变异原因分析。 6. 其他患者方面的原因等。			
	再入院间隔时间：	2周			

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		治疗		药物	
I 级护理	ACAC0001	普通病理会诊	疑难病理读片会诊 AADC0001或同步远程 病理会诊AADD0001或 非同步远程病理会诊 AADD0002	紫杉类	
II 级护理	ACAA0001	抗肿瘤治疗药物/肠 外营养液集中配置	ABCJ0001	水化、碱化	
检查				铂类	
血常规	全血细胞计数+3分群 检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分 类检测CAAB1000			止吐、保肝	
尿常规化学分析	CCAA2000			抑酸剂	
粪便常规检查	CCCA3000			止泻剂	
隐血试验	CCCB8000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (Alb) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000乳酸脱氢酶 (LD) 测定CECW1000				
肺功能检测	CAMA1000				
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000和尿酸 (UA) 测定 CEEE8000和 β 2微球蛋白 (β 2-MG) 测定CEAS8000				
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测定 CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测定 CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000				
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间 (APTT) 测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间 (PT) 测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000				
胃镜检查	电子胃镜检查 FPB01602和超声胃镜检查 FPB01604和消化内镜活检术 FPA07601或消化内镜检查麻醉术FPA42201				
食管X线造影	EACPC001				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
常规心电图检查	单通通常规心电图检查 FKA03701或多通通常规心电图检查 FKA03702或十二通通常规心电图检查 FKA03703				
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001				
腹部彩超检查	胃肠充盈造影B超检查EDBPA002和肝胆胰脾彩色多普勒超声检查EDCQT001				
颈部X线透视	EAAHY001				
颈部B超	甲状腺B超检查EDBDC001				
腹部B超	右下腹B超检查EDBQT003				
腹部CT检查	上腹部X线计算机体层(CT)平扫EBAQT001和上腹部X线计算机体层(CT)增强扫描EBBQT001或下腹部X线计算机体层(CT)平扫EBAQT002和下腹部X线计算机体层(CT)增强扫描EBBQT002				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
SPECT/CT骨断层显像	EEDX6001			抗菌药物	
心肌酶	肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定CECT1000、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000、乳酸脱氢酶同工酶测定CECX1000、肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定CECT1000、 α 羟基丁酸脱氢酶(α -HBD)测定CECY1000			抗肿瘤药	
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001			植物来源的抗肿瘤药及其衍生物	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
腹部磁共振检查	上腹部磁共振增强成像ECBQT001和下腹部磁共振增强成像ECBQT002和盆腔磁共振增强成像ECBQU001			抗代谢药	
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702或三通道动态心电图检查FKA03704或十二通道动态心电图检查FKA03705				
肺功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404				
心功能检查	普通二维超声心动图EDFKA005或心电图踏车负荷试验FKA04701或冠状动脉CT三维成像EBCKU002				
盆腔B超	泌尿系B超检查EDBRA001或经直肠B超常规检查EDBQT005				
盆腔X线计算机体层(CT)平扫	EBAQU001				
盆腔X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBQU001				
头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001				
/头部磁共振成像	头颅非增强磁共振动脉血管成像ECABJ001或头颅非增强磁共振静脉血管成像ECABM001				
全身骨显像	EEAX6004				
监测					
院内遥测心电监护	KKA28701				

食管鳞癌

姑息治疗

适用对象：	病种编码：	JM008			
	主要诊断：	食管鳞癌		ICD-10码：	Z51.104，C15
	主要操作/主要治疗方式：	姑息治疗		CCHI码：	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：Z51.104，C15食管鳞癌疾病编码。 2. 符合治疗适应症、无治疗禁忌症。 3. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 病人一般情况良好，体温正常。 2. 没有需要住院处理的并发症。			
	最短住院日参考值：	5-15天			
	变异条件：	1. 治疗前、中、后有感染、贫血、出血及其他合并症者，需进行相关的诊断和治疗，可能延长住院时间并导致费用增加。 2. 治疗后出现骨髓抑制，需要对症处理，导致治疗时间延长、费用增加。 3. 根据腺癌患者HER2表达情况，可选用针对HER2受体的靶向治疗药物联合治疗方案。 4. 70岁以上的食管癌患者根据个体化情况具体实施。 5. 医师认可的变异原因分析。 6. 其他患者方面的原因等。			
	再入院间隔时间：	2周			

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		治疗		药物	
I 级护理	ACAC0001	普通病理诊断或会诊	疑难病理读片会诊 AADC0001或同步远程 病理会诊AADD0001或 非同步远程病理会诊 AADD0002	抗肿瘤药物	
II 级护理	ACAA0001	抗肿瘤治疗药物/肠 外营养液集中配置	ABCJ0001	水化、碱化	
检查					
血常规	全血细胞计数+3分群 检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分 类检测CAAB1000			止吐、保肝	
尿常规化学分析	CCAA2000			抑酸剂	
粪便常规检查	CCCA3000			止泻剂	
隐血试验	CCCB8000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (Alb) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000乳酸脱氢酶 (LD) 测定CECW1000				
肺功能检测	CAMA1000				
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000和 β 2微球蛋白 (β 2-MG) 测定CEAS8000				
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测定 CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测定 CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000				
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间 (APTT) 测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间 (PT) 测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000				
胃镜检查	电子胃镜检查 FPB01602和超声胃镜检查 FPB01604和消化道内镜活检术 FPA07601或消化内镜检查麻醉术FPA42201				
食管X线造影	EACPC001				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703				
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001				
胸部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBJT001				
腹部彩超检查	胃肠充盈造影B超检查EDBPA002和肝胆胰脾彩色多普勒超声检查EDCQT001				
颈部B超	甲状腺B超检查EDBDC001				
腹部B超	右下腹B超检查EDBQT003				
腹部CT检查	上腹部X线计算机体层(CT)平扫EBAQT001和上腹部X线计算机体层(CT)增强扫描EBBQT001或下腹部X线计算机体层(CT)平扫EBAQT002和下腹部X线计算机体层(CT)增强扫描EBBQT002				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
SPECT/CT骨断层显像	EEDX6001	院内遥测心电监护	KKA28701	抗菌药物	
心肌酶	肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定CECT1000、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000、乳酸脱氢酶同工酶测定CECX1000、肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定CECT1000、α-羟基丁酸脱氢酶(α-HBD)测定CECY1000				
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001			抗代谢药	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
腹部磁共振检查	上腹部磁共振增强成像ECBQT001和下腹部磁共振增强成像ECBQT002和盆腔磁共振增强成像ECBQU001			植物来源的抗肿瘤药及其衍生物	
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702或三通道动态心电图检查FKA03704或十二通道动态心电图检查FKA03705			营养支持	
肺功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404				
心功能检查	普通二维超声心动图EDFKA005或心电图踏车负荷试验FKA04701或冠状动脉CT三维成像EBCKU002				
盆腔B超	泌尿系B超检查EDBRA001或经直肠B超常规检查EDBQT005				
盆腔X线计算机体层(CT)平扫	EBAQU001		ABCD0001		
盆腔X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBQU001				
头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001				
头部磁共振成像	头颅非增强磁共振动脉血管成像ECABJ001或头颅非增强磁共振静脉血管成像ECABM001				
全身骨显像	EEAX6004				
经电子内镜食管支架置入术	HPC62601				
监测					

轻症急性胰腺炎

适用对象：	病种编码：	JM009	ICD-10码：K85.001/K85.101 /K85.201/K85.301/K85.801/K85.802/K85.901
	主要诊断：	轻症急性胰腺炎	CCHI码：
	主要操作/主要治疗方式：		
入院标准：		1. 第一诊断必须符合ICD-10：K85.001/K85.101/K85.201/K85.301/K85.801/K85.802/K85.901轻症急性胰腺炎疾病编码。 2. 排除急性重症胰腺炎及有严重并发症的患者（合并心、肺、肾等脏器功能损害，合并胰腺脓肿、胰腺囊肿等）。 3. 排除其他急腹症：急性肠梗阻、消化性溃疡穿孔、胆石症和急性胆囊炎、肠系膜血管栓塞、心绞痛或心肌梗死者。 4. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。	
出院标准：		1. 腹痛、腹胀缓解，开始进食。 2. 血淀粉酶稳定下降，或进食后无明显升高。	
最短住院日参考值：		14天	
变异条件：		1. 患者由轻症急性胰腺炎转为重症急性胰腺炎，退出本路径。 2. 内镜治疗：对于怀疑或已证实的急性胆源性胰腺炎，在治疗中病情恶化者，可行胆管引流术或内镜下括约肌切开术，转入相应路径。 3. 血淀粉酶持续高水平，或进食后明显升高，CRP持续高水平，导致住院时间延长。	
再入院间隔时间：		14天	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		治疗		药物	
I 级护理	ACAC0001	静脉输液	ABCA0001	抑制胰腺分泌药物或胰酶抑制剂	
II 级护理	ACAA0001	静脉采血	ABBB0001	抑酸药	
检查				其他消化系统用药及其类似药物	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			抗菌药物	
尿常规化学分析	CCAA2000			质子泵抑制剂PPI类药物	
粪便常规检查	CCCA3000				
隐血试验	CCCB8000				
甘油三酯(TG)测定	CEHB1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
ABO血型鉴定(正定型)	CAMA1000				
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000				
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000				
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000				
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000				
离子钙(Ca ²⁺)测定	CEJG1000				
血气分析	CEJM1000				
淀粉酶同工酶测定	CEDE1000				
脂肪酶(LPS)测定	CEDG1000				
C-反应蛋白(CRP)测定	CGCA1000				
胸部X线摄影	EABJT001				
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703				
腹部CT检查	上腹部X线计算机体 层(CT)平扫EBAQT001 或下腹部X线计算机 体层(CT)平扫 EBAQT002				
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目:					
检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肿瘤标志物检查	癌胚抗原(CEA)测定 CGRA1000和甲胎蛋白 (AFP)测定CGRB8000 和糖类抗原CA-125测 定CGRP1000和糖类抗 原CA-153测定 CGRR1000和糖类抗原 CA-199测定CGRS1000 和神经元特异性烯醇 化酶(NSE)测定 CGRH1000和肿瘤坏死 因子 α (TNF- α)测定 CGRY1000和糖类抗原 CA-724测定CGRV1000				
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000或ABO血 型鉴定(反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定(正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定(反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000				
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000或Rh血型c 抗原鉴定CAMH1000或 Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000或Rh血型e 抗原鉴定CAMK1000或 Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000				
抗核抗体(ANA)测定	CGDB1000				
ENA抗体谱六项测定	CGDC1000				
EB病毒早期抗原抗体 IgG(抗EA IgG)测定	CGMU1000				
EB病毒核抗原抗体 IgG(抗EBNA IgG)测定	CGMV1000				
胰胆管系统磁共振水 成像(MRCP)	ECAQP001				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
内镜下逆行性胰胆管造影（ERCP）	经纤维内镜逆行胰胆管造影术 (ERCP) EACQP001或经 电子内镜逆行胰胆管 造影术 (ERCP) EACQP002				
超声胃镜检查	FPB01604				

胃十二指肠溃疡

适用对象：	病种编码：	JM010			
	主要诊断：	胃十二指肠溃疡	ICD-10码：	K27.300	
	主要操作/主要治疗方式：		CCHI码：		
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：K27.300胃十二指肠溃疡疾病编码； 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。				
出院标准：	腹痛减轻或消失。				
最短住院日参考值：	7天				
变异条件：	1. 临床症状改善不明显，调整药物治疗，导致住院时间延长； 2. 难治性或顽固性溃疡，需要进一步诊治，导致住院时间延长； 3. 胃十二指肠溃疡出现并发症（出血、穿孔、幽门梗阻、癌变等），退出本路径，转入相应临床路径。				
再入院间隔时间：	14天				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		治疗		药物	
II级护理	ACAB0001	静脉采血	ABBB0001	抑制胃酸药	
检查	ACAA0001			胃粘膜保护剂	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			抗Hp治疗	
尿常规化学分析	CCAA2000			促动力药	
粪便常规检查	CCCA3000			质子泵抑制剂PPI	
隐血试验	CCCB8000			抗菌药物	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000			H2受体拮抗剂	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (Alb) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000			根除Hp (幽门螺杆菌) 药物	
肾脏功能检查	CAMA1000				
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测定 CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测定 CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000				
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间 (APTT) 测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间 (PT) 测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000				
胃镜检查	电子胃镜检查 FPB01602和超声胃镜检查 FPB01604和消化道内镜活检术 FPA07601或消化内镜检查麻醉术 FPA42201				
活检组织病理诊断	BCAB0001				
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000				
碳13尿素呼气试验	CGQE9000				
碳14尿素呼气试验	CGQF9000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703				
胸部X线摄影	EABJT001				
上消化道X线造影	EACPB001				
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
淀粉酶同工酶测定	CEDE1000				
胃泌素释放肽前体 (ProGRP)测定	CERZ1000				
肿瘤标志物检查	癌胚抗原 (CEA) 测定 CGRA1000和甲胎蛋白 (AFP) 测定CGRB8000 和糖类抗原CA-125测 定CGRP1000和糖类抗 原CA-153测定 CGRR1000和糖类抗原 CA-199测定CGRS1000 和神经元特异性烯醇 化酶 (NSE) 测定 CGRH1000和肿瘤坏死 因子 α (TNF- α) 测定 CGRY1000和糖类抗原 CA-724测定CGRV1000				
上腹部X线计算机体 层 (CT) 平扫	EBAQT001				
腹部X线检查	腹部X线透视 EAAQT001或腹部X线 摄影EABQT001				
胃肠排空试验-钡餐 透视法	EACPA001				

反流食管炎

适用对象：	病种编码：	JM011			
	主要诊断：	反流食管炎		ICD-10码：	K21.001
	主要操作/主要治疗方式：			CCHI码：	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：K21.001反流食管炎疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 诊断已明确。 2. 治疗后症状缓解或明显减轻。			
	最短住院日参考值：	3-5天			
	变异条件：	1. 反流食管炎出现并发症（如食管狭窄、出血、Barrett食管甚至可疑癌变）时不进入本路径。 2. 药物治疗无效或食管狭窄者，活检病理提示恶性，可考虑内镜下治疗或外科治疗，退出本路径。 3. 临床症状改善不明显，调整药物治疗，导致住院时间延长、费用增加。			
	再入院间隔时间：	14天			

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		检查		药物	
II级护理	ACAB0001	胃镜检查	电子胃镜检查 FPB01602和超声胃镜 检查FPB01604和消化 道内镜活检术 FPA07601或消化内镜 检查麻醉术FPA42201	质子泵抑制剂	
检查	ACAA0001	治疗		胃粘膜保护药物	
血常规	全血细胞计数+3分群 检测CAAA1000 或全 血细胞计数+5分类检 测CAAB1000	食管功能测定	食管测压FPC02401或 24小时食管胃肠压力 测定FPB02401	抑酸药物	
尿常规化学分析	CCAA2000	监测		促动力药物	
粪便常规检查	CCCA3000	24小时胃食管pH值监 测	FPB05402	中医中药	
隐血试验	CCCB8000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000				
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000				
电解质测定	CAMA1000				
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000				
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703				
胸部X线摄影	EABJT001				
内镜检查	电子胃镜检查FPB01602/超声胃镜检查FPB01604/消化道内镜活检术FPA07601/消化内镜检查麻醉术FPA42201				
活检组织病理诊断	BCAB0001				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
胃肠排空试验-钡餐透视法	EACPA001			促动力药	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
胃镜检查	电子胃镜检查 FPB01602和超声胃镜 检查FPB01604和消化 道内镜活检术 FPA07601或消化内镜 检查麻醉术FPA42201			粘膜保护剂	
				质子泵抑制剂	

轮状病毒肠炎

适用对象：	疾病编码：	JM012			
	主要诊断：	轮状病毒肠炎	ICD-10码：	A08.000	
	主要操作/主要治疗方式：		CCHI码：		
入院标准：		1. 第一诊断必须符合ICD-10：A08.000轮状病毒肠炎疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，只要住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
出院标准：		1. 体温正常，腹泻好转。 2. 无呕吐，脱水纠正。 3. 大便常规、电解质正常。			
最短住院日参考值：		3-7天			
变异条件：		1. 存在使腹泻进一步加重的其他疾病，需要处理干预。 2. 患儿入院时已发生严重脱水、电解质紊乱，需进行积极对症处理，完善相关检查，向家属解释并告知病情，导致住院时间延长，增加住院费用等。			
再入院时间间隔要求：		7天			

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	静脉输液	ABCA0001	肠道菌群调节剂	
尿常规化学分析	CCAA2000	输液泵辅助静脉输液	ABCB0001	胃肠粘膜保护剂	
粪便常规检查	ACAA0001			静脉补液	
肌酸激酶(CK)测定	CECS1000				
肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定	CECT1000				
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEE8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(Alb)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000				
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000				
C-反应蛋白(CRP)测定	CGCA1000				
人轮状病毒抗原测定	CAMA1000				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目:					
检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
半乳糖测定	半乳糖定性测定CEFB2000半乳糖定量测定CEFC8000	氧气吸入	ABJA0001	免疫调节剂	
血气分析	CEJM1000	监测		电解质平衡调节药	
空肠弯曲菌培养+鉴定	CJBT3000	心电监护	院内遥测心电监护KKA28701或无创心电监测FKA05705	抗生素	
幽门螺杆菌培养+鉴定	CJBU3000	无创血压监测	FKA05709		
军团菌培养+鉴定	CJBV5000				
0-157大肠埃希菌培养	CJBK8000				
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
消化道超声检查	超声胃镜检查 FPB01604或胃肠道彩色多普勒超声检查 EDCPA001				

胃癌

姑息治疗

适用对象：	病种编码：	JM013	
	主要诊断：	胃癌	ICD-10码：Z51.104+C16.0-C16.6, Z51.104+C16.8-C16.9
	主要操作/主要治疗方式：	姑息治疗	CCHI码：
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：Z51.104+C16.0-C16.6, Z51.104+C16.8-C16.9胃癌疾病编码。 2. 有复发转移或准备入院检查确认复发转移，或因其他原因无法根治手术 3. 无需特殊处理的合并症，如消化道大出血、幽门梗阻、胸腹水、肠梗阻等。 4. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。	
	出院标准：	1. 病人一般情况良好，生命体征平稳正常。 2. 没有需要住院处理的并发症。	
	最短住院日参考值：	5-9天	
	变异条件：	1. 治疗前、中、后有感染、严重贫血、出血、梗阻及其他合并症者，需进行相关的诊断和治疗，可能延长住院时间并致费用增加。 2. 治疗后出现骨髓抑制，需要对症处理，导致治疗时间延长、费用增加。 3. 药物不良反应需要特殊处理，如过敏反应、神经毒性、心脏毒性等。 4. 对HER-2表达呈阳性（免疫组化染色呈+++，或免疫组化染色呈++且FISH检测呈阳性）的晚期胃癌患者，可考虑在治疗的基础上，联合使用分子靶向治疗药物曲妥珠单抗。导致费用增加。 5. 高龄患者根据个体化情况具体实施。 6. 医师认可的变异原因分析，如药物减量使用。 7. 其他患者方面的原因等。	

再入院间隔时间：

检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		护理		药物	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	静脉补液	
检查	ACAA0001	治疗		止痛药物	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	抗肿瘤治疗药物/肠外营养液集中配置	ABCJ0001	止吐、保肝	
尿常规化学分析	CCAA2000	经皮动脉内灌注治疗术	HL948202	止泻药	
粪便常规检查	CCCA3000			抑酸剂	
隐血试验	CCCB8000			腹腔内治疗药物	

检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (Alb) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000和乳酸脱氢酶 (LD) 测定CECW1000			抗代谢药物	
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000和尿酸 (UA) 测定 CEEE8000和 β 2微球蛋白 (β 2-MG) 测定CEAS8000			铂类药物	
电解质测定	CAMA1000			靶向药物	
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000			紫杉类药物	
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间 (APTT) 测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间 (PT) 测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道 常规心电图检查FKA03702或十二通道 常规心电图检查FKA03703				
胃镜检查	纤维胃镜检查 FPB01601或电子胃镜检查 FPB01602或经鼻电子胃镜检查 FPB01603				
胸部CT（平扫+增强扫描）	胸部X线计算机体层 (CT) 平扫EBAJT001和 胸部X线计算机体层 (CT) 增强扫描 EBBJT001				

检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
胸部X光片	胸部X线透视 EAAJT001或胸部X线 摄影EABJT001				
腹部影像学检查	上腹部X线计算机体 层(CT)增强扫描 EBBQT001和下腹部X 线计算机体层(CT)增 强扫描EBBQT002和盆 腔X线计算机体层 (CT)增强扫描 EBBQU001				
盆腔X线计算机体层 (CT)平扫	EBAQU001				
盆腔X线计算机体层 (CT)增强扫描	EBBQU001				
肿瘤标记物测定	癌胚抗原(CEA)测定 CGRA1000和糖类抗原 CA-125测定CGRP1000 和糖类抗原CA-199测 定CGRS1000和糖类抗 原CA-242测定 CGRT1000和糖类抗原 CA-724测定CGRV1000				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目:					
检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
上消化道X线造影	EACPB001	院内遥测心电监护	KKA28701	植物来源的抗肿瘤药 及其衍生物	
结肠X线造影	EACPS001			其他对症治疗药物, 如抗过敏药物、抗菌 素	
SPECT/CT骨断层显像	EEDX6001				
PET/CT肿瘤显像	PET/CT肿瘤局部显像 EEFZX001或PET/CT肿 瘤全身显像EEFZY001				
超声胃镜检查	超声胃镜检查 FPB01604或经电子胃 镜超声微探头检查 FPB01605				
甲状腺B超检查	EDBDC001				
腹部X线平片	腹部X线透视 EAAQT001或盆部X线 透视EAAQU001				

检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
监测					
病理					
活检组织病理诊断	BCAB0001				

胃癌

术前新辅助治疗

适用对象：	病种编码：	JM014	
	主要诊断：	胃癌	ICD-10码：Z51.101+C16.0-C16.6, Z51.101+C16.8-C16.9
	主要操作/主要治疗方式：	术前新辅助治疗	CCHI码：
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：Z51.101+C16.0-C16.6, Z51.101+C16.8-C16.9胃癌疾病编码。 2. 无远处转移。 3. 无需特殊处理的合并症，如消化道大出血、梗阻、穿孔等。 4. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 病人一般情况良好，生命体征平稳正常。 2. 没有需要住院处理的并发症。		
最短住院日参考值：	5-9天		

- 变异条件：
1. 治疗前、中、后有感染、严重贫血、出血、梗阻及其他合并症者，需进行相关的诊断和治疗，可能延长住院时间并致费用增加。
 2. 治疗后出现骨髓抑制，需要对症处理，导致治疗时间延长、费用增加。
 3. 药物不良反应需要特殊处理，如过敏反应、神经毒性、心脏毒性等。
 4. 对HER-2表达呈阳性（免疫组化染色呈+++，或免疫组化染色呈++且FISH检测呈阳性）的晚期胃癌患者，可考虑在治疗的基础上，联合使用分子靶向治疗药物曲妥珠单抗。导致费用增加。
 5. 高龄患者根据个体化情况具体实施。
 6. 医师认可的变异原因分析，如药物减量使用。
 7. 其他患者方面的原因等。

再入院间隔时间：

检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		护理		药物	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	止痛药物	
检查	ACAA0001	治疗		止吐、保肝	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	抗肿瘤治疗药物/肠外营养液集中配置	ABCJ0001	止泻药	
尿常规化学分析	CCAA2000	经皮动脉内灌注治疗术	HL948202	抑酸剂	
粪便常规检查	CCCA3000	静脉置管术	经皮穿刺颈内静脉置管术HMD62201或经皮穿刺锁骨下静脉置管术HME62201或经皮穿刺股静脉置管术HM262201	腹腔内治疗药物	
隐血试验	CCCB8000	院内遥测心电监护	KKA28701	促白细胞增生药	

检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT)测定 CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和白蛋白 (A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP)测定 CECD8000和乳酸脱氢酶 (LD)测定CECW1000			抗代谢药	
肾脏功能检查	尿素 (Urea)测定 CEEA8000和肌酐 (Cr)测定 CEEB8000和尿酸 (UA)测定 CEEE8000和 β 2微球蛋白 (β 2-MG)测定 CEAS8000			紫杉类药物	
电解质测定	CAMA1000			铂类	
葡萄糖 (Glu)测定	CEFA8000			蒽环类	
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT)测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间 (APTT)测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间 (PT)测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道常规心电图检查 FKA03702或十二通道常规心电图检查 FKA03703				
胃镜检查	纤维胃镜检查 FPB01601或电子胃镜检查 FPB01602或经鼻电子胃镜检查 FPB01603				

检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
胸部CT（平扫+增强扫描）	胸部X线计算机体层(CT)平扫EBAJT001和胸部X线计算机体层(CT)增强扫描EBBJT001				
胸部X光片	胸部X线透视EAAJT001或胸部X线摄影EABJT001				
腹部影像学检查	上腹部X线计算机体层(CT)增强扫描EBBQT001和下腹部X线计算机体层(CT)增强扫描EBBQT002和盆腔X线计算机体层(CT)增强扫描EBBQU001				
盆腔X线计算机体层(CT)平扫	EBAQU001				
心功能检查	普通二维超声心动图EDFKA005或心电图踏车负荷试验FKA04701或冠状动脉CT三维成像EBCKU002				
肿瘤标记物测定	癌胚抗原(CEA)测定CGRA1000和糖类抗原CA-125测定CGRP1000和糖类抗原CA-199测定CGRS1000和糖类抗原CA-242测定CGRT1000和糖类抗原CA-724测定CGRV1000				
监测					
病理					
活检组织病理诊断	BCAB0001				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
甲状腺B超检查	EDBDC001	血小板计数	CAAR1000	抗菌药物	
上消化道X线造影	EACPB001				
结肠X线造影	EACPS001				
SPECT/CT骨断层显像	EEDX6001				

检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
PET/CT肿瘤显像	PET/CT肿瘤局部显像 EEFZX001或PET/CT肿瘤全身显像EEFZY001				
超声胃镜检查	超声胃镜检查 FPB01604或经电子胃镜超声微探头检查 FPB01605				
肺功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查 FJE01404				
腹部MRI	上腹部磁共振成像 ECAQT001或下腹部磁共振成像ECAQT002				

胃癌

术后辅助治疗

适用对象：	病种编码：	JM015			
	主要诊断：	胃癌		ICD-10码：Z51.102+C16.0-C16.6, Z51.102+C16.8-C16.9	
	主要操作/主要治疗方式：	术后辅助化疗		CCHI码：	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合胃癌根治术后疾病编码辅助治疗治疗（ICD-10:Z51.102+C16.0-C16.6, Z51.102+C16.8-C16.9）。 2. 年龄<75岁。 3. 术后体力状况基本恢复正常，KPS≥ 80分。 4. 无全身治疗禁忌症。 5. 评估肿瘤需要接受治疗者可以进入路径。 6. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 治疗结束，无明显副反应。 2. 没有需要住院处理的并发症。			
	最短住院日参考值：	3-10天			
	变异条件：	1. 治疗期间的合并症和/或并发症，需要进行相关的诊断和治疗，导致住院时间延长、费用增加。 2. 肿瘤的复发或转移、病情进展退出临床路径。 3. 治疗后出现骨髓抑制，需要对症处理，导致治疗时延长、费用增加，退出临床路径。 4. 药物不良反应需要特殊处理，如过敏反应、神经毒性心脏毒性等。 5. 出现影响胃癌治疗的合并症，需要进行相关的治疗。 6. 医师认可的变异原因分析，如药物减量使用。 7. 其他患者方面的原因等。			
	再入院间隔时间：				

检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		护理		药物	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	止吐、保肝	
检查	ACAA0001			止泻药	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	治疗		抑酸剂	
尿常规化学分析	CCAA2000	静脉采血	ABBB0001	腹腔内治疗药物	
粪便常规检查	CCCA3000	抗肿瘤治疗药物/肠外营养液集中配置	ABCJ0001	胃动力	
隐血试验	CCCB8000	经皮动脉内灌注治疗术	HL948202	抗肿瘤药物	

检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
生化常规检查	葡萄糖(Glu)测定 CEFA8000和总钙(Ca) 测定CEJF8000和无机 磷(P)测定CEKA8000 和钾(K)测定 CEJA8000和钠(Na)测 定CEJB8000和氯(Cl) 测定CEJC8000和镁 (Mg)测定CEJE8000和 总二氧化碳(TCO2)测 定CEJD1000	深静脉置管	经皮穿刺颈内静脉置 管术HMD62201或经皮 穿刺锁骨下静脉置管 术HME62201或经皮穿 刺股静脉置管术 HM262201	水化、利尿	
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000				
常规心电图检查	CAMA1000				
胃镜检查	纤维胃镜检查 FPB01601或电子胃镜 检查FPB01602或经鼻 电子胃镜检查 FPB01603				
上消化道X线造影	EACPB001				
胸部X光片	胸部X线透视 EAAJT001或胸部X线 摄影EABJT001				
腹部影像学检查	上腹部X线计算机体 层(CT)增强扫描 EBBQT001和下腹部X 线计算机体层(CT)增 强扫描EBBQT002和盆 腔X线计算机体层 (CT)增强扫描 EBBQU001				
盆腔X线计算机体层 (CT)平扫	EBAQU001				
盆腔X线计算机体层 (CT)增强扫描	EBBQU001				
活检组织病理诊断	BCAB0001				
胸部CT(平扫+增强 扫描)	胸部X线计算机体层 (CT)平扫EBAJT001和 胸部X线计算机体层 (CT)增强扫描 EBBJT001				

检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
腹部超声或CT	肝胆胰脾B超检查 EDBQT001或上腹部X 线计算机体层(CT)平 扫EBAQT001和上腹部 X线计算机体层(CT) 增强扫描EBBQT001或 下腹部X线计算机体 层(CT)平扫EBAQT002 和下腹部X线计算机 体层(CT)增强扫描 EBBQT002				
肿瘤标记物测定	癌胚抗原(CEA)测定 CGRA1000和糖类抗原 CA-125测定CGRP1000 和糖类抗原CA-199测 定CGRS1000和糖类抗 原CA-242测定 CGRT1000和糖类抗原 CA-724测定CGRV1000				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		治疗		药物	
结肠X线造影	EACPS001	经外周静脉置入中心 静脉导管术	ABDA0001	紫杉类药物	
SPECT/CT骨断层显像	EEDX6001	外周静脉营养输注	ABCG0001	抗菌药	
头颅MRI或CT	颅脑磁共振成像 ECABA001或头部X线 计算机体层(CT)平扫 EBABP001	院内遥测心电监护	KKA28701		
PET/CT肿瘤显像	PET/CT肿瘤局部显像 EEFZX001或PET/CT肿 瘤全身显像EEFZY001	护理			
心功能检查	普通二维超声心动图 EDFKA005或心电图踏 车负荷试验FKA04701 或冠状动脉CT三维成 像EBCKU002	静脉置管护理	ACBG0002		
肺功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活 量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403或最大 通气量功能检查 FJE01404	病理			
PET/CT肿瘤局部显像	EEFZX001	病毒培养+鉴定	CJJA8000		
PET/CT肿瘤全身显像	EEFZY001				
十二通道动态心电图 检查	FKA03705				
监测					

检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码

胃癌

胃部分切除术

适用对象：	病种编码：	JS001			
	主要诊断：	胃癌		ICD-10码：	C16.0-C16.6, C16.8-C16.9
	主要操作/主要治疗方式：	胃部分切除术		CCHI码：	HPD73301
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：C16.0-C16.6, C16.8-C16.9胃癌疾病编码； 2. 术前评估肿瘤切除困难者可先行新辅助治疗后再次评估，符合手术条件者可以进入路径； 3. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施不影响手术后康复时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 伤口愈合好：引流管拔除，伤口无感染、无皮下积液； 2. 患者恢复经口进食，可以满足日常能量和营养素供给； 3. 没有需要住院处理的并发症。			
	最短住院日参考值：	14-16天			
	变异条件：	1. 围手术期的合并症和/或并发症，需要进行相关的诊断和治疗，导致住院时间延长、费用增加； 2. 早期胃癌可行腹腔镜下或内镜下切除； 3. 胃癌根治术中，胃的切除范围根据肿瘤部位、大小、浸润程度等决定，可分为远端胃次全切除、近端胃次全切除、全胃切除术、联合脏器切除术。 4. 淋巴清除范围超过第二站者。 5. 医生认为的变异原因。 6. 患者其他原因的变异。			
	再入院间隔时间：	1周			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查	ACAA0001	检查		/II级护理	ACAB0001
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000			检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
尿常规化学分析	CCAA2000	胃管置管术	ABGB0001	肝功能检查（每日一次，直到进食。）	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
粪便常规检查	CCCA3000	胃肠减压	ABGA0001	肾脏功能检查（禁食期间，每日一次。）	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000
隐血试验	CCCB8000	氧气吸入	ABJA0001	电解质测定（禁食期间，每日一次。）	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和总钙(Ca)测定CEJF8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	监测		葡萄糖(Glu)测定（禁食期间，每日一次。）	CEFA8000
肾脏功能检查	CAMA1000	院内遥测心电监护	KKA28701	血气分析	CEJM1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
电解质测定	钾（K）测定 CEJA8000和钠（Na） 测定CEJB8000和氯 （Cl）测定CEJC8000 和总二氧化碳 （TCO2）测定 CEJD1000和总钙 （Ca）测定CEJF8000	无创指脉血氧饱和度 监测	FKA05710	肿瘤标记物测定	癌胚抗原（CEA）测定 CGRA1000和糖类抗原 CA-125测定CGRP1000 和糖类抗原CA-199测 定CGRS1000和糖类抗 原CA-242测定 CGRT1000和糖类抗原 CA-724测定CGRV1000
葡萄糖（Glu）测定	CEFA8000	麻醉		治疗	
血脂检查	甘油三酯（TG）测定 CEHB1000和总胆固醇 （TC）测定CEHA1000和	全身麻醉	HAA42901	氧气吸入	ABJA0001
凝血功能测定	凝血酶时间（TT）测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间（APTT） 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间（PT）测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	/腰麻复合连续硬膜 外阻滞麻醉	HAC42103	换药	换药（小）ABFA0001或 换药（中）ABFA0002或 换药（大）ABFA0003或 换药（特大）ABFA0004
肿瘤标记物测定	癌胚抗原（CEA）测定 CGRA1000和糖类抗原 CA-125测定CGRP1000 和糖类抗原CA-199测 定CGRS1000和糖类抗 原CA-242测定 CGRT1000和糖类抗原 CA-724测定CGRV1000	手术		监测	
生理盐水介质交叉配 血	CAMW1000	胃部分切除术	HPD73301	院内遥测心电监护	KKA28701
胸部X线摄影	EABJT001	治疗		无创指脉血氧饱和度 监测	FKA05710
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703	导尿管留置	ABHA0002	病理	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
胃镜检查	纤维胃镜检查 FPB01601或电子胃镜检查 FPB01602或经鼻电子胃镜检查 FPB01603	胃肠减压	ABGA0001	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感染标本冷冻切片病理诊断 BCBB0001或快速石蜡切片病理诊断 BCBC0001
上消化道X线造影	EACPB001	病理		免疫组织化学染色诊断	BEBA0001
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感染标本冷冻切片病理诊断 BCBB0001	药物	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	药物		静脉补液	
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	抗菌药物		抗菌药物	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	止痛药物		止痛药物	
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	静脉补液		抗血栓药物	
上腹部X线计算机体层(CT)平扫	EBAQT001			肠内营养药物	
下腹部X线计算机体层(CT)平扫	EBAQT002			止血药物	
盆腔X线计算机体层(CT)平扫	EBAQU001				
病理会诊	疑难病理读片会诊 AADCO001或同步远程病理会诊 AADD0001或院外影像学资料会诊 AADE0001				
治疗					
一般灌肠	ABGE0001				
导尿管留置	ABHA0002				
病理					
活检组织病理诊断	BCAB0001		ABCD0001		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		护理	
特殊介质交叉配血	CAMX1000	电子胃镜检查	FPB01602	特级护理	ACAD0001
疑难交叉配血	CAMY1000	治疗		检查	
普通二维超声心动图	EDFKA005	静脉输血	ABCE0001	一般细菌培养+鉴定+药敏	CJAR8000
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404	病理	ABCD0001	肝胆胰脾B超检查	EDBQT001
弥散功能检查	肺弥散功能检查—一口气法FJE01405或肺弥散功能检查—重复呼吸法FJE01406	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感染标本冷冻切片病理诊断BCBB0001	治疗	
气道阻力测定	FJB02401	药物			
PET/CT肿瘤显像	PET/CT肿瘤局部显像EEFZX001或PET/CT肿瘤全身显像EEFZY001			病理	
超声胃镜检查	超声胃镜检查 FPB01604或经电子胃镜超声微探头检查FPB01605				
治疗				药物	
人工洗胃	ABGC0001			肠道抗生素口服	
药物				泻药	

胃癌

根治性近端胃大部切除术

适用对象：	病种编码：	JS002	
	主要诊断：	胃癌	ICD-10码：C16.0-C16.6, C16.8-C16.9
	主要操作/主要治疗方式：	根治性近端胃大部切除术	CCHI码：HPD73307
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：C16.0-C16.6, C16.8-C16.9胃癌疾病编码； 2. 术前评估肿瘤切除困难者可先行新辅助治疗后再次评估，符合手术条件者可以进入路径； 3. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施不影响手术后康复时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 伤口愈合好：引流管拔除，伤口无感染、无皮下积液； 2. 患者恢复经口进食，可以满足日常能量和营养素供给； 3. 没有需要住院处理的并发症。		
最短住院日参考值：	14-16天		
变异条件：	1. 围手术期的合并症和/或并发症，需要进行相关的诊断和治疗，导致住院时间延长、费用增加； 2. 早期胃癌可行腹腔镜下或内镜下切除； 3. 胃癌根治术中，胃的切除范围根据肿瘤部位、大小、浸润程度等决定，可分为远端胃次全切除、近端胃次全切除、全胃切除术、联合脏器切除术。 4. 淋巴清除范围超过第二站者。 5. 医生认为的变异原因。 6. 患者其他原因的变异。		
再入院间隔时间：	1周		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查	ACAA0001	检查		/II级护理	ACAB0001
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000			检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
尿常规化学分析	CCAA2000	胃管置管术	ABGB0001	肝功能检查（禁食期间，每日一次。）	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
粪便常规检查	CCCA3000	胃肠减压	ABGA0001	肾脏功能检查（禁食期间，每日一次。）	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000
隐血试验	CCCB8000	监测		电解质测定（禁食期间，每日一次。）	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和总钙(Ca)测定CEJF8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	院内遥测心电图监护	KKA28701	葡萄糖(Glu)测定（禁食期间，每日一次。）	CEFA8000
生理盐水介质交叉配血	CAMA1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710	血气分析	CEJM1000
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	氧气吸入	ABJA0001	肿瘤标记物测定	癌胚抗原(CEA)测定CGRA1000和糖类抗原CA-125测定CGRP1000和糖类抗原CA-199测定CGRS1000和糖类抗原CA-242测定CGRT1000和糖类抗原CA-724测定CGRV1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
电解质测定	钾（K）测定 CEJA8000和钠（Na） 测定CEJB8000和氯 （Cl）测定CEJC8000 和总二氧化碳 （TCO2）测定 CEJD1000和总钙 （Ca）测定CEJF8000	麻醉		治疗	
葡萄糖（Glu）测定	CEFA8000	全身麻醉	HAA42901	氧气吸入	ABJA0001
血脂检查	甘油三酯（TG）测定 CEHB1000和总胆固醇 （TC）测定CEHA1000和 高密度脂蛋白胆固醇 （HDL-C）测定 CEHC1000和低密度脂 蛋白胆固醇（LDL-C） 测定CEHD1000	/腰麻复合连续硬膜 外阻滞麻醉	HAC42103	换药	换药（小）ABFA0001或 换药（中）ABFA0002或 换药（大）ABFA0003或 换药（特大）ABFA0004
凝血功能测定	凝血酶时间（TT）测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间（APTT） 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间（PT）测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	手术		监测	
肿瘤标记物测定	癌胚抗原（CEA）测定 CGRA1000和糖类抗原 CA-125测定CGRP1000 和糖类抗原CA-199测 定CGRS1000和糖类抗 原CA-242测定 CGRT1000和糖类抗原 CA-724测定CGRV1000	根治性近端胃大部切 除术	HPD73307	院内遥测心电图监护	KKA28701
胸部X线摄影	EABJT001	治疗		无创指脉血氧饱和度 监测	FKA05710
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703	导尿管留置	ABHA0002	病理	
胃镜检查	纤维胃镜检查 FPB01601或电子胃镜 检查FPB01602或经鼻 电子胃镜检查 FPB01603	胃肠减压	ABGA0001	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感 染标本冷冻切片病理 诊断 BCBB0001或快 速石蜡切片病理诊断 BCBC0001
上消化道X线造影	EACPB001	病理		药物	
乙型肝炎表面抗原 （抗HBs）测定	乙型肝炎表面抗原定 性（HBsAg）测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 （HBsAg）测定 CGLH1000	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感 染标本冷冻切片病理 诊断BCBB0001	静脉补液	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	药物		抗菌药物	
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	抗菌药物		止痛药物	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	止痛药物		抗血栓药物	
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	静脉补液		肠内营养药物	
上腹部X线计算机体层(CT)平扫	EBAQT001			止血药物	
下腹部X线计算机体层(CT)平扫	EBAQT002				
盆腔X线计算机体层(CT)平扫	EBAQU001				
病理会诊	疑难病理读片会诊 AADCO001或同步远程 病理会诊AADD0001或 院外影像学资料会诊 AADE0001				
治疗					
一般灌肠	ABGE0001				
导尿管留置	ABHA0002				
病理					
活检组织病理诊断	BCAB0001		ABCD0001		
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		护理	
特殊介质交叉配血	CAMX1000	电子胃镜检查	FPB01602	特级护理	ACAD0001
疑难交叉配血	CAMY1000			检查	
普通二维超声心动图	EDFKA005	治疗		一般细菌培养+鉴定+药敏	CJAR8000
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活 量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403或最大 通气量功能检查 FJE01404	静脉输血	ABCD0001	治疗	
气道阻力测定	FJB02401	病理			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
PET/CT肿瘤显像	PET/CT肿瘤局部显像 EEFZX001或PET/CT肿瘤全身显像EEFZY001	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感染标本冷冻切片病理诊断BCBB0001	病理	
超声胃镜检查	超声胃镜检查 FPB01604或经电子胃镜超声微探头检查 FPB01605	药物		免疫组织化学染色诊断	BEBA0001
治疗				药物	
人工洗胃	ABGC0001			肠道抗生素口服	
药物				泻药	

胃癌

根治性远端胃大部切除术

适用对象：	病种编码：	JS003	
	主要诊断：	胃癌	ICD-10码：C16.0-C16.6, C16.8-C16.9
	主要操作/主要治疗方式：	根治性远端胃大部切除术	CCHI码：HPD73308
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：C16.0-C16.6, C16.8-C16.9胃癌疾病编码； 2. 术前评估肿瘤切除困难者可先行新辅助治疗后再次评估，符合手术条件者可以进入路径； 3. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施不影响手术后康复时，可以进入路径。	
	出院标准：	1. 伤口愈合好：引流管拔除，伤口无感染、无皮下积液； 2. 患者恢复经口进食，可以满足日常能量和营养素供给； 3. 没有需要住院处理的并发症。	
	最短住院日参考值：	14-16天	
	变异条件：	1. 围手术期的合并症和/或并发症，需要进行相关的诊断和治疗，导致住院时间延长、费用增加； 2. 早期胃癌可行腹腔镜下或内镜下切除； 3. 胃癌根治术中，胃的切除范围根据肿瘤部位、大小、浸润程度等决定，可分为远端胃次全切除、近端胃次全切除、全胃切除术、联合脏器切除术。 4. 淋巴清除范围超过第二站者。 5. 医生认为的变异原因。 6. 患者其他原因的变异。	
	再入院间隔时间：	1周	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查	ACAA0001	检查		/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			检查	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
尿常规化学分析	CCAA2000	胃管置管术	ABGB0001	肝功能检查（禁食期间，每日一次。）	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
粪便常规检查	CCCA3000	胃肠减压	ABGA0001	肾脏功能检查（禁食期间，每日一次。）	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000	氧气吸入	ABJA0001	血气分析	CEJM1000
隐血试验	CCCB8000	监测		电解质测定（禁食期间，每日一次。）	钾（K）测定CEJA8000和钠（Na）测定CEJB8000和氯（Cl）测定CEJC8000和总二氧化碳（TCO2）测定CEJD1000和总钙（Ca）测定CEJF8000
肝功能检查	CAMA1000	院内遥测心电监护	KKA28701	葡萄糖(Glu)测定（禁食期间，每日一次。）	CEFA8000
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710	肿瘤标记物测定	癌胚抗原(CEA)测定CGRA1000和糖类抗原CA-125测定CGRP1000和糖类抗原CA-199测定CGRS1000和糖类抗原CA-242测定CGRT1000和糖类抗原CA-724测定CGRV1000
电解质测定	钾（K）测定CEJA8000和钠（Na）测定CEJB8000和氯（Cl）测定CEJC8000和总二氧化碳（TCO2）测定CEJD1000和总钙（Ca）测定CEJF8000	麻醉		治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000	全身麻醉	HAA42901	氧气吸入	ABJA0001
血脂检查	甘油三酯(TG)测定 CEHB1000和总胆固醇 (TC)测定CEHA1000和 高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)测定 CEHC1000和低密度脂 蛋白胆固醇(LDL-C) 测定CEHD1000	/腰麻复合连续硬膜 外阻滞麻醉	HAC42103	换药	换药(小)ABFA0001或 换药(中)ABFA0002或 换药(大)ABFA0003或 换药(特大)ABFA0004
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	手术		监测	
肿瘤标记物测定	癌胚抗原(CEA)测定 CGRA1000和糖类抗原 CA-125测定CGRP1000 和糖类抗原CA-199测 定CGRS1000和糖类抗 原CA-242测定 CGRT1000和糖类抗原 CA-724测定CGRV1000	根治性远端胃大部切 除术	HPD73308	院内遥测心电图监护	KKA28701
胸部X线摄影	EABJT001	治疗		无创指脉血氧饱和度 监测	FKA05710
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703	导尿管留置	ABGA0001	病理	
胃镜检查	纤维胃镜检查 FPB01601或电子胃镜 检查FPB01602或经鼻 电子胃镜检查 FPB01603	胃肠减压	ABGA0001	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感 染标本冷冻切片病理 诊断 BCBB0001或快 速石蜡切片病理诊断 BCBC0001
上消化道X线造影	EACPB001	病理		免疫组织化学染色诊 断	BEBA0001
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感 染标本冷冻切片病理 诊断BCBB0001	药物	
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	药物		静脉补液	
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	抗菌药物		抗菌药物	
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000	止痛药物		止痛药物	
上腹部X线计算机体 层(CT)平扫	EBAQT001	静脉补液		抗血栓药物	
下腹部X线计算机体 层(CT)平扫	EBAQT002			肠内营养药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
盆腔X线计算机体层(CT)平扫	EBAQU001			止血药物	
病理会诊	疑难病理读片会诊 AADC0001或同步远程 病理会诊AADD0001或 院外影像学资料会诊 AADE0001				
治疗					
一般灌肠	ABGE0001				
导尿管留置	ABHA0002				
病理					
活检组织病理诊断	BCAB0001				
药物			ABCD0001		
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		护理	
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000	电子胃镜检查	FPB01602	特级护理	ACAD0001
特殊介质交叉配血	CAMX1000	治疗		检查	
疑难交叉配血	CAMY1000	静脉输血		一般细菌培养+鉴定+ 药敏	CJAR8000
普通二维超声心动图	EDFKA005			治疗	
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活 量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403或最大 通气量功能检查 FJE01404		ABCD0001		
气道阻力测定	FJB02401	病理		病理	
PET/CT肿瘤显像	PET/CT肿瘤局部显像 EEFZX001或PET/CT肿 瘤全身显像EEFZY001	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感 染标本冷冻切片病理 诊断BCBB0001		
超声胃镜检查	超声胃镜检查 FPB01604或经电子胃 镜超声微探头检查 FPB01605	药物		药物	
治疗				肠道抗生素口服	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
人工洗胃	ABGC0001			泻药	
药物					

胃癌

扩大根治性近端胃大部切除术

适用对象：	病种编码：	JS004		
适用对象：	主要诊断：	胃癌	ICD-10码：C16.0-C16.6,C16.8-C16.9	
	主要操作/主要治疗方式：	扩大根治性近端胃大部切除术	CCHI码：HPD77301	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：C16.0-C16.6,C16.8-C16.9胃癌疾病编码；		
		2. 术前评估肿瘤切除困难者可先行新辅助治疗后再次评估，符合手术条件者可以进入路径；		
		3. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施不影响手术后康复时，可以进入路径。		
	出院标准：	1. 伤口愈合好：引流管拔除，伤口无感染、无皮下积液；		
	2. 患者恢复经口进食，可以满足日常能量和营养素供给；			
		3. 没有需要住院处理的并发症。		
最短住院日参考值：	14-16天			
变异条件：	1. 围手术期的合并症和/或并发症，需要进行相关的诊断和治疗，导致住院时间延长、费用增加；			
	2. 早期胃癌可行腹腔镜下或内镜下切除；			
	3. 胃癌根治术中，胃的切除范围根据肿瘤部位、大小、浸润程度等决定，可分为远端胃次全切除、近端胃次全切除、全胃切除术、联合脏器切除术。			
	4. 淋巴清除范围超过第二站者。			
	5. 医生认为的变异原因。			
	6. 患者其他原因的变异。			
再入院间隔时间：	1周			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查	ACAA0001	检查		/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	胃管置管术	ABGB0001	检查	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	胃肠减压	ABGA0001	肝功能检查（禁食期间，每日一次。）	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000	氧气吸入	ABJA0001	血气分析	CEJM1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
粪便常规检查	CCCA3000	监测		肾脏功能检查（禁食期间，每日一次。）	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000
隐血试验	CCCB8000	院内遥测心电监护	KKA28701	电解质测定（禁食期间，每日一次。）	钾（K）测定 CEJA8000和钠（Na） 测定CEJB8000和氯 （Cl）测定CEJC8000 和总二氧化碳 （TCO2）测定 CEJD1000和总钙 （Ca）测定CEJF8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和γ-谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000	无创指脉血氧饱和度 监测	FKA05710	葡萄糖(Glu)测定 （禁食期间，每日一次。）	CEFA8000
肾脏功能检查	CAMA1000	麻醉		肿瘤标记物测定	癌胚抗原(CEA)测定 CGRA1000和糖类抗原 CA-125测定CGRP1000 和糖类抗原CA-199测 定CGRS1000和糖类抗 原CA-242测定 CGRT1000和糖类抗原 CA-724测定CGRV1000
电解质测定	钾（K）测定 CEJA8000和钠（Na） 测定CEJB8000和氯 （Cl）测定CEJC8000 和总二氧化碳 （TCO2）测定 CEJD1000和总钙 （Ca）测定CEJF8000	全身麻醉	HAA42901		
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	/腰麻复合连续硬膜 外阻滞麻醉	HAC42103	治疗	
血脂检查	甘油三酯(TG)测定 CEHB1000和总胆固醇 (TC)测定CEHA1000和 高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)测定 CEHC1000和低密度脂 蛋白胆固醇(LDL-C) 测定CEHD1000	手术		氧气吸入	ABJA0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	扩大根治性近端胃大 部切除术	HPD77301	换药	换药(小)ABFA0001或 换药(中)ABFA0002或 换药(大)ABFA0003或 换药(特大)ABFA0004
肿瘤标记物测定	癌胚抗原(CEA)测定 CGRA1000和糖类抗原 CA-125测定CGRP1000 和糖类抗原CA-199测 定CGRS1000和糖类抗 原CA-242测定 CGRT1000和糖类抗原 CA-724测定CGRV1000	治疗		监测	
胸部X线摄影	EABJT001	导尿管留置	ABGA0001	院内遥测心电图监护	KKA28701
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703	胃肠减压	ABGA0001	无创指脉血氧饱和度 监测	FKA05710
胃镜检查	纤维胃镜检查 FPB01601或电子胃镜 检查FPB01602或经鼻 电子胃镜检查 FPB01603	病理		病理	
上消化道X线造影	EACPB001	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感 染标本冷冻切片病理 诊断BCBB0001	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感 染标本冷冻切片病理 诊断 BCBB0001或快 速石蜡切片病理诊断 BCBC0001
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	药物		免疫组织化学染色诊 断	BEBA0001
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	抗菌药物		药物	
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	止痛药物		静脉补液	
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000	静脉补液		抗菌药物	
胸部X线计算机体层 (CT)平扫	EBAJT001			止痛药物	
上腹部X线计算机体 层(CT)平扫	EBAQT001			抗血栓药物	
下腹部X线计算机体 层(CT)平扫	EBAQT002			肠内营养药物	
盆腔X线计算机体层 (CT)平扫	EBAQU001			止血药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
病理会诊	疑难病理读片会诊 AADC0001或同步远程 病理会诊AADD0001或 院外影像学资料会诊 AADE0001				
治疗					
一般灌肠	ABGE0001				
导尿管留置	ABHA0002				
病理					
活检组织病理诊断	BCAB0001				
药物			ABCD0001		
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		护理	
特殊介质交叉配血	CAMX1000	电子胃镜检查	FPB01602	特级护理	ACAD0001
疑难交叉配血	CAMY1000	治疗		检查	
普通二维超声心动图	EDFKA005	静脉输血		一般细菌培养+鉴定+ 药敏	CJAR8000
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活 量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403或最大 通气量功能检查 FJE01404	病理		治疗	
气道阻力测定	FJB02401	冷冻切片病理诊断	ABCD0001		
PET/CT肿瘤显像	PET/CT肿瘤局部显像 EEFZX001或PET/CT肿 瘤全身显像EEFZY001	药物		病理	
超声胃镜检查	超声胃镜检查 FPB01604或经电子胃 镜超声微探头检查 FPB01605				
治疗				药物	
人工洗胃	ABGC0001			肠道抗生素口服	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
药物				泻药	

胃癌

扩大根治性远端胃大部切除术

适用对象：	病种编码：	JS005	
	主要诊断：	胃癌	ICD-10码：C16.0-C16.6, C16.8-C16.9
	主要操作/主要治疗方式：	扩大根治性远端胃大部切除术	CCHI码：HPD77302
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：C16.0-C16.6, C16.8-C16.9胃癌疾病编码； 2. 术前评估肿瘤切除困难者可先行新辅助治疗后再次评估，符合手术条件者可以进入路径； 3. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施不影响手术后康复时，可以进入路径。	
	出院标准：	1. 伤口愈合好：引流管拔除，伤口无感染、无皮下积液； 2. 患者恢复经口进食，可以满足日常能量和营养素供给； 3. 没有需要住院处理的并发症。	
	最短住院日参考值：	14-16天	
	变异条件：	1. 围手术期的合并症和/或并发症，需要进行相关的诊断和治疗，导致住院时间延长、费用增加； 2. 早期胃癌可行腹腔镜下或内镜下切除； 3. 胃癌根治术中，胃的切除范围根据肿瘤部位、大小、浸润程度等决定，可分为远端胃次全切除、近端胃次全切除、全胃切除术、联合脏器切除术。 4. 淋巴清除范围超过第二站者。 5. 医生认为的变异原因。 6. 患者其他原因的变异。	
	再入院间隔时间：	1周	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查	ACAA0001	检查		/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			检查	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
尿常规化学分析	CCAA2000	胃管置管术	ABGB0001	肝功能检查（禁食期间，每日一次。）	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
粪便常规检查	CCCA3000	胃肠减压	ABGA0001	肾脏功能检查（禁食期间，每日一次。）	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000
隐血试验	CCCB8000	氧气吸入	ABJA0001	电解质测定（禁食期间，每日一次。）	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO ₂)测定CEJD1000和总钙(Ca)测定CEJF8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	监测		葡萄糖(Glu)测定（禁食期间，每日一次。）	CEFA8000
肾脏功能检查	CAMA1000	院内遥测心电监护	KKA28701	肿瘤标记物测定	癌胚抗原(CEA)测定CGRA1000和糖类抗原CA-125测定CGRP1000和糖类抗原CA-199测定CGRS1000和糖类抗原CA-242测定CGRT1000和糖类抗原CA-724测定CGRV1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
电解质测定	钾（K）测定 CEJA8000和钠（Na） 测定CEJB8000和氯 （Cl）测定CEJC8000 和总二氧化碳 （TCO2）测定 CEJD1000和总钙 （Ca）测定CEJF8000	无创指脉血氧饱和度 监测	FKA05710	血气分析	CEJM1000
生理盐水介质交叉配 血	CAMW1000	麻醉		治疗	
葡萄糖（Glu）测定	CEFA8000	全身麻醉	HAA42901	氧气吸入	ABJA0001
血脂检查	甘油三酯（TG）测定 CEHB1000和总胆固醇 （TC）测定CEHA1000和 高密度脂蛋白胆固醇 （HDL-C）测定 CEHC1000和低密度脂 蛋白胆固醇（LDL-C） 测定CEHD1000	/腰麻复合连续硬膜 外阻滞麻醉	HAC42103	换药	换药（小）ABFA0001或 换药（中）ABFA0002或 换药（大）ABFA0003或 换药（特大）ABFA0004
凝血功能测定	凝血酶时间（TT）测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间（APTT） 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间（PT）测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	手术		监测	
肿瘤标记物测定	癌胚抗原（CEA）测定 CGRA1000和糖类抗原 CA-125测定CGRP1000 和糖类抗原CA-199测 定CGRS1000和糖类抗 原CA-242测定 CGRT1000和糖类抗原 CA-724测定CGRV1000	扩大根治性远端胃大 部切除术	HPD77302	院内遥测心电监护	KKA28701
胸部X线摄影	EABJT001	治疗		无创指脉血氧饱和度 监测	FKA05710
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703	导尿管留置	ABHA0002	病理	
胃镜检查	纤维胃镜检查 FPB01601或电子胃镜 检查FPB01602或经鼻 电子胃镜检查 FPB01603	病理		冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感 染标本冷冻切片病理 诊断 BCBB0001或快 速石蜡切片病理诊断 BCBC0001
上消化道X线造影	EACPB001	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感 染标本冷冻切片病理 诊断BCBB0001	免疫组织化学染色诊 断	BEBA0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000	药物		药物	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	抗菌药物		静脉补液	
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	止痛药物		抗菌药物	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	静脉补液		止痛药物	
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001			抗血栓药物	
上腹部X线计算机体层(CT)平扫	EBAQT001			肠内营养药物	
下腹部X线计算机体层(CT)平扫	EBAQT002			止血药物	
盆腔X线计算机体层(CT)平扫	EBAQU001				
病理会诊	疑难病理读片会诊 AADCO001或同步远程病理会诊AADD0001或院外影像学资料会诊AADE0001				
治疗					
一般灌肠	ABGE0001				
导尿管留置	ABHA0002				
病理					
活检组织病理诊断	BCAB0001		ABCD0001		
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目:					
检查		检查		检查	
特殊介质交叉配血	CAMX1000	电子胃镜检查	FPB01602	一般细菌培养+鉴定+药敏	CJAR8000
疑难交叉配血	CAMY1000	治疗		治疗	
普通二维超声心动图	EDFKA005	静脉输血	ABCD0001		
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404		ABCD0001	病理	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
气道阻力测定	FJB02401				
PET/CT肿瘤显像	PET/CT肿瘤局部显像 EEFZX001或PET/CT肿瘤全身显像EEFZY001	病理		药物	
超声胃镜检查	超声胃镜检查 FPB01604或经电子胃镜超声微探头检查 FPB01605	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感染标本冷冻切片病理诊断BCBB0001	肠道抗生素口服	
治疗		药物		泻药	
人工洗胃	ABGC0001				
药物					

胃癌

根治性全胃切除术

适用对象：	病种编码：	JS006	
	主要诊断：	胃癌	ICD-10码：C16.0-C16.6,C16.8-C16.9
	主要操作/主要治疗方式：	根治性全胃切除术	CCHI码：HPD77304
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：C16.0-C16.6,C16.8-C16.9胃癌疾病编码。 2. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施不影响手术后康复时，可以进入路径。	
	出院标准：	1. 无明显不适主诉，生命体征正常，血液学化验无明显异常。 2. 进半流食后无腹部不适，无需静脉营养支持。 3. 伤口愈合良好、腹腔（或胸腔）引流管拔除。 4. 不需要住院处理的其它并发症或合并症。	
	最短住院日参考值：	14-16天	
	变异条件：	1. 术前分期难确定者可行腹腔镜探查等进行胃癌分期。 2. 对手术产生影响的合并症及并发症，如肠梗阻、腹腔感染等，需要进行相关的诊断和治疗。 3. 新辅助放治疗可提高手术切除率。 4. 术后出现严重并发症及合并症者。 5. 淋巴清除范围超过第二站者。 6. 医生认为的变异原因。 7. 患者其他原因的变异。	
	再入院间隔时间：	2周	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查	ACAA0001	检查		II级护理	ACAB0001
全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000			引流管护理	ACBK0001
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	治疗		口腔护理	ACBH0001
生化常规检查	葡萄糖(Glu)测定CEFA8000和总钙(Ca)测定CEJF8000和无机磷(P)测定CEKA8000和钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和镁(Mg)测定CEJE8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000	导尿	ABHA0001	检查	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血气分析	CEJM1000	导尿管留置	ABHA0002	肝功能检查（禁食期间，每日一次。）	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)测定CECB1000和总胆红素 (T-Bi1)测定CELA1000和直接胆红素 (D-Bi1)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)测定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和白蛋白 (A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP)测定CECD8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)测定CECB1000和总胆红素 (T-Bi1)测定CELA1000和直接胆红素 (D-Bi1)测定CELB1000和间接胆红素 (I-Bi1)测定CELC1000和γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)测定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和白蛋白 (A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP)测定CECD8000	输血输液加温治疗	HAQ32701	肾脏功能检查（禁食期间，每日一次。）	尿素 (Urea)测定CEEA8000和肌酐 (Cr)测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000
肾脏功能检查	尿素 (Urea)测定CEEA8000和肌酐 (Cr)测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000	麻醉监护下镇静术	HAQ42101	电解质测定（禁食期间，每日一次。）	钾 (K)测定CEJA8000和钠 (Na)测定CEJB8000和氯 (Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2)测定CEJD1000和总钙 (Ca)测定CEJF8000
凝血功能测定	CAMA1000	控制性降压	HAQ99901	葡萄糖 (Glu)测定（禁食期间，每日一次。）	CEFA8000
肿瘤标志物检查	癌胚抗原 (CEA)测定CGRA1000和糖类抗原CA-125测定CGRP1000和糖类抗原CA-199测定CGRS1000和糖类抗原CA-724测定CGRV1000	自控静脉镇痛治疗	HAZ48101	血气分析	CEJM1000
脂质及其相关物质检验	总胆固醇 (TC)测定CEHA1000和甘油三酯 (TG)测定CEHB1000和高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)测定CEHC1000和低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)测定CEHD1000	监测		全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
尿常规化学分析	CCAA2000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902	生化常规检查	葡萄糖(Glu)测定 CEFA8000和总钙(Ca)测定CEJF8000和无机磷(P)测定CEKA8000和钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和镁(Mg)测定CEJE8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000
尿沉渣镜检	CCBB2000	无创心电监测	FKA05705	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和间接胆红素(I-Bil)测定CELC1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000和肌酸激酶(CK)测定CECS1000和乳酸脱氢酶(LD)测定CECW1000和α-羟基丁酸脱氢酶(α-HBD)测定CECV1000
粪便常规检查	CCCA3000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000
隐血试验	CCCB8000	麻醉恢复室监护	HAP28901	肿瘤标志物检查	癌胚抗原(CEA)测定CGRA1000和甲胎蛋白(AFP)测定CGRB8000和糖类抗原CA-125测定CGRP1000和糖类抗原CA-153测定CGRR1000和糖类抗原CA-199测定CGRS1000和糖类抗原CA-724测定CGRV1000
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	术中体温监测	HAN05702	脂质及其相关物质检验	总胆固醇(TC)测定CEHA1000和甘油三酯(TG)测定CEHB1000和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定CEHC1000和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定CEHD1000
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	麻醉		手术标本病理诊断	BCAD0001
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	腰麻复合连续硬膜外阻滞麻醉	HAC42103	免疫组织化学染色诊断	BEBA0001
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	/全身麻醉	HAA42901	非妇科液基薄层细胞学检查与诊断	BBAE0002

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
胃镜检查	电子胃镜检查 FPB01602和超声胃镜 检查FPB01604和消化 道内镜活检术 FPA07601或消化内镜 检查麻醉术FPA42201	手术		治疗	
胸部影像学检查	胸部X线摄影 EABJT001或胸部X线 计算机体层(CT)平扫 EBAJT001或胸部X线 计算机体层(CT)增强 扫描EBBJT001	根治性全胃切除术	HPD77304	氧气吸入	ABJA0001
腹部影像学检查	上腹部X线计算机体 层(CT)增强扫描 EBBQT001和下腹部X 线计算机体层(CT)增 强扫描EBBQT002和盆 腔X线计算机体层 (CT)增强扫描 EBBQU001	病理		氧气雾化吸入	ABKB0001
腹部彩超检查	胃肠充盈造影B超检 查EDBPA002和肝胆胰 脾彩色多普勒超声检 查EDCQT001	冷冻切片病理诊断	BCBA0001	换药	换药(中)ABFA0002或 换药(大)ABFA0003或 换药(特大)ABFA0004
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401和用力肺活 量功能检查FJE01402 和肺每分通气量功能 检查FJE01403和最大 通气量功能检查 FJE01404和肺弥散功 能检查—一口气法 FJE01405和流速容量 曲线(V-V曲线)测定 FJE02401和残气容积 测定—体描箱法 FJE02402	快速石蜡切片病理诊 断	BCBC0001	静脉采血	ABBB0001
肛门指诊	FPV01401	药物		皮内注射	ABAA0001
上消化道X线造影	EACPB001	麻醉常规用药		皮下注射	ABAB0001
十二通道常规心电图 检查	FKA03703	补充血容量药物		肌肉注射	ABAC0001
治疗		追加抗生素		静脉注射	ABAD0001
静脉采血	ABBB0001			静脉输液	ABCA0001
皮内注射	ABAA0001			静脉输血	ABCD0001
皮下注射	ABAB0001			外周静脉营养输注	ABCG0001
肌肉注射	ABAC0001			肠内营养灌注	ABGD0001
静脉注射	ABAD0001		ABCD0001	引流管更换	ABZG0001
静脉输液	ABCA0001			监测	
静脉输血	ABCD0001			无创心电监测	FKA05705
外周静脉营养输注	ABCG0001			药物	
胃肠减压	ABGA0001			预防性抗生素	
胃管置管术	ABGB0001			止吐药	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
导尿管留置	ABHA0002			化痰药	
病理				营养药物	
活检组织病理诊断	BCAB0001			抗血栓药物	
药物			ABCD0001	肠内营养药物	
预防性抗生素				止血药物	
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		护理	
腹部磁共振检查	上腹部磁共振增强成像ECBQT001和下腹部磁共振增强成像ECBQT002和盆腔磁共振增强成像ECBQU001	电子胃镜检查	FPB01602	特级护理	ACAD0001
全身骨显像	EEAX6004	治疗		检查	
PET/CT肿瘤全身显像	EEFZY001	临时起搏器安置术	HKT62301	胸部影像学检查	胸部X线摄影EABJT001或胸部X线计算机体层(CT)平扫EBAJT001或胸部X线计算机体层(CT)增强扫描EBBJT001
冠状动脉CT三维成像	EBCKU002	病理		腹部影像学检查	上腹部X线计算机体层(CT)增强扫描EBBQT001和下腹部X线计算机体层(CT)增强扫描EBBQT002和盆腔X线计算机体层(CT)增强扫描EBBQU001
动态心电图	三通道动态心电图检查FKA03704和24小时心率变异性分析FKA05702和心电事件记录FKA05703	特异性感染标本冷冻切片病理诊断	BCBB0001	腹部彩超检查	胃肠充盈造影B超检查EDBPA002和肝胆胰脾彩色多普勒超声检查EDCQT001
心脏彩色多普勒超声	EDFKA007	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断BCBA0001或特异性感染标本冷冻切片病理诊断BCBB0001	十二通道常规心电图检查	FKA03703
院内会诊	AADB0001	药物		一般细菌培养+鉴定+药敏	CJAR8000
疑难病理读片会诊	AADC0001	止血药		院内会诊	AADB0001
治疗		血管活性药物		治疗	
临时起搏器安置术	HKT62301	腹腔内治疗药物		无创呼吸机辅助通气	KJA21401
临时起搏器应用	KKA26701			膀胱冲洗	ABHB0001
经外周静脉置入中心静脉导管术	ABDA0001			有创呼吸机辅助通气	KJA21402

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
清洁灌肠	ABGE0004			静脉置管护理	ACBG0002
经口全消化道清洁洗肠	ABGF0001			动脉置管护理	ACBG0001
外周动脉穿刺置管术	HL962202			气管插管护理	ACBJ0003
人工洗胃	ABGC0001			吸痰护理	ACBJ0004
药物				临时起搏器应用	KKA26701
抑酸药				药物	
营养支持				制酸剂	
新辅助治疗				止血药	
				促胃肠动力药	
				抗凝药	
				胰岛素及其类似物	
				抗肿瘤药物	
				肠道抗生素口服	
				泻药	

胃十二指肠溃疡

远端胃大部切除术

适用对象：	病种编码：	JS007			
	主要诊断：	胃十二指肠溃疡	ICD-10码：	K25. 0-K25. 7, K25. 9, K26. 0-K26. 7, K26. 9	
	主要操作/主要治疗方式：	远端胃大部切除术	CCHI码：	HPD73304	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：K25. 0-K25. 7, K25. 9, K26. 0-K26. 7, K26. 9胃十二指肠溃疡疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 无发热，恢复肛门排气排便，可进半流食。 2. 切口愈合良好：引流管拔除，伤口无感染，无皮下积液（或门诊可处理的少量积液）。 3. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。			
	最短住院日参考值：	9天			
	变异条件：	1. 术前合并其他基础疾病影响手术的患者，需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术前需确定手术方式（迷走神经切断+胃引流术，胃大部切除术），视术中情况定胃肠道重建方式。 3. 胃溃疡病人术中活检提示胃癌，则按胃癌处理，进入相应路径。 4. 有并发症（穿孔、瘢痕性幽门梗阻、出血、恶变等）的胃十二指肠溃疡患者，则转入相应临床路径。			
	再入院间隔时间：	2周			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查	ACAA0001	检查		/II级护理	ACAB0001
全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000	全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000	检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
粪便常规检查	CCCA3000	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000
隐血试验	CCCB8000	治疗		肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000	胃管置管术	ABGB0001	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000	胃肠减压	ABGA0001	胃镜检查	纤维胃镜检查 FPB01601或电子胃镜 检查FPB01602
电解质测定	CAMA1000	导尿管留置	ABHA0002	治疗	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	氧气吸入	ABJA0001	胃管置管术	ABGB0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	院内遥测心电监护	KKA28701	胃肠减压	ABGA0001
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	监测		会阴擦洗	ABZE0001
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000			氧气吸入	ABJA0001
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	麻醉		换药	换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	全身麻醉	HAA42901	静脉采血	ABBB0001
胃镜检查	纤维胃镜检查FPB01601或电子胃镜检查FPB01602	手术		院内遥测心电监护	KKA28701
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	远端胃大部切除术	HPD73304	监测	
上消化道X线造影	EACPB001	病理			
十二通道常规心电图检查	FKA03703	手术标本病理诊断	BCAD0001	药物	
胸部X线摄影	EABJT001	药物		静脉补液	
治疗		静脉补液			
静脉采血	ABBB0001	抗菌药物			
一般灌肠	ABGE0001	H2受体阻断剂			
药物		/PPI抑制剂			
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目:					
检查		检查		检查	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活 量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403或最大 通气量功能检查 FJE01404				
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一 口气法FJE01405或肺 弥散功能检查-重复 呼吸法FJE01406	治疗		治疗	
气道阻力测定	FJB02401				
普通二维超声心动图	EDFKA005	药物		药物	
治疗					
胃管置管术	ABGB0001				
药物					

胃十二指肠溃疡

经腹腔镜远端胃大部切除术

适用对象：	病种编码：	JS008	
	主要诊断：	胃十二指肠溃疡	ICD-10码：K25. 0-K25. 7, K25. 9, K26. 0-K26. 7, K26. 9
	主要操作/主要治疗方式：	经腹腔镜远端胃大部切除术	CCHI码：HPD73503
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：K25. 0-K25. 7, K25. 9, K26. 0-K26. 7, K26. 9胃十二指肠溃疡疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。	
	出院标准：	1. 无发热，恢复肛门排气排便，可进半流食。 2. 切口愈合良好：引流管拔除，伤口无感染，无皮下积液（或门诊可处理的少量积液）。 3. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。	
	最短住院日参考值：	9天	
	变异条件：	1. 术前合并其他基础疾病影响手术的患者，需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术前需确定手术方式（迷走神经切断+胃引流术，胃大部切除术），视术中情况定胃肠道重建方式。 3. 胃溃疡病人术中活检提示胃癌，则按胃癌处理，进入相应路径。 4. 有并发症（穿孔、瘢痕性幽门梗阻、出血、恶变等）的胃十二指肠溃疡患者，则转入相应临床路径。	
	再入院间隔时间：	2周	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查	ACAA0001	检查		/II级护理	ACAB0001
全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000	全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000	检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(Alb)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
粪便常规检查	CCCA3000	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000
隐血试验	CCCB8000	治疗		肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000	胃管置管术	ABGB0001	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000	胃肠减压	ABGA0001	胃镜检查	纤维胃镜检查 FPB01601或电子胃镜 检查FPB01602
电解质测定	CAMA1000	导尿管留置	ABHA0002	治疗	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	氧气吸入	ABJA0001	胃管置管术	ABGB0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	院内遥测心电监护	KKA28701	胃肠减压	ABGA0001
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	监测		会阴擦洗	ABZE0001
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000			氧气吸入	ABJA0001
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	麻醉		换药	换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	全身麻醉	HAA42901	静脉采血	ABBB0001
胃镜检查	纤维胃镜检查FPB01601或电子胃镜检查FPB01602	手术		院内遥测心电监护	KKA28701
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	经腹腔镜远端胃大部切除术	HPD73503	监测	
上消化道X线造影	EACPB001	病理			
十二通道常规心电图检查	FKA03703	手术标本病理诊断	BCAD0001	药物	
胸部X线摄影	EABJT001	药物		静脉补液	
治疗		静脉补液			
静脉采血	ABBB0001	抗菌药物			
一般灌肠	ABGE0001	H2受体阻断剂			
药物		/PPI抑制剂			
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目:					
检查		检查		检查	
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一口气法FJE01405或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	治疗		治疗	
气道阻力测定	FJB02401				
普通二维超声心动图	EDFKA005	药物		药物	
治疗					
胃管置管术	ABGB0001				
药物					

胃十二指肠溃疡

胃迷走神经干切断术

适用对象：	病种编码：	JS009			
	主要诊断：	胃十二指肠溃疡	ICD-10码：	K25. 0-K25. 7, K25. 9, K26. 0-K26. 7, K26. 9	
	主要操作/主要治疗方式：	胃迷走神经干切断术	CCHI码：	HCL58301	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：K25. 0-K25. 7, K25. 9, K26. 0-K26. 7, K26. 9胃十二指肠溃疡疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 无发热，恢复肛门排气排便，可进半流食。 2. 切口愈合良好：引流管拔除，伤口无感染，无皮下积液（或门诊可处理的少量积液）。 3. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。			
	最短住院日参考值：	9天			
	变异条件：	1. 术前合并其他基础疾病影响手术的患者，需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术前需确定手术方式（迷走神经切断+胃引流术，胃大部切除术），视术中情况定胃肠道重建方式。 3. 胃溃疡病人术中活检提示胃癌，则按胃癌处理，进入相应路径。 4. 有并发症（穿孔、瘢痕性幽门梗阻、出血、恶变等）的胃十二指肠溃疡患者，则转入相应临床路径。			
	再入院间隔时间：	2周			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查	ACAA0001	检查		/II级护理	ACAB0001
全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000	全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000	检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(Alb)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
粪便常规检查	CCCA3000	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000
隐血试验	CCCB8000	治疗		肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000	胃管置管术	ABGB0001	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000	胃肠减压	ABGA0001	胃镜检查	纤维胃镜检查 FPB01601或电子胃镜 检查FPB01602
电解质测定	CAMA1000	导尿管留置	ABHA0002	治疗	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	氧气吸入	ABJA0001	胃管置管术	ABGB0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	院内遥测心电监护	KKA28701	胃肠减压	ABGA0001
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	监测		会阴擦洗	ABZE0001
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000			氧气吸入	ABJA0001
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	麻醉		换药	换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	全身麻醉	HAA42901	静脉采血	ABBB0001
胃镜检查	纤维胃镜检查FPB01601或电子胃镜检查FPB01602	手术		院内遥测心电监护	KKA28701
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	胃迷走神经干切断术	HCL58301	监测	
上消化道X线造影	EACPB001	病理			
十二通道常规心电图检查	FKA03703	手术标本病理诊断	BCAD0001	药物	
胸部X线摄影	EABJT001	药物		静脉补液	
治疗		静脉补液			
静脉采血	ABBB0001	抗菌药物			
一般灌肠	ABGE0001	H2受体阻断剂			
药物		/PPI抑制剂			
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目:					
检查		检查		检查	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活 量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403或最大 通气量功能检查 FJE01404				
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一 口气法FJE01405或肺 弥散功能检查-重复 呼吸法FJE01406	治疗		治疗	
气道阻力测定	FJB02401				
普通二维超声心动图	EDFKA005	药物		药物	
治疗					
胃管置管术	ABGB0001				

胃十二指肠溃疡
经腹腔镜胃迷走神经干切断术

适用对象：	病种编码：	JS010	
	主要诊断：	胃十二指肠溃疡	ICD-10码：K25. 0-K25. 7, K25. 9, K26. 0-K26. 7, K26. 9
	主要操作/主要治疗方式：	经腹腔镜胃迷走神经干切断术	CCHI码：HCL58501
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：K25. 0-K25. 7, K25. 9, K26. 0-K26. 7, K26. 9胃十二指肠溃疡疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。	
	出院标准：	1. 无发热，恢复肛门排气排便，可进半流食。 2. 切口愈合良好：引流管拔除，伤口无感染，无皮下积液（或门诊可处理的少量积液）。 3. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。	
	最短住院日参考值：	9天	
	变异条件：	1. 术前合并其他基础疾病影响手术的患者，需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术前需确定手术方式（迷走神经切断+胃引流术，胃大部切除术），视术中情况定胃肠道重建方式。 3. 胃溃疡病人术中活检提示胃癌，则按胃癌处理，进入相应路径。 4. 有并发症（穿孔、瘢痕性幽门梗阻、出血、恶变等）的胃十二指肠溃疡患者，则转入相应临床路径。	
	再入院间隔时间：	2周	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查	ACAA0001	检查		/II级护理	ACAB0001
全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000	全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000	检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(Alb)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
粪便常规检查	CCCA3000	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000
隐血试验	CCCB8000	治疗		肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000	胃管置管术	ABGB0001	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000	胃肠减压	ABGA0001	胃镜检查	纤维胃镜检查 FPB01601或电子胃镜 检查FPB01602
电解质测定	CAMA1000	导尿管留置	ABHA0002	治疗	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	氧气吸入	ABJA0001	胃管置管术	ABGB0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	院内遥测心电监护	KKA28701	胃肠减压	ABGA0001
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000	监测		会阴擦洗	ABZE0001
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000			氧气吸入	ABJA0001
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	麻醉		换药	换药(中)ABFA0002或 换药(大)ABFA0003
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	全身麻醉	HAA42901	静脉采血	ABBB0001
胃镜检查	纤维胃镜检查 FPB01601或电子胃镜检查 FPB01602	手术		院内遥测心电监护	KKA28701
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	经腹腔镜胃迷走神经干切断术	HCL58501	监测	
上消化道X线造影	EACPB001	病理			
十二通道常规心电图检查	FKA03703	手术标本病理诊断	BCAD0001	药物	
胸部X线摄影	EABJT001	药物		静脉补液	
治疗		静脉补液			
静脉采血	ABBB0001	抗菌药物			
一般灌肠	ABGE0001	H2受体阻断剂			
药物		/PPI抑制剂			
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目:					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
检查		检查		检查	
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活 量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403或最大 通气量功能检查 FJE01404				
弥散功能检查	肺弥散功能检查-- 一口气法FJE01405或肺 弥散功能检查-重复 呼吸法FJE01406	治疗		治疗	
气道阻力测定	FJB02401				
普通二维超声心动图	EDFKA005	药物		药物	
治疗					
胃管置管术	ABGB0001				
药物					

急性单纯性阑尾炎

阑尾切除术

适用对象：	病种编码：	JS011	
	主要诊断：	急性单纯性阑尾炎	ICD-10码：K35.9
	主要操作/主要治疗方式：	阑尾切除术	CCHI码：HPR75301
	入院标准：	1. 第一诊断符合ICD10：K35.9急性单纯性阑尾炎疾病编码。 2. 有手术适应证，无手术禁忌证。 3. 如患有其他疾病，但在住院期间无需特殊处理（检查和治疗），也不影响第一诊断时，亦可进入路径。	
	出院标准：	1. 患者一般情况良好，恢复正常饮食。 2. 体温正常，腹部无阳性体征，相关实验室检查结果基本正常。 3. 切口愈合良好（可在门诊拆线）。	
	最短住院日参考值：	7天	
	变异条件：	1. 对于阑尾周围脓肿形成者，先予抗炎治疗：如病情不能控制，行脓肿引流手术，或行超声引导下脓肿穿刺置管引流术：必要时行Ⅱ期阑尾切除术，术前准备同前。 2. 手术后继发切口感染、腹腔内感染或门脉系统感染等并发症，导致围手术期住院时间延长与费用增加。 3. 住院后出现其他内、外科疾病需进一步明确诊断，导致住院时间延长与费用增加。	
	再入院间隔时间：	2周	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
		I 级护理	ACAC0001	II 级护理	ACAB0001
检查	ACAA0001	检查		/III级护理	ACAA0001
全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000	一般细菌培养	CJAN8000	检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	普通细菌药敏试验	普通细菌药敏定性试验CJBX9000或普通细菌药敏定量试验CJBY9000	全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	治疗		生化常规检查	葡萄糖(Glu)测定CEFA8000和总钙(Ca)测定CEJF8000和无机磷(P)测定CEKA8000和钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000			治疗	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	麻醉		换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	硬膜外阻滞麻醉	骶管单次阻滞麻醉HAC42104或腰部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42109或腰部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42110或骶管连续阻滞麻醉HAC42111	药物	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CAMA1000	/腰麻复合连续硬膜外阻滞麻醉	HAC42103		
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	手术			
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	阑尾切除术	HPR75301		
十二通道常规心电图检查	FKA03703	病理			
治疗		手术标本病理诊断	BCAD0001		
		药物			
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目:					
检查		检查		检查	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
淀粉酶 (AMY) 测定	CEDC8000			肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (Alb) 测定CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定CECD8000
胸部X线透视	EAAJT001	治疗		肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000
/胸部X线摄影	EABJT001			治疗	
腹部X线摄影	EABQT001	药物			
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001			药物	
经腹部妇科B超检查	EDBTA001				
治疗					
药物					

急性单纯性阑尾炎

经腹腔镜阑尾切除术

适用对象：	病种编码：	JS012	
	主要诊断：	急性单纯性阑尾炎	ICD-10码：K35.9
	主要操作/主要治疗方式：	经腹腔镜阑尾切除术	CCHI码：HPR75501
	入院标准：	1. 第一诊断符合ICD10：K35.9急性单纯性阑尾炎疾病编码。 2. 有手术适应证，无手术禁忌证。 3. 如患有其他疾病，但在住院期间无需特殊处理（检查和治疗），也不影响第一诊断时，亦可进入路径。	
	出院标准：	1. 患者一般情况良好，恢复正常饮食。 2. 体温正常，腹部无阳性体征，相关实验室检查结果基本正常。 3. 切口愈合良好（可在门诊拆线）。	
	最短住院日参考值：	7天	
	变异条件：	1. 对于阑尾周围脓肿形成者，先予抗炎治疗：如病情不能控制，行脓肿引流手术，或行超声引导下脓肿穿刺置管引流术：必要时行Ⅱ期阑尾切除术，术前准备同前。 2. 手术后继发切口感染、腹腔内感染或门脉系统感染等并发症，导致围手术期住院时间延长与费用增加。 3. 住院后出现其他内、外科疾病需进一步明确诊断，导致住院时间延长与费用增加。	
	再入院间隔时间：	2周	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
		I 级护理	ACAC0001	II 级护理	ACAB0001
检查	ACAA0001	检查		/III级护理	ACAA0001
全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000	一般细菌培养	CJAN8000	检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	普通细菌药敏试验	普通细菌药敏定性试验CJBX9000或普通细菌药敏定量试验CJBY9000	全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000	治疗		生化常规检查	葡萄糖(Glu)测定 CEFA8000和总钙(Ca)测定 CEJF8000和无机磷(P)测定 CEKA8000和钾(K)测定 CEJA8000和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000			治疗	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	麻醉		换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	硬膜外阻滞麻醉	骶管单次阻滞麻醉HAC42104或腰部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42109或腰部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42110或骶管连续阻滞麻醉HAC42111	药物	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CAMA1000	/腰麻复合连续硬膜外阻滞麻醉	HAC42103		
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	手术			
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	经腹腔镜阑尾切除术	HPR75501		
十二通道常规心电图检查	FKA03703	病理			
治疗		手术标本病理诊断	BCAD0001		
		药物			
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目:					
检查		检查		检查	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
淀粉酶 (AMY) 测定	CEDC8000			肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (A1b) 测定CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定CECD8000
胸部X线透视	EAAJT001	治疗		肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000
/胸部X线摄影	EABJT001			治疗	
腹部X线摄影	EABQT001	药物			
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001			药物	
经腹部妇科B超检查	EDBTA001				
治疗					
药物					

直肠息肉

经内镜直肠良性肿物切除术

适用对象：	病种编码：	JS013	
	主要诊断：	直肠息肉	ICD-10码：K62.1,D12.8
	主要操作/主要治疗方式：	经内镜直肠良性肿物切除术	CCHI码：HPU73602
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：K62.1,D12.8直肠息肉疾病编码。 2. 门诊纤维内镜不能切除的广基息肉，病理未排除腺瘤癌变、家族性腺瘤性息肉病的患者。 3. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 伤口愈合好：伤口无感染及皮下积液，引流管拔除或无便血，体温正常。 2. 没有需要住院处理的并发症。		
最短住院日参考值：	4天		
变异条件：	1. 息肉性质判断与术中情况或术后病理不符，需进行相关检查和治疗，导致住院时间延长。 2. 腺瘤癌变术前病理分期，需进行相关检查。 3. 息肉大小、数目、性质影响手术方式的选择。 4. 腺瘤癌变者（高级别上皮内瘤变）患者，按直肠癌临床路径执行。 5. 有影响手术的并发症，需要进行相关的诊断和治疗。		
再入院间隔时间：	2周		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查	ACAA0001	检查		检查	
全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000	全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000		
尿常规化学分析	CCAA2000	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	治疗	
粪便常规检查	CCCA3000	治疗		氧气吸入	ABJA0001
隐血试验	CCCB8000	氧气吸入	ABJA0001	会阴擦洗	ABZE0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	会阴擦洗	ABZE0001	药物	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEB8000	院内遥测心电图监护	KKA28701		
电解质测定	CAMA1000	监测			
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000				
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	麻醉			
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	全身麻醉	HAA42901		
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	/内脏神经丛连续阻滞麻醉	HAL42102		
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	手术			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	经内镜直肠良性肿物切除术	HPU73602		
十二通道常规心电图检查	FKA03703	病理			
胸部X线摄影	EABJT001	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感染标本冷冻切片病理诊断BCBB0001		
纤维结肠镜检查	FPS01603	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001		
治疗		药物			
导尿管留置	ABHA0002	抗菌药物			
一般灌肠	ABGE0001				
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
				全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000
治疗		治疗		肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
				电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000
药物		药物		治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
				换药	换药(小)ABFA0001或 换药(中)ABFA0002或 换药(大)ABFA0003或 换药(特大)ABFA0004
				药物	
				抗菌药物	

腹股沟疝

腹股沟疝修补术

适用对象：	病种编码：	JS014	
	主要诊断：	腹股沟疝	ICD-10码：K40.0-K40.4, K40.9
	主要操作/主要治疗方式：	腹股沟疝修补术	CCHI码：HQS83301
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：K40.0-K40.4, K40.9腹股沟疝疾病代码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 切口对合好，无红肿、渗液、裂开及大面积皮下淤血情况。 2. 没有需要住院处理的手术并发症。		
最短住院日参考值：	5天		
变异条件：	1. 腹股沟嵌顿疝和绞窄疝因病情严重且变化快，可能有疝内容物坏死，须急诊手术治疗，进入其他相应路径。 2. 合并有影响腹股沟疝手术治疗实施的疾病，或发生其他严重疾病，退出本路径。 3. 出现手术并发症，需要进行相关的诊断和治疗，可导致住院时间延长和费用增加。		
再入院间隔时间：	2周		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查	ACAA0001	/II级护理	ACAB0001	/II级护理	ACAB0001
全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000	检查		检查	
尿常规化学分析	CCAA2000				
粪便常规检查	CCCA3000	治疗		治疗	
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	院内遥测心电图监护	KKA28701	换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	监测		药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000			止痛药	
葡萄糖(Glu)测定	CAMA1000	麻醉			
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	硬膜外阻滞麻醉	骶管单次阻滞麻醉 HAC42104腰部硬膜外 单次阻滞麻醉 HAC42109或腰部硬膜 外连续阻滞麻醉 HAC42110或骶管连续 阻滞麻醉HAC42111		
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测定 CAGC1000或血浆纤维 蛋白原测定 CAGD1000	局部静脉内麻醉	HAB42201		
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	手术			
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	腹股沟疝修补术	HQS83301		
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	病理			
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
十二通道常规心电图检查	FKA03703	药物			
胸部X线摄影	EABJT001				
治疗					
静脉采血	ABBB0001				
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目:					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
检查		检查		检查	
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活 量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403或最大 通气量功能检查 FJE01404			全血细胞计数+5分类 检测	CAAB1000
弥散功能检查	肺弥散功能检查--一 口气法FJE01405或肺 弥散功能检查-重复 呼吸法FJE01406	治疗		肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000
气道阻力测定	FJB02401	氧气吸入	ABJA0001	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000
普通二维超声心动图	EDFKA005	药物		治疗	
腹股沟淋巴结B超检 查	EDBNK001				
泌尿系B超检查	EDBRA001			药物	
下腹部X线计算机体 层(CT)平扫	EBAQT002				
治疗					
药物					

下肢静脉曲张

大隐静脉高位结扎+剥脱术

适用对象：	病种编码：	JS015			
	主要诊断：	下肢静脉曲张		ICD-10码：	I83.0-I83.2, I83.9
	主要操作/主要治疗方式：	大隐静脉高位结扎+剥脱术		CCHI码：	HM573301
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：I83.0-I83.2, I83.9下肢静脉曲张疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 患者体温正常，伤口无感染迹象，能正常下床活动。 2. 没有需要住院处理的并发症。			
	最短住院日参考值：	7天			
	变异条件：	1. 严重基础疾病可能对手术造成影响者，术前准备时间会延长。 2. 术后出现伤口感染、下肢深静脉血栓形成等并发症时，住院恢复时间相应延长。			
	再入院间隔时间：	2周			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	II级护理	ACAB0001
检查	ACAA0001	检查		/III级护理	ACAA0001
全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000			检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗			
粪便常规检查	CCCA3000	氧气吸入	ABJA0001	治疗	
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	麻醉		换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEE8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000	硬膜外阻滞麻醉	骶管单次阻滞麻醉 HAC42104腰部硬膜外 单次阻滞麻醉 HAC42109或腰部硬膜 外连续阻滞麻醉 HAC42110或骶管连续 阻滞麻醉HAC42111	药物	
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	/腰麻复合连续硬膜 外阻滞麻醉	HAC42103	止痛药	
凝血功能测定	CAMA1000	手术		止呕药	
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	大隐静脉高位结扎+ 剥脱术	HM573301		
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	病理			
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000	药物			
胸部X线摄影	EABJT001	抗菌药物			
十二通道常规心电图 检查	FKA03703				
下肢动脉彩色多普勒 超声检查	EDCL5001				
治疗					
药物					
选择项目					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
下肢浅静脉彩色多普勒超声检查	EDCM4001			全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000
/下肢深静脉彩色多普勒超声检查	EDCM1001	治疗		肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(Alb)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
下肢静脉切开造影术	EACM1002	静脉输血	ABCD0001	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000
普通二维超声心动图	EDFKA005	药物		治疗	
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404	静脉补液			
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一口气法FJE01405或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406			药物	
气道阻力测定	FJB02401			静脉补液	
治疗					
药物					

下肢静脉曲张
大隐静脉腔内激光闭合术

适用对象：	病种编码：	JS016			
	主要诊断：	下肢静脉曲张	ICD-10码：	I83.0-I83.2, I83.9	
	主要操作/主要治疗方式：	大隐静脉腔内激光闭合术	CCHI码：	HM559301	
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：I83.0-I83.2, I83.9下肢静脉曲张疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。				
出院标准：	1. 患者体温正常，伤口无感染迹象，能正常下床活动。 2. 没有需要住院处理的并发症。				
最短住院日参考值：	7天				
变异条件：	1. 严重基础疾病可能对手术造成影响者，术前准备时间会延长。 2. 术后出现伤口感染、下肢深静脉血栓形成等并发症时，住院恢复时间相应延长。				
再入院间隔时间：	2周				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	II级护理	ACAB0001
检查	ACAA0001	检查		/III级护理	ACAA0001
全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000			检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗			
粪便常规检查	CCCA3000	氧气吸入	ABJA0001	治疗	
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	麻醉		换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000	硬膜外阻滞麻醉	骶管单次阻滞麻醉 HAC42104或腰部硬膜 外单次阻滞麻醉 HAC42109或腰部硬膜 外连续阻滞麻醉 HAC42110或骶管连续 阻滞麻醉HAC42111	药物	
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测 定CEJC8000和总二氧化 碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测 定CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000	/腰麻复合连续硬膜 外阻滞麻醉	HAC42103	止痛药	
凝血功能测定	CAMA1000	手术		止呕药	
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs) 测定	乙型肝炎表面抗原定 性 (HBsAg) 测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg) 测定 CGLH1000	大隐静脉腔内激光闭 合术	HM559301		
丙型肝炎抗体 (抗 HCV) 测定	CGMA1000	病理			
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV) 测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体 (抗 TP) 测定	CGPP1000	药物			
胸部X线摄影	EABJT001	抗菌药物			
十二通道常规心电图 检查	FKA03703				
下肢动脉彩色多普勒 超声检查	EDCL5001				
治疗					
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
检查		检查		检查	
下肢浅静脉彩色多普勒超声检查	EDCM4001			全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000
/下肢深静脉彩色多普勒超声检查	EDCM1001	治疗		肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
下肢静脉切开造影术	EACM1002	静脉输血	ABCD0001	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000
普通二维超声心动图	EDFKA005	药物		治疗	
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404	静脉补液			
弥散功能检查	肺弥散功能检查--一口气法FJE01405或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406			药物	
气道阻力测定	FJB02401			静脉补液	
治疗					
药物					

原发性甲状腺功能亢进

甲状腺次全切除术

适用对象：	病种编码：	JS017			
	主要诊断：	原发性甲状腺功能亢进	ICD-10码：	E05.805	
	主要操作/主要治疗方式：	甲状腺次全切除术	CCHI码：	HDC73306	
入院标准：		1. 第一诊断为原发性甲状腺机能亢进症（ICD -10：E05.805）。 2. 年龄≤70岁。 3. 需要进行手术治疗。 4. 当患者同时具有其他疾病诊断时，但在住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。 5. 对继发性甲状腺功能亢进，胸骨后甲状腺肿和可疑甲状腺癌变的复杂甲状腺结节病例，不进入临床路径。 6. 术前已出现严重合并症，如：甲亢危象，心功Ⅱ级以下，房颤等病例，不进入路径。 7. 因各种原因急诊手术者不进入路径。			
出院标准：		1. 一般情况良好。 2. 无引流管或引流管拔除。 3. 可门诊拆线，切口愈合良好。			
最短住院日参考值：		5天			
变异条件：		1. 因患者术后出现严重并发症而延期出院。 2. 术后诊断甲状腺恶性肿瘤等情况。			
再入院间隔时间：		2周			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
Ⅱ级护理	ACAB0001	Ⅰ级护理	ACAC0001	Ⅱ级护理	ACAB0001
检查	ACAA0001	检查		检查	
全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000			三碘甲状原氨酸(T ₃)测定	CEQJ1000
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	治疗		甲状腺素(T ₄)测定	CEQH1000
尿常规化学分析	CCAA2000	氧气吸入	ABJA0001	促甲状腺激素(TSH)测定	CEQD1000
游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定	CEQM1000	静脉注射	ABAD0001	甲状腺球蛋白(TG)测定	CEQQ1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
游离甲状腺素 (FT4) 测定	CEQL1000	院内遥测心电监护	KKA28701	甲状旁腺激素 (PTH) 测定	CEQR1000
促甲状腺激素 (TSH) 测定	CEQD1000	监测		抗甲状腺过氧化物酶抗体 (TPOAb) 测定	CGEP1000
甲状腺球蛋白 (TG) 测定	CAMA1000			抗甲状腺球蛋白抗体 (TGAb) 测定	CGEM1000
甲状旁腺激素 (PTH) 测定	CEQR1000	麻醉		三碘甲状腺原氨酸 (T3) 抑制试验	FDC04401
抗甲状腺过氧化物酶抗体 (TPOAb) 测定	CGEP1000	颈丛神经阻滞麻醉	HAF42101	甲状腺素 (T4) 测定	CEQH1000
抗甲状腺球蛋白抗体 (TGAb) 测定	CGEM1000	/全身麻醉	HAA42901	治疗	
三碘甲状腺原氨酸 (T3) 抑制试验	FDC04401	手术		换药	换药 (中) ABFA0002或换药 (大) ABFA0003
甲状腺素 (T4) 测定	CEQH1000	甲状腺次全切除术	HDC73306	皮内注射	ABAA0001
生化常规检查	葡萄糖 (Glu) 测定 CEFA8000和总钙 (Ca) 测定 CEJF8000和无机磷 (P) 测定 CEKA8000和钾 (K) 测定 CEJA8000和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测定 CEJC8000	病理		皮下注射	ABAB0001
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定 CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定 CEAA8000和白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感染标本冷冻切片病理诊断 BCBB0001	肌肉注射	ABAC0001
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000和尿酸 (UA) 测定 CEEE8000	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001	静脉注射	ABAD0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	药物		静脉输液	ABCA0001
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000			清创(缝合)术	清创(缝合)术 (大)ABEA0003或清创 (缝合)术 (中)ABEA0002或清创 (缝合)术 (小)ABEA0001
乙型肝炎表面抗体 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗体定 性(抗HBs)测定 CGLK1000或乙型肝炎 表面抗体定量(抗 HBs)测定CGLL1000			空气压缩泵雾化吸入	ABKC0001
乙型肝炎核心抗体 (抗HBc)测定	CGLS1000			引流管更换	ABZG0001
乙型肝炎e抗体 (HBeAb)测定	CGLP1000			颈部综合运动训练	MBBH001
乙型肝炎e抗原 (HBeAg)测定	乙型肝炎e抗原定性 (HBeAg)测定 CGLM1000或乙型肝炎 e抗原定量(HBeAg)测 定CGLN1000			口腔护理	ACBH0001
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000			药物	
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000			化痰药	
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000			止血药	
声带功能检查对应咽 喉功能检查	纤维喉镜检查 FGM01602或电子纤维 喉镜检查FGM01603			降心率药	
颈椎X线摄影	EABVH001				
胸部X线摄影	EABJT001				
十二通道常规心电图 检查	FKA03703				
甲状腺彩色多普勒超 声检查	EDCDC001				
院内会诊	AADB0001				
治疗			ABCD0001		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
药物					
抗甲亢类药物					
甲状腺激素类药物					
碘剂					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查	ABCD0001	检查	
院际会诊	AADA0001	院际会诊	AADA0001	院际会诊	AADA0001
治疗		院内会诊	AADB0001	院内会诊	AADB0001
胰岛素皮下注射	HDE48101	治疗		治疗	
药物		胰岛素皮下注射	HDE48101	胃管置管术	ABGB0001
抗生素		静脉输血	ABCD0001	清洁灌肠	ABGE0004
升白药		药物		人工辅助通便	ABGG0001
维生素类		抗生素		导尿	ABHA0001
降心率药		糖皮质激素		导尿管留置	ABHA0002
清脏腑热药				氧气吸入	ABJA0001
				擦浴降温	ABLA0001
				危重病人抢救	ABMA0001
				会阴擦洗	ABZE0001
				吸痰护理	ACBJ0004
				胰岛素皮下注射	HDE48101
				气管切开护理	ACBJ0001
				气管切开套管更换	ACBJ0002
				吸痰护理	ACBJ0004
				药物	
				止痛药	
				镇静药	
				抗甲亢类药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
				糖皮质激素	
				钙剂	
				维生素类、矿物质类药	

胆管结石（无胆管炎或胆囊炎）

胆总管探查T管引流术

适用对象：	病种编码：	JS018	
	主要诊断：	胆管结石（无胆管炎或胆囊炎）	ICD-10码：K80.5
	主要操作/主要治疗方式：	胆总管探查T管引流术	CCHI码：HQM45301
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合胆管结石ICD-10：K80.5疾病编码。 2. 患者本人有手术治疗意愿，并符合以下条件： （1）结石沿肝内胆管树局限分布于1个或2个肝段内，常合并病变区段肝管的狭窄及受累肝段的萎缩。 （2）合并肝外胆管结石。 3. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。	
	出院标准：	1. 伤口无感染、腹腔引流管拔除（T管可保留）。 2. 无发热、血白细胞正常、生命体征平稳。 3. 饮食恢复，无需静脉输液。 4. 不需要住院处理的其它并发症和/或合并症如胆漏、胰腺炎等。	
	最短住院日参考值：	9-11天	
	变异条件：	1. 患者存在合并症及并发症，如全身重要器官功能不全等，手术风险增高，需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术前或术中发现胆管癌、肝癌、胰头癌，或伴有胆汁性肝硬化和门静脉高压症且肝功能失代偿期，则进入相应路径。 3. 围手术期由于营养不良，糖代谢异常以及合并症，需延期外科手术，住院时间延长，费用增加。 4. 围手术期的并发症和/或合并症（如术后残留结石），需要进行相关的诊断和治疗，导致住院时间延长、费用增加。	
	再入院间隔时间：	1周	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查	ACAA0001	检查		检查	
全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000	一般细菌培养+鉴定+药敏	CJAR8000	全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	治疗		肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEE8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定EEEE8000
尿常规化学分析	CCAA2000	静脉输血	ABCD0001	肝胆胰脾B超检查	EDBQT001
粪便常规检查	CCCA3000	胃管置管术	ABGB0001	经T管胆道X线造影	EACQE002

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
隐血试验	CCCB8000	导尿管留置	ABHA0002	生化常规检查	葡萄糖(Glu)测定 CEFA8000和总钙(Ca) 测定CEJF8000和无机 磷(P)测定CEKA8000 和钾(K)测定 CEJA8000和钠(Na)测 定CEJB8000和氯(Cl) 测定CEJC8000
生化常规检查	葡萄糖(Glu)测定 CEFA8000和总钙(Ca) 测定CEJF8000和无机 磷(P)测定CEKA8000 和钾(K)测定 CEJA8000和钠(Na)测 定CEJB8000和氯(Cl) 测定CEJC8000	氧气吸入	ABJA0001	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和γ-谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000
肝功能检查	CAMA1000	静脉注射	ABAD0001	治疗	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000	静脉输液	ABCA0001	换药	换药(中)ABFA0002或 换药(大)ABFA0003或 换药(小)ABFA0001
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	院内遥测心电监护	KKA28701	皮内注射	ABAA0001
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	监测		皮下注射	ABAB0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000			肌肉注射	ABAC0001
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	麻醉		静脉采血	ABBB0001
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	全身麻醉	HAA42901	引流管护理	ACBK0001
胸部X线摄影	EABJT001	手术		静脉注射	ABAD0001
十二通道常规心电图检查	FKA03703	胆总管探查T管引流术	HQM45301	静脉输液	ABCA0001
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	病理		清创(缝合)术(中)	ABEA0002
胰胆管系统磁共振水成像(MRCP)	ECAQP001	冷冻切片病理诊断	BCBA0001	超声雾化吸入	ABKA0001
乙型肝炎表面抗体(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定 CGLK1000或乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	手术标本病理诊断	BCAD0001	引流管更换	ABZG0001
乙型肝炎e抗原(HBeAg)测定	乙型肝炎e抗原定性(HBeAg)测定 CGLM1000或乙型肝炎e抗原定量(HBeAg)测定CGLN1000	免疫组织化学染色诊断	BEBA0001	胃肠减压	ABGA0001
乙型肝炎e抗体(HBeAb)测定	CGLP1000	药物		口腔护理	ACBH0001
乙型肝炎核心抗体(抗HBc)测定	CGLS1000	抗菌素		导尿	ABHA0001
院内会诊	AADB0001	麻醉药		导尿管留置	ABHA0002
治疗		血管活性药物		氧气吸入	ABJA0001
静脉采血	ABBB0001			药物	
药物				化痰药	
造影剂				止痛药	
				抗菌素	
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目:					
检查		检查		检查	
院际会诊	AADA0001	院际会诊		院际会诊	AADA0001
心脏彩色多普勒超声	EDFKA007	院内会诊		院内会诊	AADB0001
血气分析	CEJM1000	治疗		胸部X线摄影	EABJT001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肺活量功能检查	FJE01401			治疗	
糖类抗原CA-199测定	CGRS1000	药物		外周静脉营养输注	ABCG0001
癌胚抗原(CEA)测定	CGRA1000	糖皮质激素		胃管置管术	ABGB0001
治疗				人工辅助通便	ABGG0001
				擦浴降温	ABLA0001
药物				危重病人抢救	ABMA0001
				会阴擦洗	ABZE0001
				吸痰护理	ACBJ0004
				胰岛素皮下注射	HDE48101
				气管切开护理	ACBJ0001
				气管切开套管更换	ACBJ0002
				药物	
				糖皮质激素	

胆管结石（无胆管炎或胆囊炎）

胆总管切开取石+空肠Roux-y吻合术

适用对象：	病种编码：	JS019			
	主要诊断：	胆管结石（无胆管炎或胆囊炎）	ICD-10码：	K80.5	
	主要操作/主要治疗方式：	胆总管切开取石+空肠Roux-y吻合术	CCHI码：	HQM86301	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合胆管结石ICD-10：K80.5疾病编码。 2. 患者本人有手术治疗意愿，并符合以下条件： （1）结石沿肝内胆管树局限分布于1个或2个肝段内，常合并病变区段肝管的狭窄及受累肝段的萎缩。 （2）合并肝外胆管结石。 3. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 伤口无感染、腹腔引流管拔除（T管可保留）。 2. 无发热、血白细胞正常、生命体征平稳。 3. 饮食恢复，无需静脉输液。 4. 不需要住院处理的其它并发症和/或合并症如胆漏、胰腺炎等。			
	最短住院日参考值：	9-11天			
	变异条件：	1. 患者存在合并症及并发症，如全身重要器官功能不全等，手术风险增高，需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术前或术中发现胆管癌、肝癌、胰头癌，或伴有胆汁性肝硬化和门静脉高压症且肝功能失代偿期，则进入相应路径。 3. 围手术期由于营养不良，糖代谢异常以及合并症，需延期外科手术，住院时间延长，费用增加。 4. 围手术期的并发症和/或合并症（如术后残留结石），需要进行相关的诊断和治疗，导致住院时间延长、费用增加。			
	再入院间隔时间：	1周			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查	ACAA0001	检查		检查	
全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000	一般细菌培养+鉴定+药敏	CJAR8000	全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	治疗		肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEE8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEE8000
尿常规化学分析	CCAA2000	静脉输血	ABCD0001	肝胆胰脾B超检查	EDBQT001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
粪便常规检查	CCCA3000	胃管置管术	ABGB0001	经T管胆道X线造影	EACQE002
隐血试验	CCCB8000	导尿管留置	ABHA0002	生化常规检查	葡萄糖(Glu)测定 CEFA8000和总钙(Ca) 测定CEJF8000和无机 磷(P)测定CEKA8000 和钾(K)测定 CEJA8000和钠(Na)测 定CEJB8000和氯(Cl) 测定CEJC8000
生化常规检查	葡萄糖(Glu)测定 CEFA8000和总钙(Ca) 测定CEJF8000和无机 磷(P)测定CEKA8000 和钾(K)测定 CEJA8000和钠(Na)测 定CEJB8000和氯(Cl) 测定CEJC8000	氧气吸入	ABJA0001	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和γ-谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000
肝功能检查	CAMA1000	静脉注射	ABAD0001	治疗	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000	静脉输液	ABCA0001	换药	换药(中)ABFA0002或 换药(大)ABFA0003或 换药(小)ABFA0001
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	院内遥测心电图监护	KK28701	皮内注射	ABAA0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000	监测		皮下注射	ABAB0001
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000			肌肉注射	ABAC0001
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	麻醉		静脉采血	ABBB0001
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	全身麻醉	HAA42901	引流管护理	ACBK0001
胸部X线摄影	EABJT001	手术		静脉注射	ABAD0001
十二通道常规心电图检查	FKA03703	胆总管切开取石+空肠Roux-y吻合术	HQM86301	静脉输液	ABCA0001
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	病理		清创(缝合)术(中)	ABEA0002
胰胆管系统磁共振水成像(MRCP)	ECAQP001	冷冻切片病理诊断	BCBA0001	超声雾化吸入	ABKA0001
乙型肝炎表面抗体(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定 CGLK1000或乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	手术标本病理诊断	BCAD0001	引流管更换	ABZG0001
乙型肝炎e抗原(HBeAg)测定	乙型肝炎e抗原定性(HBeAg)测定 CGLM1000或乙型肝炎e抗原定量(HBeAg)测定CGLN1000	免疫组织化学染色诊断	BEBA0001	胃肠减压	ABGA0001
乙型肝炎e抗体(HBeAb)测定	CGLP1000	药物		口腔护理	ACBH0001
乙型肝炎核心抗体(抗HBc)测定	CGLS1000	抗菌素		导尿	ABHA0001
院内会诊	AADB0001	麻醉药		导尿管留置	ABHA0002
治疗		血管活性药物		氧气吸入	ABJA0001
静脉采血	ABBB0001			药物	
药物				化痰药	
造影剂				止痛药	
				抗菌素	
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目:					
检查		检查		检查	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
院际会诊	AADA0001	院际会诊		院际会诊	AADA0001
心脏彩色多普勒超声	EDFKA007	院内会诊		院内会诊	AADB0001
血气分析	CEJM1000	治疗		胸部X线摄影	EABJT001
肺活量功能检查	FJE01401			治疗	
糖类抗原CA-199测定	CGRS1000	药物		外周静脉营养输注	ABCG0001
癌胚抗原(CEA)测定	CGRA1000	糖皮质激素		胃管置管术	ABGB0001
治疗				人工辅助通便	ABGG0001
				擦浴降温	ABLA0001
药物				危重病人抢救	ABMA0001
				会阴擦洗	ABZE0001
				吸痰护理	ACBJ0004
				胰岛素皮下注射	HDE48101
				气管切开护理	ACBJ0001
				气管切开套管更换	ACBJ0002
				药物	
				糖皮质激素	

胆管结石（无胆管炎或胆囊炎）

经腹腔镜胆管异物取出术

适用对象：	病种编码：	JS020			
	主要诊断：	胆管结石（无胆管炎或胆囊炎）	ICD-10码：	K80.5	
	主要操作/主要治疗方式：	经腹腔镜胆管异物取出术	CCHI码：	HQE65503	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合胆管结石ICD-10：K80.5疾病编码。 2. 患者本人有手术治疗意愿，并符合以下条件： （1）结石沿肝内胆管树局限分布于1个或2个肝段内，常合并病变区段肝管的狭窄及受累肝段的萎缩。 （2）合并肝外胆管结石。 3. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 伤口无感染、腹腔引流管拔除（T管可保留）。 2. 无发热、血白细胞正常、生命体征平稳。 3. 饮食恢复，无需静脉输液。 4. 不需要住院处理的其它并发症和/或合并症如胆漏、胰腺炎等。			
	最短住院日参考值：	9-11天			
	变异条件：	1. 患者存在合并症及并发症，如全身重要器官功能不全等，手术风险增高，需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术前或术中发现胆管癌、肝癌、胰头癌，或伴有胆汁性肝硬化和门静脉高压症且肝功能失代偿期，则进入相应路径。 3. 围手术期由于营养不良，糖代谢异常以及合并症，需延期外科手术，住院时间延长，费用增加。 4. 围手术期的并发症和/或合并症（如术后残留结石），需要进行相关的诊断和治疗，导致住院时间延长、费用增加。			
	再入院间隔时间：	1周			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查	ACAA0001	检查		检查	
全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000	一般细菌培养+鉴定+药敏	CJAR8000	全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	治疗		肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEE8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定EEEE8000
尿常规化学分析	CCAA2000	静脉输血	ABCD0001	肝胆胰脾B超检查	EDBQT001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
粪便常规检查	CCCA3000	胃管置管术	ABGB0001	经T管胆道X线造影	EACQE002
隐血试验	CCCB8000	导尿管留置	ABHA0002	生化常规检查	葡萄糖(Glu)测定 CEFA8000和总钙(Ca) 测定CEJF8000和无机 磷(P)测定CEKA8000 和钾(K)测定 CEJA8000和钠(Na)测 定CEJB8000和氯(Cl) 测定CEJC8000
生化常规检查	葡萄糖(Glu)测定 CEFA8000和总钙(Ca) 测定CEJF8000和无机 磷(P)测定CEKA8000 和钾(K)测定 CEJA8000和钠(Na)测 定CEJB8000和氯(Cl) 测定CEJC8000	氧气吸入	ABJA0001	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和γ-谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(Alb)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000
肝功能检查	CAMA1000	静脉注射	ABAD0001	治疗	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000	静脉输液	ABCA0001	换药	换药(中)ABFA0002或 换药(大)ABFA0003或 换药(小)ABFA0001
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	院内遥测心电监护	KKA28701	皮内注射	ABAA0001
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	监测		皮下注射	ABAB0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000			肌肉注射	ABAC0001
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	麻醉		静脉采血	ABBB0001
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	全身麻醉	HAA42901	引流管护理	ACBK0001
胸部X线摄影	EABJT001	手术		静脉注射	ABAD0001
十二通道常规心电图检查	FKA03703	经腹腔镜胆管异物取出术	HQE65503	静脉输液	ABCA0001
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	经腹腔镜胆囊切除术	HQK75501	清创(缝合)术(中)	ABEA0002
胰胆管系统磁共振水成像(MRCP)	ECAQP001	病理		超声雾化吸入	ABKA0001
乙型肝炎表面抗体(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定 CGLK1000或乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	冷冻切片病理诊断	BCBA0001	引流管更换	ABZG0001
乙型肝炎e抗原(HBeAg)测定	乙型肝炎e抗原定性(HBeAg)测定 CGLM1000或乙型肝炎e抗原定量(HBeAg)测定CGLN1000	手术标本病理诊断	BCAD0001	胃肠减压	ABGA0001
乙型肝炎e抗体(HBeAb)测定	CGLP1000	免疫组织化学染色诊断	BEBA0001	口腔护理	ACBH0001
乙型肝炎核心抗体(抗HBc)测定	CGLS1000	药物		导尿	ABHA0001
院内会诊	AADB0001	抗菌素		导尿管留置	ABHA0002
治疗		麻醉药		氧气吸入	ABJA0001
静脉采血	ABBB0001	血管活性药物		药物	
药物				化痰药	
造影剂				止痛药	
				抗菌素	
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
院际会诊	AADA0001	院际会诊		院际会诊	AADA0001
心脏彩色多普勒超声	EDFKA007	院内会诊		院内会诊	AADB0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血气分析	CEJM1000	治疗		胸部X线摄影	EABJT001
肺活量功能检查	FJE01401			治疗	
糖类抗原CA-199测定	CGRS1000	药物		外周静脉营养输注	ABCG0001
癌胚抗原(CEA)测定	CGRA1000	糖皮质激素		胃管置管术	ABGB0001
治疗				人工辅助通便	ABGG0001
				擦浴降温	ABLA0001
药物				危重病人抢救	ABMA0001
				会阴擦洗	ABZE0001
				吸痰护理	ACBJ0004
				一般尸体料理	AZBA0001
				胰岛素皮下注射	HDE48101
				气管切开护理	ACBJ0001
				气管切开套管更换	ACBJ0002
				药物	
				糖皮质激素	

先天性胆管扩张症（胆总管囊肿）

先天性胆总管囊肿切除肝门空肠Roux-y成形术

适用对象：	病种编码：	JS021			
	主要诊断：	先天性胆管扩张症（胆总管囊肿）	ICD-10码：	Q44.504	
	主要操作/主要治疗方式：	先天性胆总管囊肿切除肝门空肠Roux-y成形术	CCHI码：	HQM73301	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：Q44.504先天性胆管扩张症（胆总管囊肿）疾病编码。 2. 患儿一般情况良好，可耐受手术。 3. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需特殊处理，也不影响第一诊断的临床路径实施时，可以进入路径。 4. 因本病发生胆管穿孔或严重感染等不进入路径。			
	出院标准：	1. 一般情况好，无发热，消化道功能恢复好。 2. 切口愈合良好，引流管拔除后愈合良好，无瘘形成。 3. 无其他需要住院处理的并发症。			
	最短住院日参考值：	10-12天			
	变异条件：	1. 术前合并其他基础疾病影响手术的患者，需要进行相关的诊断和治疗。 2. 为进一步明确诊断，术中须常规抽取胆囊或扩张胆管内胆汁，检测淀粉酶水平、细菌培养加药敏；可行术中胆管造影显示胰胆合流情况和肝内胆管畸形，以利手术具体方式和抗生素的选择。 3. 有并发症（有严重肝功能损害及黄疸、胆管穿孔、急性胰腺炎、胆管出血或恶变等）的先天性胆管扩张症，则转入相应临床路径。			
	再入院间隔时间：	1周			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查	ACAA0001	治疗		检查	
全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000	静脉输血	ABCD0001	全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	胃管置管术	ABGB0001	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEE80000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000
尿常规化学分析	CCAA2000	导尿管留置	ABHA0002	肝胆胰脾B超检查	EDBQT001
粪便常规检查	CCCA3000	氧气吸入	ABJA0001	淀粉酶(AMY)测定	CEDC8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
隐血试验	CCCB8000	静脉注射	ABAD0001	生化常规检查	葡萄糖 (Glu) 测定 CEFA8000和总钙 (Ca) 测定 CEJF8000和无机磷 (P) 测定 CEKA8000和钾 (K) 测定 CEJA8000和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测定 CEJC8000
生化常规检查	葡萄糖 (Glu) 测定 CEFA8000和总钙 (Ca) 测定 CEJF8000和无机磷 (P) 测定 CEKA8000和钾 (K) 测定 CEJA8000和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测定 CEJC8000	静脉输液	ABCA0001	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定 CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定 CEAA8000和白蛋白 (Alb) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000
肝功能检查	CAMA1000	院内遥测心电监护	KKA28701	治疗	
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000和尿酸 (UA) 测定 CEEE8000	监测		换药	换药 (中) ABFA0002或 换药 (大) ABFA0003
淀粉酶 (AMY) 测定	CEDC8000			皮内注射	ABAA0001
血气分析	CEJM1000	麻醉		皮下注射	ABAB0001
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间 (APTT) 测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间 (PT) 测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000	全身麻醉	HAA42901	肌肉注射	ABAC0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000	手术		静脉采血	ABBB0001
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	先天性胆总管囊肿切除肝门空肠Roux-y成形术	HQM73301	引流管护理	ACBK0001
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	病理		静脉注射	ABAD0001
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	冷冻切片病理诊断	BCBA0001	静脉输液	ABCA0001
一般细菌培养+鉴定+药敏	CJAR8000	手术标本病理诊断	BCAD0001	清创(缝合)术(中)	ABEA0002
胸部X线摄影	EABJT001	免疫组织化学染色诊断	BEBA0001	超声雾化吸入	ABKA0001
十二通道常规心电图检查	FKA03703	药物		引流管更换	ABZG0001
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	抗菌素		胃肠减压	ABGA0001
胰胆管系统磁共振水成像(MRCP)	ECAQP001	麻醉药		口腔护理	ACBH0001
院内会诊	AADB0001	血管活性药物		药物	
乙型肝炎表面抗体(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定 CGLK1000或乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000			化痰药	
乙型肝炎e抗原(HBeAg)测定	乙型肝炎e抗原定性(HBeAg)测定 CGLM1000或乙型肝炎e抗原定量(HBeAg)测定CGLN1000			止痛药	
乙型肝炎e抗体(HBeAb)测定	CGLP1000			抗菌素	
乙型肝炎核心抗体(抗HBc)测定	CGLS1000				
治疗					
静脉采血	ABBB0001				
静脉注射	ABAD0001				
药物					
造影剂					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目:					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
检查		检查		检查	
院际会诊	AADA0001	院际会诊	AADA0001	院际会诊	AADA0001
心脏彩色多普勒超声	EDFKA007	院内会诊	AADB0001	院内会诊	AADB0001
糖类抗原CA-199测定	CGRS1000	治疗		胸部X线摄影	EABJT001
癌胚抗原(CEA)测定	CGRA1000			治疗	
经电子内镜逆行胰胆管造影术(ERCP)	EACQP002	药物		外周静脉营养输注	ABCG0001
治疗		糖皮质激素		胃管置管术	ABGB0001
				清洁灌肠	ABGE0004
药物				人工辅助通便	ABGG0001
				导尿	ABHA0001
				导尿管留置	ABHA0002
				氧气吸入	ABJA0001
				擦浴降温	ABLA0001
				危重病人抢救	ABMA0001
				会阴擦洗	ABZE0001
				吸痰护理	ACBJ0004
				气管切开护理	ACBJ0001
				气管切开套管更换	ACBJ0002
				药物	
				糖皮质激素	

腹股沟疝

无张力腹股沟疝修补术

适用对象：	病种编码：	JS022		
	主要诊断：	腹股沟疝	ICD-10码：K40. 0-K40. 4, K40. 9	
	主要操作/主要治疗方式：	无张力腹股沟疝修补术	CCHI码：HQS83302	
	入院标准：	1. 第一诊断符合ICD10：K40. 0-K40. 4, K40. 9疾病编码。 2. 年龄≤70岁，无严重合并疾病，重要脏器功能无明显异常。 3. 需要进行手术治疗。 4. 当患者同时具有其他疾病诊断时，但在住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。 5. 对腹股沟疝和股疝伴嵌顿等病情复杂的病例，不进入路径。		
	出院标准：	1. 生命体征稳定，一般情况良好。 2. 无严重并发症。		
	最短住院日参考值：	1天		
	变异条件：	1. 因患者术后出现严重并发症而延期出院。 2. 术前检查结果明显异常不适宜日间手术者。		
	再入院间隔时间：	2周		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II 级护理	ACAB0001	I 级护理	ACAC0001	II 级护理	ACAB0001
检查	ACAA0001	检查		检查	
全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000			腹股沟淋巴结彩色多普勒超声检查	EDCNK001
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	静脉输液	ABCA0001	生化常规检查	葡萄糖(Glu)测定CEFA8000和总钙(Ca)测定CEJF8000和无机磷(P)测定CEKA8000和钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
生化常规检查	葡萄糖(Glu)测定 CEFA8000和总钙(Ca)测定 CEJF8000和无机磷(P)测定 CEKA8000和钾(K)测定 CEJA8000和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000	院内遥测心电监护	KKA28701	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定 CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定 CECC8000和总蛋白(TP)测定 CEAA8000和白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定 CECD8000
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	监测		肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr)测定 CEEB8000和尿酸(UA)测定 CEEE8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定 CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定 CECC8000和总蛋白(TP)测定 CEAA8000和白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定 CECD8000			治疗	
肾脏功能检查	CAMA1000	麻醉			
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000	局部静脉内麻醉	HAB42201	药物	
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000	全身麻醉	HAA42901		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	硬膜外阻滞麻醉	骶管单次阻滞麻醉 HAC42104或颈部硬膜外单次阻滞麻醉 HAC42105或颈部硬膜外连续阻滞麻醉 HAC42106或胸部硬膜外单次阻滞麻醉 HAC42107或胸部硬膜外连续阻滞麻醉 HAC42108或腰部硬膜外单次阻滞麻醉 HAC42109或腰部硬膜外连续阻滞麻醉 HAC42110或骶管连续阻滞麻醉HAC42111		
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	手术			
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	无张力腹股沟疝修补术	HQS83302		
院内会诊	AADB0001	病理			
胸部X线摄影	EABJT001	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感染标本冷冻切片病理诊断BCBB0001		
十二通道常规心电图检查	FKA03703	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001		
腹股沟淋巴结彩色多普勒超声检查	EDCNK001	药物			
治疗		局麻药			
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001			下腹部X线计算机体层(CT)平扫	EBAQT002
下腹部X线计算机体层(CT)平扫	EBAQT002	治疗		盆腔X线计算机体层(CT)平扫	EBAQU001
盆腔X线计算机体层(CT)平扫	EBAQU001			治疗	
治疗		药物			
		预防性抗生素		药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
药物		麻醉常规用药		预防性抗生素	
		补充血容量药物		止血药	
		止血药		化痰药	
		血管活性药物		营养药物	
				促胃肠动力药	

血栓性外痔

血栓性外痔切除术

适用对象：	病种编码：	JS023	
主要诊断：	血栓性外痔	ICD-10码：I84.3	
主要操作/主要治疗方式：	血栓性外痔切除术	CCHI码：PBEA0101	
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：I84.3血栓性外痔疾病编码。 2. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 患者一般情况良好，正常饮食，排便顺畅，无明显排便时肛门疼痛，各项实验室检查结果正常，体温正常。 2. 肛门部创面无异常分泌物，引流通畅，无明显水肿、出血。		
最短住院日参考值：	3天		
变异条件：	1. 手术后出现继发切口感染或持续性大出血等并发症时，导致住院时间延长与费用增加。 2. 伴发其他基础疾病需要进一步明确诊断，导致住院时间延长与费用增加。		
再入院间隔时间：	14天		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	II级护理	ACAB0001	II级护理	ACAB0001
检查	ACAA0001	检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000				
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		治疗	
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000			坐浴	ABZD0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000或肌酐(Cr) 测定CEEB8000或尿酸 (UA)测定CEEE8000	麻醉		换药(大)	ABFA0003
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	局部静脉内麻醉	HAB42201	氧气吸入	ABJA0001
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	/腰麻复合连续硬膜 外阻滞麻醉	HAC42103	院内遥测心电图监护	KKA28701
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	CAMA1000	/腰部硬膜外连续阻 滞麻醉	HAC42110	监测	
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	手术		无创心电图监测	FKA05705
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	血栓性外痔切除术	PBEA0101	病理	
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000	药物		手术标本病理诊断	BCAD0001
胸部X线摄影	EABJT001	抗菌药物		药物	
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703				
治疗					
一般灌肠	ABGE0001				
药物					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
纤维结肠镜检查	FPS01603				
电子乙状结肠镜检查	FPT01602	治疗		治疗	
直肠镜检查	FPU01601				
治疗		药物		药物	

小肠间质瘤

肠切除肠吻合术

适用对象：	病种编码：	JS024	
	主要诊断：	小肠间质瘤	ICD-10码：D37.2+M8590/1,C17.0-C17.3+M8590/1,C17.8-C17.9+M8590/1
	主要操作/主要治疗方式：	肠切除肠吻合术	CCHI码：HPH73301
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：D37.2+M8590/1,C17.0-C17.3+M8590/1,C17.8-C17.9+M8590/1小肠间质瘤疾病编码。 2. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 生命体征平稳。 2. 伤口无感染、引流管拔除。 3. 无发热、血白细胞正常。 4. 饮食恢复，无需静脉补液。 5. 不需要住院处理的其它并发症或合并症。		
最短住院日参考值：	11-18天		
变异条件：	1. 对手术产生影响的合并症及并发症，如肠梗阻、腹腔感染等，需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术前危险度评估不准确者，术中可根据探查结果改变术式。 3. 术中必要时可留置空肠营养管。 4. 术后出现严重并发症及合并症者，则转入相应临床路径。		
再入院间隔时间：			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
Ⅱ级护理	ACAB0001	Ⅰ级护理	ACAC0001	Ⅰ级护理	ACAC0001
Ⅲ级护理	ACAA0001	Ⅱ级护理	ACAB0001	检查	
检查		检查		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			治疗	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000			药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
粪便常规检查	CCCA3000	麻醉		抗菌药物	
隐血试验	CCCB8000	支气管内麻醉	HAA42401	病理	
凝血功能测定	CAMA1000	/全身麻醉	HAA42901	免疫组织化学染色诊断	BEBA0001
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil)测定 CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)测定 CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和白蛋白 (A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP)测定 CECD8000	胸部硬膜外连续阻滞麻醉	HAC42108		
肾脏功能检查	尿素 (Urea)测定 CEEA8000和肌酐 (Cr)测定 CEEB8000和尿酸 (UA)测定 CEEE8000	手术			
电解质测定	钾 (K)测定 CEJA8000和钠 (Na)测定 CEJB8000和氯 (Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2)测定 CEJD1000和总钙 (Ca)测定 CEJF8000	病理			
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性 (HBsAg)测定 CGLG1000和乙型肝炎表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000和乙肝病毒表面抗原确认试验 (HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000和乙型肝炎表面抗体定性 (抗HBs)测定 CGLK1000和乙型肝炎表面抗体定量 (抗HBs)测定 CGLL1000	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001		
丙型肝炎核心抗原测定	CGLY1000	全器官大切片检查与诊断	BCAG0001		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	药物			
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	麻醉常规用药			
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	补充血容量药物			
胸部X线摄影	EABJT001	抗菌药物			
肿瘤标记物测定	癌胚抗原(CEA)测定 CGRA1000和糖类抗原CA-153测定 CGRRI1000和雌二醇(E2)测定 CERHI1000和卵泡刺激素(FSH)测定 CEQE8000				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道常规心电图检查 FKA03702或十二通道常规心电图检查 FKA03703				
上腹部X线计算机体层(CT)平扫	EBAQT001				
下腹部X线计算机体层(CT)平扫	EBAQT002				
盆腔X线计算机体层(CT)平扫	EBAQU001				
上腹部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBQT001				
下腹部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBQT002				
盆腔X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBQU001				
治疗					
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查	ABCD0001	检查	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活 量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403或最大 通气量功能检查 FJE01404			中心静脉压测定	检测仪中心静脉压测 定FKA02203或人工中 心静脉压测定 FKA02202
血气分析	CEJM1000	治疗		肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000
普通二维超声心动图	EDFKA005	静脉输血	ABCD0001	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000
全消化道造影	EACPA002	病理		胸部X线摄影	EABJT001
上腹部磁共振成像	ECAQT001	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感 染标本冷冻切片病理 诊断BCBB0001	上腹部X线计算机体 层(CT)平扫	EBAQT001
下腹部磁共振成像	ECAQT002	药物		下腹部X线计算机体 层(CT)平扫	EBAQT002
盆腔磁共振成像	ECAQU001	止血药		盆腔X线计算机体层 (CT)平扫	EBAQU001
治疗		血管活性药物		上腹部X线计算机体 层(CT)增强扫描	EBBQT001
		化痰药		下腹部X线计算机体 层(CT)增强扫描	EBBQT002
药物		制酸剂		盆腔X线计算机体层 (CT)增强扫描	EBBQU001
止泻药		其他消化系统用药		治疗	
解痉药物				静脉输液	ABCA0001
				药物	
				止痛药物	
				止吐药物	
				制酸剂	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
				止血药	
				化痰药	

慢性胆囊炎或合并胆囊结石

经腹腔镜胆囊切除术

适用对象：	病种编码：	JS125			
	主要诊断：	慢性胆囊炎或合并胆囊结石	ICD-10码：	K80.1, K81.1	
	主要操作/主要治疗方式：	经腹腔镜胆囊切除术	CCHI码：	HQK75501	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：K80.1, K81.1慢性胆囊炎或合并胆囊结石疾病编码。 2. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 一般状况好，体温正常，无明显腹痛。 2. 恢复肛门排气排便，可进半流食，可以自由活动，无明显腹部体征。 3. 实验室检查基本正常。 4. 切口愈合良好：引流管拔除，伤口无感染，无皮下积液（或门诊可处理的少量积液），可门诊拆线。			
	最短住院日：	3天			
	变异条件：	1. 术前合并其他基础疾病影响手术的患者，需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术中发现胆管癌、肝癌，则进入相应路径。 3. 术后出现并发症（胆漏、出血等）的患者，住院时间延长、费用增加。 4. 合并不可逆转的凝血酶原时间异常，住院时间延长、费用增加。			
	再入院间隔时间：				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	II级护理	ACAB0001
/III级护理	ACAA0001			/III级护理	ACAA0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
粪便常规检查	CCCA3000	氧气雾化吸入	ABKB0001	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000
隐血试验	CCCB8000	氧气吸入	ABJA0001	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000和β2微球蛋白(β2-MG)测定CEAS8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	监测		治疗	
肾脏功能检查	CAMA1000	生命体征监测	有创连续动脉血压监测HAN05201或有创血流动力学监测HAN05202或无创血流动力学监测HAN05701或全身麻醉下呼吸功能监测HAN05902	静脉采血	ABBB0001
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	麻醉		换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	全身麻醉	HAA42901	监测	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	/支气管内麻醉	HAA42401	生命体征监测	有创连续动脉血压监测HAN05201或有创血流动力学监测HAN05202或无创血流动力学监测HAN05701或全身麻醉下呼吸功能监测HAN05902
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000或Rh血型c抗原鉴定CAMH1000或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	手术		药物	
乙型肝炎表面抗体(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000或乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	经腹腔镜胆囊切除术	HQK75501	抗菌药物	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	病理			
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	手术标本病理诊断	BCAD0001		
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	活检组织病理诊断	BCAB0001		
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	药物			
胸部X线摄影	EABJT001	抗菌药物			
腹部超声或CT	肝胆胰脾B超检查EDBQT001或上腹部X线计算机体层(CT)平扫EBAQT001或下腹部X线计算机体层(CT)平扫EBAQT002				
上腹部磁共振成像	ECAQT001				
下腹部磁共振成像	ECAQT002				
盆腔磁共振成像	ECAQU001				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
普通细菌药敏定性试验	CJBX9000				
治疗					
导尿管留置	ABHA0002				
胃管置管术	ABGB0001				
药物					
抗菌药物					
造影剂					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
上腹部X线计算机体层(CT)平扫	EBAQT001	葡萄糖(Glu)测定		胸部X光片	胸部X线透视EAAJT001或胸部X线摄影EABJT001
普通二维超声心动图	EDFKA005	人工中心静脉压测定	FKA02202	腹部超声或CT	肝胆胰脾B超检查EDBQT001或上腹部X线计算机体层(CT)平扫EBAQT001或下腹部X线计算机体层(CT)平扫EBAQT002
肿瘤标志物检查	癌胚抗原(CEA)测定 CGRA1000和甲胎蛋白(AFP)测定CGRB8000 和糖类抗原CA-125测定CGRP1000和糖类抗原CA-153测定 CGRR1000和糖类抗原CA-199测定CGRS1000 和神经元特异性烯醇化酶(NSE)测定 CGRH1000和肿瘤坏死因子 α (TNF- α)测定 CGRY1000和糖类抗原CA-724测定CGRV1000	淀粉酶(AMY)测定	CEDC8000	治疗	
血气分析	CEJM1000	凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000		
肺功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404	治疗		药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
治疗		胃肠减压	ABGA0001		
		病理			
药物		冷冻切片病理诊断	BCBA0001		
		药物			
		制酸剂			

肛裂

肛裂切除术

适用对象：	病种编码：	JS026			
	主要诊断：	肛裂		ICD-10码：	K60.0-K60.2
	主要操作/主要治疗方式：	肛裂切除术		CCHI码：	HPV73304
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：K60.0-K60.2肛裂疾病编码。 2. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。 3. 表浅的、经过保守治疗可以治愈或症状严重，需要加行内括约肌切断术的肛裂患者不进入本路径。				
出院标准：	1. 体温正常，无需要住院处理的并发症和/或合并症。 2. 肛门口创面无异常分泌物，引流通畅，无明显水肿、出血。				
最短住院日：	4-7天				
变异条件：	1. 手术后出现继发感染或大出血等并发症时，导致住院时间延长与费用增加。 2. 伴发其他基础疾病需要进一步明确诊断，导致住院时间延长与费用增加。				
再入院间隔时间：					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	II级护理	ACAB0001
检查	ACAA0001				
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查		检查	
尿常规化学分析	CCAA2000			血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
粪便常规检查	CCCA3000	治疗		肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
隐血试验	CCCB8000			肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000和 β 2微球蛋白(β 2- MG)测定CEAS8000
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	麻醉		治疗	
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(Alb)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000	局部静脉内麻醉	HAB42201	针灸	电冷针灸治疗 PBCA2502或电热针灸 治疗PBCA2504
肾脏功能检查	CAMA1000	腰部硬膜外连续阻滞 麻醉	HAC42110	导尿	ABHA0001
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	单次腰麻	HAC42101	坐浴	ABZD0001
乙型肝炎表面抗体 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗体定 性(抗HBs)测定 CGLK1000或乙型肝炎 表面抗体定量(抗 HBs)测定CGLL1000	手术		氦氖(He-Ne)激光照 射治疗	KYR72701
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	肛裂切除术	HPV73304	换药	换药(小)ABFA0001或 换药(中)ABFA0002或 换药(大)ABFA0003或 换药(特大)ABFA0004
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000			药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	病理		局部用药	
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703			镇静药	
胸部X线摄影	EABJT001	药物		软化大便药物	
治疗		抗菌药物			
一般灌肠	ABGE0001				
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
24小时食管胃肠压力测定	FPB02401				
胃-幽门-十二指肠压力测定	FPB02402	治疗		治疗	
纤维结肠镜检查	FPS01603				
普通二维超声心动图	EDFKA005	病理		药物	
肺功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404	冷冻切片病理诊断	BCBA0001	栓剂	
治疗		药物		膏剂	
				洗剂	
药物				抗菌药	
				止痛药	

食管癌

食管癌切除胃代食管胸内吻合术

适用对象：	病种编码	JS027		
	主要诊断：	食管癌	ICD-10码：C15	
	主要操作/主要治疗方式：	食管癌切除胃代食管胸内吻合术	CCHI码：HPC86310	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：C15食管癌疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可进入此路径。		
	出院标准：	1. 进半流食顺利。 2. 切口愈合良好，或门诊可处理的愈合不良切口。 3. 体温正常，胸片提示无明显感染征象。		
	最短住院日参考值：	13天		
	变异条件：	1. 有影响手术的合并症，需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、呼吸功能衰竭、心脏功能衰竭、吻合口瘘等并发症，需要延长治疗时间。		
	再入院间隔时间：	1周		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	特级护理	ACAD0001	特级护理	ACAD0001
检查	ACAA0001	/ I级护理	ACAC0001	/ I级护理	ACAC0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查		/ II级护理	ACAB0001
尿常规化学分析	CCAA2000			检查	
粪便常规检查	CCCA3000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000和乳酸脱氢酶(LD)测定CECW1000和尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000和肌酸激酶(CK)测定CECS1000和肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定CECT1000和甘油三酯(TG)测定CEHB1000和总胆固醇(TC)测定CEHA1000和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定CEHC1000和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定CEHD1000和葡萄糖(Glu)测定CEFA8000和总钙(Ca)测定CEJF8000和无机磷(P)测定CEKA8000和钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定	氧气吸入	ABJA0001	生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000和乳酸脱氢酶(LD)测定CECW1000和尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000和肌酸激酶(CK)测定CECS1000和肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定CECT1000和甘油三酯(TG)测定CEHB1000和总胆固醇(TC)测定CEHA1000和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定CEHC1000和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定CEHD1000和葡萄糖(Glu)测定CEFA8000和总钙(Ca)测定CEJF8000和无机磷(P)测定CEKA8000和钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	胃肠减压	ABGA0001	血气分析	CEJM1000
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	胸腔穿刺置管引流术	HJM45101	胸部X线摄影	EABJT001
乙型肝炎表面抗体(抗HBs)测定	CAMA1000	导尿管留置	ABHA0002	治疗	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	胃管置管术	ABGB0001	换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	雾化吸入	超声雾化吸入ABKA0001或氧气雾化吸入ABKB0001或空气压缩泵雾化吸入ABKC0001或蒸汽雾化吸入ABKD0001或经呼吸机管道雾化吸入ABKE0001	外周静脉营养输注	ABCG0001
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	院内遥测心电监护	KKA28701	病理	
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404	监测		手术标本病理诊断	BCAD0001
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一口气法FJE01405或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406			药物	
气道阻力测定	FJB02401	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902		
血气分析	CEJM1000	麻醉			
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	全身麻醉	HAA42901		
胃镜检查	纤维胃镜检查FPB01601或电子胃镜检查FPB01602或经鼻电子胃镜检查FPB01603	手术			
胸部X线摄影	EABJT001	食管癌切除胃代食管胸内吻合术	HPC86310		
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001	病理			
/胸部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBJT001	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001		
上消化道X线造影	EACPB001	药物			
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	抗菌药物			
上腹部X线计算机体层(CT)平扫	EBAQT001	镇痛药物			
治疗					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
一般灌肠	ABGE0001				
导尿管留置	ABHA0002				
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
普通二维超声心动图	EDFKA005			上消化道X线造影	EACPB001
PET/CT肿瘤局部显像	EEFZX001	治疗			
电子支气管镜检查	FJD01602			治疗	
经纤维支气管镜吸痰	HJD65603	药物			
治疗				药物	
药物					

食管癌

经胸腔镜食管癌切除术

适用对象：	病种编码：	JS028	
	主要诊断：	食管癌	ICD-10码：C15
	主要操作/主要治疗方式：	经胸腔镜食管癌切除术	CCHI码：HPC73503
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：C15食管癌疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可进入此路径。		
出院标准：	1. 进半流食顺利。 2. 切口愈合良好，或门诊可处理的愈合不良切口。 3. 体温正常，胸片提示无明显感染征象。		
最短住院日参考值：	13天		
变异条件：	1. 有影响手术的合并症，需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、呼吸功能衰竭、心脏功能衰竭、吻合口瘘等并发症，需要延长治疗时间。		
再入院间隔时间：	1周		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	特级护理	ACAD0001	特级护理	ACAD0001
检查	ACAA0001	/ I级护理	ACAC0001	/ I级护理	ACAC0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测 CAAA1000或全血细胞计数 +5分类检测CAAB1000	检查		/ II级护理	ACAB0001
尿常规化学分析	CCAA2000			检查	
粪便常规检查	CCCA3000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测 CAAA1000或全血细胞计数 +5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000和乳酸脱氢酶(LD)测定CECW1000和尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000和肌酸激酶(CK)测定CECS1000和肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定CECT1000和甘油三酯(TG)测定CEHB1000和总胆固醇(TC)测定CEHA1000和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定CEHC1000和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定CEHD1000和葡萄糖(Glu)测定CEFA8000和总钙(Ca)测定CEJF8000和无机磷(P)测定CEKA8000和钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000	氧气吸入	ABJA0001	生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000和乳酸脱氢酶(LD)测定CECW1000和尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000和肌酸激酶(CK)测定CECS1000和肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定CECT1000和甘油三酯(TG)测定CEHB1000和总胆固醇(TC)测定CEHA1000和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定CEHC1000和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定CEHD1000和葡萄糖(Glu)测定CEFA8000和总钙(Ca)测定CEJF8000和无机磷(P)测定CEKA8000和钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	胃肠减压	ABGA0001	血气分析	CEJM1000
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	胸腔穿刺置管引流术	HJM45101	胸部X线摄影	EABJT001
乙型肝炎表面抗体(抗HBs)测定	CAMA1000	导尿管留置	ABHA0002	治疗	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	胃管置管术	ABGB0001	换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	雾化吸入	超声雾化吸入ABKA0001或氧气雾化吸入ABKB0001或空气压缩泵雾化吸入ABKC0001或蒸汽雾化吸入ABKD0001或经呼吸机管道雾化吸入ABKE0001	外周静脉营养输注	ABCG0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	院内遥测心电监护	KKA28701	病理	
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401 或用力肺活量功能检查 FJE01402或肺每分通气量 功能检查FJE01403或最大 通气量功能检查FJE01404	监测		手术标本病理诊断	BCAD0001
弥散功能检查	肺弥散功能检查--一口气 法FJE01405或肺弥散功能 检查-重复呼吸法 FJE01406			药物	
气道阻力测定	FJB02401	全身麻醉下呼吸功 能监测	HAN05902		
血气分析	CEJM1000	麻醉			
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道常规心 电图检查FKA03702或十二 通道常规心电图检查 FKA03703	全身麻醉	HAA42901		
胃镜检查	纤维胃镜检查FPB01601或 电子胃镜检查FPB01602或 经鼻电子胃镜检查 FPB01603	手术			
胸部X线摄影	EABJT001	经胸腔镜食管癌切 除术	HPC73503		
胸部X线计算机体层 (CT)平扫	EBAJT001	病理			
/胸部X线计算机体层 (CT)增强扫描	EBBJT001	快速石蜡切片病理 诊断	BCBC0001		
上消化道X线造影	EACPB001	药物			
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	抗菌药物			
上腹部X线计算机体 层(CT)平扫	EBAQT001	镇痛药物			
治疗					
一般灌肠	ABGE0001				
导尿管留置	ABHA0002				
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
普通二维超声心动图	EDFKA005			上消化道X线造影	EACPB001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
PET/CT肿瘤局部显像	EEFZX001	治疗			
电子支气管镜检查	FJD01602			治疗	
治疗		药物			
经纤维支气管镜吸痰	HJD65603			药物	
药物					

贲门失弛缓症

经胸腔镜食管下段贲门肌层切开术

适用对象：	病种编码：	JS029			
	主要诊断：	贲门失弛缓症		ICD-10码：	K22.0
	主要操作/主要治疗方式：	经胸腔镜食管下段贲门肌层切开术		CCHI码：	HPC50501
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：K22.0贲门失弛缓症疾病编码。 2. 有适应证，无手术禁忌证。 3. 当患者同时具有其他疾病诊断，但住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 一般情况良好，体温正常。 2. 血常规、肝肾功能、电解质化验无明显异常。 3. 切口无感染征象或可门诊处理的伤口情况。			
	最短住院日参考值：	10天			
	变异条件：	1. 既往有胸腔或腹腔手术史，可影响手术方式的选择。 2. 因手术后发生消化道痿或其他并发症，导致术后住院时间延长。 3. 因患者伴发其他疾病，导致术前、术后住院时间延长。			
	再入院间隔时间：	14天			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	特级护理	ACAD0001	/ I级护理	ACAC0001
检查	ACAA0001	/ I级护理	ACAC0001	II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查		检查	
尿常规化学分析	CCAA2000			血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	治疗		生化常规检查	葡萄糖(Glu)测定 CEFA8000和总钙(Ca) 测定CEJF8000和无机 磷(P)测定CEKA8000 和钾(K)测定 CEJA8000和钠(Na)测 定CEJB8000和氯(Cl) 测定CEJC8000和镁 (Mg)测定CEJE8000和 总二氧化碳(TCO2)测 定CEJD1000
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000或ABO血 型鉴定(反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定(正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定(反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000	氧气吸入	ABJA0001	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	监测		胸部X线摄影	EABJT001
生化常规检查	葡萄糖(Glu)测定 CEFA8000和总钙(Ca) 测定CEJF8000和无机 磷(P)测定CEKA8000 和钾(K)测定 CEJA8000和钠(Na)测 定CEJB8000和氯(Cl) 测定CEJC8000和镁 (Mg)测定CEJE8000和 总二氧化碳(TCO2)测 定CEJD1000	无创指脉血氧饱和度 监测	FKA05710	上消化道X线造影	EACPB001
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	CAMA1000	心电监测	心电监测远程传输 FKA05704或无创心电 监测FKA05705	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和γ-谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	术中体温监测	HAN05702	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEE8000或肌酐(Cr) 测定CEEB8000或尿酸 (UA)测定CEEE8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	无创血压监测	FKA05709	治疗	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	麻醉		外周静脉营养输注	ABCG0001
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	全身麻醉	HAA42901	监测	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000或肌酐(Cr)测定CEEB8000或尿酸(UA)测定CEEE8000	手术		心电监测	心电监测远程传输FKA05704或无创心电监测FKA05705
胸部X线摄影	EABJT001	经胸腔镜食管下段贲门肌层切开术	HPC50501	药物	
胃肠排空试验-钡餐透视法	EACPA001	药物		抗菌药物	
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401和用力肺活量功能检查FJE01402和肺每分钟通气量功能检查FJE01403和最大通气量功能检查FJE01404和肺弥散功能检查--一口气法FJE01405和流速容量曲线(V-V曲线)测定FJE02401和残气容积测定-体描箱法FJE02402	抗菌药物		镇痛药物	
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	镇痛药物		抑制胃酸药物	
纤维胃镜检查	FPB01601	抑制胃酸药物			
治疗		营养药			
一般灌肠	ABGE0001				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
胃管置管术	ABGB0001				
导尿管留置	ABHA0002				
药物					
生理盐水					
镇静药物					
抗菌药物					
抗胆碱能药物					
硝基咪唑类					
监测					
24小时胃食管pH值监测	FPB05402				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
普通二维超声心动图	EDFKA005				
超声胃镜检查	FPB01604	治疗		治疗	
食管测压	FPC02401	静脉输血	ABCD0001		
治疗		药物		药物	
药物					

胃食管反流病

胃底折叠术

适用对象：	病种编码：	JS030	
	主要诊断：	胃食管反流病	ICD-10码：K21.9
	主要操作/主要治疗方式：	胃底折叠术	CCHI码：HPF83301
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：K21.9贲门失弛缓症疾病编码。 2. 有适应证，无手术禁忌证。 3. 当患者同时具有其他疾病诊断，但住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 一般情况良好，体温正常。 2. 血常规、肝肾功能、电解质化验无明显异常。 3. 切口无感染征象或可门诊处理的伤口情况。		
最短住院日参考值：	10天		
变异条件：	1. 既往有胸腔或腹腔手术史，可影响手术方式的选择。 2. 因手术后发生消化道瘘或其他并发症，导致术后住院时间延长。 3. 因患者伴发其他疾病，导致术前、术后住院时间延长。		
再入院间隔时间：	14天		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	特级护理	ACAD0001	/ I级护理	ACAC0001
检查	ACAA0001	/ I级护理	ACAC0001	II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查		检查	
尿常规化学分析	CCAA2000			血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	治疗		生化常规检查	葡萄糖(Glu)测定 CEFA8000和总钙(Ca) 测定CEJF8000和无机 磷(P)测定CEKA8000 和钾(K)测定 CEJA8000和钠(Na)测 定CEJB8000和氯(Cl) 测定CEJC8000和镁 (Mg)测定CEJE8000和 总二氧化碳(TCO2)测 定CEJD1000
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000或ABO血 型鉴定(反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定(正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定(反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000	氧气吸入	ABJA0001	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	监测		胸部X线摄影	EABJT001
生化常规检查	葡萄糖(Glu)测定 CEFA8000和总钙(Ca) 测定CEJF8000和无机 磷(P)测定CEKA8000 和钾(K)测定 CEJA8000和钠(Na)测 定CEJB8000和氯(Cl) 测定CEJC8000和镁 (Mg)测定CEJE8000和 总二氧化碳(TCO2)测 定CEJD1000	无创指脉血氧饱和度 监测	FKA05710	上消化道X线造影	EACPB001
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	CAMA1000	心电监测	心电监测远程传输 FKA05704或无创心电 监测FKA05705	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和γ-谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(Alb)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	无创血压监测	FKA05709	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEE8000或肌酐(Cr) 测定CEEB8000或尿酸 (UA)测定EEEE8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	术中体温监测	HAN05702	治疗	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	麻醉		外周静脉营养输注	ABCG0001
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	全身麻醉	HAA42901	监测	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000或肌酐(Cr)测定CEEB8000或尿酸(UA)测定CEEE8000	手术		心电监测	心电监测远程传输FKA05704或无创心电监测FKA05705
胸部X线摄影	EABJT001	胃底折叠术	HPF83301	药物	
胃肠排空试验-钡餐透视法	EACPA001	药物		抗菌药物	
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401和用力肺活量功能检查FJE01402和肺每分通气量功能检查FJE01403和最大通气量功能检查FJE01404和肺弥散功能检查-一口气法FJE01405和流速容量曲线(V-V曲线)测定FJE02401和残气容积测定-体描箱法FJE02402	抗菌药物		镇痛药物	
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	镇痛药物		抑制胃酸药物	
纤维胃镜检查	FPB01601	抑制胃酸药物			
治疗		营养药			
一般灌肠	ABGE0001				
胃管置管术	ABGB0001				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
导尿管留置	ABHA0002				
药物					
生理盐水					
镇静药物					
抗菌药物					
抗胆碱能药物					
硝基咪唑类					
监测					
24小时胃食管pH值监测	FPB05402				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
普通二维超声心动图	EDFKA005				
超声胃镜检查	FPB01604	治疗		治疗	
食管测压	FPC02401	静脉输血	ABCD0001		
治疗		药物		药物	
药物					

结肠癌

根治性结肠癌切除术

适用对象：	病种编码：	JS031	
	主要诊断：	结肠癌	ICD-10码：C18.0-C18.9
	主要操作/主要治疗方式：	根治性结肠癌切除术	CCHI码：HPS77301
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：C18.0-C18.9结肠癌疾病编码； 2. 术前评估肿瘤切除困难者可先行新辅助治疗后再次评估，符合手术条件者可以进入路径； 3. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 引流管拔除，伤口无感染（或门诊可以处理）； 2. 没有需要住院处理的并发症。		
最短住院日参考值：	14天		
变异条件：	1. 围手术期的合并症和/或并发症，需要进行相关的诊断和治疗，导致住院时间延长、费用增加； 2. 结肠癌根治术中，结肠的切除范围根据肿瘤部位、大小、浸润程度等决定，可分为右半结肠切除、横结肠切除、左半结肠切除、乙状结肠切除、全结肠切除、联合脏器切除术等。		
再入院间隔时间：	1周		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查	ACAA0001	检查		/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			/III级护理	ACAA0001
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		检查	
粪便常规检查	CCCA3000	导尿管留置	ABHA0002	肿瘤标记物测定	癌胚抗原(CEA)测定CGRA1000和糖类抗原CA-125测定CGRP1000和糖类抗原CA-199测定CGRS1000和糖类抗原CA-242测定CGRT1000和糖类抗原CA-724测定CGRV1000
隐血试验	CCCB8000			一般细菌培养+鉴定+药敏	CJAR8000
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEE8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	胃肠减压	ABGA0001	治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	氧气吸入	ABJA0001		
电解质测定	CAMA1000	胃管置管术	ABGB0001	病理	
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	麻醉		免疫组织化学染色诊断	BEBA0001
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	全身麻醉	HAA42901		
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	/腰部硬膜外连续阻滞麻醉	HAC42110	药物	
血脂检查	甘油三酯(TG)测定CEHB1000和总胆固醇(TC)测定CEHA1000和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定CEHC1000和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定CEHD1000	手术		抗菌药物	
肿瘤标记物测定	癌胚抗原(CEA)测定CGRA1000和糖类抗原CA-125测定CGRP1000和糖类抗原CA-199测定CGRS1000和糖类抗原CA-242测定CGRT1000和糖类抗原CA-724测定CGRV1000	根治性结肠癌切除术	HPS77301	静脉补液	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000	病理			
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	手术标本病理诊断	BCAD0001		
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	药物			
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	抗菌药物			
胸部X线摄影	EABJT001	静脉补液			
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703				
上腹部X线计算机体层(CT)平扫	EBAQT001				
下腹部X线计算机体层(CT)平扫	EBAQT002				
盆腔X线计算机体层(CT)平扫	EBAQU001				
结肠X线造影	EACPS001				
结肠镜检查	电子结肠镜检查FPS01601或超声结肠镜检查FPS01602或纤维结肠镜检查FPS01603				
病理					
活检组织病理诊断	BCAB0001				
治疗					
一般灌肠	ABGE0001				
导尿管留置	ABHA0002				
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目:					
检查		检查		检查	
上消化道X线造影	EACPB001			胸部X线摄影	EABJT001
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分钟通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404	病理		上腹部X线计算机体层(CT)平扫	EBAQT001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
普通二维超声心动图	EDFKA005	冷冻切片病理诊断	BCBA0001	下腹部X线计算机体层(CT)平扫	EBAQT002
治疗		治疗		盆腔X线计算机体层(CT)平扫	EBAQU001
				血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
药物		药物		肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
				肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000
				电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和总钙(Ca)测定CEJF8000
				葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000
				肝胆胰脾B超检查	EDBQT001
				治疗	
				病理	
				药物	
				镇痛药	
				止痛药物	
				抗血栓药物	

结肠癌

扩大根治性结肠癌切除术

适用对象：	病种编码：	JS032	
	主要诊断：	结肠癌	ICD-10码：C18.0-C18.9
	主要操作/主要治疗方式：	扩大根治性结肠癌切除术	CCHI码：HPS77302
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：C18.0-C18.9结肠癌疾病编码。 2. 术前评估肿瘤切除困难者可先行新辅助治疗后再次评估，符合手术条件者可以进入路径。 3. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 引流管拔除，伤口无感染（或门诊可以处理）； 2. 没有需要住院处理的并发症。		
最短住院日参考值：	14天		
变异条件：	1. 围手术期的合并症和/或并发症，需要进行相关的诊断和治疗，导致住院时间延长、费用增加。 2. 结肠癌根治术中，结肠的切除范围根据肿瘤部位、大小、浸润程度等决定，可分为全结肠切除、联合脏器切除术等。		
再入院间隔时间：	1周		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查	ACAA0001	检查		/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			/III级护理	ACAA0001
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		检查	
粪便常规检查	CCCA3000	导尿管留置	ABHA0002	肿瘤标记物测定	癌胚抗原(CEA)测定CGRA1000和糖类抗原CA-125测定CGRP1000和糖类抗原CA-199测定CGRS1000和糖类抗原CA-242测定CGRT1000和糖类抗原CA-724测定CGRV1000
隐血试验	CCCB8000	胃肠减压	ABGA0001	一般细菌培养+鉴定+药敏	CJAR8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和 白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000	氧气吸入	ABJA0001	治疗	
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000	胃管置管术	ABGB0001		
电解质测定	CAMA1000	麻醉		病理	
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000	全身麻醉	HAA42901	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感染标本冷冻切片病理 诊断 BCBB0001或快速石蜡切片病理诊断 BCBC0001
血型鉴定	ABO血型鉴定 (正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定 (反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定 (正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定 (反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	/腰部硬膜外连续阻滞麻醉	HAC42110	免疫组化	免疫组织化学染色诊断 BEBA0001
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间 (APTT) 测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间 (PT) 测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000	手术		药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血脂检查	甘油三酯(TG)测定 CEHB1000和总胆固醇 (TC)测定CEHA1000和 高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)测定 CEHC1000和低密度脂 蛋白胆固醇(LDL-C) 测定CEHD1000	扩大根治性结肠癌切 除术	HPS77302	抗菌药物	
肿瘤标记物测定	癌胚抗原(CEA)测定 CGRA1000和糖类抗原 CA-125测定CGRP1000 和糖类抗原CA-199测 定CGRS1000和糖类抗 原CA-242测定 CGRT1000和糖类抗原 CA-724测定CGRV1000	病理		静脉补液	
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	手术标本病理诊断	BCAD0001		
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	药物			
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	抗菌药物			
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000	静脉补液			
胸部X线摄影	EABJT001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703				
上腹部X线计算机体 层(CT)平扫	EBAQT001				
下腹部X线计算机体 层(CT)平扫	EBAQT002				
盆腔X线计算机体层 (CT)平扫	EBAQU001				
结肠X线造影	EACPS001				
结肠镜检查	电子结肠镜检查 FPS01601或超声结肠 镜检查FPS01602或纤 维结肠镜检查 FPS01603				
病理					
活检组织病理诊断	BCAB0001				
治疗					
一般灌肠	ABGE0001				
导尿管留置	ABHA0002				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
上消化道X线造影	EACPB001				
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活 量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403或最大 通气量功能检查 FJE01404	病理		胸部X线摄影	EABJT001
气道阻力测定	FJB02401	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感 染标本冷冻切片病理 诊断BCBB0001	上腹部X线计算机体 层(CT)平扫	EBAQT001
普通二维超声心动图	EDFKA005	治疗		下腹部X线计算机体 层(CT)平扫	EBAQT002
治疗				盆腔X线计算机体层 (CT)平扫	EBAQU001
		药物		血常规	全血细胞计数+3分群 检测CAAA1000或全血 细胞计数+5分类检测 CAAB1000
药物				肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000
				肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000
				电解质测定	钾(K)测定 CEJA8000和钠(Na) 测定CEJB8000和氯 (Cl)测定CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2)测定 CEJD1000和总钙 (Ca)测定CEJF8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
				葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000
				肝胆胰脾B超检查	EDBQT001
				治疗	
				病理	
				药物	
				镇痛药	
				止痛药物	
				抗血栓药物	

结肠癌

经腹腔镜结肠癌根治术

适用对象：	病种编码：	JS033	
	主要诊断：	结肠癌	ICD-10码：C18.0-C18.9
	主要操作/主要治疗方式：	经腹腔镜结肠癌根治术	CCHI码：HPS77501
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：C18.0-C18.9结肠癌疾病编码； 2. 术前评估肿瘤切除困难者可先行新辅助治疗后再次评估，符合手术条件者可以进入路径； 3. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 引流管拔除，伤口无感染（或门诊可以处理）； 2. 没有需要住院处理的并发症。		
最短住院日参考值：	14天		
变异条件：	1. 围手术期的合并症和/或并发症，需要进行相关的诊断和治疗，导致住院时间延长、费用增加； 2. 结肠癌根治术中，结肠的切除范围根据肿瘤部位、大小、浸润程度等决定，可分为右半结肠切除、横结肠切除、左半结肠切除、乙状结肠切除、全结肠切除、联合脏器切除术等。		
再入院间隔时间：	1周		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查	ACAA0001	检查		/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			/III级护理	ACAA0001
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		检查	
粪便常规检查	CCCA3000	导尿管留置	ABHA0002	肿瘤标记物测定	癌胚抗原(CEA)测定 CGRA1000和糖类抗原CA-125测定 CGRP1000和糖类抗原CA-199测定 CGRS1000和糖类抗原CA-242测定 CGRT1000和糖类抗原CA-724测定 CGRV1000
隐血试验	CCCB8000	胃肠减压	ABGA0001	一般细菌培养+鉴定+药敏	CJAR8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	氧气吸入	ABJA0001	治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEE8000和肌酐 (Cr) 测定CEE8000和尿酸 (UA) 测定CEE8000	胃管置管术	ABGB0001		
电解质测定	CAMA1000	麻醉		病理	
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000	全身麻醉	HAA42901	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感 染标本冷冻切片病理 诊断 BCBB0001或快 速石蜡切片病理诊断 BCBC0001
血型鉴定	ABO血型鉴定 (正定 型)CAMA1000或ABO血 型鉴定 (反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定 (正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定 (反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000	/腰部硬膜外连续阻 滞麻醉	HAC42110	免疫组织化学染色诊 断	BEBA0001
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间 (APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间 (PT) 测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	手术		药物	
血脂检查	甘油三酯 (TG) 测定 CEHB1000和总胆固醇 (TC) 测定CEHA1000和 高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C) 测定 CEHC1000和低密度脂 蛋白胆固醇 (LDL-C) 测定CEHD1000	经腹腔镜结肠癌根治 术	HPS77501	抗菌药物	
肿瘤标记物测定	癌胚抗原 (CEA) 测定 CGRA1000和糖类抗原 CA-125测定CGRP1000 和糖类抗原CA-199测 定CGRS1000和糖类抗 原CA-242测定 CGRT1000和糖类抗原 CA-724测定CGRV1000	病理		静脉补液	
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs) 测定	乙型肝炎表面抗原定 性 (HBsAg) 测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg) 测定 CGLH1000	手术标本病理诊断	BCAD0001		
丙型肝炎抗体 (抗 HCV) 测定	CGMA1000	药物			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	抗菌药物			
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	静脉补液			
胸部X线摄影	EABJT001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703				
上腹部X线计算机体层(CT)平扫	EBAQT001				
下腹部X线计算机体层(CT)平扫	EBAQT002				
盆腔X线计算机体层(CT)平扫	EBAQU001				
结肠X线造影	EACPS001				
结肠镜检查	电子结肠镜检查FPS01601或超声结肠镜检查FPS01602或纤维结肠镜检查FPS01603				
病理					
活检组织病理诊断	BCAB0001				
治疗					
一般灌肠	ABGE0001				
导尿管留置	ABHA0002				
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404			胸部X线摄影	EABJT001
气道阻力测定	FJB02401	病理		上腹部X线计算机体层(CT)平扫	EBAQT001
普通二维超声心动图	EDFKA005	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断BCBA0001或特异性感染标本冷冻切片病理诊断BCBB0001	下腹部X线计算机体层(CT)平扫	EBAQT002
PET/CT肿瘤显像	PET/CT肿瘤局部显像EEFZX001或PET/CT肿瘤全身显像EEFZY001	治疗		盆腔X线计算机体层(CT)平扫	EBAQU001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
上消化道X线造影	EACPB001				
治疗				血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
		药物		肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
药物				肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000
				电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和总钙(Ca)测定CEJF8000
				葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000
				肝胆胰脾B超检查	EDBQT001
				治疗	
				病理	
				药物	
				镇痛药	
				止痛药物	

食管平滑肌瘤

食管良性肿物切除术

适用对象：	病种编码：	JS034	
	主要诊断：	食管平滑肌瘤	ICD-10码：D13.0+M8890/0
	主要操作/主要治疗方式：	食管良性肿物切除术	CCHI码：HPC73303
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：D13.0+M8890/0食管平滑肌瘤疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在门诊治疗期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。	
	出院标准：	1. 恢复饮食。 2. 切口愈合良好，或门诊可处理的愈合不良切口。 3. 体温正常。 4. 胸片呈正常术后改变，无明显异常。 5. 没有需要住院处理的其他并发症或合并症。	
	最短住院日参考值：	8天	
	变异条件：	1. 存在影响手术的合并症，术前需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、呼吸功能衰竭、心脏功能衰竭、食管胸膜瘘、胃肠功能障碍等并发症，需要延长治疗时间。	
	再入院间隔时间：	2周	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	特级护理	ACAD0001	特级护理	ACAD0001
检查	ACAA0001	/ I级护理	ACAC0001	/ I级护理	ACAC0001
全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000	检查		/ II级护理	ACAB0001
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	生理盐水介质交叉配血	CAMW1000	检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000
粪便常规检查	CCCA3000	静脉输液	ABCA0001	生化常规检查	葡萄糖(Glu)测定CEFA8000和总钙(Ca)测定CEJF8000和无机磷(P)测定CEKA8000和钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
隐血试验	CCCB8000	麻醉		肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
生化常规检查	葡萄糖(Glu)测定CEFA8000和总钙(Ca)测定CEJF8000和无机磷(P)测定CEKA8000和钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000	全身麻醉	HAA42901	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000
肝功能检查	CAMA1000	/支气管内麻醉	HAA42401	胸部X线摄影	EABJT001
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	手术		食管X线造影	EACPC001
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	食管良性肿物切除术	HPC73303	治疗	
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	病理		换药	换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感染标本冷冻切片病理诊断BCBB0001	静脉输液	ABCA0001
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	手术标本病理诊断	BCAD0001	药物	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	药物			
胸部X线摄影	EABJT001				
十二通道常规心电图检查	FKA03703				
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404				
超声胃镜检查	FPB01604				
纤维胃镜检查	FPB01601				
肝胆胰脾彩色多普勒超声检查	EDCQT001				
食管X线造影	EACPC001				
胸部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBJT001				
院内会诊	AADB0001				
治疗					
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
血气分析	CEJM1000	超声胃镜检查	FPB01604		
肿瘤标志物检查	癌胚抗原(CEA)测定 CGRA1000和糖类抗原CA-125测定CGRP1000 和糖类抗原CA-199测定CGRS1000和肿瘤坏死因子 α (TNF- α)测定CGRY1000	纤维胃镜检查		治疗	
心脏彩色多普勒超声	EDFKA007	治疗			
胸部磁共振增强成像	ECBJT001			药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
治疗		药物			
药物					

胰腺癌

胰十二指肠切除术(Whipple手术)

适用对象：	病种编码：	JS035			
	主要诊断：	胰腺癌		ICD-10码：	C25. 0–C25. 4, C25. 7–C25. 9
	主要操作/主要治疗方式：	胰十二指肠切除术(Whipple手术)		CCHI码：	HQN73311
入院标准：	1. 第一诊断必须符合胰腺癌（ICD-10：C25. 0–C25. 4, C25. 7–C25. 9）疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施不影响术后康复时，可以进入路径。				
出院标准：	1. 伤口愈合好。 2. 没有需要住院处理的并发症。				
最短住院日参考值：	21天				
变异条件：	1. 有影响手术的合并症，需要进行相关的诊断和治疗。 2. 不能耐受规范根治性手术的患者，酌情适当缩小手术范围。 3. 肿瘤侵犯血管不能行根治性切除的患者。 4. 患者一般情况差，肝功能差，需要术前行ERCP或PTCD减黄的患者。 5. 医生认为的变异原因。 6. 患者其他原因的变异。				
再入院间隔时间：	2周				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II 级护理	ACAB0001	I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001
检查	ACAA0001	检查		/ II 级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血气分析	CEJM1000	检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
粪便常规检查	CCCA3000	氧气吸入	ABJA0001	肝功能检查（禁食期间，每日一次）	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	导尿管留置	ABHA0002	肾脏功能检查（禁食期间，每日一次）	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	胃管置管术	ABGB0001	电解质测定（禁食期间，每日一次）	钾（K）测定CEJA8000和钠（Na）测定CEJB8000和氯（Cl）测定CEJC8000和总二氧化碳（TCO2）测定CEJD1000和总钙（Ca）测定CEJF8000
电解质测定	钾（K）测定CEJA8000和钠（Na）测定CEJB8000和氯（Cl）测定CEJC8000和总二氧化碳（TCO2）测定CEJD1000和总钙（Ca）测定CEJF8000	经外周静脉置入中心静脉导管术	ABDA0001	一般细菌培养+鉴定+药敏	CJAR8000
葡萄糖(Glu)测定	CAMA1000	静脉输液	ABCA0001	葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	监测		胸部X线摄影	EABJT001
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	院内遥测心电监护	KKA28701	离子钙(Ca ²⁺)测定（禁食期间，每日一次）	CEJG1000
离子钙(Ca ²⁺)测定	CEJG1000	麻醉		淀粉酶(AMY)测定（禁食期间，每日一次）	CEDC8000
无机磷(P)测定	CEKA8000	全身麻醉	HAA42901	无机磷(P)测定（禁食期间，每日一次）	CEKA8000
甲胎蛋白(AFP)测定	CGRB8000	手术		肝胆胰脾B超检查	EDBQT001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
癌胚抗原(CEA)测定	CGRA1000	胰十二指肠肠切除术 (Whipple手术)	HQN73311	上腹部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBQT001
糖类抗原CA-199测定	CGRS1000	病理		血气分析	CEJM1000
糖类抗原CA-125测定	CGRP1000			治疗	
糖类抗原CA-242测定	CGRT1000	药物		换药	换药(小)ABFA0001或 换药(中)ABFA0002或 换药(大)ABFA0003或 换药(特大)ABFA0004
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000	抗菌药物		静脉输液	ABCA0001
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000或 Rh血型c 抗原鉴定CAMH1000或 Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000或Rh血型e 抗原鉴定CAMK1000或 Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000	悬浮红细胞		监测	
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性 (HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	新鲜冰冻血浆		院内遥测心电监护	KKA28701
乙型肝炎核心抗原 (HBcAg)测定	乙型肝炎核心抗原 (HBcAg)测定 CGLQ6000或乙型肝炎 核心抗原定量 (HBcAg)测定 CGLR6000	代血浆胶体液		病理	
乙型肝炎核心抗体 (抗HBc)测定	CGLS1000			特异性感染标本冷冻 切片病理诊断	BCBB0001
乙型肝炎e抗原 (HBeAg)测定	乙型肝炎e抗原定性 (HBeAg)测定 CGLM1000或乙型肝炎 e抗原定量(HBeAg)测定 CGLN1000			快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001
乙型肝炎e抗体 (HBeAb)测定	CGLP1000			药物	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000			抗菌药物	
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000			其他消化系统用药	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000			质子泵抑制剂	
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001			静脉营养	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
上腹部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBQT001			肠内营养	
胸部X线摄影	EABJT001			止痛药物	
普通二维超声心动图	EDFKA005			止血药物	
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404			抗血栓药物	
胰胆管系统磁共振水成像(MRCP)	ECAQP001				
上消化道X线造影	EACPB001				
上腹部磁共振增强成像	ECBQT001				
下腹部磁共振增强成像	ECBQT002				
普通病理会诊	疑难病理读片会诊 AADC0001或同步远程病理会诊AADD0001或非同步远程病理会诊AADD0002				
治疗					
胃管置管术	ABGB0001				
血液净化用中心静脉临时导管置管术	HRZ62301				
导尿管留置	ABHA0002				
病理				监测	
药物					
清脏腑热药					
抗菌药物					
泻药					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
纤维小肠镜检查	FPJ01601				
治疗		治疗		治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
经纤维内镜十二指肠乳头括约肌切开术(EST)	HPK50601				
/经电子内镜十二指肠乳头括约肌切开术(EST)	HPK50602	监测		病理	
经皮经肝胆道支架置入术	HQE62101	有创连续动脉血压监测	HAN05201	免疫组织化学染色诊断	BEBA0001
药物		病理		药物	
肠外营养		冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感染标本冷冻切片病理诊断BCBB0001	悬浮红细胞	
		药物		新鲜冰冻血浆	
				治疗用生物制品	

胰腺癌

胰体尾切除术

适用对象：	病种编码：	JS036			
	主要诊断：	胰腺癌	ICD-10码：	C25. 0- C25. 4, C25. 7-C25. 9	
	主要操作/主要治疗方式：	胰体尾切除术	CCHI码：	HQN73305	
入院标准：	1. 第一诊断必须符合胰腺癌（ICD-10：C25. 0-C25. 4, C25. 7-C25. 9）疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施不影响术后康复时，可以进入路径。				
出院标准：	1. 伤口愈合好。 2. 没有需要住院处理的并发症。				
最短住院日参考值：	21天				
变异条件：	1. 有影响手术的合并症，需要进行相关的诊断和治疗。 2. 不能耐受规范根治性手术的患者，酌情适当缩小手术范围。 3. 肿瘤侵犯血管不能行根治性切除的患者。 4. 患者需要根据术中情况决定是否保留脾脏。 5. 医生认为的变异原因。 6. 患者其他原因的变异。				
再入院间隔时间：	2周				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II 级护理	ACAB0001	I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001
检查	ACAA0001	检查		/ II 级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血气分析	CEJM1000	检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		院内遥测心电监护	KKA28701
粪便常规检查	CCCA3000	氧气吸入	ABJA0001	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	导尿管留置	ABHA0002	肝功能检查(禁食期间, 每日一次)	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	胃管置管术	ABGB0001	肾脏功能检查(禁食期间, 每日一次)	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和总钙(Ca)测定CEJF8000	经外周静脉置入中心静脉导管术	ABDA0001	电解质测定(禁食期间, 每日一次)	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和总钙(Ca)测定CEJF8000
葡萄糖(Glu)测定	CAMA1000	院内遥测心电监护	KKA28701	一般细菌培养+鉴定+药敏	CJAR8000
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	静脉输液	ABCA0001	葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	麻醉		胸部X线摄影	EABJT001
离子钙(Ca2+)测定	CEJG1000	全身麻醉	HAA42901	离子钙(Ca2+)测定(禁食期间, 每日一次)	CEJG1000
无机磷(P)测定	CEKA8000	手术		淀粉酶(AMY)测定(禁食期间, 每日一次)	CEDC8000
甲胎蛋白(AFP)测定	CGRB8000	胰体尾切除术	HQN73305	无机磷(P)测定(禁食期间, 每日一次)	CEKA8000
癌胚抗原(CEA)测定	CGRA1000	病理		肝胆胰脾B超检查	EDBQT001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
				上腹部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBQT001
糖类抗原CA-199测定	CGRS1000	药物		血气分析	CEJM1000
糖类抗原CA-125测定	CGRP1000	抗菌药物		治疗	
糖类抗原CA-242测定	CGRT1000	悬浮红细胞		换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000或Rh血型c抗原鉴定CAMH1000或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000			静脉输液	ABCA0001
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000	新鲜冰冻血浆		病理	
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	代血浆胶体液		特异性感染标本冷冻切片病理诊断	BCBB0001
乙型肝炎核心抗原(HBcAg)测定	乙型肝炎核心抗原(HBcAg)测定CGLQ6000或乙型肝炎核心抗原定量(HBcAg)测定CGLR6000			快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001
乙型肝炎核心抗体(抗HBc)测定	CGLS1000			免疫组织化学染色诊断	BEBA0001
乙型肝炎e抗原(HBeAg)测定	乙型肝炎e抗原定性(HBeAg)测定CGLM1000或乙型肝炎e抗原定量(HBeAg)测定CGLN1000			药物	
乙型肝炎e抗体(HBeAb)测定	CGLP1000			抗菌药物	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000			其他消化系统用药	
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000			静脉营养	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000			肠内营养	
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001			止痛药物	
上腹部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBQT001			止血药物	
胸部X线摄影	EABJT001			抗血栓药物	
普通二维超声心动图	EDFKA005				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活 量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403或最大 通气量功能检查 FJE01404				
胰胆管系统磁共振水 成像(MRCP)	ECAQP001				
上消化道X线造影	EACPB001				
普通病理会诊	疑难病理读片会诊 AADC0001或同步远程 病理会诊AADD0001或 非同步远程病理会诊 AADD0002				
治疗					
胃管置管术	ABGB0001				
血液净化用中心静脉 临时导管置管术	HRZ62301				
导尿管留置	ABHA0002				
病理					
药物				监测	
抗菌药物					
泻药					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目:					
检查		检查		检查	
		有创连续动脉血压监 测	HAN05201		
治疗		治疗		治疗	
药物		病理		病理	
清脏腑热药		冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感 染标本冷冻切片病理 诊断BCBB0001		
肠外营养		药物		药物	
				悬浮红细胞	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
				新鲜冰冻血浆	
				治疗用生物制品	

直肠癌

超低位直肠癌根治术

适用对象：	病种编码：	JS037	
	主要诊断：	直肠癌	ICD-10：C20
	主要操作/主要治疗方式：	超低位直肠癌根治术	CCHI码：HPU77302
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：C20直肠癌疾病编码。 2. 可R0切除的中高位直肠癌（Ⅰ期、部分Ⅱ和Ⅲ期）。 3. 有手术适应证，无绝对禁忌证。 4. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。	
	出院标准：	1. 病人一般情况良好，基本恢复正常饮食和肠道功能。 2. 体温正常，腹部检查无阳性体征，相关实验室检查结果基本正常。 3. 腹部切口Ⅱ/甲愈合。	
	最短住院日参考值：	14-16天	
	变异条件：	1. 有影响手术的合并症，需要进行相关的诊断和治疗。 2. 对于完全肠梗阻患者，可一期行乙状结肠双腔造口术，缓解梗阻症状后可行新辅助治疗。 3. 围手术期并发症可能造成住院日延长或费用超出参考标准。 4. 医生认为的变异原因。 5. 患者其他原因的变异。	
	再入院间隔时间：		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
Ⅱ级护理	ACAB0001	Ⅰ级护理	ACAC0001	Ⅱ级护理	ACAB0001
检查	ACAA0001	检查		Ⅲ级护理	ACAA0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		检查	
粪便常规检查	CCCA3000	自控静脉镇痛治疗	HAZ48101	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000
隐血试验	CCCB8000	胃管置管术	ABGB0001	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	氧气吸入	ABJA0001	肛门指诊	FPV01401
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000	全胃肠外营养深静脉 输注	ABCF0001	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000
肾脏功能检查	CAMA1000	导尿管留置	ABHA0002	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧化 碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	监测		治疗	
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	心电监护	院内遥测心电监护 KKA28701 或无创心电监测 FKA05705	全胃肠外营养深静脉 输注	ABCF0001
肿瘤标志物检查	癌胚抗原(CEA)测定 CGRA1000和甲胎蛋白 (AFP)测定CGRB8000 和糖类抗原CA-125测 定CGRP1000和糖类抗 原CA-153测定 CGRR1000和糖类抗原 CA-199测定CGRS1000 和神经元特异性烯醇 化酶(NSE)测定 CGRH1000和肿瘤坏死 因子 α (TNF- α)测定 CGRY1000和糖类抗原 CA-724测定CGRV1000	麻醉		氧气雾化吸入	ABKB0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	全身麻醉	HAA42901	导尿管留置	ABHA0002
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	/腰麻复合连续硬膜外阻滞麻醉	HAC42103		
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	手术			
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	超低位直肠癌根治术	HPU77302		
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	病理			
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	手术标本病理诊断	BCAD0001		
电子结肠镜检查	FPS01601	活检组织病理诊断	BCAB0001		
胸部X线摄影	EABJT001	药物			
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001	麻醉常规用药			
盆腔磁共振成像	ECAQU001	抗菌药物			
盆腔X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBQU001				
经直肠彩色多普勒超声检查	EDCQT004				
治疗					
药物					
抗菌药物					
合并症治疗用药					
泻药					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目:					
检查		检查	ABCD0001	护理	
上腹部X线计算机体层(CT)平扫	EBAQT001	电子结肠镜检查		I 级护理	ACAC0001
上腹部磁共振增强成像	ECBQT001	生理盐水介质交叉配血	CAMW1000	特级护理	ACAD0001
电子膀胱镜检查	FRG01601	一般细菌培养+鉴定+药敏	CJAR8000	造口护理	ACBL0001
电子阴道镜检查	FTL01603	治疗		检查	
活检组织病理诊断	BCAB0001	静脉输血	ABCD0001	肝胆胰脾B超检查	EDBQT001
血气分析	CEJM1000	病理		葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000
肺功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查 FJE01404	冷冻切片病理诊断		一般细菌培养+鉴定+药敏	CJAR8000
SPECT/CT骨断层显像	EEDX6001			治疗	
普通二维超声心动图	EDFKA005			静脉输血	ABCD0001
胸部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBJT001			药物	
心肌酶	肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定 CECT1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000和乳酸脱氢酶同工酶测定 CECX1000和肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定 CECT1000和α-羟基丁酸脱氢酶(α-HBD)测定 CECY1000			监测	
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000			肠内营养灌注	
一般细菌培养+鉴定+药敏	CJAR8000			止痛药物	
				抗血栓药物	

直肠癌

经腹腔镜超低位直肠癌根治术

适用对象：	病种编码：	JS038			
	主要诊断：	直肠癌		ICD-10：C20	
	主要操作/主要治疗方式：	经腹腔镜超低位直肠癌根治术		CCHI码：HPU77502	
入院标准：		1. 第一诊断必须符合ICD-10：C20直肠癌疾病编码。 2. 可R0切除的中高位直肠癌（Ⅰ期、部分Ⅱ和Ⅲ期）。 3. 有手术适应证，无绝对禁忌证。			
出院标准：		1. 病人一般情况良好，基本恢复正常饮食和肠道功能。 2. 体温正常，腹部检查无阳性体征，相关实验室检查结果基本正常。 3. 腹部切口Ⅱ/甲愈合。			
最短住院日参考值：	14-16天				
变异条件：		1. 有影响手术的合并症，需要进行相关的诊断和治疗。 2. 对于完全肠梗阻患者，可一期行乙状结肠双腔造口术，缓解梗阻症状后可行新辅助治疗。 3. 围手术期并发症可能造成住院日延长或费用超出参考标准。 4. 医生认为的变异原因。 5. 患者其他原因的变异。			
再入院间隔时间：					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
Ⅱ级护理	ACAB0001	Ⅰ级护理	ACAC0001	Ⅱ级护理	ACAB0001
检查	ACAA0001	检查		Ⅲ级护理	ACAA0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		检查	
粪便常规检查	CCCA3000	胃管置管术	ABGB0001	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000
隐血试验	CCCB8000	自控静脉镇痛治疗	HAZ48101	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	氧气吸入	ABJA0001	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和γ-谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和γ-谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000	全胃肠外营养深静脉 输注	ABCF0001	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000
肾脏功能检查	CAMA1000	导尿管留置	ABHA0002	肛门指诊	FPV01401
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	监测		治疗	
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	心电监护	院内遥测心电监护 KKA28701 或无创心电监测 FKA05705	全胃肠外营养深静脉 输注	ABCF0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肿瘤标志物检查	癌胚抗原 (CEA) 测定 CGRA1000和甲胎蛋白 (AFP) 测定CGRB8000 和糖类抗原CA-125测定CGRP1000和糖类抗原CA-153测定 CGRR1000和糖类抗原CA-199测定CGRS1000 和神经元特异性烯醇化酶 (NSE) 测定 CGRH1000和肿瘤坏死因子 α (TNF- α) 测定 CGRY1000和糖类抗原CA-724测定CGRV1000	麻醉		氧气雾化吸入	ABKB0001
血型鉴定	ABO血型鉴定 (正定型) CAMA1000或ABO血型鉴定 (反定型) CAMB1000或ABO亚型鉴定 (正定型) CAMD1000或ABO亚型鉴定 (反定型) CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	全身麻醉	HAA42901	导尿管留置	ABHA0002
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性 (HBsAg) 测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量 (HBsAg) 测定 CGLH1000	/腰麻复合连续硬膜外阻滞麻醉	HAC42103		
丙型肝炎抗体 (抗HCV)测定	CGMA1000	手术			
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	超低位直肠癌根治术	HPU77302		
梅毒螺旋体抗体 (抗TP)测定	CGPP1000	病理			
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	手术标本病理诊断	BCAD0001		
电子结肠镜检查	FPS01601	活检组织病理诊断	BCAB0001		
胸部X线摄影	EABJT001	药物			
胸部X线计算机体层 (CT) 平扫	EBAJT001	麻醉常规用药			
盆腔磁共振成像	ECAQU001	抗菌药物			
盆腔X线计算机体层 (CT) 增强扫描	EBBQU001				
治疗					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
药物					
抗菌药物					
合并症治疗用药					
泻药					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		护理	
上腹部X线计算机体层(CT)平扫	EBAQT001	电子结肠镜检查	ABCD0001	I 级护理	ACAC0001
上腹部磁共振增强成像	ECBQT001	治疗		特级护理	ACAD0001
电子膀胱镜检查	FRG01601	静脉输血	ABCD0001	造口护理	ACBL0001
电子阴道镜检查	FTL01603	病理		检查	
血气分析	CEJM1000	冷冻切片病理诊断	BCBA0001	肝胆胰脾B超检查	EDBQT001
肺功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404			葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000
SPECT/CT骨断层显像	EEDX6001			一般细菌培养+鉴定+药敏	CJAR8000
普通二维超声心动图	EDFKA005			治疗	
胸部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBJT001			静脉输血	ABCD0001
心肌酶	肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定 CECT1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和乳酸脱氢酶同工酶测定CECX1000和肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定CECT1000和α 羟基丁酸脱氢酶(α -HBD)测定CECY1000			药物	
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000			肠内营养灌注	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
一般细菌培养+鉴定+药敏	CJAR8000			监测	
病理				止痛药物	
活检组织病理诊断	BCAB0001			抗血栓药物	

直肠癌

经腹会阴直肠癌根治术(Miles手术)

适用对象：	病种编码：	JS039		
	主要诊断：	直肠癌	ICD-10码：C20	
	主要操作/主要治疗方式：	经腹会阴直肠癌根治术(Miles手术)	CCHI码：HPU77801	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：C20直肠癌疾病编码。 2. 可R0切除的低位直肠癌（Ⅰ期、部分Ⅱ和Ⅲ期）。 3. 有手术适应证，无绝对禁忌证。 4. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
	出院标准：	1. 病人一般情况良好，基本恢复正常饮食和肠道功能。 2. 体温正常，腹部检查无阳性体征，相关实验室检查基本正常。 3. 切口Ⅱ/甲愈合。		
	最短住院日参考值：	19-21天		
	变异条件：	1. 有影响手术的合并症，需要进行相关的诊断和治疗。 2. 对于完全肠梗阻患者，可一期行乙状结肠双腔造口术，缓解梗阻症状后可行新辅助放治疗。 3. 围手术期并发症可能造成住院日延长或费用超出参考标准。 4. 医生认为的变异原因。 5. 患者其他原因的变异。		
	再入院间隔时间：			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
Ⅱ级护理	ACAB0001	Ⅰ级护理	ACAC0001	Ⅱ级护理	ACAB0001
	ACAA0001			Ⅲ级护理	ACAA0001
检查		检查		换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
粪便常规检查	CCCA3000	治疗		电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000
隐血试验	CCCB8000	胃管置管术	ABGB0001	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	氧气吸入	ABJA0001	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000
肾脏功能检查	CAMA1000	会阴擦洗	ABZE0001	生化常规检查	葡萄糖(Glu)测定CEFA8000和总钙(Ca)测定CEJF8000和无机磷(P)测定CEKA8000和钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和镁(Mg)测定CEJE8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	自控静脉镇痛治疗	HAZ48101	治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	导尿管留置	ABHA0002	抗肿瘤治疗药物/肠外营养液集中配置	ABCJ0001
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	全胃肠外营养深静脉输注	ABCF0001	全胃肠外营养深静脉输注	ABCF0001
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	监测		氧气雾化吸入	ABKB0001
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	心电监护	院内遥测心电监护KKA28701或无创心电监测FKA05705	会阴擦洗	ABZE0001
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	麻醉		药物	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	全身麻醉	HAA42901		
肿瘤标志物检查	癌胚抗原(CEA)测定CGRA1000和甲胎蛋白(AFP)测定CGRB8000和糖类抗原CA-125测定CGRP1000和糖类抗原CA-153测定CGRRI1000和糖类抗原CA-199测定CGRS1000和神经元特异性烯醇化酶(NSE)测定CGRH1000和肿瘤坏死因子 α (TNF- α)测定CGRY1000和糖类抗原CA-724测定CGRV1000	/腰麻复合连续硬膜外阻滞麻醉	HAC42103		
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	手术			
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001	经腹会阴直肠癌根治术(Miles手术)	HPU77801		
胸部X线摄影	EABJT001	病理			
电子结肠镜检查	FPS01601	活检组织病理诊断	BCAB0001		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
电子乙状结肠镜检查	FPT01602	手术标本病理诊断	BCAD0001		
盆腔磁共振成像	ECAQU001	药物			
盆腔磁共振增强成像	ECBQU001	抗菌药物			
治疗		麻醉常规用药			
药物					
抗菌药物					
泻药					
合并症治疗用药					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查	ABCD0001	护理	
胸部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBJT001	电子结肠镜检查		I 级护理	ACAC0001
上腹部X线计算机体层(CT)平扫	EBAQT001	治疗		特级护理	ACAD0001
上腹部磁共振增强成像	ECBQT001	静脉输血	ABCD0001	造口护理	ACBL0001
电子膀胱镜检查	FRG01601	药物		检查	
电子阴道镜检查	FTL01603	腹腔治疗药物		肝胆胰脾B超检查	EDBQT001
		病理		葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000
SPECT/CT骨断层显像	EEDX6001	冷冻切片病理诊断		一般细菌培养+鉴定+药敏	CJAR8000
血气分析	CEJM1000			治疗	
肺功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404			氧气吸入	ABJA0001
普通二维超声心动图	EDFKA005			静脉输血	ABCD0001
癌胚抗原(CEA)测定	CGRA1000			监测	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
心肌酶	肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定 CECT1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000和乳酸脱氢酶同工酶测定 CECX1000和肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定 CECT1000和α-羟丁酸脱氢酶(α-HBD)测定 CECY1000			院内遥测心电监护	KKA28701
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000			药物	
一般细菌培养+鉴定+药敏	CJAR8000			抗菌药物	
病理				肠内营养灌注	
活检组织病理诊断	BCAB0001			止痛药物	
				抗血栓药物	

直肠癌

经腹腔镜会阴直肠癌根治术(Miles手术)

适用对象：	病种编码：	JS040	
	主要诊断：	直肠癌	ICD-10码：C20
	主要操作/主要治疗方式：	经腹腔镜会阴直肠癌根治术(Miles手术)	CCHI码：HPU77802
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：C20直肠癌疾病编码。 2. 可R0切除的低位直肠癌（I期、部分II和III期）。 3. 有手术适应证，无绝对禁忌证。 4. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 病人一般情况良好，基本恢复正常饮食和肠道功能。 2. 体温正常，腹部检查无阳性体征，相关实验室检查基本正常。 3. 切口II/甲愈合。		
最短住院日参考值：	19-21天		
变异条件：	1. 有影响手术的合并症，需要进行相关的诊断和治疗。 2. 对于完全肠梗阻患者，可一期行乙状结肠双腔造口术，缓解梗阻症状后可行新辅助放治疗。 3. 围手术期并发症可能造成住院日延长或费用超出参考标准。 4. 医生认为的变异原因。 5. 患者其他原因的变异。		
再入院间隔时间：			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	II级护理	ACAB0001
	ACAA0001			III级护理	ACAA0001
检查		检查		换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
粪便常规检查	CCCA3000	治疗		电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000
隐血试验	CCCB8000	胃管置管术	ABGB0001	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	氧气吸入	ABJA0001	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000
肾脏功能检查	CAMA1000	会阴擦洗	ABZE0001	生化常规检查	葡萄糖(Glu)测定CEFA8000和总钙(Ca)测定CEJF8000和无机磷(P)测定CEKA8000和钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和镁(Mg)测定CEJE8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	自控静脉镇痛治疗	HAZ48101	治疗	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	导尿管留置	ABHA0002	抗肿瘤治疗药物/肠外营养液集中配置	ABCJ0001
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	全胃肠外营养深静脉输注	ABCF0001	全胃肠外营养深静脉输注	ABCF0001
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	监测		氧气雾化吸入	ABKB0001
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	心电监护	院内遥测心电监护KKA28701或无创心电监测FKA05705	会阴擦洗	ABZE0001
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	麻醉		药物	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	全身麻醉	HAA42901		
肿瘤标志物检查	癌胚抗原(CEA)测定CGRA1000和甲胎蛋白(AFP)测定CGRB8000和糖类抗原CA-125测定CGRP1000和糖类抗原CA-153测定CGRR1000和糖类抗原CA-199测定CGRS1000和神经元特异性烯醇化酶(NSE)测定CGRH1000和肿瘤坏死因子 α (TNF- α)测定CGRY1000和糖类抗原CA-724测定CGRV1000	/腰麻复合连续硬膜外阻滞麻醉	HAC42103		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道常规 心电图检查FKA03702或 十二通道常规心电图检 查FKA03703	手术			
胸部X线计算机体层 (CT) 平扫	EBAJT001	经腹会阴直肠癌根治 术 (Miles手术)	HPU77801		
胸部X线摄影	EABJT001	病理			
电子结肠镜检查	FPS01601	活检组织病理诊断	BCAB0001		
电子乙状结肠镜检查	FPT01602	手术标本病理诊断	BCAD0001		
盆腔磁共振成像	ECAQU001	药物			
盆腔磁共振增强成像	ECBQU001	抗菌药物			
活检组织病理诊断	BCAB0001	麻醉常规用药			
治疗					
药物					
抗菌药物					
泻药					
合并症治疗用药					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		护理	
胸部X线计算机体层 (CT) 增强扫描	EBBJT001	电子结肠镜检查	FPS01601	I 级护理	ACAC0001
上腹部X线计算机体 层 (CT) 平扫	EBAQT001	治疗		特级护理	ACAD0001
上腹部磁共振增强成 像	ECBQT001	静脉输血	ABCD0001	造口护理	ACBL0001
纤维膀胱镜检查	FRG01602	药物		检查	
电子阴道镜检查	FTL01603	腹腔治疗药物		肝胆胰脾B超检查	EDBQT001
SPECT/CT骨断层显像	EEDX6001	病理		葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000
血气分析	CEJM1000	冷冻切片病理诊断	BCBA0001	一般细菌培养+鉴定+ 药敏	CJAR8000
肺功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活量 功能检查FJE01402或肺 每分通气量功能检查 FJE01403或最大通气量 功能检查FJE01404			治疗	
普通二维超声心动图	EDFKA005			静脉输血	ABCD0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
癌胚抗原(CEA)测定	CGRA1000			监测	
心肌酶	肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定 CECT1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000和乳酸脱氢酶同工酶测定CECX1000和肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定 CECT1000和α-羟基丁酸脱氢酶(α-HBD)测定 CECY1000			氧气吸入	KKA28701
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000			监测	
一般细菌培养+鉴定+药敏	CJAR8000			院内遥测心电监护	KKA28701
				药物	
				抗菌药物	
				肠内营养灌注	

先天性巨结肠

经腹先天性巨结肠根治术

适用对象：	病种编码：	JS041			
	主要诊断：	先天性巨结肠	ICD-10码：	Q43.1	
	主要操作/主要治疗方式：	经腹先天性巨结肠根治术	CCHI码：	HPS73304	
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：Q43.1先天性巨结肠疾病编码。 2. 符合短段型、常见型、长段型巨结肠诊断的病例，进入临床路径。 3. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径实施时，可以进入路径。				
出院标准：	1. 一般情况良好。 2. 便秘症状消失或缓解。 3. 伤口愈合良好，无出血、感染、痿等。 4. 无其他需要住院处理的并发症。				
最短住院日参考值：	14天				
变异条件：	1. 经手术证实为特殊类型先天性巨结肠（全结肠型、超短段型等），手术困难，术后恢复慢，导致住院时间延长和费用增加。 2. 围手术期并发症等造成住院时间延长和费用增加。				
再入院间隔时间：	无需（出现其他并发症除外）				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查	ACAA0001	肛周护理	ACBM0001	/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查		肛周护理	ACBM0001
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000			检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
粪便常规检查	CCCA3000	导尿管留置	ABHA0002	肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红 素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶 (GGT) 测 定CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和 白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶 (ALP) 测定 CECD8000	胃管置管术	ABGB0001	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红 素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶 (GGT) 测 定CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和 白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶 (ALP) 测定 CECD8000
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000	胃肠减压	ABGA0001	电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测 定CEJC8000和总二氧化 碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测 定CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000
电解质测定	CAMA1000	院内遥测心电监护	KKA28701	治疗	
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定 CAGA1000和活化部分 凝血活酶时间 (APTT) 测定CAGB1000和血浆 凝血酶原时间 (PT) 测 定CAGC1000和血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	监测		胃肠减压	ABGA0001
乙型肝炎表面抗体 (抗HBs) 测定	乙型肝炎表面抗体定 性 (抗HBs) 测定 CGLK1000或乙型肝炎 表面抗体定量 (抗 HBs) 测定CGLL1000			导尿管留置	ABHA0002
丙型肝炎抗体 (抗 HCV) 测定	CGMA1000	麻醉		换药	换药 (中) ABFA0002或 换药 (大) ABFA0003
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV) 测定	CGMF1000	全身麻醉	HAA42901	监测	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	经腹先天性巨结肠根治术	HPS73304	无创心电监测	FKA05705
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	病理		药物	
胸部X线摄影	EABJT001	冷冻切片病理诊断	BCBA0001	抗菌药物	
治疗		药物			
静脉采血	ABBB0001	抗菌药物及液体补充			
清洁灌肠	ABGE0004				
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
隐血试验	CCCB8000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血气分析	CEJM1000
大肠灌肠造影B超检查	EDBPN001	血气分析	CEJM1000	C-反应蛋白(CRP)测定	CGCA1000
普通二维超声心动图	EDFKA005	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	治疗	
血气分析	CEJM1000	C-反应蛋白(CRP)测定	CGCA1000	静脉输血	ABCD0001
C-反应蛋白(CRP)测定	CGCA1000	治疗		换药(小)	ABFA0001
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000	肛管排气	ABGH0001		
治疗		静脉输血	ABCD0001	监测	
胃管置管术	ABGB0001			院内遥测心电监护	KKA28701

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
导尿管留置	ABHA0002	药物		药物	
药物					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码

胰岛素

先天性巨结肠

经腹腔镜先天性巨结肠切除术

适用对象：	病种编码：	JS042			
	主要诊断：	先天性巨结肠		ICD-10码：	Q43.1
	主要操作/主要治疗方式：	经腹腔镜先天性巨结肠切除术		CCHI码：	HPS73501
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：Q43.1先天性巨结肠疾病编码。 2. 符合短段型、常见型、长段型巨结肠诊断的病例，进入临床路径。 3. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径实施时，可以进入路径。				
出院标准：	1. 一般情况良好。 2. 便秘症状消失或缓解。 3. 伤口愈合良好，无出血、感染、瘘等。 4. 无其他需要住院处理的并发症。				
最短住院日参考值：	14天				
变异条件：	1. 经手术证实为特殊类型先天性巨结肠（全结肠型、超短段型等），手术困难，术后恢复慢，导致住院时间延长和费用增加。 2. 围手术期并发症等造成住院时间延长和费用增加。				
再入院间隔时间：	无需（出现其他并发症除外）				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查	ACAA0001	肛周护理	ACBM0001	/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查		肛周护理	ACBM0001
尿常规化学分析	CCAA2000			检查	
粪便常规检查	CCCA3000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	导尿管留置	ABHA0002	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	胃肠减压	ABGA0001	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	院内遥测心电监护	KKA28701	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000
凝血功能测定	CAMA1000	监测			
乙型肝炎表面抗体(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000或乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000			治疗	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	麻醉	HAA42901	胃肠减压	ABGA0001
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	全身麻醉		导尿管留置	ABHA0002
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	手术	HPS73501	换药	换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703	经腹腔镜先天性巨结肠切除术		监测	
胸部X线摄影	EABJT001	病理	BCBA0001	无创心电监测	FKA05705
治疗		冷冻切片病理诊断		药物	
静脉采血	ABBB0001	药物		抗菌药物	
清洁灌肠	ABGE0004	抗菌药物及液体补充			
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
隐血试验	CCCB8000	血常规	全血细胞计数+3分群 检测CAAA1000或全血 细胞计数+5分类检测 CAAB1000	血气分析	CEJM1000
大肠灌肠造影B超检查	EDBPN001	血气分析	CEJM1000	C-反应蛋白(CRP)测定	CGCA1000
普通二维超声心动图	EDFKA005	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙(Ca)测定 CEJF8000	治疗	
血气分析	CEJM1000	C-反应蛋白(CRP)测定	CGCA1000	静脉输血	ABCD0001
C-反应蛋白(CRP)测定	CGCA1000	治疗		换药(小)	ABFA0001
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000	肛管排气	ABGH0001		
治疗		静脉输血	ABCD0001	监测	
胃管置管术	ABGB0001			院内遥测心电监护	KKA28701
导尿管留置	ABHA0002	药物		药物	
药物					

先天性幽门肥厚性狭窄

幽门环肌切开术

适用对象：	病种编码：	JS043	
	主要诊断：	先天性幽门肥厚性狭窄	ICD-10码：Q40.0
	主要操作/主要治疗方式：	幽门环肌切开术	CCHI码：HPG50301
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：Q40.0先天性幽门肥厚性狭窄疾病编码。 2. 当患儿同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 一般情况良好，进食可，没有或偶有呕吐。 2. 伤口愈合良好。 3. 没有需要住院处理的并发症。		
最短住院日参考值：	6天		
变异条件：	1. 围手术期并发症等造成住院日延长和费用增加。 2. 存在其他系统的先天畸形，不能耐受手术的患儿，转入相应的路径治疗。		
再入院间隔时间：	无需（出现其他并发症除外）		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001	II 级护理	ACAB0001
检查	ACAA0001	检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	治疗	
尿常规化学分析	CCAA2000	血气分析	CEJM1000	换药	换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	治疗		药物	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	胃肠减压	ABGA0001	抗菌药物	
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	氧气吸入	ABJA0001		
凝血功能测定	CAMA1000	院内遥测心电监护	KKA28701		
乙型肝炎表面抗体(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000或乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	监测			
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000				
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	麻醉			
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	全身麻醉	HAA42901		
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	手术			
胸部X线摄影	EABJT001	幽门环肌切开术	HPG50301		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
治疗		病理			
胃肠减压	ABGA0001				
药物		药物			
抗菌药物		抗菌药物			
液体补充		液体补充			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
C-反应蛋白(CRP)测定	CGCA1000			电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000
普通二维超声心动图	EDFKA005	治疗		治疗	
血气分析	CEJM1000			换药(小)	ABFA0001
治疗		药物		药物	
药物					

先天性幽门肥厚性狭窄

经腹腔镜幽门环肌切开术

适用对象：	病种编码：	JS044	
	主要诊断：	先天性幽门肥厚性狭窄	ICD-10码：Q40.0
	主要操作/主要治疗方式：	经腹腔镜幽门环肌切开术	CCHI码：HPG50501
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：Q40.0先天性幽门肥厚性狭窄疾病编码。 2. 当患儿同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径实施时，可以进入路径。	
	出院标准：	1. 一般情况良好，进食可，没有或偶有呕吐。 2. 伤口愈合良好。 3. 没有需要住院处理的并发症。	
	最短住院日参考值：	5天	
	变异条件：	1. 围手术期并发症等造成住院日延长和费用增加。 2. 存在其他系统的先天畸形，不能耐受手术的患儿，转入相应的路径治疗。	
	再入院间隔时间：	无需（出现其他并发症除外）	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001	II 级护理	ACAB0001
检查	ACAA0001	检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	治疗	
尿常规化学分析	CCAA2000	血气分析	CEJM1000	换药	换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(Alb)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	治疗		药物	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	胃肠减压	ABGA0001	抗菌药物	
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	氧气吸入	ABJA0001		
血气分析	CAMA1000	院内遥测心电监护	KKA28701		
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000和活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000和血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000和血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	监测			
乙型肝炎表面抗体(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000或乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000				
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	麻醉			
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	全身麻醉	HAA42901		
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	手术			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	经腹腔镜幽门环肌切开术	HPG50501		
胸部X线摄影	EABJT001	病理			
治疗					
胃肠减压	ABGA0001	药物			
药物		抗菌药物			
抗菌药物		液体补充			
液体补充					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
C-反应蛋白(CRP)测定	CGCA1000	治疗		电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000
普通二维超声心动图	EDFKA005			治疗	
治疗		药物		换药(小)	ABFA0001
				药物	
药物					

急性肠套叠

肠扭转肠套叠复位术

适用对象：	病种编码：	JS045			
	主要诊断：	急性肠套叠		ICD-10码：	K56.1
	主要操作/主要治疗方式：	肠扭转肠套叠复位术		CCHI码：	HPH70302
	入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10码：K56.1急性肠套叠编码。 2. 年龄≤2岁（原发性肠套叠）。 3. 需要进行手术治疗。 4. 当患儿同时具有其他疾病诊断时，但在住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。 5. 对具有肠套叠致肠坏死、肠穿孔致全腹膜炎等病情变异者不进入路径。			
	出院标准：	1. 一般情况良好。 2. 恢复胃肠道功能。 3. 伤口愈合良好。			
	最短住院日参考值：	5-8天			
	变异条件：	1. 术后肠梗阻。 2. 肠穿孔。 3. 腹膜炎。 4. 酸中毒。 5. 休克。			
	再入院间隔时间：	14天			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001
检查	ACAA0001	检查		/ II 级护理	ACAB0001
全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000			检查	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	治疗		氧气吸入	ABJA0001
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	氧气吸入	ABJA0001	治疗	
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	监测		换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710	胃肠减压	ABGA0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	无创心电监测	FKA05705	静脉输液	ABCA0001
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CAMA1000	麻醉		监测	
尿常规化学分析	CCAA2000	全身麻醉	HAA42901	无创心电监测	FKA05705
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	手术		药物	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	肠扭转肠套叠复位术	HPH70302		
生化常规检查	葡萄糖(Glu)测定CEFA8000和总钙(Ca)测定CEJF8000和无机磷(P)测定CEKA8000和钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000	药物			
肝胆胰脾彩色多普勒超声检查	EDCQT001				
腹部X线摄影	EABQT001				
胸部X线摄影	EABJT001				
粪便常规检查	CCCA3000				
治疗					
胃肠减压	ABGA0001				
静脉输液	ABCA0001				
监测					
无创心电监测	FKA05705				
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703			生化常规检查	葡萄糖(Glu)测定CEFA8000和总钙(Ca)测定CEJF8000和无机磷(P)测定CEKA8000和钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000
血气分析	CEJM1000	病理		治疗	
治疗		快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001		
导尿管留置	ABHA0002	治疗		监测	
导尿	ABHA0001			无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710
药物		手术		药物	
		阑尾切除术		抗菌药	
		药物			
		抗菌药			

急性化脓性阑尾炎

阑尾切除术

适用对象：	病种编码：	JS046			
	主要诊断：	急性化脓性阑尾炎	ICD-10码：	K35. 0, K35. 1, K35. 9	
	主要操作/主要治疗方式：	阑尾切除术	CCHI码：	HPR75301	
	入院标准：	1. 第一诊断符合ICD10：K35. 0, K35. 1, K35. 9急性化脓性阑尾炎编码。 2. 年龄 <18岁。 3. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施。 4. 如诊断为坏疽穿孔性阑尾炎、全腹膜炎不进入本路径。			
	出院标准：	1. 一般情况良好。 2. 胃肠道功能恢复良好。 3. 腹腔引流条已拔除，伤口愈合良好。			
	最短住院日参考值：	5-7天			
	变异条件：	1. 粘连性肠梗阻。 2. 腹腔残余感染。 3. 切口感染。 4. 腹膜炎。			
	再入院间隔时间：	14天			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
Ⅱ级护理	ACAB0001	Ⅰ级护理	ACAC0001	Ⅰ级护理	ACAC0001
检查	ACAA0001	检查		Ⅱ级护理	ACAB0001
全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000	一般细菌培养+鉴定+药敏	CJAR8000	检查	
超敏C反应蛋白(hs-CRP)测定	CEAU1000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	氧气吸入	ABJA0001	超敏C反应蛋白(hs-CRP)测定	CEAU1000
粪便常规检查	CCCA3000	静脉输液	ABCA0001	治疗	
尿常规化学分析	CCAA2000	监测		换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
生化常规检查	葡萄糖(Glu)测定 CEFA8000和总钙(Ca) 测定CEJF8000和无机 磷(P)测定CEKA8000 和钾(K)测定 CEJA8000和钠(Na)测 定CEJB8000和氯(Cl) 测定CEJC8000	无创心电监测	FKA05705	氧气吸入	ABJA0001
肝功能检查	CAMA1000	无创指脉血氧饱和度 监测	FKA05710	静脉输液	ABCA0001
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000	麻醉		监测	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	全身麻醉	HAA42901	无创心电监测	FKA05705
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	手术		无创指脉血氧饱和度 监测	FKA05710
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	阑尾切除术	HPR75301	药物	
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	病理		抗菌药	
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000	快速石蜡切片病理诊 断	BCBC0001		
治疗		药物			
		抗菌药			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
药物					
抗菌药					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
十二通道常规心电图检查	FKA03703				
肝胆胰脾彩色多普勒超声检查	EDCQT001	治疗		治疗	
腹部X线摄影	EABQT001				
胸部X线摄影	EABJT001	手术		药物	
治疗					
		药物			
药物					

胆总管结石

经电子内镜胆管机械碎石取石术

适用对象：	病种编码：	JS047	
	主要诊断：	胆总管结石	ICD-10码：K80.3-K80.5
	主要操作/主要治疗方式：	经电子内镜胆管机械碎石取石术	CCHI码：HQE65602
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD10：K80.3-K80.5胆总管结石疾病编码。 2. 患有其他疾病，但在住院期间不需要特殊处理（检查和治疗），也不影响第一诊断时，可以进入路径。	
	出院标准：	1. 一般状况好，体温正常，无明显腹痛。 2. 化验指标基本正常。 3. 无操作并发症。	
	最短住院日：	7天	
	变异条件：	1. 出现并发症（ERCP相关性胰腺炎、胆道感染、出血、穿孔及麻醉意外者）等转入相应临床路径。 2. 合并胆道狭窄、占位者转入相应临床路径。 3. 巨大结石需要内镜下机械或激光碎石，多次镜下取石等转入相应临床路径。 4. 合并胆囊结石、肝内胆管结石者转入相应临床路径。	
	再入院间隔时间：	2周	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	III级护理	ACAA0001
检查	ACAA0001	检查		/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	经电子内镜逆行胰胆管造影术(ERCP)	EACQP002	检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
粪便常规检查	CCCA3000	静脉输液	ABCA0001	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红 素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶 (GGT) 测 定CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和 白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶 (ALP) 测定 CECD8000
隐血试验	CCCB8000	麻醉		电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测 定CEJC8000和总二氧 化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测 定CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红 素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶 (GGT) 测 定CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和 白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶 (ALP) 测定 CECD8000	全身麻醉	HAA42901	淀粉酶同工酶测 定	CEDE1000
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000	手术		胰淀粉酶 (AMS) 测 定	CEDD8000
电解质测定	CAMA1000	经电子内镜十二 指肠乳头括约肌 切开术 (EST)	HPK50602	脂肪酶 (LPS) 测定	CEDG1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	经电子内镜胆管机械碎石取石术	HQE65602	肝胆胰脾B超检查	EDBQT001
淀粉酶同工酶测定	CEDE1000	病理		治疗	
胰淀粉酶(AMS)测定	CEDD8000			静脉输液	ABCA0001
脂肪酶(LPS)测定	CEDG1000	药物		药物	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000	抗菌药物		抗菌药物	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000或 Rh血型c抗原鉴定 CAMH1000或 Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000或Rh血型e抗原鉴定 CAMK1000或 Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000				
乙肝五项	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000或乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定 CGLK1000或乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定 CGLL1000或乙型肝炎e抗原定性(HBeAg)测定 CGLM1000或乙型肝炎e抗原定量(HBeAg)测定 CGLN1000或乙型肝炎e抗体(HBeAb)测定 CGLP1000或乙型肝炎核心抗原(HBcAg)测定 CGLQ6000或乙型肝炎核心抗原定量(HBcAg)测定 CGLR6000				
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000				
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703				
胸部X线摄影	EABJT001				
治疗					
静脉采血	ABBB0001				
药物					
镇静药					
解痉药					
有机碘造影剂					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
上腹部X线计算机体层(CT)平扫	EBAQT001				
普通二维超声心动图	EDFKA005	治疗		治疗	
胰胆管系统磁共振水成像(MRCP)	ECAQP001				
治疗		药物		药物	
药物					

胆总管结石

经电子内镜胆管结石激光碎石取石术

适用对象：	病种编码：	JS048		
	主要诊断：	胆总管结石	ICD-10码：K80.3-K80.5	
	主要操作/主要治疗方式：	经电子内镜胆管结石激光碎石取石术	CCHI码：HQE65603	
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD10：K80.3-K80.5胆总管结石疾病编码。 2. 患有其他疾病，但在住院期间不需要特殊处理（检查和治疗），也不影响第一诊断时，可以进入路径。			
出院标准：	1. 一般状况好，体温正常，无明显腹痛。 2. 化验指标基本正常。 3. 无操作并发症。			
最短住院日：	7天			
变异条件：	1. 出现并发症（ERCP相关性胰腺炎、胆道感染、出血、穿孔及麻醉意外者）等转入相应临床路径。 2. 合并胆道狭窄、占位者转入相应临床路径。 3. 巨大结石需要内镜下机械或激光碎石，多次镜下取石等转入相应临床路径。 4. 合并胆囊结石、肝内胆管结石者转入相应临床路径。			
再入院间隔时间：	2周			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	III级护理	ACAA0001
检查	ACAA0001	检查		/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	经电子内镜逆行胰胆管造影术(ERCP)	EACQP002	检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
粪便常规检查	CCCA3000	静脉输液	ABCA0001	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000
隐血试验	CCCB8000	麻醉		电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测定CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测定CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000	全身麻醉	HAA42901	淀粉酶同工酶测定	CEDE1000
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000	手术		胰淀粉酶 (AMS) 测定	CEDD8000
电解质测定	CAMA1000	经内镜十二指肠乳头括约肌切开术	经纤维内镜十二指肠乳头括约肌切开术 (EST) HPK50601或经电子内镜十二指肠乳头括约肌切开术 (EST) HPK50602	脂肪酶 (LPS) 测定	CEDG1000
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000	经电子内镜胆管结石激光碎石取石术	HQE65603	肝胆胰脾B超检查	EDBQT001
淀粉酶同工酶测定	CEDE1000	病理		治疗	
胰淀粉酶 (AMS) 测定	CEDD8000			静脉输液	ABCA0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
脂肪酶(LPS)测定	CEDG1000	药物		药物	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	抗菌药物		抗菌药物	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000或 Rh血型c 抗原鉴定CAMH1000或 Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000或Rh血型e 抗原鉴定CAMK1000或 Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000	镇静药			
乙型肝炎表面抗原 (HBsAg)测定	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	解痉药			
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	造影剂			
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000				
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703				
胸部X线摄影	EABJT001				
治疗					
静脉采血	ABBB0001				
药物					
镇静药					
解痉药					
造影剂					
有机碘造影剂					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目:					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
检查		检查		检查	
上腹部X线计算机体层(CT)平扫	EBAQT001				
普通二维超声心动图	EDFKA005	治疗		治疗	
胰胆管系统磁共振水成像(MRCP)	ECAQP001				
治疗		药物		药物	
药物					

肝硬化腹水

经腹盆腹腔液性包块穿刺引流术

适用对象：	病种编码：	JS049	
	主要诊断：	肝硬化腹水	ICD-10码： K70. 3+R18, K71. 7+R1 8. K74. 1-K74. 6+R18
	主要操作/主要治疗方式：	经腹盆腹腔液性包块穿刺引流术	CCHI码：HQU45102
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：K70. 3+R18, K71. 7+R18, K74. 1-K74. 6+R18肝硬化腹水疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 腹胀症状缓解。 2. 腹围减小。 3. 体重稳步下降。 4. 无严重电解质紊乱。		
最短住院日参考值：	10天		
变异条件：	1. 出现并发症（如消化道出血、原发性腹膜炎、原发性肝癌、肝性脑病、肝肾综合征、肝性胸水等）转入相应路径。 2. 合并结核性腹膜炎、肺部感染等转入相应路径。 3. 顽固性腹水，需进一步诊治，导致住院时间延长、费用增加。		
再入院间隔时间：	14天		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	II级护理	ACAB0001	II级护理	ACAB0001
检查	ACAA0001	检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	白蛋白(A1b)测定	CEAE8000	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定EEEE8000
尿常规化学分析	CCAA2000	总蛋白(TP)测定	CEAA8000	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
粪便常规检查	CCCA3000	厌氧菌培养	CJAV8000	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000
隐血试验	CCCB8000	胸腹水常规检查	CCDA4000	肝胆胰脾B超检查	EDBQT001
血型鉴定	ABO血型鉴定 (正定型) CAMA1000或ABO血型鉴定 (反定型) CAMB1000或ABO亚型鉴定 (正定型) CAMD1000或ABO亚型鉴定 (反定型) CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	胸腹水细胞学检查	CCDB4000	肝静脉彩色多普勒超声检查	EDCMM001
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000	治疗		24小时尿比重渗透压试验	FDA04406
肾脏功能检查	CAMA1000			治疗	
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测定 CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测定 CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000	麻醉			
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000	局部静脉内麻醉	HAB42201	药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	手术		利尿剂	
甲胎蛋白(AFP)测定	CGRB8000	经腹盆腹腔液性包块 穿刺引流术	HQU45102	清脏腑热药	
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	药物		抗病毒药物	
乙肝五项	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000或乙型肝炎 表面抗体定性(抗 HBs)测定CGLK1000或 乙型肝炎表面抗体定 量(抗HBs)测定 CGLL1000或乙型肝炎 e抗原定性(HBeAg)测 定CGLM1000或乙型肝 炎e抗原定量(HBeAg) 测定CGLN1000或乙型 肝炎e抗体(HBeAb)测 定CGLP1000或乙型肝 炎核心抗原(HBcAg) 测定CGLQ6000或乙型 肝炎核心抗原定量 (HBcAg)测定 CGLR6000	利尿剂			
胸腹水常规检查	CCDA4000	白蛋白			
丙型肝炎病毒基因分 型检测	CLAR8000	清脏腑热药			
乙型肝炎病毒前C区 变异检测	CLAM8000	抗病毒药物			
胸部X线摄影	EABJT001				
腹部X线计算机体层 (CT)平扫	上腹部X线计算机体 层(CT)平扫EBAQT001 或下腹部X线计算机 体层(CT)平扫 EBAQT002				
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
24小时尿比重渗透压试验	FDA04406				
乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸扩增定量检测	CLAK8000				
丙型肝炎病毒核糖核酸扩增定性检测	丙型肝炎病毒核糖核酸扩增定量检测 CLAQ8000或丙型肝炎病毒核糖核酸扩增定量检测CLAQ8000				
治疗					
药物					
利尿剂					
清脏腑热药					
抗病毒药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
胰胆管系统磁共振水成像(MRCP)	ECAQP001				
乙型肝炎表面抗原(HBsAg)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000	治疗			
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
腹部CT检查	上腹部X线计算机体层(CT)平扫EBAQT001 或下腹部X线计算机体层(CT)平扫EBAQT002				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
内镜检查	电子胃镜检查 FPB01602和超声胃镜 检查FPB01604和消化 道内镜活检术 FPA07601或消化内镜 检查麻醉术FPA42201				

大肠息肉

经电子内镜结肠息肉激光切除术

适用对象：	病种编码：	JS050	
主要诊断：	大肠息肉	ICD-10码：D12. 6/D12. 8/K62. 1/K63. 5	
主要操作/主要治疗方式：	经电子内镜结肠息肉激光切除术	CCHI码：HPS72604	
入院标准：	1.第一诊断必须符合ICD-10：D12. 6/D12. 8/K62. 1/K63. 5大肠息肉疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 患者一般情况良好。 2. 无出血、穿孔、感染等并发症。		
最短住院日参考值：	3天		
变异条件：	1. 患者年龄小于18岁，或大于65岁者，可疑存在肠道特殊疾病患者，进入相应临床路径。 2. 合并严重心、肺、肝、肾等其他脏器基础疾病及凝血功能障碍者，退出本路径。 3. 息肉不符合内镜治疗指征，或患者存在内镜治疗禁忌证，出院或转外科，进入结肠肿瘤外科治疗住院流程。 4. 患者住院期间出现合并症，如急性消化道大出血、肠道穿孔或活检病理提示为恶性肿瘤等，必要时转外科手术，转入相应临床路径。 5. 合并感染，需要继续抗感染治疗，进入肠道感染住院流程。 6. 多发息肉、大息肉或复杂情况：多发大于5枚以上，或息肉直径≥2cm；或广基息肉；或粗蒂息肉（蒂直径≥1cm）；或侧向生长型息肉等。		
再入院间隔时间：	14天		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001	II 级护理	ACAB0001
/ II 级护理	ACAA0001	/ II 级护理	ACAB0001	检查	
检查		检查		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	电子结肠镜检查	FPS01601	粪便常规检查	CCCA3000
尿常规化学分析	CCAA2000	肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	隐血试验	CCCB8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
粪便常规检查	CCCA3000	手术		治疗	
隐血试验	CCCB8000	经电子内镜结肠息肉激光切除术	HPS72604	静脉输液	ABCA0001
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	药物			
肝功能检查	CAMA1000	清肠剂			
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEE8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	局部麻醉药			
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000				
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000				
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000				
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000或Rh血型c抗原鉴定CAMH1000或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000				
肿瘤标志物检查	癌胚抗原(CEA)测定CGRA1000和甲胎蛋白(AFP)测定CGRB8000和糖类抗原CA-125测定CGRP1000和糖类抗原CA-153测定CGRR1000和糖类抗原CA-199测定CGRS1000和神经元特异性烯醇化酶(NSE)测定CGRH1000和肿瘤坏死因子 α (TNF- α)测定CGRY1000和糖类抗原CA-724测定CGRV1000				
乙型肝炎表面抗原(HBsAg)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000				
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000				
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703				
胸部X线摄影	EABJT001				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
治疗					
静脉采血	ABBB0001				
一般灌肠	ABGE0001				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
		超声结肠镜检查	FPS01602		
治疗		治疗		治疗	
药物		药物		药物	
				术后抗生素	

大肠息肉

经电子内镜结肠息肉微波切除术

适用对象：	病种编码：	JS051		
	主要诊断：	大肠息肉	ICD-10码：D12. 6/D12. 8/K62. 1/K63. 5	
	主要操作/主要治疗方式：	经电子内镜结肠息肉微波切除术	CCHI码：HPS72602	
入院标准：	1.第一诊断必须符合ICD-10：D12. 6/D12. 8/K62. 1/K63. 5大肠息肉疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
出院标准：	2. 无出血、穿孔、感染等并发症。			
最短住院日参考值：	3天			
变异条件：	1. 患者年龄小于18岁，或大于65岁者，可疑存在肠道特殊疾病患者，进入相应临床路径。 2. 合并严重心、肺、肝、肾等其他脏器基础疾病及凝血功能障碍者，退出本路径。 3. 息肉不符合内镜治疗指征，或患者存在内镜治疗禁忌证，出院或转外科，进入结肠肿瘤外科治疗住院流程。 4. 患者住院期间出现合并症，如急性消化道大出血、肠道穿孔或活检病理提示为恶性肿瘤等，必要时转外科手术，转入相应临床路径。 5. 合并感染，需要继续抗感染治疗，进入肠道感染住院流程。 6. 多发息肉、大息肉或复杂情况：多发大于5枚以上，或息肉直径≥2cm；或广基息肉；或粗蒂息肉（蒂直径≥1cm）；或侧向生长型息肉等。			
再入院间隔时间：	14天			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001	II 级护理	ACAB0001
/ II 级护理	ACAA0001	/ II 级护理	ACAB0001		
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	电子结肠镜检查	FPS01601	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
尿常规化学分析	CCAA2000	肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	粪便常规检查	CCCA3000
粪便常规检查	CCCA3000	手术		隐血试验	CCCB8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
隐血试验	CCCB8000	经电子内镜结肠息肉微波切除术	HPS72602	治疗	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	药物		静脉输液	ABCA0001
肝功能检查	CAMA1000	清肠剂			
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr)测定 CEEB8000和尿酸(UA)测定 CEEE8000	局部麻醉药			
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000				
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙(Ca)测定 CEJF8000				
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000				
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000或Rh血型c抗原鉴定 CAMH1000或Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000或Rh血型e抗原鉴定 CAMK1000或Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肿瘤标志物检查	癌胚抗原 (CEA) 测定 CGRA1000和甲胎蛋白 (AFP) 测定CGRB8000 和糖类抗原CA-125测定 CGRP1000和糖类抗原CA-153测定 CGRR1000和糖类抗原CA-199测定CGRS1000 和神经元特异性烯醇化酶 (NSE) 测定 CGRH1000和肿瘤坏死因子 α (TNF- α) 测定 CGRY1000和糖类抗原CA-724测定CGRV1000				
乙型肝炎表面抗原 (HBsAg) 测定	乙型肝炎表面抗原定性 (HBsAg) 测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量 (HBsAg) 测定 CGLH1000				
丙型肝炎抗体 (抗HCV) 测定	CGMA1000				
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV) 测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体 (抗TP) 测定	CGPP1000				
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道 常规心电图检查FKA03702或十二通道 常规心电图检查FKA03703				
胸部X线摄影	EABJT001				
治疗					
静脉采血	ABBB0001				
一般灌肠	ABGE0001				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
		超声结肠镜检查	FPS01602		
治疗		治疗		治疗	
药物		药物		药物	
				术后抗生素	

十一、肾脏和泌尿道疾病

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
KS001	肾癌	根治性肾切除术
KS002	肾癌	经腹腔镜根治性肾切除术
KS003	膀胱肿瘤	膀胱部分切除术
KS004	膀胱肿瘤	经腹腔镜膀胱部分切除术
KS005	膀胱肿瘤	经尿道膀胱肿瘤电切治疗
KS006	输尿管结石	经尿道输尿管镜超声碎石取石术
KS007	输尿管结石	经尿道输尿管镜激光碎石取石术
KS008	输尿管结石	经尿道输尿管镜气压弹道碎石取石术
KS009	输尿管癌	经腹腔镜肾部分切除术
KS010	尿道下裂	尿道下裂阴茎下弯矫治术
KS011	尿道下裂	尿道下裂Ⅰ期成形术
KS012	尿道下裂	尿道下裂Ⅱ期成形术
KS013	终末期肾脏病	自体动静脉内瘘成形术
KS014	终末期肾脏病	血液透析

肾癌

根治性肾切除术

适用对象：	病种编码：	KS001	
主要诊断：	肾癌	ICD-10码：C64	
主要操作/主要治疗方式：	根治性肾切除术	CCHI码：HRB77301	
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：C64肾癌疾病编码，且没有瘤栓，没有转移。 2. 当患者合并其他疾病，但住院期间无需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 一般情况良好。 2. 切口愈合好。		
最短住院日参考值：	12天		
变异条件：	1. 术中、术后出现并发症，需要进一步诊治，导致住院时间延长、费用增加。 2. 术后原伴随疾病控制不佳，需请相关科室会诊，进一步诊治。 3. 住院后出现其他内、外科疾病需进一步明确诊断，可进入其他路径。		
再入院间隔时间：	3个月		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
III级护理	ACAA0001	I 级护理	ACAC0001	II 级护理	ACAB0001
检查		检查		/III级护理	ACAA0001
全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000			检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000或总胆红素(T-Bil)测定CELA1000或直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000或γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000或总蛋白(TP)测定CEAA8000或白蛋白(A1b)测定CEAE8000或碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000			尿常规化学分析	CCAA2000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000	麻醉		治疗	
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	全身麻醉	HAA42901		
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型) CAMA1000或ABO血型 鉴定(反定型)	腰部硬膜外连续阻滞 麻醉	HAC42110	药物	
乙型肝炎表面抗原定量 (HBsAg)测定	CGLH1000	手术		抗菌药物	
丙型肝炎抗体(抗HCV) 测定	CGMA1000	根治性肾切除术	HRB77301		
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	病理			
梅毒螺旋体抗体(抗TP) 测定	CGPP1000				
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测定 CAGC1000或血浆纤维 蛋白原测定 CAGD1000	药物			
胸部X线摄影	EABJT001	心脑血管药物			
十二导联常规心电图检查	FKA03703	抗菌药物			
治疗					
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
治疗		治疗		治疗	
胃管置管术	ABGB0001	静脉输血	ABCD0001		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
药物		药物		药物	
		抑酸剂		抑酸剂	

肾癌

经腹腔镜根治性肾切除术

适用对象：	病种编码：	KS002	
主要诊断：	肾癌	ICD-10码：C64	
主要操作/主要治疗方式：	经腹腔镜根治性肾切除术	CCHI码：HRB77501	
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：C64肾癌疾病编码。 2. 当患者合并其他疾病，但住院期间无需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 一般情况良好。 2. 切口愈合好。		
最短住院日参考值：	12天		
变异条件：	1. 术中、术后出现并发症，需要进一步诊治，导致住院时间延长、费用增加。 2. 术后原伴随疾病控制不佳，需请相关科室会诊，进一步诊治。 3. 住院后出现其他内、外科疾病需进一步明确诊断，可进入其他路径。		
再入院间隔时间：	3个月		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
III级护理	ACAA0001	I 级护理	ACAC0001	II 级护理	ACAB0001
检查		检查		/III级护理	ACAA0001
全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000			检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	麻醉		治疗	
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	全身麻醉	HAA42901		
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型) CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)	/腰部硬膜外连续阻滞麻醉	HAC42110	尿常规化学分析	CCAA2000
乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定	CGLH1000	手术		药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	经腹腔镜根治性肾切除术	HRB77501	抗菌药物	
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	病理			
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000或总胆红素(T-Bil)测定CELA1000或直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000或 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000或总蛋白(TP)测定CEAA8000或白蛋白(A1b)测定CEAE8000或碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	药物			
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	心脑血管药物			
胸部X线摄影	EABJT001	抗菌药物			
十二导联常规心电图检查	FKA03703				
治疗					
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
治疗		治疗		治疗	
胃管置管术	ABGB0001	静脉输血	ABCD0001		
药物		药物		药物	
		抑酸剂		抑酸剂	

膀胱肿瘤

膀胱部分切除术

适用对象：	病种编码：	KS003	
主要诊断：	膀胱肿瘤		ICD-10码：D30.3, D41
主要操作/主要治疗方式：	膀胱部分切除术		CCHI码：HRG73301
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：D30.3, D41.4, C67.0-C67.6, C67.8, 2. 当患者合并其他疾病诊断，但住院期间无需特殊处理也不影响进入路径。		
出院标准：	1. 一般情况良好。 2. 拔除尿管。		
最短住院日参考值：	8天		
变异条件：	1. 术中、术后出现并发症，需要进一步诊治，导致住院时间延长 2. 电切手术效果不满意，需进一步治疗（如膀胱全切、动脉化疗 3. 术后原伴随疾病控制不佳，需请相关科室会诊，进一步诊治。 4. 住院后出现其他内、外科疾病需进一步明确诊断，可进入其他		

再入院间隔时间：1个月

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后
基本项目				
护理		护理		护理
III级护理	ACAA0001	I级护理	ACAC0001	II级护理
检查		检查		检查
全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000			全血细胞计数+5分类检测
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		尿常规化学分析
肝功能检查	内氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000或总胆红素(T-Bil)测定CELA1000或直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000或γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000或总蛋白(TP)测定CEAA8000或白蛋白(A1b)测定CEAE8000或碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000			治疗
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	麻醉		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	全身麻醉	HAA42901	药物
乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定	CGLH1000	/腰部硬膜外连续阻滞麻醉	HAC42110	静脉补液
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	手术		抗菌药物
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	膀胱部分切除术	HRG73301	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	病理		
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	手术标本病理诊断	BCAD0001	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)			
胸部X线摄影	EABJT001	药物		
十二导常规心电图检查	FKA03703			
纤维膀胱镜检查	FRG01602			
治疗				
导尿管留置	ABHA0002			
药物				
抗菌药物				
选择项目				
因病情需要而选择的其他项目：				
检查		检查		检查
治疗		治疗		治疗
		静脉输血	ABCD0001	
药物		药物		药物

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后
		抗菌药物		抑制膀胱痉挛药
		抑酸剂		止血药物
		化疗药物		抑酸剂
		止血药物		膀胱灌注化疗药

. 4, C67. 0-C67. 6, C67. 8, C67. 9

. C67. 9膀胱肿瘤疾病编码。
第一诊断临床路径实施时，可以

、费用增加。
等）。

路径。

CCHI码
ACAB0001
CAAB1000
CCAA2000

[illegible]

CCHI码

膀胱肿瘤

经腹腔镜膀胱部分切除术

适用对象：	病种编码：	KS004			
	主要诊断：	膀胱肿瘤		ICD-10码：	D30. 3, D41. 4, C67. 0-C67. 6, C67. 8, C67. 9
	主要操作/主要治疗方式：	经腹腔镜膀胱部分切除术		CCHI码：	HRG73501
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：D30. 3, D41. 4, C67. 0-C67. 6, C67. 8, C67. 9膀胱肿瘤疾病编码。 2. 当患者合并其他疾病诊断，但住院期间无需特殊处理也不影响第一诊断临床路径实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 一般情况良好。 2. 拔除尿管。			
	最短住院日参考值：				
	变异条件：	1. 术中、术后出现并发症，需要进一步诊治，导致住院时间延长、费用增加。 2. 电切手术效果不满意，需进一步治疗（如膀胱全切、动脉化疗等）。 3. 术后原伴随疾病控制不佳，需请相关科室会诊，进一步诊治。 4. 住院后出现其他内、外科疾病需进一步明确诊断，可进入其他路径。			
	再入院间隔时间：	1个月			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
III级护理	ACAA0001	I 级护理	ACAC0001	II 级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000			全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		尿常规化学分析	CCAA2000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000或总胆红素(T-Bil)测定CELA1000或直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000或γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000或总蛋白(TP)测定CEAA8000或白蛋白(A1b)测定CEAE8000或碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000			治疗	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	麻醉			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	全身麻醉	HAA42901	药物	
乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定	CGLH1000	/腰部硬膜外连续阻滞麻醉	HAC42110	静脉补液	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	手术		抗菌药物	
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	经腹腔镜膀胱部分切除术	HRG73501		
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	病理			
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	手术标本病理诊断	BCAD0001		
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMP1000或ABO亚				
胸部X线摄影	EABJT001	药物			
十二导联常规心电图检查	FKA03703				
纤维膀胱镜检查	FRG01602				
治疗					
导尿管留置	ABHA0002				
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
治疗		治疗		治疗	
		静脉输血	ABCD0001		
药物		药物		药物	
		抗菌药物		抑制膀胱痉挛药	
		抑酸剂		止血药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
		化疗药物		抑酸剂	
		止血药物		膀胱灌注化疗药	

膀胱肿瘤

经尿道膀胱肿瘤电切治疗

适用对象：	病种编码：	KS005	
	主要诊断：	膀胱肿瘤	ICD-10码：D30. 3, D41. 4, C67. 0- C67. 6, C67. 8, C67. 9
	主要操作/主要治疗 方式：	经尿道膀胱肿瘤电切治疗	CCHI码：HRG73401
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：D30. 3, D41. 4, C67. 0-C67. 6, C67. 8, C67. 9膀胱肿瘤疾病编码。 2. 当患者合并其他疾病诊断，但住院期间无需特殊处理也不影响第一诊断临床路径实施时，可以进入路径。	
	出院标准：	1. 一般情况良好。 2. 拔除尿管。	
	最短住院日参考值：		
	变异条件：	1. 术中、术后出现并发症，需要进一步诊治，导致住院时间延长、费用增加。 2. 电切手术效果不满意，需进一步治疗（如膀胱全切、动脉化疗等）。 3. 术后原伴随疾病控制不佳，需请相关科室会诊，进一步诊治。 4. 住院后出现其他内、外科疾病需进一步明确诊断，可进入其他路径。	
	再入院间隔时间：	1个月	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
III级护理	ACAA0001	I 级护理	ACAC0001	II 级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000			全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		尿常规化学分析	CCAA2000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000或总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000或直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000或γ-谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000或总蛋白 (TP) 测定CEAA8000或白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000或碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000			治疗	
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000和尿酸 (UA) 测定 CEEE8000	麻醉			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	全身麻醉	HAA42901	药物	
乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定	CGLH1000	/腰部硬膜外连续阻滞麻醉	HAC42110	静脉补液	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	手术		抗菌药物	
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	经尿道膀胱肿瘤电切治疗	HRG73401		
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	病理			
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	手术标本病理诊断	BCAD0001		
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)				
胸部X线摄影	EABJT001	药物			
十二导联常规心电图检查	FKA03703				
纤维膀胱镜	FRG01602				
治疗					
导尿管留置	ABHA0002				
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
治疗		治疗		治疗	
		静脉输血	ABCD0001		
药物		药物		药物	
		抗菌药物		抑制膀胱痉挛药	
		抑酸剂		止血药物	
		化疗药物		抑酸剂	
		止血药物		膀胱灌注化疗药	

输尿管结石

经尿道输尿管镜超声碎石取石术

适用对象：	病种编码：	KS006			
	主要诊断：	输尿管结石		ICD-10码：	N20.1
	主要操作/主要治疗方式：	经尿道输尿管镜超声碎石取石术		CCHI码：	HRF65610
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：N20.1输尿管结石疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。				
出院标准：	1. 一般情况良好。 2. D-J管位置正常。				
最短住院日参考值：	≤7天				
变异条件：	1. 术中、术后出现并发症，需要进一步诊治，导致住院时间延长、费用增加。 2. 术后出现结石残留，需要进一步诊治，导致住院时间延长、费用增加。 3. 术后原伴随疾病控制不佳，需请相关科室会诊，进一步诊治。 4. 住院后出现其他内、外科疾病需进一步明确诊断，可进入其他路径。				
再入院间隔时间：	14天				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
III级护理	ACAA0001	I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001
检查		检查		II 级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	尿结石成份分析	CCBV2000	III级护理	ACAA0001
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		检查	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	静脉输液	ABCA0001	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	导尿管留置	ABHA0002	尿常规化学分析	CCAA2000
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000或肌酐(Cr)测定 CEEB8000或尿酸(UA)测定 CEEE8000	麻醉		腹部尿路X线摄影(KUB)	EABRA001
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙(Ca)测定 CEJF8000	硬膜外阻滞麻醉	骶管单次阻滞麻醉 HAC42104或颈部硬膜外单次阻滞麻醉 HAC42105或颈部硬膜外连续阻滞麻醉 HAC42106或胸部硬膜外单次阻滞麻醉 HAC42107或胸部硬膜外连续阻滞麻醉 HAC42108或腰部硬膜外单次阻滞麻醉 HAC42109或腰部硬膜外连续阻滞麻醉 HAC42110或骶管连续阻滞麻醉 HAC42111	治疗	
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定 CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定 CECC8000和总蛋白(TP)测定 CEAA8000和白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定 CECD8000	/全身麻醉	HAA42901		
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000	手术		药物	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	经尿道输尿管镜超声碎石取石术	HRF65610	抗菌药物	
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	病理			
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
胸部X线摄影	EABJT001	药物			
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703	麻醉药			
治疗					
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
泌尿系逆行	EACRA001				
治疗		治疗			
		静脉输血	ABCD0001	治疗	
药物		加压快速输血	ABCE0001		
抗生素					
解疼止痛药物		药物		药物	
		抗菌药物		预防结石及排石药物	
		抑酸剂		解疼阵痛药	

输尿管结石

经尿道输尿管镜激光碎石取石术

适用对象：	病种编码：	KS007			
	主要诊断：	输尿管结石		ICD-10码：	N20.1
	主要操作/主要治疗方式：	经尿道输尿管镜激光碎石取石术		CCHI码：	HRF65604
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：N20.1输尿管结石疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 一般情况良好。 2. D-J管位置正常。			
	最短住院日参考值：	≤7天			
	变异条件：	1. 术中、术后出现并发症，需要进一步诊治，导致住院时间延长、费用增加。 2. 术后出现结石残留，需要进一步诊治，导致住院时间延长、费用增加。 3. 术后原伴随疾病控制不佳，需请相关科室会诊，进一步诊治。 4. 住院后出现其他内、外科疾病需进一步明确诊断，可进入其他路径。			
	再入院间隔时间：	14天			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
III级护理	ACAA0001	I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001
检查		检查		II 级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	尿结石成份分析	CCBV2000	III级护理	ACAA0001
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		检查	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	静脉输液	ABCA0001	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	导尿管留置	ABHA0002	尿常规化学分析	CCAA2000
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEE8000或肌酐(Cr)测定CEEB8000或尿酸(UA)测定CEEE8000	麻醉		腹部尿路X线摄影(KUB)	EABRA001
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	硬膜外阻滞麻醉	骶管单次阻滞麻醉HAC42104或颈部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42105或颈部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42106或胸部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42107或胸部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42108或腰部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42109或腰部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42110或骶管连续阻滞麻醉HAC42111	治疗	
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	/全身麻醉	HAA42901		
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	手术		药物	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	经尿道输尿管镜激光碎石取石术	HRF65604	抗菌药物	
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	病理			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
胸部X线摄影	EABJT001	药物			
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	麻醉药			
治疗					
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
泌尿系逆行	EACRA001				
治疗		治疗			
		静脉输血	ABCD0001	治疗	
药物		加压快速输血	ABCE0001		
抗生素					
解疼止痛药物		药物		药物	
		抗菌药物		预防结石及排石药物	
		抑酸剂		解疼阵痛药	

输尿管结石

经尿道输尿管镜气压弹道碎石取石术

适用对象：	病种编码：	KS008			
	主要诊断：	输尿管结石		ICD-10码：	N20.1
	主要操作/主要治疗方式：	经尿道输尿管镜气压弹道碎石取石术		CCHI码：	HRF65607
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：N20.1输尿管结石疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 一般情况良好。 2. D-J管位置正常。			
	最短住院日参考值：	≤7天			
	变异条件：	1. 术中、术后出现并发症，需要进一步诊治，导致住院时间延长、费用增加。 2. 术后出现结石残留，需要进一步诊治，导致住院时间延长、费用增加。 3. 术后原伴随疾病控制不佳，需请相关科室会诊，进一步诊治。 4. 住院后出现其他内、外科疾病需进一步明确诊断，可进入其他路径。			
	再入院间隔时间：	14天			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
III级护理	ACAA0001	I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001
检查		检查		II 级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	尿结石成份分析	CCBV2000	III级护理	ACAA0001
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		检查	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	静脉输液	ABCA0001	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	导尿管留置	ABHA0002	尿常规化学分析	CCAA2000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000或肌酐 (Cr) 测定CEEB8000或尿酸 (UA) 测定CEEE8000	麻醉		腹部尿路X线摄影 (KUB)	EABRA001
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测定 CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测定 CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000	硬膜外阻滞麻醉	骶管单次阻滞麻醉 HAC42104或颈部硬膜 外单次阻滞麻醉 HAC42105或颈部硬膜 外连续阻滞麻醉 HAC42106或胸部硬膜 外单次阻滞麻醉 HAC42107或胸部硬膜 外连续阻滞麻醉 HAC42108或腰部硬膜 外单次阻滞麻醉 HAC42109或腰部硬膜 外连续阻滞麻醉 HAC42110或骶管连续 阻滞麻醉HAC42111	治疗	
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红 素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶 (GGT) 测 定CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和 白蛋白 (Alb) 测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶 (ALP) 测定 CECD8000	/全身麻醉	HAA42901		
乙型肝炎表面抗原 (抗 HBs) 测定	乙型肝炎表面抗原定 性 (HBsAg) 测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg) 测定 CGLH1000	手术		药物	
丙型肝炎抗 体 (抗HCV) 测定	CGMA1000	经尿道输尿管镜气压 弹道碎石取石术	HRF65607	抗菌药物	
人免疫缺陷 病毒抗体 (抗HIV) 测 定	CGMF1000	病理			
梅毒螺旋体 抗体 (抗TP) 测定	CGPP1000				
胸部X线摄 影	EABJT001	药物			
常规心电图 检查	单通道常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703	麻醉药			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
治疗					
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
泌尿系逆行	EACRA001				
治疗		治疗			
		静脉输血	ABCD0001	治疗	
药物		加压快速输血	ABCE0001		
抗生素					
解疼止痛药物		药物		药物	
		抗菌药物		预防结石及排石药物	
		抑酸剂		解疼阵痛药	

输尿管癌

经腹腔镜肾部分切除术

适用对象： 病种编码： KS009

主要诊断： 输尿管癌 ICD-10码： C66

主要操作/主要治疗方式： 经腹腔镜肾部分切除术 CCHI码:HRB73503

入院标准： 1. 第一诊断必须符合ICD-10：C66输尿管癌疾病编码。
2. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。

出院标准： 1. 伤口愈合好。
2. 一般情况好，没有需要住院处理的并发症。

最短住院日参考值： 10天

变异条件： 1. 术中、术后出现并发症，需要进一步诊治，导致住院时间延长、费用增加。
2. 术后原伴随疾病控制不佳，需请相关科室会诊，进一步诊治。
3. 住院后出现其他内、外科疾病需进一步明确诊断，可进入其他路径。

再入院间隔时间： 无

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查		/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			引流管护理	ACBK0001
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		检查	
粪便常规检查	CCCA3000	氧气吸入	ABJA0001	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	导尿管留置	ABHA0002	尿常规化学分析	CCAA2000
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	监测		肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO ₂)测定CEJD1000和总钙(Ca)测定CEJF8000	院内遥测心电监护	KKA28701	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	麻醉		电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO ₂)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	全身麻醉	HAA42901	葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000或 Rh血型c 抗原鉴定CAMH1000或 Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000或Rh血型e 抗原鉴定CAMK1000或 Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000	手术			
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	联合经尿道电切肾盂 癌根治术	HRC77801	治疗	
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000	病理		换药	换药(小)ABFA0001或 换药(中)ABFA0002或 换药(大)ABFA0003或 换药(特大)ABFA0004
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	冷冻切片病理诊断	BCBA0001	膀胱灌注	HRG48401
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	快速石蜡切片病理诊 断	BCBC0001	病理	
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	药物		手术标本病理诊断	BCAD0001
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	抗菌药物		免疫组织化学染色诊 断	BEBA0001
胸部X线摄影	EABJT001	静脉补液		药物	
常规心电图检查	单通通常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703			抗菌药物	
泌尿系B超检查	EDBRA001			静脉补液	
上腹部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBQT001				
盆腔X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBQU001				
电子膀胱镜检查	FRG01601				
/纤维膀胱镜检查	FRG01602				
膀胱镜尿道镜检查	FRG01603				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
普通病理会诊	疑难病理读片会诊 AADC0001或同步远程 病理会诊AADD0001或 非同步远程病理会诊 AADD0002				
治疗					
导尿管留置	ABHA0002				
一般灌肠	ABGE0001				
静脉采血	ABBB0001				
病理					
非妇科脱落 细胞学检查 与诊断	BBAC0001				
活检组织病 理诊断	BCAB0001				
药物					
抗菌药物					
静脉补液					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
肝胆胰脾B 超检查	EDBQT001	血气分析	CEJM1000		
肺通气功能 检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活 量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403或最大 通气量功能检查 FJE01404	治疗		血浆D-二聚体 (D- Dimer)测定	CAJY1000
弥散功能检 查	肺弥散功能检查-- 一口气法FJE01405或肺 弥散功能检查-重复 呼吸法FJE01406			治疗	
气道阻力测 定	FJB02401	病理		氧气吸入	ABJA0001
心功能测定	左心室收缩功能超声 测定EDFKJ001或左心 室舒张功能超声测定 EDFKJ002	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感 染标本冷冻切片病理 诊断BCBB0001	超声雾化吸入	ABKA0001
普通二维超 声心动图	EDFKA005	药物		空气压缩泵雾化吸入	ABKC0001
血浆D-二聚 体 (D- Dimer)测	CAJY1000	止血药物		蒸汽雾化吸入	ABKD0001
血气分析	CEJM1000			监测	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
运动心肺功能检查	FJE01702			院内遥测心电监护	KKA28701
泌尿系逆行X线造影	EACRA001			病理	
泌尿系统磁共振水成像(MRI)	ECARA001				
静脉肾盂X线造影	EACRC001			药物	
肾动态显像	EEBRB001			止痛药物	
经尿道输尿管镜检查	FRF01601			止血药物	
经尿道纤维输尿管镜检查	FRF01602			解痉药物	
经尿道电子输尿管镜检查	FRF01603			化疗药物	
经尿道输尿管镜活检术	FRF07601				
经膀胱镜活检术	FRG07601				
治疗					
药物					

尿道下裂

尿道下裂阴茎下弯矫治术

适用对象：	疾病编码：	KS010			
	主要诊断：	尿道下裂		ICD-10码：Q54.0-Q54.3, Q54.8, Q54.9	
	主要操作/主要治疗方式：	尿道下裂阴茎下弯矫治术		CCHI码：HRJ83323	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：Q54.0-Q54.3, Q54.8, Q54.9尿道下裂疾病编码。 2. 无需使用游离移植物的尿道下裂患儿，可以进入路径。 3. 已排除隐睾、性别畸形，可进行I期手术矫治的患儿，进入路径。 4. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 一般情况良好。 2. 没有需要住院处理的并发症。			
	最短住院日：	7-14天			
	变异条件：	1. 住院治疗期间，发现染色体异常，合并两性畸形患儿，进入其他路径。 2. 围手术期并发症等造成住院日延长和费用增加。 3. 术后有尿道痿等并发症，进入其他路径。			
	再入院间隔时间：	14天			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查		II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗			
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	导尿管留置	ABHA0002	治疗	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	麻醉		导尿管留置	ABHA0002

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	全身麻醉	HAA42901	换药	换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	/硬膜外阻滞麻醉麻醉	JAJ29106	药物	
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	手术		抗菌药物	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	尿道下裂阴茎下弯矫治术	HRJ83323		
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	药物			
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	抗菌药物			
胸部X线摄影	EABJT001	麻醉药			
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703				
治疗					
静脉采血	ABBB0001				
一般灌肠	ABGE0001				
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
C-反应蛋白(CRP)测定	CGCA1000			血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
泌尿系彩色多普勒超声检查	EDCRA001	治疗		尿常规化学分析	BABF201
人绒毛膜促性腺激素(HCG)兴奋试验	FDA04207	一般灌肠	ABGE0001	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000
普通二维超声心动图	EDFKA005	药物		治疗	
治疗		镇静药物			
		膀胱舒张药物		药物	
药物		新鲜血浆或止血药物			

尿道下裂

尿道下裂 I 期成形术

适用对象： 疾病编码： KS011

主要诊断： 尿道下裂

ICD-10码： Q54. 0-
Q54. 3, Q54. 8, Q54. 9

主要操作/主要治疗
方式： 尿道下裂 I 期成形术

CCHI码： HRJ83319

入院标准：
1. 第一诊断必须符合ICD-10： Q54. 0-Q54. 3, Q54. 8, Q54. 9尿道下裂疾病编码。
2. 无需使用游离移植物的尿道下裂患儿，可以进入路径。
3. 已排除隐睾、性别畸形，可进行I期手术矫治的患儿，进入路径。
4. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径实施时，可以进入路径。

出院标准：
1. 一般情况良好。
2. 没有需要住院处理的并发症。

最短住院日： 7-14天

变异条件：
1. 住院治疗期间，发现染色体异常，合并两性畸形患儿，进入其他路径。
2. 围手术期并发症等造成住院日延长和费用增加。
3. 术后有尿道痿等并发症，进入其他路径。

再入院间隔时间： 14天

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II 级护理	ACAB0001	I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001
检查		检查		II 级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群 检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分 类检测CAAB1000			检查	
尿常规化学 分析	CCAA2000	治疗			
凝血功能测 定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	导尿管留置	ABHA0002	治疗	
肾脏功能检 查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000	麻醉		换药	换药(中)ABFA0002或 换药(大)ABFA0003

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	全身麻醉	HAA42901	导尿管留置	ABHA0002
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	/硬膜外阻滞麻醉麻醉	JAJ29106	药物	
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	手术		抗菌药物	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	尿道下裂 I 期成形术	HRJ83319		
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	药物			
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	抗菌药物			
胸部X线摄影	EABJT001	麻醉药			
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703				
治疗					
静脉采血	ABBB0001				
一般灌肠	ABGE0001				
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
检查		检查		检查	
C-反应蛋白(CRP)测定	CGCA1000			血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
泌尿系彩色多普勒超声检查	EDCRA001	治疗		尿常规化学分析	BABF201
人绒毛膜促性腺激素(HCG)兴奋试验	FDA04207	一般灌肠	ABGE0001	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000
普通二维超声心动图	EDFKA005	药物		治疗	
治疗		镇静药物			
		膀胱舒张药物		药物	
药物		新鲜血浆或止血药物			

尿道下裂

尿道下裂Ⅱ期成形术

适用对象：	疾病编码：	KS012			
	主要诊断：	尿道下裂	ICD-10码：	Q54. 0- Q54. 3, Q54. 8, Q54. 9	
	主要操作/主要治疗 方式：	尿道下裂Ⅱ期成形术	CCHI码：	HRJ83320	
入院标准：		1. 第一诊断必须符合ICD-10：Q54. 0-Q54. 3, Q54. 8, Q54. 9尿道下裂疾病编码。 2. 无需使用游离移植物的尿道下裂患儿，可以进入路径。 3. 已排除隐睾、性别畸形，可进行I期手术矫治的患儿，进入路径。 4. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径实施时，可以进入路径。			
出院标准：		1. 一般情况良好。 2. 没有需要住院处理的并发症。			
最短住院日：		7-14天			
变异条件：		1. 住院治疗期间，发现染色体异常，合并两性畸形患儿，进入其他路径。 2. 围手术期并发症等造成住院日延长和费用增加。 3. 术后有尿道瘘等并发症，进入其他路径。			
再入院间隔时间：		14天			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
Ⅱ级护理	ACAB0001	Ⅰ级护理	ACAC0001	Ⅰ级护理	ACAC0001
检查		检查		Ⅱ级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群 检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分 类检测CAAB1000			检查	
尿常规化学 分析	CCAA2000	治疗			
凝血功能测 定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	导尿管留置	ABHA0002	治疗	
肾脏功能检 查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000	麻醉		导尿管留置	ABHA0002

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	全身麻醉	HAA42901	换药	换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	/硬膜外阻滞麻醉麻醉	JAJ29106	药物	
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	手术		抗菌药物	
内型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	尿道下裂Ⅱ期成形术	HRJ83320		
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	药物			
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	抗菌药物			
胸部X线摄影	EABJT001	麻醉药			
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703				
治疗					
静脉采血	ABBB0001				
一般灌肠	ABGE0001				
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
检查		检查		检查	
C-反应蛋白(CRP)测定	CGCA1000			血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
泌尿系彩色多普勒超声检查	EDCRA001	治疗		尿常规化学分析	BABF201
人绒毛膜促性腺激素(HCG)兴奋试验	FDA04207	一般灌肠	ABGE0001	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000
普通二维超声心动图	EDFKA005	药物		治疗	
治疗		镇静药物			
		膀胱舒张药物		药物	
药物		新鲜血浆或止血药物			

终末期肾脏病
自体动静脉内瘘成形术

适用对象：	病种编码：	KS013	
主要诊断：	终末期肾脏病	ICD-10码：N18.0	
主要操作/主要治疗方式：	自体动静脉内瘘成形术	CCHI码：HM983302	
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：N18.0 疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断时，但在住院期间不需要特殊处理，也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 伤口愈合好。 2. 无需要继续住院诊治的手术并发症/合并症。 3. 指导患者学会内瘘的保养（血液透析）。		
最短住院日参考值：	10天		
变异条件：	1. 有紧急透析指征的慢性肾脏病患者，需要紧急透析，不进入本路径。 2. 达到慢性肾脏病5期，但尿量不少、营养不良、没有症状，预计1年内不会进入透析者，不进入本路径。 3. 出现手术并发症，需要进行相关的诊断和治疗。 4. 伴有合并症时，需要进行相关的诊断和治疗。		
再入院间隔时间：	无		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001			I级护理	ACAC0001
检查		检查		II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	麻醉			
粪便常规检查	CCCA3000	局部麻醉	踝关节局部阻滞麻醉HAB42101或局部静脉内麻醉HAB42201	治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	手术		换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	自体动静脉内瘘成形术	HM983302	局部理疗	红外线局部照射治疗LEAYR001
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000或肌酐(Cr)测定CEEB8000或尿酸(UA)测定CEEE8000	治疗		药物	
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000			止痛药物	
血脂检查	甘油三酯(TG)测定CEHB1000和总胆固醇(TC)测定CEHA1000和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定CEHC1000和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定CEHD1000	药物		抗菌药物	
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	局部麻醉药		抗凝血药	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	抗凝血药		抗凝药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定 CGLK1000或乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	生理盐水			
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000				
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
胸部X线摄影	EABJT001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703				
普通二维超声心动图	EDFKA005				
上肢动脉彩色多普勒超声检查	EDCL3001				
上肢静脉彩色多普勒超声检查	上肢深静脉彩色多普勒超声检查EDCMH001或上肢浅静脉彩色多普勒超声检查EDCMG001				
治疗					
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
上肢静脉切开造影术	EACMF002				
治疗		治疗		治疗	
		静脉输血	ABCD0001		
药物		药物		药物	
抗菌药物					

终末期肾脏病
血液透析

适用对象：	病种编码：	KS014			
	主要诊断：	终末期肾脏病		ICD-10：	N18.0
	主要操作/主要治疗方式：	血液透析		CCHI码：	KRZ22201
进入标准：		1. 第一诊断必须符合ICD-10：N18.0疾病编码。 2. 符合血液透析适应证。 3. 当患者同时具有其他疾病诊断，但不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。 4. 做血液透析滤过等其他净化方式的，不进入路径。			
出血液透析标准：		无			
维持透析计算周期，时间参考值：		三月			
变异条件：		1. 病情需要进行其他方式的血液净化治疗（如高通量血液透析、血液滤过、血液透析滤过、血液灌流等）。 2. 转为其他的治疗方式（腹膜透析、肾移植等）。 3. 需要增加透析次数。 4. 伴有其他疾病时，需要进行相关的诊断和治疗。 5. 有紧急透析指征的慢性肾脏病患者，需要紧急透析。 6. 各种原因终止治疗。			
再入院间隔时间：		无			

透析前	CCHI码	透析中	CCHI码	透析后	CCHI码
基本项目					
护理（每周平均3次，每三月36次）		护理（每周平均3次，每三月36次）		检查	
I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001	电解质测定（三次）	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000和无机磷(P)测定CEKA8000
静脉置管护理	ACBG0002	静脉置管护理	ACBG0002	肾脏功能检查（三次）	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000
检查		治疗（每周平均3次，每三月36次）		治疗	
血常规（三次）	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血液透析	KRZ22201		

透析前	CCHI码	透析中	CCHI码	透析后	CCHI码
肾脏功能检查（三次）	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000	药物		药物	
电解质测定（三次）	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000 和无机磷(P)测定 CEKA8000	抗凝剂			
肝功能检查（三次）	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和γ-谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000				
葡萄糖 (Glu)测定 (三次)	CEFA8000				
血脂检查 (三次)	甘油三酯(TG)测定 CEHB1000和总胆固醇 (TC)测定CEHA1000和 高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)测定 CEHC1000和低密度脂 蛋白胆固醇(LDL-C) 测定CEHD1000				
C-反应蛋白 (CRP)测定 (三次)	CGCA1000				
甲状旁腺激 素(PTH)测 定	CEQR1000				
铁四项	铁蛋白(Fer)测定 CEAK1000和铁(Fe)测 定CEKB1000和总铁结 合力(TIBC)测定 CEAP1000和转铁蛋白 (TF)测定CEAL8000				
叶酸(FA)测 定	CEMA1000				
维生素 B12(VitB1 2)测定	CEMD1000				

透析前	CCHI码	透析中	CCHI码	透析后	CCHI码
药物					
降压药物					
促红细胞生成素					
铁剂					
降磷药					
维生素类药					
钙敏感受体激动剂					
酸碱平衡调节药					
利尿药					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸扩增定量检测	CLAK8000				
丙型肝炎病毒核糖核酸扩增定量检测	CLAQ8000	治疗		治疗	
心脏彩超多普勒超声（病情平稳时，每年一次）	EDFKA007				
乙肝五项（每半年一次）	乙型肝炎表面抗原定性(抗HBs)测定 CGLK1000和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定 CGLL1000和乙型肝炎e抗原定性(HBeAg)测定 CGLM1000和乙型肝炎e抗体(HBeAb)测定 CGLP1000和乙型肝炎核心抗体(抗HBc)测定 CGLS1000	监测			
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定（每半年一次）	CGMA1000	在线血透监测	FRZ05201		
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定（每半年一次）	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定（每半年一次）	CGPP1000				
治疗					

透析前	CCHI码	透析中	CCHI码	透析后	CCHI码

十二、男性生殖系统疾病

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
LS001	良性前列腺增生	经尿道膀胱镜前列腺电切术
LS002	良性前列腺增生	经尿道前列腺激光气化切除术
LS003	肾结石	经皮肾镜超声碎石取石术
LS004	精索静脉曲张	精索静脉曲张高位结扎术
LS005	精索静脉曲张	经腹腔镜精索静脉曲张高位结扎术
LS006	睾丸鞘膜积液	睾丸鞘膜翻转术
LS007	隐睾（睾丸可触及）	隐睾下降固定术
LS008	隐睾（睾丸可触及）	经腹腔镜隐睾下降固定术
LS009	前列腺癌	保留神经前列腺癌根治术

良性前列腺增生

经尿道膀胱镜前列腺电切术

适用对象：	病种编码：	LS001	
	主要诊断：	良性前列腺增生	ICD-10码：N40. x00
	主要操作/主要治疗方式：	经尿道膀胱镜前列腺电切术	CCHI码：HSK73601
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：N40. x00良性前列腺增生疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 一般情况良好。 2. 拔除尿管后，排尿通畅。 3. 耻骨上造瘘口无漏尿。		
最短住院日参考值：			
变异条件：	1. 术中、术后出现并发症，需要进一步诊治，导致住院时间延长、费用增加。 2. 术后出现排尿功能异常，需要进一步诊治，导致住院时间延长、费用增加。 3. 术后原伴随疾病控制不佳，需请相关科室会诊，进一步诊治。 4. 住院后出现其他内、外科疾病需进一步明确诊断，可进入其他路径。		
再入院间隔时间：	6个月		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
III级护理	ACAA0001	I 级护理	ACAC0001	II 级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000			全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		尿常规化学分析	CCAA2000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000或总胆红素(T-Bil)测定CELA1000或直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000或γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000或总蛋白(TP)测定CEAA8000或白蛋白(A1b)测定CEAE8000或碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000			治疗	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	麻醉		换药(大)	ABFA0003
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	全身麻醉	HAA42901	膀胱冲洗	膀胱冲洗ABHB0001或持续膀胱冲洗ABHB0002
ABO血型鉴定(正定型)	CAMA1000	/腰部硬膜外连续阻滞麻醉	HAC42110	静脉输液	ABCA0001
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	手术		药物	
乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定	CGLH1000	经尿道膀胱镜前列腺电切术	HSK73601	抗菌药物	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	病理			
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	手术标本病理诊断	BCAD0001		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	药物			
胸部X线摄影	EABJT001	抗菌药物			
十二通道常规心电图检查	FKA03703				
治疗					
导尿管留置	ABHA0002				
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
治疗		治疗		治疗	
		静脉输血	ABCD0001		
药物		药物		药物	
		抑制膀胱痉挛药		抑制膀胱痉挛药	
		止血药物		止血药物	
		抑酸剂		抑酸剂	

良性前列腺增生

经尿道前列腺激光气化切除术

适用对象：	病种编码：	LS002	
	主要诊断：	良性前列腺增生	ICD-10码：N40
	主要操作/主要治疗方式：	经尿道前列腺激光气化切除术	CCHI码：HSK73401
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：N40良性前列腺增生疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。	
	出院标准：	1. 一般情况良好。 2. 拔除尿管后，排尿通畅。 3. 耻骨上造瘘口无漏尿。	
	最短住院日参考值：	10天	
	变异条件：	1. 术中、术后出现并发症，需要进一步诊治，导致住院时间延长、费用增加。 2. 术后出现排尿功能异常，需要进一步诊治，导致住院时间延长、费用增加。 3. 术后原伴随疾病控制不佳，需请相关科室会诊，进一步诊治。 4. 住院后出现其他内、外科疾病需进一步明确诊断，可进入其他路径。	
	再入院间隔时间：	6个月	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
III级护理	ACAA0001	I 级护理	ACAC0001	II 级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000			全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		尿常规化学分析	CCAA2000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000或总胆红素(T-Bil)测定CELA1000或直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000或γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000或总蛋白(TP)测定CEAA8000或白蛋白(A1b)测定CEAE8000或碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000			治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000	麻醉		换药(大)	ABFA0003
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	全身麻醉	HAA42901	膀胱冲洗	膀胱冲洗ABHB0001或 持续膀胱冲洗 ABHB0002
ABO血型鉴定(正定 型)	CAMA1000	/腰部硬膜外连续阻 滞麻醉	HAC42110	静脉输液	ABCA0001
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	手术		药物	
乙型肝炎表面抗原定 量(HBsAg)测定	CGLH1000	经尿道前列腺激光气 化切除术	HSK73401	抗菌药物	
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	病理			
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	手术标本病理诊断	BCAD0001		
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000	药物			
胸部X线摄影	EABJT001	抗菌药物			
十二通道常规心电图 检查	FKA03703				
治疗					
导尿管留置	ABHA0002				
药物					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
治疗		治疗		治疗	
		静脉输血	ABCD0001		
药物		药物		药物	
		抑制膀胱痉挛药		抑制膀胱痉挛药	
		止血药物		止血药物	
		抑酸剂		抑酸剂	

肾结石

经皮肾镜超声碎石取石术

适用对象：	病种编码：	LS003
主要诊断：	肾结石	ICD-10码：N20.0
主要操作/主要治疗方式：	经皮肾镜超声碎石取石术	CCHI码：HRB65506
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：N20.0肾结石疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。	
出院标准：	1. 一般情况良好。 2. 肾造瘘无漏尿。 3. D-J管位置正常。	
最短住院日参考值：	10天	
变异条件：	1. 术中、术后出现并发症，需要进一步诊治，导致住院时间延长、费用增加。 2. 术后出现结石残留，需要进一步诊治，导致住院时间延长、费用增加。 3. 术后原伴随疾病控制不佳，需请相关科室会诊，进一步诊治。 4. 住院后出现其他内、外科疾病需进一步明确诊断，可进入其他路径。	
再入院间隔时间：	3个月	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
III级护理	ACAA0001	I 级护理	ACAC0001	II 级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000			全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		尿常规化学分析	CCAA2000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000或总胆红素(T-Bil)测定CELA1000或直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000或 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000或总蛋白(TP)测定CEAA8000或白蛋白(A1b)测定CEAE8000或碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	肾造瘘术	HRB50301	治疗	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	静脉输液	ABCA0001	静脉输液	ABCA0001
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO ₂)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	麻醉		药物	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000	全身麻醉	HAA42901	抗菌药物	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	/腰部硬膜外连续阻滞麻醉	HAC42110		
乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定	CGLH1000	手术			
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	经皮肾镜超声碎石取石术	HRB65506		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	病理			
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
胸部X线摄影	EABJT001	药物			
十二通道常规心电图检查	FKA03703	抗菌药物			
治疗					
导尿管留置	ABHA0002				
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
肾图检查	EEGRB001			尿结石成份分析	CCBV2000
治疗		治疗		治疗	
药物		药物		药物	
		抑酸剂		止血药物	
				抑酸剂	

精索静脉曲张

精索静脉曲张高位结扎术

适用对象：	病种编码：	LS004			
	主要诊断：	精索静脉曲张	ICD-10码：	I86.101	
	主要操作/主要治疗方式：	精索静脉曲张高位结扎术	CCHI码：	HSH59301	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：I86.101单侧精索静脉曲张疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 一般情况良好。 2. 伤口愈合好。			
	最短住院日参考值：	5天			
	变异条件：	1. 术中、术后出现并发症，需要进一步诊治，导致住院时间延长、费用增加。 2. 术后原伴随疾病控制不佳，需请相关科室会诊，进一步诊治。 3. 住院后出现其他内、外科疾病需进一步明确诊断，可进入其他路径。			
	再入院间隔时间：	6个月			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
III级护理	ACAA0001	I 级护理	ACAC0001	II 级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000				
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		治疗	
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000或总胆红素(T-Bil)测定CELA1000或直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000或γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000或总蛋白(TP)测定CEAA8000或白蛋白(A1b)测定CEAE8000或碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000	麻醉		药物	
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测 定CEJC8000和总二氧 化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测 定CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000	腰部硬膜外连续阻滞 麻醉	HAC42110	静脉补液	
血型鉴定	ABO血型鉴定 (正定 型) CAMA1000	手术			
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间 (APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间 (PT) 测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	精索静脉曲张高位结 扎术	HSH59301		
胸部X线摄影	EABJT001	药物			
十二通道常规心电图 检查	FKA03703				
乙型肝炎表面抗原定 量 (HBsAg) 测定	CGLH1000				
丙型肝炎抗体 (抗 HCV) 测定	CGMA1000				
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV) 测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体 (抗 TP) 测定	CGPP1000				
治疗					
导尿管留置	ABHA0002				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
精液常规检查	CCEL5000				
治疗		治疗		治疗	
药物		药物		药物	
				止血药物	
				抑酸剂	

精索静脉曲张

经腹腔镜精索静脉曲张高位结扎术

适用对象：	病种编码：	LS005		
	主要诊断：	精索静脉曲张	ICD-10码：	I86.101
	主要操作/主要治疗方式：	经腹腔镜精索静脉曲张高位结扎术	CCHI码：	HSH59501
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：I86.101单侧精索静脉曲张疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
	出院标准：	1. 一般情况良好。 2. 伤口愈合好。		
	最短住院日参考值：	5天	1. 不中、不后出现并发症，需要进一步诊治，导致住院时间延长、费用增加。 2. 术后原伴随疾病控制不佳，需请相关科室会诊，进一步诊治。	
	变异条件：	3. 住院后出现其他内、外科疾病需进一步明确诊断，可进入其他路径。		
	再入院间隔时间：	6个月		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
III级护理	ACAA0001	I 级护理	ACAC0001	II 级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
全血细胞计数+5分类检测	CAAB1000				
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		治疗	
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000或总胆红素(T-Bil)测定CELA1000或直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000或γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000或总蛋白(TP)测定CEAA8000或白蛋白(A1b)测定CEAE8000或碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEE8000和肌酐 (Cr) 测定CEE8000和尿酸 (UA) 测定CEE8000	麻醉		药物	
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测 定CEJC8000和总二氧化 碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测 定CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000	全身麻醉	HAA42901	静脉补液	
血型鉴定	ABO血型鉴定 (正定 型) CAMA1000	手术			
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间 (APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间 (PT) 测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	经腹腔镜精索静脉曲 张高位结扎术	HSH59501		
胸部X线摄影	EABJT001	药物			
十二通道常规心电图 检查	FKA03703				
乙型肝炎表面抗原定 量 (HBsAg) 测定	CGLH1000				
丙型肝炎抗体 (抗 HCV) 测定	CGMA1000				
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV) 测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体 (抗 TP) 测定	CGPP1000				
治疗					
导尿管留置	ABHA0002				
药物					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
精液常规检查	CCEL5000				
治疗		治疗		治疗	
药物		药物		药物	
				止血药物	
				抑酸剂	

睾丸鞘膜积液

睾丸鞘膜翻转术

适用对象：	病种编码：	LS006			
	主要诊断：	睾丸鞘膜积液	ICD-10码：	P83. 5, N43. 0-N43. 3	
	主要操作/主要治疗方式：	睾丸鞘膜翻转术	CCHI码：	HSB70301	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10码:P83. 5, N43. 0-N43. 3睾丸鞘膜积液疾病编码。 2. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 一般情况良好。 2. 伤口无异常。			
	最短住院日参考值：	5天（术后最短2天）			
	变异条件：	1. 术中、术后出现并发症，需要进一步诊治，导致住院时间延长、费用增加。 2. 术后原伴随疾病控制不佳，需请相关科室会诊，进一步诊治。 3. 住院后出现其他内、外科疾病需进一步明确诊断，可进入其他路径。			
	再入院间隔时间：	6个月			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II 级护理	ACAB0001	I 级护理	ACAC0001	II 级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000				
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)测定 CECB1000 和总胆红素 (T-Bil)测定CELA1000 和直接胆红素 (D-Bil)测定CELB1000 和γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)测定 CECC8000 和总蛋白 (TP)测定 CEAA8000 和白蛋白 (A1b)测定 CEAE8000 和碱性磷酸酶 (ALP)测定CECD8000	导尿管留置	ABHA0002	换药	换药 (小) ABFA0001 或换药 (中) ABFA0002 或换药 (大) ABFA0003
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000 和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000 和尿酸 (UA) 测定 CEEE8000	氧气吸入	ABJA0001	监测	
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000 和氯 (Cl) 测定 CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2) 测定CEJD1000 和镁 (Mg) 测定 CEJE8000 和总钙 (Ca) 测定 CEJF8000	/氧气雾化吸入	ABKB0001		
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定 CAGA1000 或活化部分凝血活酶时间 (APTT) 测定 CAGB1000 或血浆凝血酶原时间 (PT) 测定CAGC1000 或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	静脉输液	ABCA0001	药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000 或RhD血型鉴定CAMF1000	导尿	ABHA0001		
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000 或 Rh血型c抗原鉴定CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	经口气管插管术	HAM62401		
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000 和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000 和乙肝病毒表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定CGLJ1000 和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000 和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	无创呼吸机辅助通气	KJA21401		
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	监测			
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902		
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	检测仪中心静脉压测定	FKA02203		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000	无创心电图监测	院内遥测心电监护 KKA28701或无创心电图监测FKA05705		
胸部X线摄影	EABJT001	有创连续动脉血压监测	HAN05201		
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701 或多通道常规心电图检查FKA03702 或十二通道常规心电图检查FKA03703	无创血压监测	FKA05709		
治疗		无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710		
一般灌肠	ABGE0001	术中体温监测	HAN05702		
药物		麻醉恢复室监护	HAP28901		
		麻醉深度电生理监测	HAP05902		
		麻醉			
		全身麻醉	HAA42901		
		腰麻复合连续硬膜外阻滞麻醉	HAC42103		
		手术			
		睾丸鞘膜翻转术	HSB70301		
		病理			
		药物			
		抗菌药物			
		胃粘膜保护剂			
		麻醉药			
选择项目					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
男性生殖系统彩色多普勒超声检查	EDCSA001				
治疗		治疗		治疗	
		静脉输血	ABCD0001		
药物		加压快速输血	ABCE0001	药物	
		监测			
		药物			

隐睾（睾丸可触及）
睾丸下降固定术

适用对象：	病种编码：	LS007			
	主要诊断：	隐睾（睾丸可触及）	ICD-10码：	Q53. 1, Q53. 2, Q53. 9	
	主要操作/主要治疗方式：	隐睾下降固定术	CCHI码：	HSB71302	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10码：Q53. 1, Q53. 2, Q53. 9隐睾或睾丸下降不全（不包括腹内睾丸下降不全）疾病编码。 2. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需特殊处理，也不影响第一诊断的临床路径实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 患儿体温、饮食、排便正常。 2. 患儿体格检查睾丸位于阴囊内，阴囊无明显肿胀，伤口无渗血等。			
	最短住院日参考值：	3天（术后最短2天）			
	变异条件：	精索紧，经充分游离，睾丸仍然无法下降至阴囊底部，可将睾丸先固定于可以到达的最低位，6 - 12个月后行二期手术。			
	再入院间隔时间：	6个月			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
Ⅱ级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	Ⅱ级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)测定 CECB1000 和总胆红素 (T-Bil)测定CELA1000 和直接胆红素 (D-Bil)测定CELB1000 和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT)测定 CECC8000 和总蛋白 (TP)测定 CEAA8000 和白蛋白 (A1b)测定 CEAE8000 和碱性磷酸酶 (ALP)测定CECD8000	治疗		治疗	
肾脏功能检查	尿素 (Urea)测定 CEEA8000 和肌酐 (Cr)测定 CEEB8000 和尿酸 (UA)测定 CEEE8000	导尿管留置	ABHA0002	换药	换药 (小) ABFA0001 或换药 (中) ABFA0002 或换药 (大) ABFA0003
电解质测定	钾 (K)测定CEJA8000 和钠 (Na)测定 CEJB8000 和氯 (Cl)测定 CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2)测定CEJD1000 和镁 (Mg)测定 CEJE8000 和总钙 (Ca)测定 CEJF8000	氧气吸入	ABJA0001	监测	
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT)测定 CAGA1000 或活化部分凝血活酶时间 (APTT)测定 CAGB1000 或血浆凝血酶原时间 (PT)测定CAGC1000 或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	氧气雾化吸入	ABKB0001		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000 或RhD血型鉴定CAMF1000	静脉输液	ABCA0001	药物	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000 或 Rh血型c抗原鉴定CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	导尿	ABHA0001		
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000 和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000 和乙肝病毒表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定CGLJ1000 和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000 和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	经口气管插管术	HAM62401		
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	无创呼吸机辅助通气	KJA21401		
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	监测			
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902		
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000	检测仪中心静脉压测定	FKA02203		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
胸部X线摄影	EABJT001	无创心电监测	院内遥测心电监护 KKA28701 或无创心电监测 FKA05705		
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701 或多通道常规心电图检查FKA03702 或十二通道常规心电图检查FKA03703	/有创连续动脉血压监测	HAN05201		
腹股沟超声	腹股沟淋巴结彩色多普勒超声检查 EDCNK001 或腹股沟淋巴结B超检查 EDBNK001	无创血压监测	FKA05709		
男性生殖系统彩色多普勒超声检查	EDCSA001	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710		
治疗		术中体温监测	HAN05702		
一般灌肠	ABGE0001	麻醉恢复室监护	HAP28901		
药物		麻醉深度电生理监测	HAP05902		
		麻醉			
		全身麻醉	HAA42901		
		腰麻复合连续硬膜外阻滞麻醉	HAC42103		
		手术			
		隐睾下降固定术	HSB71302		
		病理			
		药物			
		抗菌药物			
		胃粘膜保护剂			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
		麻醉药			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
尿常规化学分析	CCAA2000				
普通二维超声心动图	EDFKA005	治疗		治疗	
治疗		静脉输血	ABCD0001	静脉输血	ABCD0001
		加压快速输血	ABCE0001	加压快速输血	ABCE0001
药物		监测		药物	
		药物			

隐睾（睾丸可触及）

经腹腔镜隐睾下降固定术

适用对象：	病种编码：	LS008			
	主要诊断：	隐睾（睾丸可触及）	ICD-10码：	Q53. 1, Q53. 2, Q53. 9	
	主要操作/主要治疗方式：	经腹腔镜隐睾下降固定术	CCHI码：	HSB71501	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10码：Q53. 1, Q53. 2, Q53. 9隐睾或睾丸下降不全（不包括腹内睾丸下降不全）疾病编码。 2. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需特殊处理，也不影响第一诊断的临床路径实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 患儿体温、饮食、排便正常。 2. 患儿体格检查睾丸位于阴囊内，阴囊无明显肿胀，伤口无渗血等。			
	最短住院日参考值：	3天（术后最短2天）			
	变异条件：	精索紧，经充分游离，睾丸仍然无法下降至阴囊底部，可将睾丸先固定于可以到达的最低位，6 - 12个月后行二期手术。			
	再入院间隔时间：	6个月			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
Ⅱ级护理	ACAB0001	Ⅰ级护理	ACAC0001	Ⅱ级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶 (AST)测定 CECB1000 和总胆红素 (T-Bil) 测定CELA1000 和直接胆红素 (D- Bil)测定CELB1000 和γ-谷氨酰基转移 酶 (GGT)测定 CECC8000 和总蛋白 (TP)测定 CEAA8000 和白蛋白 (Alb)测定 CEAE8000 和碱性磷酸酶 (ALP) 测定CECD8000	治疗		治疗	
肾脏功能检查	尿素 (Urea)测定 CEEA8000 和肌酐 (Cr)测定 CEEB8000 和尿酸 (UA)测定 CEEE8000	导尿管留置	ABHA0002	换药	换药 (小) ABFA0001 或换药 (中) ABFA0002 或换药 (大) ABFA0003
电解质测定	钾 (K)测定CEJA8000 和钠 (Na)测定 CEJB8000 和氯 (Cl)测定 CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2) 测定CEJD1000 和镁 (Mg)测定 CEJE8000 和总钙 (Ca)测定 CEJF8000	氧气吸入	ABJA0001	监测	
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT)测定 CAGA1000 或活化部分凝血活酶 时间 (APTT)测定 CAGB1000 或血浆凝血酶原时间 (PT)测定CAGC1000 或血浆纤维蛋白原测 定CAGD1000	/氧气雾化吸入	ABKB0001		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000 或RhD血型鉴定CAMF1000	静脉输液	ABCA0001	药物	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000 或 Rh血型c抗原鉴定CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	导尿	ABHA0001		
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000 和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000 和乙肝病毒表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定CGLJ1000 和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000 和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	经口气管插管术	HAM62401		
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	无创呼吸机辅助通气	KJA21401		
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	监测			
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000	检测仪中心静脉压测定	FKA02203		
胸部X线摄影	EABJT001	无创心电图监测	院内遥测心电监护 KKA28701 或无创心电图监测 FKA05705		
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701 或多通道常规心电图检查FKA03702 或十二通道常规心电图检查FKA03703	/有创连续动脉血压监测	HAN05201		
腹股沟超声	腹股沟淋巴结彩色多普勒超声检查 EDCNK001或腹股沟淋巴结B超检查 EDBNK001	无创血压监测	FKA05709		
男性生殖系统彩色多普勒超声检查	EDCSA001	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710		
治疗		术中体温监测	HAN05702		
一般灌肠	ABGE0001	麻醉恢复室监护	HAP28901		
药物		麻醉深度电生理监测	HAP05902		
		麻醉			
		全身麻醉	HAA42901		
		手术			
		经腹腔镜隐睾下降固定术	HSB71501		
		病理			
		药物			
		抗菌药物			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
		胃粘膜保护剂			
		麻醉药			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
尿常规化学分析	CCAA2000				
普通二维超声心动图	EDFKA005	治疗		治疗	
治疗		静脉输血	ABCD0001	静脉输血	ABCD0001
		加压快速输血	ABCE0001	加压快速输血	ABCE0001
药物		监测		药物	
		药物			

前列腺癌

保留神经前列腺癌根治术

适用对象：	病种编码：	LS009			
	主要诊断：	前列腺癌		ICD-10码：	C61
	主要操作/主要治疗方式：	保留神经前列腺癌根治术		CCHI码：	HSK77303
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10:C61前列腺癌疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 伤口愈合好。 2. 一般情况良好，没有需要住院处理的并发症。			
	最短住院日参考值：	17天			
	变异条件：	1. 术中、术后出现并发症，需要进一步诊治，导致住院时间延长、费用增加。 2. 术后原伴随疾病控制不佳，需请相关科室会诊和治疗，进一步诊治。 3. 住院后出现其他内、外科疾病需进一步明确诊断，可进入其他路径。 4. 曾行前列腺放疗或经尿道电切手术的患者不进入本路径。			
	再入院间隔时间：	无			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查		/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			引流管护理	ACBK0001
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		检查	
粪便常规检查	CCCA3000	氧气吸入	ABJA0001	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT)测定 CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和白蛋白 (A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP)测定 CECD8000	导尿管留置	ABHA0002	尿常规化学分析	CCAA2000
肾脏功能检查	尿素 (Urea)测定 CEEA8000和肌酐 (Cr)测定 CEEB8000和尿酸 (UA)测定 CEEE8000	监测		肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT)测定 CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和白蛋白 (A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP)测定 CECD8000
电解质测定	钾 (K)测定CEJA8000和钠 (Na)测定 CEJB8000和氯 (Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2)测定 CEJD1000和镁 (Mg)测定 CEJE8000和总钙 (Ca)测定 CEJF8000	院内遥测心电监护	KKA28701	肾脏功能检查	尿素 (Urea)测定 CEEA8000和肌酐 (Cr)测定 CEEB8000和尿酸 (UA)测定 CEEE8000
葡萄糖 (Glu)测定	CEFA8000	麻醉		电解质测定	钾 (K)测定CEJA8000和钠 (Na)测定 CEJB8000和氯 (Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2)测定 CEJD1000和镁 (Mg)测定 CEJE8000和总钙 (Ca)测定 CEJF8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	全身麻醉	HAA42901	葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000或Rh血型c抗原鉴定CAMH1000或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	/腰麻复合连续硬膜外阻滞麻醉	HAC42103	治疗	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	手术		换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000	保留神经前列腺癌根治术	HSK77303	病理	
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	病理		手术标本病理诊断	BCAD0001
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	冷冻切片病理诊断	BCBA0001	免疫组织化学染色诊断	BEBA0001
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	药物		药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	抗菌药物		抗菌药物	
总前列腺特异性抗原(TPSA)测定	CGRD1000	静脉补液		静脉补液	
游离前列腺特异性抗原(FPSA)测定	CGRE1000				
胸部X线摄影	EABJT001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703				
前列腺磁共振成像	ECASK001				
单脏器灌注磁共振成像	ECCZX002				
磁共振单脏器弥散加权成像	ECCZX003				
磁共振单脏器磁敏感加权成像	ECCZX004				
经直肠B超常规检查	EDBQT005				
泌尿系B超检查	EDBRA001				
膀胱残余尿量B超测定	EDBRG001				
前列腺指检	FSK01401				
经直肠前列腺穿刺活检术	FSK07101				
普通病理会诊	疑难病理读片会诊AADCO001或同步远程病理会诊AADD0001或非同步远程病理会诊AADD0002				
治疗					
导尿管留置	ABHA0002				
一般灌肠	ABGE0001				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
静脉采血	ABBB0001				
胃管置管术	ABGB0001				
病理					
穿刺组织活检病理诊断	BCAA0001				
药物					
抗菌药物					
静脉补液					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	血气分析	CEJM1000	血浆D-二聚体 (D-Dimer)测定	CAJY1000
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404	治疗		总前列腺特异性抗原 (TPSA)测定	CGRD1000
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一口气法FJE01405或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406			治疗	
气道阻力测定	FJB02401	病理		换药 (特大)	ABFA0004
心功能测定	左心室收缩功能超声测定EDFKJ001或左心室舒张功能超声测定EDFKJ002	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断BCBA0001或特异性感染标本冷冻切片病理诊断BCBB0001	氧气吸入	ABJA0001
普通二维超声心动图	EDFKA005	药物		超声雾化吸入	ABKA0001
血浆D-二聚体 (D-Dimer)测定	CAJY1000	止血药物		空气压缩泵雾化吸入	ABKC0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血气分析	CEJM1000			蒸汽雾化吸入	ABKD0001
运动心肺功能检查	FJE01702			监测	
全身骨显像	EEAX6004			院内遥测心电监护	KKA28701
经会阴前列腺穿刺活检术	FSK07102			病理	
治疗					
				药物	
药物				止痛药物	
内分泌治疗药物				止血药物	
				内分泌治疗药物	
				解痉药物	
				对症治疗药物	

十三、女性生殖系统疾病

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
MS001	子宫腺肌病	经腹子宫腺肌病灶切除术
MS002	子宫腺肌病	经腹腔镜子宫腺肌病灶切除术
MS003	卵巢良性肿瘤	经腹单侧卵巢囊肿剥除术
MS004	卵巢良性肿瘤	经腹腔镜单侧卵巢囊肿剥除术
MS005	卵巢良性肿瘤	经腹单侧卵巢切除术
MS006	卵巢良性肿瘤	经腹腔镜单侧卵巢切除术
MS007	输卵管妊娠	经腹单侧输卵管切除术
MS008	输卵管妊娠	经腹腔镜单侧输卵管切除术
MS009	输卵管妊娠	经腹单侧输卵管开窗术
MS010	输卵管妊娠	经腹腔镜单侧输卵管开窗术
MS011	子宫平滑肌瘤	经腹全子宫切除术
MS012	子宫平滑肌瘤	经腹腔镜全子宫切除术
MS013	子宫平滑肌瘤	经阴道全子宫切除术
MS014	子宫平滑肌瘤	经腹子宫次全切除术
MS015	子宫平滑肌瘤	腹腔镜联合阴式全子宫切除术
MS016	子宫平滑肌瘤	经宫腔镜黏膜下肌瘤切除术
MS017	宫颈癌	经腹腔镜全子宫切除术
MS018	宫颈癌	腹腔镜联合阴式全子宫切除术
MS019	宫颈癌	经腹膜外盆腔淋巴结切除术

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
MS020	宫颈癌	经腹全子宫切除术
MS021	宫颈癌	经腹广泛性子宫切除术
MS022	宫颈癌	经腹腔镜广泛子宫切除术

子宫腺肌病

经腹子宫腺肌病灶切除术

适用对象：	病种编码：	MS001	
	主要诊断：	子宫腺肌病	ICD-10码：N80.001
	主要操作/主要治疗方式：	经腹子宫腺肌病灶切除术	CCHI码：HTZ73301
入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10：N80.001子宫腺肌病疾病编码。 2. 符合手术适应证，无手术禁忌证。 3. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 病人一般情况良好，体温正常，完成复查项目。 2. 伤口愈合好。 3. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。		
最短住院日参考值：	4天（术前化验在门诊完成）；6天（术前化验住院完成）		
变异条件：	1. 因化验检查异常需要复查，导致术前住院时间延长。 2. 有影响手术的合并症，需要进行相关的诊断和治疗。 3. 因手术并发症需要进一步治疗。		
再入院间隔时间：	1个月 例外情况：1）因手术并发症需入院治疗；2）因其他疾病需入院治疗。		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
Ⅱ级护理	ACAB0001	Ⅰ级护理	ACAC0001	Ⅰ级护理	ACAC0001
检查		检查		/Ⅱ级护理	ACAB0001
经腹部妇科彩色多普勒超声检查	EDCTA002			检查	
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	导尿管留置	ABHA0002	治疗	
尿常规化学分析	CCAA2000	静脉输液	ABCA0001	静脉输液	ABCA0001
粪便常规检查	CCCA3000	监测		换药(中)	ABFA0002

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	无创心电图监测	FKA05705	药物	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEE8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	麻醉		抗菌药物	
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000无机磷(P)测定CEKA8000	全身麻醉	HAA42901	静脉补液	
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	/腰麻复合连续硬膜外阻滞麻醉	HAC42103		
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	手术			
血型鉴定	ABOABOABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	经腹子宫腺肌病灶切除术	HTZ73301		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000或Rh血型c抗原鉴定CAMG1000或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000或Rh血型e抗原鉴定CAMJ1000或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	病理			
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000				
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	药物			
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	抗菌药物			
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
胸部X线摄影	EABJT001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703				
治疗					
一般灌肠	ABGE0001				
会阴擦洗	ABZE0001				
静脉采血	ABBB0001				
病理					
妇科脱落细胞学检查与诊断	BBAB0001				
/妇科液基薄层细胞学检查与诊断	BBAE0001				
药物					
选择项目					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
特殊介质交叉配血	CAMX1000			经腹部妇科彩色多普勒超声检查	EDCTA002
疑难交叉配血	CAMY1000	治疗		血浆D-二聚体(D-Dimer)测定	CAJY1000
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	氧气吸入	ABJA0001	治疗	
盆腔磁共振成像	ECAQU001	院内遥测心电监护	KKA28701	经皮盆腔引流管调管术	HQU63101
盆腔X线计算机体层(CT)平扫	EBAQU001	监测		药物	
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活量 功能检查FJE01402或肺 每分通气量功能检查 FJE01403或最大通气量 功能检查FJE01404			止痛药物	
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一口 气法FJE01405或肺弥散 功能检查-重复呼吸法 FJE01406	病理			
气道阻力测定	FJB02401	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性 感染标本冷冻切片 病理诊断BCBB0001		
泌尿系逆行X线造影	EACRA001	快速石蜡切片病理 诊断	BCBC0001		
血浆D-二聚体(D-Dimer)测定	CAJY1000	药物			
糖类抗原CA-125测定	CGRP1000	止血药物			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肿瘤标志物测定	癌胚抗原 (CEA) 测定 CGRA1000或甲胎蛋白 (AFP) 测定CGRB8000或碱性胎儿蛋白 (BFP) 测定CGRC1000或总前列腺特异性抗原 (TPSA) 测定CGRD1000或游离前列腺特异性抗原 (FPSA) 测定CGRE1000或复合前列腺特异性抗原 (CPSA) 测定CGRF1000或前列腺酸性磷酸酶 (PAP) 测定CGRG1000或神经元特异性烯醇化酶 (NSE) 测定CGRH1000或细胞角蛋白19片段测定CGRJ1000或细胞角蛋白18片段测定CGRK1000或糖类抗原CA-27测定CGRL1000或糖类抗原CA-29测定CGRM1000或糖类抗原CA-50测定CGRN1000或糖类抗原CA-125测定CGRP1000或糖类抗原CA-130测定CGRQ1000或糖类抗原CA-153测定CGRR1000或糖类抗原CA-199测定CGRS1000或糖类抗原CA-242测定CGRT1000或糖类抗原CA-549测定CGRU1000或糖类抗原CA-724测定CGRV1000或鳞状细胞癌相关抗原 (SCC) 测定CGRW1000或肿瘤坏死因子 (TNF) 测定CGRX1000或肿瘤坏死因子 α (TNF- α) 测定CGRY1000或肿瘤相关抗原 (MG-Ags) 测定CGRZ1000或肿瘤相关抗原 (TA-2) 测定CGSA1000或显形胶质蛋白 (AP) 测定CGSB1000或恶性肿瘤特异生长因子 (TSGF) 测定CGSC1000或肿瘤相关物质测定CGSD1000或人附睾分泌蛋白 (HE4) 测定CGSE1000或高尔基体蛋白73 (GP73) 测定CGSF1000或组织多肽特异抗原 (TPS) 测定CGSG1000或端粒酶活性检测CGSH1000或等克分子前列腺特异抗原测定CGSJ1000或尿核基质蛋白 (NMP22) 测定CGSK1000或甲胎蛋白异质体测定CGSL1000	促子宫收缩药物			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
治疗					
药物					

子宫腺肌病

经腹腔镜子宫腺肌病灶切除术

适用对象：	病种编码：	MS002			
	主要诊断：	子宫腺肌病		ICD-10码：	N80.001
	主要操作/主要治疗方式：	经腹腔镜子宫腺肌病灶切除术		CCHI码：	HTZ73501
	入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10：N80.001子宫腺肌病疾病编码。 2. 符合手术适应证，无手术禁忌证。 3. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 病人一般情况良好，体温正常，完成复查项目。 2. 伤口愈合好。 3. 没有需要住院处理的并发症和 /或合并症。			
	最短住院日参考值：	4天			
	变异条件：	1. 因化验检查异常需要复查，导致术前住院时间延长。 2. 有影响手术的合并症，需要进行相关的诊断和治疗。 3. 因手术并发症需要进一步治疗。			
	再入院间隔时间：	1个月 例外情况：1) 因手术并发症需入院治疗；2) 因其他疾病需入院治疗			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查		/II级护理	ACAB0001
经腹部妇科彩色多普勒超声检查	EDCTA002			检查	
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	导尿管留置	ABHA0002	治疗	
尿常规化学分析	CCAA2000	静脉输液	ABCA0001	静脉输液	ABCA0001
粪便常规检查	CCCA3000	监测		换药(中)	ABFA0002

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	无创心电监测	FKA05705	药物	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	麻醉		抗菌药物	
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000无机磷(P)测定CEKA8000	全身麻醉	HAA42901	静脉补液	
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	手术			
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	经腹腔镜子宫腺肌病灶切除术	HTZ73501		
血型鉴定	ABOABOABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	病理			
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000或Rh血型c抗原鉴定CAMG1000或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000或Rh血型e抗原鉴定CAMJ1000或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000	药物			
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	抗菌药物			
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
胸部X线摄影	EABJT001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703				
病理					
妇科脱落细胞学检查与诊断	BBAB0001				
/妇科液基薄层细胞学检查与诊断	BBAE0001				
治疗					
一般灌肠	ABGE0001				
会阴擦洗	ABZE0001				
静脉采血	ABBB0001				
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
特殊介质交叉配血	CAMX1000			经腹部妇科彩色多普勒超声检查	EDCTA002
疑难交叉配血	CAMY1000	治疗		血浆D-二聚体(D-Dimer)测定	CAJY1000
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	氧气吸入	ABJA0001	治疗	
盆腔磁共振成像	ECAQU001	院内遥测心电监护	KKA28701		
盆腔X线计算机体层(CT)平扫	EBAQU001	监测		药物	
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404			止痛药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肿瘤标志物测定	癌胚抗原 (CEA) 测定 CGRA1000或甲胎蛋白 (AFP) 测定CGRB8000 或碱性胎儿蛋白 (BFP) 测定CGRC1000 或总前列腺特异性抗 原 (TPSA) 测定 CGRD1000或游离前列 腺特异性抗原 (FPSA) 测定CGRE1000或复合 前列腺特异性抗原 (CPSA) 测定CGRF1000 或前列腺酸性磷酸酶 (PAP) 测定CGRG1000 或神经元特异性烯醇 化酶 (NSE) 测定 CGRH1000或细胞角蛋 白19片段测定 CGRJ1000或细胞角蛋 白18片段测定 CGRK1000或糖类抗原 CA-27测定CGRL1000 或糖类抗原CA-29测 定CGRM1000或糖类抗 原CA-50测定 CGRN1000或糖类抗原 CA-125测定CGRP1000 或糖类抗原CA-130测 定CGRQ1000或糖类抗 原CA-153测定 CGRR1000或糖类抗原 CA-199测定CGRS1000 或糖类抗原CA-242测 定CGRT1000或糖类抗 原CA-549测定 CGRU1000或糖类抗原 CA-724测定CGRV1000 或鳞状细胞癌相关抗 原 (SCC) 测定 CGRW1000或肿瘤坏死 因子 (TNF) 测定 CGRX1000或肿瘤坏死 因子 α (TNF- α) 测定 CGRY1000或肿瘤相关 抗原 (MG-Ags) 测定 CGRZ1000或肿瘤相关 抗原 (TA-2) 测定 CGSA1000或显形胶质 蛋白 (AP) 测定 CGSB1000或恶性肿瘤 特异生长因子 (TSGF) 测定CGSC1000或肿瘤 相关物质测定 CGSD1000或人附睾分 泌蛋白 (HE4) 测定 CGSE1000或高尔基体 蛋白73 (GP73) 测定 CGSF1000或组织多肽 特异抗原 (TPS) 测定 CGSG1000或端粒酶活 性检测CGSH1000或等 克分子前列腺特异抗 原测定CGSJ1000或尿 核基质蛋白 (NMP22) 测定CGSK1000或甲胎 蛋白异质体测定 CGSL1000	促子宫收缩药物			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
治疗					
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一口气法FJE01405或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	病理			
气道阻力测定	FJB02401	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断BCBA0001或特异性感染标本冷冻切片病理诊断BCBB0001		
泌尿系逆行X线造影	EACRA001	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001		
血浆D-二聚体(D-Dimer)测定	CAJY1000	药物			
糖类抗原CA-125测定	CGRP1000	止血药物			
药物					

卵巢良性肿瘤

经腹单侧卵巢囊肿剥除术

适用对象：	病种编码：	MS003		
	主要诊断：	卵巢良性肿瘤	ICD-10码：	D27. x00
	主要操作/主要治疗方式：	经腹单侧卵巢囊肿剥除术	CCHI码：	HTB73301
入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10：D27. x00卵巢良性肿瘤疾病编码。 2. 符合手术适应证，无手术禁忌证。 3. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
出院标准：	1. 病人一般情况良好，体温正常，完成复查项目。 2. 伤口愈合好。 3. 没有需要住院处理的并发症和 /或合并症。			
最短住院日参考值：	4天	1. 因手术并发症需进一步治疗。 2. 有影响手术的合并症，需要进行相关的诊断和治疗。 3. 因手术并发症需进一步治疗。		
变异条件：	4. 术后病理提示为恶性肿瘤，则转入相应的路径治疗。			
再入院间隔时间：	1个月	例外情况：1) 因手术并发症需入院治疗；2) 因其他疾病需入院治疗		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
Ⅱ级护理	ACAB0001	Ⅰ级护理	ACAC0001	Ⅰ级护理	ACAC0001
检查		检查		/Ⅱ级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	经腹部妇科彩色多普勒超声检查	EDCTA002	检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
粪便常规检查	CCCA3000	导尿管留置	ABHA0002	治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和 白蛋白 (Alb) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000	监测		换药 (中)	ABFA0002
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000	无创心电监测	FKA05705	静脉输液	ABCA0001
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测定 CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测定 CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000	麻醉		病理	
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000	全身麻醉	HAA42901		
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间 (APTT) 测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间 (PT) 测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000	/腰麻复合连续硬膜外阻滞麻醉	HAC42103	药物	
血型鉴定	ABOABO血型鉴定 (正定型) CAMA1000或 ABO血型鉴定 (反定型) CAMB1000或ABO亚型鉴定 (正定型) CAMD1000或ABO亚型鉴定 (反定型) CAME1000或RhD血型鉴定 CAMF1000	手术		静脉补液	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000或 Rh血型c抗原鉴定 CAMG1000或 Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000或Rh血型e抗原鉴定 CAMJ1000或 Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000	经腹单侧卵巢囊肿剥除术	HTB73301	抗菌药物	
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000	病理			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000				
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	药物			
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
胸部X线摄影	EABJT001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703				
肿瘤标志物测定	糖类抗原CA-50测定CGRN1000或糖类抗原CA-125测定CGRP1000或糖类抗原CA-199测定CGRS1000或甲胎蛋白(AFP)测定CGRB8000或癌胚抗原(CEA)测定CGRA1000或人附睾分泌蛋白(HE4)测定CGSE1000				
β 人绒毛膜促性腺激素(β -HCG)测定	CERS1000				
病理					
妇科脱落细胞学检查与诊断	BBAB0001				
/妇科液基薄层细胞学检查与诊断	BBAE0001				
治疗					
一般灌肠	ABGE0001				
静脉采血	ABBB0001				
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
检查		检查		检查	
特殊介质交叉配血	CAMX1000			肿瘤标志物测定	癌胚抗原 (CEA) 测定 CGRA1000或甲胎蛋白 (AFP) 测定 CGRB8000或碱性胎儿蛋白 (BFP) 测定 CGRC1000或总前列腺特异性抗原 (TPSA) 测定 CGRD1000或游离前列腺特异性抗原 (FPSA) 测定 CGRE1000或复合前列腺特异性抗原 (CPSA) 测定 CGRF1000或前列腺酸性磷酸酶 (PAP) 测定 CGRG1000或神经元特异性烯醇化酶 (NSE) 测定 CGRH1000或细胞角蛋白19片段测定 CGRJ1000或细胞角蛋白18片段测定 CGRK1000或糖类抗原CA-27测定 CGRL1000或糖类抗原CA-29测定 CGRM1000或糖类抗原CA-50测定 CGRN1000或糖类抗原CA-125测定 CGRP1000或糖类抗原CA-130测定 CGRQ1000或糖类抗原CA-153测定 CGRR1000或糖类抗原CA-199测定 CGRS1000或糖类抗原CA-242测定 CGRT1000或糖类抗原CA-549测定 CGRU1000或糖类抗原CA-724测定 CGRV1000或鳞状细胞癌相关抗原 (SCC) 测定 CGRW1000或肿瘤坏死因子 (TNF) 测定

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
					CGRX1000或肿瘤坏死因子α (TNF-α)测定 CGRY1000或肿瘤相关抗原 (MG-Ags) 测定 CGRZ1000或肿瘤相关抗原 (TA-2) 测定 CGSA1000或显形胶质蛋白 (AP) 测定 CGSB1000或恶性肿瘤特异生长因子 (TSGF) 测定 CGSC1000或肿瘤相关物质测定 CGSD1000或人附睾分泌蛋白 (HE4) 测定 CGSE1000或高尔基体蛋白73 (GP73) 测定 CGSF1000或组织多肽特异抗原 (TPS) 测定 CGSG1000或端粒酶活性检测 CGSH1000或等克分子前列腺特异抗原测定 CGSJ1000或尿核基质蛋白 (NMP22) 测定 CGSK1000或甲胎蛋白异质体测定 CGSL1000
疑难交叉配血	CAMY1000	治疗		血浆D-二聚体 (D-Dimer) 测定	CAJY1000
甲胎蛋白 (AFP) 测定	CGRB8000	氧气吸入	ABJA0001	治疗	
人绒毛膜促性腺激素 (HCG) 测定	CERR8000	静脉输液	ABCA0001	经皮盆腔引流管调管术	HQU63101
癌胚抗原 (CEA) 测定	CGRA1000	院内遥测心电监护	KKA28701	药物	
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	监测			
盆腔磁共振成像	ECAQU001			病理	
盆腔X线计算机体层 (CT) 平扫	EBAQU001	病理		免疫组织化学染色诊断	BEBA0001
泌尿系逆行X线造影	EACRA001	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感染标本冷冻切片病理诊断 BCBB0001		
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活量功能检查 FJE01402或肺每分通气量功能检查 FJE01403或最大通气量功能检查 FJE01404	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001		
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一口气法 FJE01405或肺弥散功能检查-重复呼吸法 FJE01406	药物			
气道阻力测定	FJB02401	抗菌药物			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
心功能测定	左心室收缩功能超声测定EDFKJ001或左心室舒张功能超声测定EDFKJ002	止血药物			
血浆D-二聚体(D-Dimer)测定	CAJY1000	促子宫收缩药物			
治疗					
药物					

卵巢良性肿瘤
经腹腔镜单侧卵巢囊肿剥除术

适用对象：	病种编码：	MS004
	主要诊断：	卵巢良性肿瘤ICD-10码：D27. x00
	主要操作/主要治疗方式：	经腹腔镜单侧卵巢囊肿剥除术CCHI码：HTB73501
入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10：D27. x00卵巢良性肿瘤疾病编码。 2. 符合手术适应证，无手术禁忌证。 3. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。	
出院标准：	1. 病人一般情况良好，体温正常，完成复查项目。 2. 伤口愈合好。 3. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。	
最短住院日参考值：	4天	
变异条件：	1. 因化验检查异常需要复查，导致术前住院时间延长。 2. 有影响手术的合并症，需要进行相关的诊断和治疗。 3. 因手术并发症需要进一步治疗。 4. 术后病理提示为恶性肿瘤，则转入相应的路径治疗。	
再入院间隔时间：	1个月 例外情况：1) 因手术并发症需入院治疗；2) 因其他疾病需入院治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查		/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	经腹部妇科彩色多普勒超声检查	EDCTA002	检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
粪便常规检查	CCCA3000	导尿管留置	ABHA0002	治疗	
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	监测		换药(中)	ABFA0002
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	无创心电监测	FKA05705	静脉输液	ABCA0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙(Ca)测定 CEJF8000	麻醉		病理	
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	全身麻醉	HAA42901		
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测定 CAGC1000或血浆纤维 蛋白原测定 CAGD1000	/腰麻复合连续硬膜 外阻滞麻醉	HAC42103	药物	
血型鉴定	ABOABOABO血型鉴定 (正定型)CAMA1000或 ABO血型鉴定(反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定(正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定(反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000	手术		静脉补液	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000或 Rh血型c 抗原鉴定CAMG1000或 Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000或Rh血型e 抗原鉴定CAMJ1000或 Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000	经腹腔镜单侧卵巢囊 肿剥除术	HTB73501	抗菌药物	
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000	病理			
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000				
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	药物			
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
胸部X线摄影	EABJT001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肿瘤标志物测定	糖类抗原CA-50测定 CGRN1000或糖类抗原 CA-125测定CGRP1000 或糖类抗原CA-199测 定CGRS1000或甲胎蛋 白(AFP)测定 CGRB8000或癌胚抗原 (CEA)测定CGRA1000 或人附睾分泌蛋白 (HE4)测定CGSE1000				
β人绒毛膜促性腺激 素(β-HCG)测定	CERS1000				
病理					
妇科脱落细胞学检查 与诊断	BBAB0001				
/妇科液基薄层细胞 学检查与诊断	BBAE0001				
治疗					
一般灌肠	ABGE0001				
静脉采血	ABBB0001				
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
特殊介质交叉配血	CAMX1000			肿瘤标志物测定	糖类抗原CA-50测定 CGRN1000或糖类抗原 CA-125测定CGRP1000 或糖类抗原CA-199测 定CGRS1000或甲胎蛋 白(AFP)测定 CGRB8000或癌胚抗原 (CEA)测定CGRA1000 或人附睾分泌蛋白 (HE4)测定CGSE1000
疑难交叉配血	CAMY1000	治疗		血浆D-二聚体(D- Dimer)测定	CAJY1000
甲胎蛋白(AFP)测定	CGRB8000	氧气吸入	ABJA0001	治疗	
人绒毛膜促性腺激素 (HCG)测定	CERR8000	静脉输液	ABCA0001		
癌胚抗原(CEA)测定	CGRA1000	院内遥测心电图监护	KKA28701	病理	
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	监测		免疫组织化学染色诊 断	BEBA0001
盆腔磁共振成像	ECAQU001			药物	
盆腔X线计算机体层 (CT)平扫	EBAQU001	病理			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
泌尿系逆行X线造影	EACRA001	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感染标本冷冻切片病理诊断BCBB0001		
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001		
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一口气法FJE01405或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	药物			
气道阻力测定	FJB02401	抗菌药物			
心功能测定	左心室收缩功能超声测定EDFKJ001或左心室舒张功能超声测定EDFKJ002	止血药物			
血浆D-二聚体(D-Dimer)测定	CAJY1000	促子宫收缩药物			
治疗					
药物					

卵巢良性肿瘤
经腹单侧卵巢切除术

适用对象：	病种编码：	MS005			
	主要诊断：	卵巢良性肿瘤	ICD-10码：	D27. x00	
	主要操作/主要治疗方式：	经腹单侧卵巢切除术	CCHI码：	HTB73304	
入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10：D27. x00卵巢良性肿瘤疾病编码。 2. 符合手术适应证，无手术禁忌证。 3. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。				
出院标准：	1. 病人一般情况良好，体温正常，完成复查项目。 2. 伤口愈合好。 3. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。				
最短住院日参考值：	4天				
变异条件：	1. 因化验检查异常需要复查，导致术前住院时间延长。 2. 有影响手术的合并症，需要进行相关的诊断和治疗。 3. 因手术并发症需要进一步治疗。 4. 术后病理提示为恶性肿瘤，则转入相应的路径治疗。				
再入院间隔时间：	1个月 例外情况：1) 因手术并发症需入院治疗；2) 因其他疾病需入院治疗				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查		/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	经腹部妇科彩色多普勒超声检查	EDCTA002	检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
粪便常规检查	CCCA3000	导尿管留置	ABHA0002	治疗	
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	监测		换药(中)	ABFA0002

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000	无创心电监测	FKA05705	静脉输液	ABCA0001
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	麻醉		药物	
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	全身麻醉	HAA42901	静脉补液	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	/腰麻复合连续硬膜 外阻滞麻醉	HAC42103	抗菌药物	
血型鉴定	ABOABOABO血型鉴定 (正定型)CAMA1000或 ABO血型鉴定(反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定(正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定(反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000	手术			
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000或 Rh血型c 抗原鉴定CAMG1000或 Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000或Rh血型e 抗原鉴定CAMJ1000或 Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000	经腹单侧卵巢切除术	HTB73304		
肿瘤标志物测定	糖类抗原CA-50测定 CGRN1000或糖类抗原 CA-125测定CGRP1000 或糖类抗原CA-199测 定CGRS1000或甲胎蛋 白(AFP)测定 CGRB8000或癌胚抗原 (CEA)测定CGRA1000 或人附睾分泌蛋白 (HE4)测定CGSE1000	病理			
生理盐水介质交叉配 血	CAMW1000	快速石蜡切片病理诊 断	BCBC0001		
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	药物			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000				
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
胸部X线摄影	EABJT001				
常规心电图检查	单通通常规心电图检查 FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703				
糖类抗原测定	糖类抗原CA-27测定 CGRL1000或糖类抗原 CA-29测定CGRM1000 或糖类抗原CA-50测 定CGRN1000或糖类抗 原CA-125测定 CGRP1000或糖类抗原 CA-130测定CGRQ1000 或糖类抗原CA-153测 定CGRR1000或糖类抗 原CA-199测定 CGRS1000或糖类抗原 CA-242测定CGRT1000 或糖类抗原CA-549测 定CGRU1000或糖类抗 原CA-724测定 CGRV1000				
病理					
妇科脱落细胞学检查 与诊断	BBAB0001				
/妇科液基薄层细胞 学检查与诊断	BBAE0001				
治疗					
一般灌肠	ABGE0001				
静脉采血	ABBB0001				
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
特殊介质交叉配血	CAMX1000			肿瘤标志物测定	糖类抗原CA-50测定 CGRN1000或糖类抗原 CA-125测定CGRP1000 或糖类抗原CA-199测 定CGRS1000或甲胎蛋 白(AFP)测定 CGRB8000或癌胚抗原 (CEA)测定CGRA1000 或人附睾分泌蛋白 (HE4)测定CGSE1000
疑难交叉配血	CAMY1000	治疗		血浆D-二聚体(D- Dimer)测定	CAJY1000
人绒毛膜促性腺激素 (HCG)测定	CERR8000	氧气吸入	ABJA0001	治疗	
癌胚抗原(CEA)测定	CGRA1000	静脉输液	ABCA0001	经皮盆腔引流管调管 术	HQU63101
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	院内遥测心电图监护	KKA28701	病理	
盆腔磁共振成像	ECAQU001	监测		免疫组织化学染色诊 断	BEBA0001
盆腔X线计算机体层 (CT)平扫	EBAQU001			药物	
泌尿系逆行X线造影	EACRA001	病理			
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活 量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403或最大 通气量功能检查 FJE01404	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感 染标本冷冻切片病理 诊断BCBB0001		
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一 口气法FJE01405或肺 弥散功能检查-重复 呼吸法FJE01406	药物			
气道阻力测定	FJB02401	抗菌药物			
心功能测定	左心室收缩功能超声 测定EDFKJ001或左心 室舒张功能超声测定 EDFKJ002	止血药物			
血浆D-二聚体(D- Dimer)测定	CAJY1000	促子宫收缩药物			
治疗					
药物					

卵巢良性肿瘤

经腹腔镜单侧卵巢切除术

适用对象：	病种编码：	MS006			
	主要诊断：	卵巢良性肿瘤		ICD-10码：	D27. x00
	主要操作/主要治疗方式：	经腹腔镜单侧卵巢切除术		CCHI码：	HTB73504
	入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10：D27. x00卵巢良性肿瘤疾病编码。 2. 符合手术适应证，无手术禁忌证。 3. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 病人一般情况良好，体温正常，完成复查项目。 2. 伤口愈合好。 3. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。			
	最短住院日参考值：	4天			
	变异条件：	1. 因化验检查异常需要复查，导致术前住院时间延长。 2. 有影响手术的合并症，需要进行相关的诊断和治疗。 3. 因手术并发症需要进一步治疗。 4. 术后病理提示为恶性肿瘤，则转入相应的路径治疗。			
	再入院间隔时间：	1个月	例外情况：1) 因手术并发症需入院治疗；2) 因其他疾病需入院治疗		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查		/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	经腹部妇科彩色多普勒超声检查	EDCTA002	检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
粪便常规检查	CCCA3000	导尿管留置	ABHA0002	治疗	
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	监测		换药(中)	ABFA0002

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000	无创心电监测	FKA05705	静脉输液	ABCA0001
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和二氧化 碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	麻醉		药物	
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	全身麻醉	HAA42901	静脉补液	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	/腰麻复合连续硬膜 外阻滞麻醉	HAC42103	抗菌药物	
血型鉴定	ABOABOABO血型鉴定 (正定型)CAMA1000或 ABO血型鉴定(反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定(正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定(反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000	手术			
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000或 Rh血型c 抗原鉴定CAMG1000或 Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000或Rh血型e 抗原鉴定CAMJ1000或 Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000	经腹腔镜单侧卵巢切 除术	HTB73504		
肿瘤标志物测定	糖类抗原CA-50测定 CGRN1000或糖类抗原 CA-125测定CGRP1000 或糖类抗原CA-199测 定CGRS1000或甲胎蛋 白(AFP)测定 CGRB8000或癌胚抗原 (CEA)测定CGRA1000 或人附睾分泌蛋白 (HE4)测定CGSE1000	病理			
生理盐水介质交叉配 血	CAMW1000	快速石蜡切片病理诊 断	BCBC0001		
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	药物			
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
胸部X线摄影	EABJT001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道常规心电图检查 FKA03702或十二通道常规心电图检查 FKA03703				
糖类抗原测定	糖类抗原CA-27测定 CGRL1000或糖类抗原CA-29测定 CGRM1000或糖类抗原CA-50测定 CGRN1000或糖类抗原CA-125测定 CGRP1000或糖类抗原CA-130测定 CGRQ1000或糖类抗原CA-153测定 CGRR1000或糖类抗原CA-199测定 CGRS1000或糖类抗原CA-242测定 CGRT1000或糖类抗原CA-549测定 CGRU1000或糖类抗原CA-724测定 CGRV1000				
病理					
妇科脱落细胞学检查与诊断	BBAB0001				
/妇科液基薄层细胞学检查与诊断	BBAE0001				
治疗					
一般灌肠	ABGE0001				
静脉采血	ABBB0001				
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
特殊介质交叉配血	CAMX1000			肿瘤标志物测定	糖类抗原CA-50测定 CGRN1000或糖类抗原CA-125测定 CGRP1000或糖类抗原CA-199测定 CGRS1000或甲胎蛋白(AFP)测定 CGRB8000或癌胚抗原(CEA)测定 CGRA1000或人附睾分泌蛋白(HE4)测定 CGSE1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
疑难交叉配血	CAMY1000	治疗		血浆D-二聚体 (D-Dimer) 测定	CAJY1000
人绒毛膜促性腺激素 (HCG) 测定	CERR8000	氧气吸入	ABJA0001	治疗	
癌胚抗原 (CEA) 测定	CGRA1000	静脉输液	ABCA0001		
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	院内遥测心电监护	KKA28701	病理	
盆腔磁共振成像	ECAQU001	监测		免疫组织化学染色诊断	BEBA0001
盆腔X线计算机体层 (CT) 平扫	EBAQU001			药物	
泌尿系逆行X线造影	EACRA001	病理			
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感染标本冷冻切片病理诊断BCBB0001		
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一口气法FJE01405或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	药物			
气道阻力测定	FJB02401	抗菌药物			
心功能测定	左心室收缩功能超声测定EDFKJ001或左心室舒张功能超声测定EDFKJ002	止血药物			
血浆D-二聚体 (D-Dimer) 测定	CAJY1000	促子宫收缩药物			
治疗					
药物					

输卵管妊娠
经腹单侧输卵管切除术

适用对象：	病种编码：	MS007
	主要诊断：	输卵管妊娠ICD-10码：000.1
	主要操作/主要治疗方式：	经腹单侧输卵管切除术CCHI码：HTC73302
	入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10：000.1输卵管妊娠疾病编码。 2. 符合手术适应证，无手术禁忌证。 3. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。
	出院标准：	1. 病人一般情况良好，体温正常，完成复查项目。 2. 伤口愈合好。 3. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。
	最短住院日参考值：	4天
	变异条件：	1. 有急诊手术指征入院后应立即施行手术。 2. 因诊断不明确，导致术前住院时间延长。 3. 有影响手术的合并症，需要进行相关的诊断和治疗。 4. 因手术并发症需要进一步治疗。
	再入院间隔时间：	1个月 例外情况：1) 因手术并发症需入院治疗；2) 因持续性异位妊娠或妊娠滋养细胞疾病再次入院治疗

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	II级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定	CERS1000
粪便常规检查	CCCA3000	导尿管留置	ABHA0002	治疗	
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	静脉输液	ABCA0001	静脉输液	ABCA0001
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	院内遥测心电图监护	KKA28701	换药(中)	ABFA0002

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	监测		药物	
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000				
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测定 CAGC1000或血浆纤维 蛋白原测定 CAGD1000	麻醉			
血型鉴定	ABOABO血型鉴定 (正定型)CAMA1000或 ABO血型鉴定(反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定(正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定(反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000	全身麻醉	HAA42901		
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000或 Rh血型c 抗原鉴定CAMG1000或 Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000或Rh血型e 抗原鉴定CAMJ1000或 Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000	/腰麻复合连续硬膜 外阻滞麻醉	HAC42103		
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	手术			
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	经腹单侧输卵管切除 术	HTC73302		
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	病理			
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000	快速石蜡切片病理诊 断	BCBC0001		
经腹部妇科彩色多普 勒超声检查	EDCTA002	药物			
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703	抗菌药物			
β人绒毛膜促性腺激 素(β-HCG)测定	CERS1000	静脉补液			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
人绒毛膜促性腺激素(HCG)测定	CERR8000				
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001				
治疗					
静脉采血	ABBB0001				
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
胸部X线摄影	EABJT001	分段诊断性刮宫术	FTD07401		
孕酮(P)测定	CERL1000	治疗		治疗	
经阴道后穹隆穿刺术	FTL06101	氧气吸入	ABJA0001	经皮盆腔引流管调管术	HQU63101
经阴道单侧输卵管积水穿刺术	HTC45401	静脉输血	ABCD0001	药物	
治疗		监测		静脉补液	
				杀伤胚胎化疗药物及解毒药物	
药物		药物			
		杀伤胚胎化疗药物及解毒药物			
		止血药物			

输卵管妊娠
经腹腔镜单侧输卵管切除术

适用对象：	病种编码：	MS008			
	主要诊断：	输卵管妊娠	ICD-10码：	000.1	
	主要操作/主要治疗方式：	经腹腔镜单侧输卵管切除术	CCHI码：	HTC73502	
入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10：000.1输卵管妊娠疾病编码。 2. 符合手术适应证，无手术禁忌证。 3. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。				
出院标准：	1. 病人一般情况良好，体温正常，完成复查项目。 2. 伤口愈合好。 3. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。				
最短住院日参考值：	4天				
变异条件：	1. 有急诊手术指征入院后应立即施行手术。 2. 因诊断不明确，导致术前住院时间延长。 3. 有影响手术的合并症，需要进行相关的诊断和治疗。 4. 因手术并发症需要进一步治疗。				
再入院间隔时间：	1个月 例外情况：1) 因手术并发症需入院治疗；2) 因持续性异位妊娠或妊娠滋养细胞疾病再次入院治疗				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	II级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定	CERS1000
粪便常规检查	CCCA3000	导尿管留置	ABHA0002	治疗	
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	静脉输液	ABCA0001	静脉输液	ABCA0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000	院内遥测心电图监护	KKA28701	换药(中)	ABFA0002
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	监测		药物	
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000				
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	麻醉			
血型鉴定	ABOABOABO血型鉴定 (正定型)CAMA1000或 ABO血型鉴定(反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定(正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定(反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000	全身麻醉	HAA42901		
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000或 Rh血型c 抗原鉴定CAMG1000或 Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000或Rh血型e 抗原鉴定CAMJ1000或 Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000	/腰麻复合连续硬膜 外阻滞麻醉	HAC42103		
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	手术			
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	经腹腔镜单侧输卵管 切除术	HTC73502		
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	病理			
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000	快速石蜡切片病理诊 断	BCBC0001		
经腹部妇科彩色多普 勒超声检查	EDCTA002	药物			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703	抗菌药物			
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	静脉补液			
β 人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定	CERS1000				
人绒毛膜促性腺激素(HCG)测定	CERR8000				
治疗					
一般灌肠	ABGE0001				
静脉采血	ABBB0001				
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
胸部X线摄影	EABJT001	分段诊断性刮宫术	FTD07401		
孕酮(P)测定	CERL1000	治疗		治疗	
经阴道后穹隆穿刺术	FTL06101	氧气吸入	ABJA0001		
经阴道单侧输卵管积水穿刺术	HTC45401	静脉输血	ABCD0001	药物	
治疗		监测		静脉补液	
				杀伤胚胎化疗药物及 解毒药物	
药物		药物			
		杀伤胚胎化疗药物及 解毒药物			
		止血药物			

输卵管妊娠
经腹单侧输卵管开窗术

适用对象：	病种编码：	MS009
	主要诊断：	输卵管妊娠ICD-10码：000.1
	主要操作/主要治疗方式：	经腹单侧输卵管开窗术CCHI码：HTC50301
入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10：000.1输卵管妊娠疾病编码。 2. 符合手术适应证，无手术禁忌证。 3. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。	
出院标准：	1. 病人一般情况良好，体温正常，完成复查项目。 2. 伤口愈合好。 3. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。	
最短住院日参考值：	4天	
变异条件：	1. 有急诊手术指征入院后应立即施行手术。 2. 因诊断不明确，导致术前住院时间延长。 3. 有影响手术的合并症，需要进行相关的诊断和治疗。 4. 因手术并发症需要进一步治疗。	
再入院间隔时间：	1个月 例外情况：1）因手术并发症需入院治疗；2）因持续性异位妊娠或妊娠滋养细胞疾病再次入院治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	II级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定	CERS1000
粪便常规检查	CCCA3000	导尿管留置	ABHA0002	治疗	
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	静脉输液	ABCA0001	静脉输液	ABCA0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEE8000和肌酐(Cr) 测定CEE8000和尿酸 (UA)测定CEE8000	院内遥测心电监护	KKA28701	换药(中)	ABFA0002
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	监测		药物	
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000				
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	麻醉			
血型鉴定	ABOABOABO血型鉴定 (正定型)CAMA1000或 ABO血型鉴定(反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定(正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定(反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000	全身麻醉	HAA42901		
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000或 Rh血型c 抗原鉴定CAMG1000或 Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000或Rh血型e 抗原鉴定CAMJ1000或 Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000	/腰麻复合连续硬膜 外阻滞麻醉	HAC42103		
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	手术			
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	经腹单侧输卵管开窗 术	HTC50301		
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	病理			
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000	快速石蜡切片病理诊 断	BCBC0001		
经腹部妇科彩色多普 勒超声检查	EDCTA002	药物			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703	抗菌药物			
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	静脉补液			
β 人绒毛膜促性腺激素(β -HCG)测定	CERS1000				
人绒毛膜促性腺激素(HCG)测定	CERR8000				
治疗					
一般灌肠	ABGE0001				
静脉采血	ABBB0001				
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
胸部X线摄影	EABJT001	分段诊断性刮宫术	FTD07401		
经阴道后穹隆穿刺术	FTL06101	治疗		治疗	
经阴道单侧输卵管积水穿刺术	HTC45401	氧气吸入	ABJA0001	经皮盆腔引流管调管术	HQU63101
治疗		静脉输血	ABCD0001	药物	
		监测		静脉补液	
药物				杀伤胚胎化疗药物及 解毒药物	
		手术			
		药物			
		杀伤胚胎化疗药物及 解毒药物			
		止血药物			

输卵管妊娠
经腹腔镜单侧输卵管开窗术

适用对象：	病种编码：	MS010			
	主要诊断：	输卵管妊娠		ICD-10码：	000.100
	主要操作/主要治疗方式：	经腹腔镜单侧输卵管开窗术		CCHI码：	HTC50501
入院标准：		1. 第一诊断符合ICD-10：000.100输卵管妊娠疾病编码。 2. 符合手术适应证，无手术禁忌证。 3. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
出院标准：		1. 病人一般情况良好，体温正常，完成复查项目。 2. 伤口愈合好。 3. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。			
最短住院日参考值：		4天			
变异条件：		1. 有急诊手术指征入院后应立即施行手术。 2. 因诊断不明确，导致术前住院时间延长。 3. 有影响手术的合并症，需要进行相关的诊断和治疗。 4. 因手术并发症需要进一步治疗。			
再入院间隔时间：		1个月 例外情况：1) 因手术并发症需入院治疗；2) 因持续性异位妊娠或妊娠滋养细胞疾病再次入院治疗			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	II级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定	CERS1000
粪便常规检查	CCCA3000	导尿管留置	ABHA0002	静脉输液	ABCA0001
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	静脉输液	ABCA0001	治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000	院内遥测心电监护	KKA28701	换药(中)	ABFA0002
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	监测		药物	
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000				
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	麻醉			
血型鉴定	ABOABOABO血型鉴定 (正定型)CAMA1000或 ABO血型鉴定(反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定(正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定(反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000	全身麻醉	HAA42901		
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000或 Rh血型c 抗原鉴定CAMG1000或 Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000或Rh血型e 抗原鉴定CAMJ1000或 Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000	/腰麻复合连续硬膜 外阻滞麻醉	HAC42103		
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	手术			
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	经腹腔镜单侧输卵管 开窗术	HTC50501		
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	病理			
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000	快速石蜡切片病理诊 断	BCBC0001		
经腹部妇科彩色多普 勒超声检查	EDCTA002	药物			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703	抗菌药物			
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001				
β 人绒毛膜促性腺激素 (β -HCG) 测定	CERS1000				
人绒毛膜促性腺激素 (HCG) 测定	CERR8000				
治疗					
一般灌肠	ABGE0001				
静脉采血	ABBB0001				
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
胸部X线摄影	EABJT001	分段诊断性刮宫术	FTD07401		
经阴道后穹隆穿刺术	FTL06101	治疗		治疗	
经阴道单侧输卵管积水穿刺术	HTC45401	氧气吸入	ABJA0001		
治疗		静脉输血	ABCD0001	药物	
		监测		静脉补液	
药物				杀伤胚胎化疗药物及 解毒药物	
		药物			
		杀伤胚胎化疗药物及 解毒药物			
		止血药物			

子宫平滑肌瘤
经腹全子宫切除术

适用对象：	病种编码：	MS011	
	主要诊断：	子宫平滑肌瘤	ICD-10码：D25.0-D25.2, D25.9
	主要操作/主要治疗方式：	经腹全子宫切除术	CCHI码：HTD75301
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD10：D25.0-D25.2, D25.9子宫平滑肌瘤 疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断时，但在住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 患者一般情况良好，恢复正常饮食，腹部无阳性体征。 2. 相关实验室检查结果基本正常，体温正常。 3. 切口愈合良好。		
最短住院日参考值：	5 天		
变异条件：	1. 因实验室检查结果异常需要复查，导致术前住院时间延长。 2. 其他意外情况需进一步明确诊断，导致术前住院时间延长。 3. 术后出现发热及出血等并发症需要治疗和住院观察，导致住院时间延长。		
再入院间隔时间：	1个月 例外情况：1) 因手术并发症需入院治疗；2) 因其他疾病需入院治疗		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查		/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			/III级护理	ACAA0001
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		检查	
粪便常规检查	CCCA3000	导尿管留置	ABHA0002	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	静脉输液	ABCA0001	治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000	会阴擦洗	ABZE0001	静脉采血	ABBB0001
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	监测		换药(中)	ABFA0002
血型鉴定	ABOABOABO血型鉴定 (正定型)CAMA1000或 ABO血型鉴定(反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定(正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定(反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000	全身麻醉下呼吸功能 监测	HAN05902	会阴擦洗	ABZE0001
	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 或天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000或总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000或直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000或 γ -谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000或总蛋白 (TP)测定CEAA8000或 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000或碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000或乳酸脱氢 酶(LD)测定CECW1000 或尿素(Urea)测定 CEEA8000或肌酐(Cr) 测定CEEB8000或尿酸 (UA)测定CEEE8000或				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
生化常规检查	肌酸激酶(CK)测定 CECS1000或肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定 CECT1000或甘油三酯(TG)测定 CEHB1000或总胆固醇(TC)测定 CEHA1000或高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定 CEHC1000或低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定 CEHD1000或葡萄糖(Glu)测定 CEFA8000或总钙(Ca)测定 CEJF8000或无机磷(P)测定 CEKA8000或钾(K)测定 CEJA8000或钠(Na)测定 CEJB8000或氯(Cl)测定 CEJC8000或总二氧化碳(TCO2)测定 CEJD1000	麻醉		静脉输液	ABCA0001
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000或 Rh血型c抗原鉴定 CAMG1000或 Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000或 Rh血型e抗原鉴定 CAMJ1000或 Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000	全身麻醉	HAA42901	药物	
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000	/腰麻复合连续硬膜外阻滞麻醉	HAC42103	静脉补液	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000	手术		抗菌药物	
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000	经腹全子宫切除术	HTD75301		
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	病理			
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001		
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	药物			
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	抗菌药物			
胸部X线摄影	EABJT001	静脉补液			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703				
经腹部妇科彩色多普勒超声检查	EDCTA002				
病理					
妇科脱落细胞学检查与诊断	BBAB0001				
治疗					
一般灌肠	ABGE0001				
导尿管留置	ABHA0002				
静脉采血	ABBB0001				
阴道冲洗	ABZF0001				
会阴擦洗	ABZE0001				
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
治疗		治疗		治疗	
		院内遥测心电监护	KKA28701	经皮盆腔引流管调管术	HQU63101
药物		监测			
				药物	
		病理		止血药物	
		冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感染标本冷冻切片病理诊断BCBB0001		
		药物			
		止血药物			

子宫平滑肌瘤
经腹腔镜全子宫切除术

适用对象：	病种编码：	MS012	
	主要诊断：	子宫平滑肌瘤	ICD-10码：D25.0-D25.2, D25.9
	主要操作/主要治疗方式：	经腹腔镜全子宫切除术	CCHI码：HTD75501
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD10：D25.0-D25.2, D25.9子宫平滑肌瘤 疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断时，但在住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 患者一般情况良好，恢复正常饮食，腹部无阳性体征。 2. 相关实验室检查结果基本正常，体温正常。 3. 切口愈合良好。		
最短住院日参考值：	5 天		
变异条件：	1. 因实验室检查结果异常需要复查，导致术前住院时间延长。 2. 其他意外情况需进一步明确诊断，导致术前住院时间延长。 3. 术后出现发热及出血等并发症需要治疗和住院观察，导致住院时间延长。		
再入院间隔时间：	1个月 例外情况：1) 因手术并发症需入院治疗；2) 因其他疾病需入院治疗		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查		/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			/III级护理	ACAA0001
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		检查	
粪便常规检查	CCCA3000	导尿管留置	ABHA0002	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	静脉输液	ABCA0001	治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000	会阴擦洗	ABZE0001	静脉采血	ABBB0001
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测 定CEJC8000和总二氧化 化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测 定CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000	监测		换药 (中)	ABFA0002
血型鉴定	ABOABOABO血型鉴定 (正定型) CAMA1000或 ABO血型鉴定 (反定 型) CAMB1000或ABO亚 型鉴定 (正定 型) CAMD1000或ABO亚 型鉴定 (反定 型) CAME1000或RhD血 型鉴定 CAMF1000	全身麻醉下呼吸功能 监测	HAN05902	静脉输液	ABCA0001
生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 或天门冬氨酸氨基转 移酶 (AST) 测定 CECB1000或总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000或直接胆红 素 (D-Bil) 测定 CELB1000或 γ -谷氨 酰基转移酶 (GGT) 测 定CECC8000或总蛋白 (TP) 测定CEAA8000或 白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000或碱性磷酸 酶 (ALP) 测定 CECD8000或乳酸脱氢 酶 (LD) 测定CECW1000 或尿素 (Urea) 测定 CEEA8000或肌酐 (Cr) 测定CEEB8000或尿酸 (UA) 测定CEEE8000或 肌酐清除率 (Cr) 测定	麻醉		药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
生化常规检查	肌酸激酶(CK)测定 CECS1000或肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定 CECT1000或甘油三酯(TG)测定 CEHB1000或总胆固醇(TC)测定 CEHA1000或高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定 CEHC1000或低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定 CEHD1000或葡萄糖(Glu)测定 CEFA8000或总钙(Ca)测定 CEJF8000或无机磷(P)测定 CEKA8000或钾(K)测定 CEJA8000或钠(Na)测定 CEJB8000或氯(Cl)测定 CEJC8000或总二氧化碳(TCO2)测定 CEJD1000	麻醉		药物	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000或 Rh血型c抗原鉴定 CAMG1000或 Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000或Rh血型e抗原鉴定 CAMJ1000或 Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000	全身麻醉	HAA42901	静脉补液	
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000	/腰麻复合连续硬膜外阻滞麻醉	HAC42103	抗菌药物	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000	手术			
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000	经腹腔镜全子宫切除术	HTD75501		
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	病理			
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001		
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	药物			
胸部X线摄影	EABJT001	抗菌药物			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	静脉补液			
经腹部妇科彩色多普勒超声检查	EDCTA002				
病理					
妇科脱落细胞学检查与诊断	BBAB0001				
治疗					
一般灌肠	ABGE0001				
导尿管留置	ABHA0002				
静脉采血	ABBB0001				
阴道冲洗	ABZF0001				
会阴擦洗	ABZE0001				
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001				
治疗		治疗		治疗	
		院内遥测心电监护	KKA28701	会阴擦洗	ABZE0001
药物		监测		药物	
				止血药物	
		病理			
		冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断BCBA0001或特异性感染标本冷冻切片病理诊断BCBB0001		
		药物			
		止血药物			

子宫平滑肌瘤

经阴道全子宫切除术

适用对象：	病种编码：	MS013	
	主要诊断：	子宫平滑肌瘤	ICD-10码：D25.0-D25.2, D25.9
	主要操作/主要治疗方式：	经阴道全子宫切除术	CCHI码：HTD75401
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD10：D25.0-D25.2, D25.9子宫平滑肌瘤 疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断时，但在住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 患者一般情况良好，恢复正常饮食，腹部无阳性体征。 2. 相关实验室检查结果基本正常，体温正常。 3. 切口愈合良好。		
最短住院日参考值：	5 天		
变异条件：	1. 因实验室检查结果异常需要复查，导致术前住院时间延长。 2. 其他意外情况需进一步明确诊断，导致术前住院时间延长。 3. 术后出现发热及出血等并发症需要治疗和住院观察，导致住院时间延长。		
再入院间隔时间：	1个月	例外情况：1) 因手术并发症需入院治疗；2) 因其他疾病需入院治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II 级护理	ACAB0001			I 级护理	ACAC0001
检查		I 级护理	ACAC0001	/ II 级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查		/III级护理	ACAA0001
尿常规化学分析	CCAA2000			检查	
粪便常规检查	CCCA3000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	导尿管留置	ABHA0002	治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABOABOABO血型鉴定 (正定型)CAMA1000或 ABO血型鉴定(反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定(正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定(反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000	静脉输液	ABCA0001	静脉采血	ABBB0001
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000或 Rh血型c 抗原鉴定CAMG1000或 Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000或Rh血型e 抗原鉴定CAMJ1000或 Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000	会阴擦洗	ABZE0001	会阴擦洗	ABZE0001
生理盐水介质交叉配 血	CAMW1000	监测		静脉输液	ABCA0001
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	全身麻醉下呼吸功能 监测	HAN05902	药物	
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	全身麻醉	HAA42901		
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	/腰麻复合连续硬膜 外阻滞麻醉	HAC42103		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 或天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000或总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000或直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000或 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000或总蛋白 (TP) 测定CEAA8000或 白蛋白 (Alb) 测定 CEAE8000或碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000或乳酸脱氢酶 (LD) 测定CECW1000 或尿素 (Urea) 测定 CEEA8000或肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000或尿酸 (UA) 测定CEEE8000或 肌酸激酶 (CK) 测定 CECS1000或肌酸激酶-MB同工酶活性 (CK-MB) 测定CECT1000或 甘油三酯 (TG) 测定 CEHB1000或总胆固醇 (TC) 测定CEHA1000或 高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C) 测定 CEHC1000或低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C) 测定 CEHD1000或葡萄糖 (Glu) 测定 CEFA8000或总钙 (Ca) 测定CEJF8000或无机磷 (P) 测定CEKA8000 或钾 (K) 测定 CEJA8000或钠 (Na) 测定CEJB8000或氯 (Cl) 测定CEJC8000或总二氧化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定 CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和 白蛋白 (Alb) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000和尿素 (Urea) 测定CEEA8000 和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000	麻醉		抗菌药物	
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV) 测定	CGMF1000	手术			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	经阴道全子宫切除术	HTD75401		
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	病理			
胸部X线摄影	EABJT001	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001		
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道常规心电图检查 FKA03702或十二通道常规心电图检查 FKA03703	药物			
经腹部妇科彩色多普勒超声检查	EDCTA002	静脉补液			
病理					
妇科脱落细胞学检查与诊断	BBAB0001	抗菌药物			
治疗					
一般灌肠	ABGE0001				
导尿管留置	ABHA0002				
静脉采血	ABBB0001				
阴道冲洗	ABZF0001				
会阴擦洗	ABZE0001				
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
治疗		治疗		治疗	
		院内遥测心电监护	KKA28701	经皮盆腔引流管调管术	HQU63101
药物		监测		药物	
				止血药物	
		病理			
		冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感染标本冷冻切片病理诊断BCBB0001		
		药物			
		止血药物			

子宫平滑肌瘤
经腹子宫次全切除术

适用对象：	病种编码：	MS014	
	主要诊断：	子宫平滑肌瘤	ICD-10码：D25.0-D25.2, D25.9
	主要操作/主要治疗方式：	经腹子宫次全切除术	CCHI码：HTD73303
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD10：D25.0-D25.2, D25.9子宫平滑肌瘤 疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断时，但在住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 患者一般情况良好，恢复正常饮食，腹部无阳性体征。 2. 相关实验室检查结果基本正常，体温正常。 3. 切口愈合良好。		
最短住院日参考值：	5 天		
变异条件：	1. 因实验室检查结果异常需要复查，导致术前住院时间延长。 2. 其他意外情况需进一步明确诊断，导致术前住院时间延长。 3. 术后出现发热及出血等并发症需要治疗和住院观察，导致住院时间延长。		
再入院间隔时间：	1个月 例外情况：1) 因手术并发症需入院治疗；2) 因其他疾病需入院治疗		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查		/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			/III级护理	ACAA0001
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		检查	
粪便常规检查	CCCA3000	导尿管留置	ABHA0002	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	静脉输液	ABCA0001	治疗	
血型鉴定	ABOABOABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	会阴擦洗	ABZE0001	静脉采血	ABBB0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000或 Rh血型c 抗原鉴定CAMG1000或 Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000或Rh血型e 抗原鉴定CAMJ1000或 Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000	监测		会阴擦洗	ABZE0001
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000	全身麻醉下呼吸功能 监测	HAN05902	静脉输液	ABCA0001
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	麻醉		药物	
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	/腰麻复合连续硬膜 外阻滞麻醉	HAC42103	抗菌药物	
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	手术			
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	经腹子宫次全切除术	HTD73303		
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000	病理			
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	快速石蜡切片病理诊 断	BCBC0001		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 或天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定CECB1000或总胆红素 (T-Bil) 测定CELA1000或直接胆红素 (D-Bil) 测定CELB1000或 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定CECC8000或总蛋白 (TP) 测定CEAA8000或白蛋白 (A1b) 测定CEAE8000或碱性磷酸酶 (ALP) 测定CECD8000或乳酸脱氢酶 (LD) 测定CECW1000或尿素 (Urea) 测定CEEA8000或肌酐 (Cr) 测定CEEB8000或尿酸 (UA) 测定CEEE8000或肌酸激酶 (CK) 测定CECS1000或肌酸激酶-MB同工酶活性 (CK-MB) 测定CECT1000或甘油三酯 (TG) 测定CEHB1000或总胆固醇 (TC) 测定CEHA1000或高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C) 测定CEHC1000或低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C) 测定CEHD1000或葡萄糖 (Glu) 测定CEFA8000或总钙 (Ca) 测定CEJF8000或无机磷 (P) 测定CEKA8000或钾 (K) 测定CEJA8000或钠 (Na) 测定CEJB8000或氯 (Cl) 测定CEJC8000或总二氧化碳 (TCO2) 测定CEJD1000和丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (A1b) 测定CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定CECD8000和尿素 (Urea) 测定CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000	全身麻醉	HAA42901	静脉补液	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
胸部X线摄影	EABJT001	药物			
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	抗菌药物			
经腹部妇科彩色多普勒超声检查	EDCTA002	静脉补液			
病理					
妇科脱落细胞学检查与诊断	BBAB0001				
治疗					
一般灌肠	ABGE0001				
导尿管留置	ABHA0002				
静脉采血	ABBB0001				
阴道冲洗	ABZF0001				
会阴擦洗	ABZE0001				
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
治疗		治疗		治疗	
		院内遥测心电监护	KKA28701	经皮盆腔引流管调管术	HQU63101
药物		监测		药物	
				止血药物	
		病理			
		冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断BCBA0001或特异性感染标本冷冻切片病理诊断BCBB0001		
		药物			
		止血药物			

子宫平滑肌瘤
腹腔镜联合阴式全子宫切除术

适用对象：	病种编码：	MS015	
	主要诊断：	子宫平滑肌瘤	ICD-10码：D25.0-D25.2, D25.9
	主要操作/主要治疗方式：	腹腔镜联合阴式全子宫切除术	CCHI码：HTD75801
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD10：D25.0-D25.2, D25.9子宫平滑肌瘤 疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断时，但在住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 患者一般情况良好，恢复正常饮食，腹部无阳性体征。 2. 相关实验室检查结果基本正常，体温正常。 3. 切口愈合良好。		
最短住院日参考值：	5 天		
变异条件：	1. 因实验室检查结果异常需要复查，导致术前住院时间延长。 2. 其他意外情况需进一步明确诊断，导致术前住院时间延长。 3. 术后出现发热及出血等并发症需要治疗和住院观察，导致住院时间延长。		
再入院间隔时间：	1个月	例外情况：1) 因手术并发症需入院治疗；2) 因其他疾病需入院治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001			I级护理	ACAC0001
检查		I级护理	ACAC0001	/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查		/III级护理	ACAA0001
尿常规化学分析	CCAA2000			检查	
粪便常规检查	CCCA3000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	导尿管留置	ABHA0002	尿常规化学分析	CCAA2000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000	静脉输液	ABCA0001	粪便常规检查	CCCA3000
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测 定CEJC8000和总二氧化 化碳 (TCO2)测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测 定CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000	会阴擦洗	ABZE0001	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红 素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶 (GGT) 测 定CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和 白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶 (ALP) 测定 CECD8000
血型鉴定	ABOABOABO血型鉴定 (正定型)CAMA1000或 ABO血型鉴定 (反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定 (正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定 (反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000	监测		肾脏功能检查	尿素 (Urea)测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000或 Rh血型c 抗原鉴定CAMG1000或 Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000或Rh血型e 抗原鉴定CAMJ1000或 Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000	麻醉		静脉采血	ABBB0001
生理盐水介质交叉配 血	CAMW1000	全身麻醉	HAA42901	换药 (中)	ABFA0002
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间 (APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间 (PT) 测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	/腰麻复合连续硬膜 外阻滞麻醉	HAC42103	会阴擦洗	ABZE0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 或天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000或总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000或直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000或 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000或总蛋白 (TP) 测定CEAA8000或 白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000或碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000或乳酸脱氢酶 (LD) 测定CECW1000 或尿素 (Urea) 测定 CEEA8000或肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000或尿酸 (UA) 测定CEEB8000或 肌酸激酶 (CK) 测定 CECS1000或肌酸激酶-MB同工酶活性 (CK-MB) 测定 CECT1000或甘油三酯 (TG) 测定 CEHB1000或总胆固醇 (TC) 测定CEHA1000或 高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C) 测定 CEHC1000或低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C) 测定 CEHD1000或葡萄糖 (Glu) 测定 CEFA8000或总钙 (Ca) 测定CEJF8000或无机 磷 (P) 测定CEKA8000或钾 (K) 测定 CEJA8000或钠 (Na) 测定CEJB8000或氯 (Cl) 测定 CEJC8000或总二氧化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902	治疗	
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs) 测定	乙型肝炎表面抗原定性 (HBsAg) 测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量 (HBsAg) 测定 CGLH1000	手术		药物	
丙型肝炎抗体 (抗HCV) 测定	CGMA1000	腹腔镜联合阴式全子宫切除术	HTD75801	静脉补液	
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV) 测定	CGMF1000	病理			
梅毒螺旋体抗体 (抗TP) 测定	CGPP1000	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001		
胸部X线摄影	EABJT001	药物			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703	抗菌药物			
经腹部妇科彩色多普勒超声检查	EDCTA002	静脉补液			
病理					
妇科脱落细胞学检查与诊断	BBAB0001				
治疗					
一般灌肠	ABGE0001				
导尿管留置	ABHA0002				
静脉采血	ABBB0001				
阴道冲洗	ABZF0001				
会阴擦洗	ABZE0001				
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001			电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000
治疗		治疗		治疗	
		院内遥测心电监护	KKa28701		
药物		监测		药物	
				抗菌药物	
		病理		止血药物	
		冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感染标本冷冻切片病理诊断BCBB0001		
		药物			
		止血药物			

子宫平滑肌瘤
经宫腔镜黏膜下肌瘤切除术

适用对象：	病种编码：	MS016	
	主要诊断：	子宫平滑肌瘤	ICD-10码：D25.0-D25.2, D25.9
	主要操作/主要治疗方式：	经宫腔镜黏膜下肌瘤切除术	CCHI码：HTF73603
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD10：D25.0-D25.2, D25.9子宫平滑肌瘤 疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断时，但在住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。 3. 不具备子宫肌瘤切除的手术指征。		
出院标准：	1. 患者一般情况良好，恢复正常饮食，腹部无阳性体征。 2. 相关实验室检查结果基本正常，体温正常。 3. 切口愈合良好。		
最短住院日参考值：	4天		
变异条件：	1. 因实验室检查结果异常需要复查，导致术前住院时间延长。 2. 其他意外情况需进一步明确诊断，导致术前住院时间延长。 3. 术后出现发热及出血等并发症需要治疗和住院观察，导致住院时间延长。		
再入院间隔时间：	1个月 例外情况：1) 因手术并发症需入院治疗；2) 因其他疾病需入院治疗		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查		/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			/III级护理	ACAA0001
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		检查	
粪便常规检查	CCCA3000	导尿管留置	ABHA0002	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000和无机磷(P)测定CEKA8000	静脉输液	ABCA0001	治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABOABOABO血型鉴定 (正定型)CAMA1000或 ABO血型鉴定(反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定(正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定(反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000	会阴擦洗	ABZE0001	静脉采血	ABBB0001
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000或 Rh血型c 抗原鉴定CAMG1000或 Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000或Rh血型e 抗原鉴定CAMJ1000或 Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000	监测		会阴擦洗	ABZE0001
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000	全身麻醉下呼吸功能 监测	HAN05902	药物	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	麻醉		静脉补液	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
生化常规检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 或天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000或总胆红素(T-Bil)测定 CELA1000或直接胆红素(D-Bil)测定 CELB1000或 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定 CECC8000或总蛋白(TP)测定CEAA8000或 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000或碱性磷酸酶(ALP)测定 CECD8000或乳酸脱氢酶(LD)测定CECW1000 或尿素(Urea)测定 CEEA8000或肌酐(Cr)测定 CEEB8000或尿酸(UA)测定 CEEE8000或肌酸激酶(CK)测定 CECS1000或肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定 CECT1000或甘油三酯(TG)测定 CEHB1000或总胆固醇(TC)测定 CEHA1000或高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定 CEHC1000或低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定 CEHD1000或葡萄糖(Glu)测定 CEFA8000	全身麻醉	HAA42901		
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	/腰麻复合连续硬膜外阻滞麻醉	HAC42103		
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	手术			
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	经宫腔镜黏膜下肌瘤切除术	HTF73603		
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	药物			
胸部X线摄影	EABJT001	抗菌药物			
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道常规心电图检查 FKA03702或十二通道常规心电图检查 FKA03703	静脉补液			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
经腹部妇科彩色多普勒超声检查	EDCTA002				
病理					
妇科脱落细胞学检查与诊断	BBAB0001				
治疗					
一般灌肠	ABGE0001				
导尿管留置	ABHA0002				
静脉采血	ABBB0001				
阴道冲洗	ABZF0001				
会阴擦洗	ABZE0001				
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001			电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000
血浆D-二聚体(D-Dimer)测定	CAJY1000	治疗		肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
治疗		院内遥测心电监护	KKA28701	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000
		监测		治疗	
药物					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
		病理		药物	
		冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感 染标本冷冻切片病理 诊断BCBB0001	抗菌药物	
		药物		止血药物	
		止血药物			
		促宫缩药物			

宫颈癌

经腹腔镜全子宫切除术

适用对象：	病种编码：	MS017			
	主要诊断：	宫颈癌		ICD-10码：	C53. 0, C53. 1, C53. 8, C53. 9
	主要操作/主要治疗方式：	经腹腔镜全子宫切除术		CCHI码：	HTD75501
入院标准：		1. 第一诊断符合ICD-10：C53. 0, C53. 1, C53. 8, C53. 9宫颈癌疾病编码。 2. FIGO分期： I a2期- II a期（肿瘤>4cm，已完成术前辅助治疗者）。 3. 符合手术适应证，无手术禁忌证。 4. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
出院标准：		1. 病人一般情况良好，体温正常，完成复查项目。 2. 伤口愈合好。 3. 没有需要住院处理的并发症/合并症。			
最短住院日参考值：	10-20天				
变异条件：		1. 有影响手术的合并症，需要进行相关的诊断和治疗，相应延长住院时间，增加治疗费用。 2. 术中发现无法行根治性全子宫切除术，仅行卵巢移位，术后放疗。 3. 术后根据病理需辅助放化疗。 4. 出现手术并发症需对症处理。			
再入院间隔时间：	1个月	例外情况：1）因手术并发症需入院治疗。2）因其他疾病需入院治疗。			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查		/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
粪便常规检查	CCCA3000	导尿管留置	ABHA0002	尿常规化学分析	CCAA2000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000	监测		肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	无创心电监测	FKA05705	肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000
泌尿系B超检查	EDBRA001	麻醉		电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测定CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测定CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000
盆腔X线计算机体层 (CT) 平扫	EBAQU001	全身麻醉	HAA42901	膀胱残余尿量B超测定	EDBRG001
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000	/腰麻复合连续硬膜外阻滞麻醉	HAC42103	治疗	
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测定CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测定CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000	手术		换药 (中)	ABFA0002
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000	经腹腔镜全子宫切除术	HTD75501	静脉输液	ABCA0001
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间 (APTT) 测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间 (PT) 测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000	病理		病理	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000				
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000或 Rh血型c抗原鉴定CAMH1000或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	药物		药物	
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000	麻醉常规用药		抗菌药物	
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000 和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000 和乙肝病毒表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定CGLJ1000 和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000 和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000				
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000				
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
胸部X线摄影	EABJT001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703				
病理					
手术标本病理诊断	BCAD0001				
妇科液基薄层细胞学检查与诊断	BBAE0001				
治疗					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
清洁灌肠	ABGE0004				
静脉采血	ABBB0001				
阴道冲洗	ABZF0001				
药物					
预防性抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
特殊介质交叉配血	CAMX1000	治疗		鳞状细胞癌相关抗原（SCC）测定	CGRW1000
疑难交叉配血	CAMY1000	氧气吸入	ABJA0001	血浆D-二聚体（D-Dimer）测定	CAJY1000
鳞状细胞癌相关抗原（SCC）测定	CGRW1000	静脉输液	ABCA0001	治疗	
糖类抗原CA-125测定	CGRP1000	输血	静脉输血ABCD0001或 加压快速输血 ABCE0001	输血	静脉输血ABCD0001或 加压快速输血 ABCE0001
甲胎蛋白（AFP）测定	CGRB8000	监测		病理	
人绒毛膜促性腺激素（HCG）测定	CERR8000	院内遥测心电监护	KKA28701		
癌胚抗原（CEA）测定	CGRA1000	病理		药物	
盆腔磁共振成像	ECAQU001	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感 染标本冷冻切片病理 诊断BCBB0001	抗凝药物	
静脉肾盂X线造影	EACRC001	药物		抗贫血药	
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活 量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403或最大 通气量功能检查 FJE01404	抗菌药物		白蛋白	
弥散功能检查	肺弥散功能检查—一 口气法FJE01405或肺 弥散功能检查—重复 呼吸法FJE01406	止血药物		酌情镇痛、止吐、补 液、维持水电解质平 衡治疗	
气道阻力测定	FJB02401			止血药物	
心功能测定	左心室收缩功能超声 测定EDFKJ001或左心 室舒张功能超声测定 EDFKJ002				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血浆D-二聚体 (D-Dimer) 测定	CAJY1000				
腹部CT检查	上腹部X线计算机体层 (CT) 平扫EBAQT001 或下腹部X线计算机体层 (CT) 平扫EBAQT002				
胸部X线计算机体层 (CT) 平扫	EBAJT001				
尿流动力学检测	FRA02402				
治疗					
经膀胱镜输尿管支架置入术	HRF62604				
药物					
阴道上药					

宫颈癌

腹腔镜联合阴式全子宫切除术

适用对象：	病种编码：	MS018			
	主要诊断：	宫颈癌		ICD-10码：	C53. 0, C53. 1, C53. 8, C53. 9
	主要操作/主要治疗方式：	腹腔镜联合阴式全子宫切除术		CCHI码：	HTD75801
	入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10：C53. 0, C53. 1, C53. 8, C53. 9宫颈癌疾病编码。 2. FIGO分期：I a2期-II a期（肿瘤>4cm，已完成术前辅助治疗者）。 3. 符合手术适应证，无手术禁忌证。 4. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 病人一般情况良好，体温正常，完成复查项目。 2. 伤口愈合好。 3. 没有需要住院处理的并发症/合并症。			
	最短住院日参考值：	10-20天			
	变异条件：	1. 有影响手术的合并症，需要进行相关的诊断和治疗，相应延长住院时间，增加治疗费用。 2. 术中发现无法行根治性经腹全子宫切除术，仅行卵巢移位，术后放疗。 3. 术后根据病理需辅助放化疗。 4. 出现手术并发症需对症处理。			
	再入院间隔时间：	1个月 例外情况：1）因手术并发症需入院治疗。2）因其他疾病需入院治疗。			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查		/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
粪便常规检查	CCCA3000	导尿管留置	ABHA0002	尿常规化学分析	CCAA2000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	监测		肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	无创心电监测	FKA05705	肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000
泌尿系B超检查	EDBRA001	麻醉		电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测 定CEJC8000和总二氧 化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测 定CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000	全身麻醉	HAA42901	膀胱残余尿量B超测 定	EDBRG001
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测 定CEJC8000和总二氧 化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测 定CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000	/腰麻复合连续硬膜 外阻滞麻醉	HAC42103	治疗	
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000	手术		换药 (中)	ABFA0002
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间 (APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间 (PT) 测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	腹腔镜联合阴式全子 宫切除术	HTD75801	静脉输液	ABCA0001
血型鉴定	ABO血型鉴定 (正定 型)CAMA1000或ABO血 型鉴定 (反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定 (正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定 (反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000	病理		病理	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000或 Rh血型c 抗原鉴定CAMH1000或 Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000或Rh血型e 抗原鉴定CAMK1000或 Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000				
生理盐水介质交叉配 血	CAMW1000	药物		药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000 和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000 和乙肝病毒表面抗原确认试验 (HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000 和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定 CGLK1000 和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定 CGLL1000	麻醉常规用药		抗菌药物	
盆腔X线计算机体层(CT)平扫	EBAQU001				
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000				
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
胸部X线摄影	EABJT001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道常规心电图检查 FKA03702或十二通道常规心电图检查 FKA03703				
活检组织病理诊断	BCAB0001				
/手术标本病理诊断	/BCAD0001				
妇科脱落细胞学检查与诊断	BBAB0001				
/妇科液基薄层细胞学检查与诊断	BBAE0001				
治疗					
清洁灌肠	ABGE0004				
静脉采血	ABBB0001				
阴道冲洗	ABZF0001				
药物					
预防性抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
特殊介质交叉配血	CAMX1000	治疗		鳞状细胞癌相关抗原（SCC）测定	CGRW1000
疑难交叉配血	CAMY1000	氧气吸入	ABJA0001	血浆D-二聚体（D-Dimer）测定	CAJY1000
鳞状细胞癌相关抗原（SCC）测定	CGRW1000	静脉输液	ABCA0001	治疗	
糖类抗原CA-125测定	CGRP1000	输血	静脉输血ABCD0001或 加压快速输血 ABCE0001	显微镜下角膜拆线	HEH64301
甲胎蛋白（AFP）测定	CGRB8000	监测		输血	静脉输血ABCD0001或 加压快速输血 ABCE0001
人绒毛膜促性腺激素（HCG）测定	CERR8000	院内遥测心电监护	KKA28701	病理	
癌胚抗原（CEA）测定	CGRA1000	病理			
盆腔磁共振成像	ECAQU001	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感 染标本冷冻切片病理 诊断BCBB0001	药物	
静脉肾盂X线造影	EACRC001	药物		抗凝药物	
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活 量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403或最大 通气量功能检查 FJE01404	抗菌药物		抗贫血药	
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一 口气法FJE01405或肺 弥散功能检查-重复 呼吸法FJE01406	止血药物		白蛋白	
气道阻力测定	FJB02401			酌情镇痛、止吐、补 液、维持水电解质平 衡治疗	
心功能测定	左心室收缩功能超声 测定EDFKJ001或左心 室舒张功能超声测定 EDFKJ002			止血药物	
血浆D-二聚体（D-Dimer）测定	CAJY1000				
腹部CT检查	上腹部X线计算机体 层（CT）平扫EBAQT001 或下腹部X线计算机 体层（CT）平扫 EBAQT002				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001				
尿流动力学检测	FRA02402				
治疗					
经膀胱镜输尿管支架置入术	HRF62604				
药物					
阴道上药					

宫颈癌

经腹膜外盆腔淋巴结切除术

适用对象：	病种编码：	MS019			
	主要诊断：	宫颈癌		ICD-10码：	C53. 0, C53. 1, C53. 8, C53. 9
	主要操作/主要治疗方式：	经腹膜外盆腔淋巴结切除术		CCHI码：	HNL73302
	入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10：C53. 0, C53. 1, C53. 8, C53. 9宫颈癌疾病编码。 2. FIGO分期： I a2期- II a期（肿瘤>4cm，已完成术前辅助治疗者）。 3. 符合手术适应证，无手术禁忌证。 4. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 病人一般情况良好，体温正常，完成复查项目。 2. 伤口愈合好。 3. 没有需要住院处理的并发症/合并症。			
	最短住院日参考值：	10-20天			
	变异条件：	1. 有影响手术的合并症，需要进行相关的诊断和治疗，相应延长住院时间，增加治疗费用。 2. 术中发现无法行根治性经腹全子宫切除术，仅行卵巢移位，术后放疗。 3. 术后根据病理需辅助化疗。 4. 出现手术并发症需对症处理。			
	再入院间隔时间：	1个月 例外情况：1）因手术并发症需入院治疗。2）因其他疾病需入院治疗。			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查		/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
粪便常规检查	CCCA3000	导尿管留置	ABHA0002	尿常规化学分析	CCAA2000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	监测		肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	无创心电监测	FKA05705	肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000
泌尿系B超检查	EDBRA001	麻醉		电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测 定CEJC8000和总二氧化 化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测 定CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000
盆腔X线计算机体层 (CT) 平扫	EBAQU001	全身麻醉	HAA42901	膀胱残余尿量B超测 定	EDBRG001
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000	/腰麻复合连续硬膜 外阻滞麻醉	HAC42103	治疗	
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测 定CEJC8000和总二氧化 化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测 定CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000	手术		换药 (中)	ABFA0002
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000	经腹全子宫切除术	HTD75301	静脉输液	ABCA0001
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间 (APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间 (PT) 测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	病理		病理	
血型鉴定	ABO血型鉴定 (正定 型) CAMA1000或ABO血 型鉴定 (反定 型) CAMB1000或ABO亚 型鉴定 (正定 型) CAMD1000或ABO亚 型鉴定 (反定 型) CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000				
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000或 Rh血型c 抗原鉴定CAMH1000或 Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000或Rh血型e 抗原鉴定CAMK1000或 Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000	药物		药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000	麻醉常规用药		抗菌药物	
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000 和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000 和乙肝病毒表面抗原确认试验 (HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000 和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定 CGLK1000 和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定 CGLL1000				
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000				
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
胸部X线摄影	EABJT001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道常规心电图检查 FKA03702或十二通道常规心电图检查 FKA03703				
病理					
手术标本病理诊断	BCAD0001				
妇科液基薄层细胞学检查与诊断	BBAE0001				
治疗					
清洁灌肠	ABGE0004				
静脉采血	ABBB0001				
阴道冲洗	ABZF0001				
药物					
预防性抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
特殊介质交叉配血	CAMX1000	治疗		鳞状细胞癌相关抗原(SCC)测定	CGRW1000
疑难交叉配血	CAMY1000	监测		血浆D-二聚体(D-Dimer)测定	CAJY1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
鳞状细胞癌相关抗原（SCC）测定	CGRW1000	院内遥测心电监护	KKA28701	治疗	
糖类抗原CA-125测定	CGRP1000	氧气吸入	ABJA0001	输血	静脉输血ABCD0001或 加压快速输血 ABCE0001
甲胎蛋白（AFP）测定	CGRB8000	静脉输液	ABCA0001	病理	
人绒毛膜促性腺激素（HCG）测定	CERR8000	输血	静脉输血ABCD0001或 加压快速输血 ABCE0001		
癌胚抗原（CEA）测定	CGRA1000	病理		药物	
盆腔磁共振成像	ECAQU001	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或特异性感 染标本冷冻切片病理 诊断BCBB0001	抗凝药物	
静脉肾盂X线造影	EACRC001	药物		抗贫血药	
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活 量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403或最大 通气量功能检查 FJE01404	抗菌药物		白蛋白	
弥散功能检查	肺弥散功能检查—一 口气法FJE01405或肺 弥散功能检查—重复 呼吸法FJE01406	止血药物		酌情镇痛、止吐、补 液、维持水电解质平 衡治疗	
气道阻力测定	FJB02401			止血药物	
心功能测定	左心室收缩功能超声 测定EDFKJ001或左心 室舒张功能超声测定 EDFKJ002				
血浆D-二聚体（D- Dimer）测定	CAJY1000				
腹部CT检查	上腹部X线计算机体 层（CT）平扫EBAQT001 或下腹部X线计算机 体层（CT）平扫 EBAQT002				
胸部X线计算机体层 （CT）平扫	EBAJT001				
尿流动力学检测	FRA02402				
治疗					
经膀胱镜输尿管支架 置入术	HRF62604				
药物					
阴道上药					

宫颈癌
经腹全子宫切除术

适用对象：	病种编码：	MS020	
	主要诊断：	宫颈癌	ICD-10码：C53. 0, C53. 1, C53. 8, C53. 9
	主要操作/主要治疗方式：	经腹全子宫切除术	CCHI码：HTD75301
入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10：C53. 0, C53. 1, C53. 8, C53. 9宫颈癌疾病编码。 2. FIGO分期： I a2期- II a期（肿瘤＞4cm，已完成术前辅助治疗者）。 3. 符合手术适应证，无手术禁忌证。 4. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 病人一般情况良好，体温正常，完成复查项目。 2. 伤口愈合好。 3. 没有需要住院处理的并发症/合并症。		
最短住院日参考值：	10-20天		
变异条件：	1. 有影响手术的合并症，需要进行相关的诊断和治疗，相应延长住院时间，增加治疗费用。 2. 术中发现无法行根治性经腹全子宫切除术，仅行卵巢移位，术后放疗。 3. 术后根据病理需辅助放化疗。 4. 出现手术并发症需对症处理。		
再入院间隔时间：	1个月 例外情况：1）因手术并发症需入院治疗。2）因其他疾病需入院治疗。		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查		/ II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
粪便常规检查	CCCA3000	导尿管留置	ABHA0002	尿常规化学分析	CCAA2000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000	监测		肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	无创心电监测	FKA05705	肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000
泌尿系B超检查	EDBRA001	麻醉		电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测定CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测定CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000
盆腔X线计算机体层 (CT) 平扫	EBAQU001	全身麻醉	HAA42901	膀胱残余尿量B超测定	EDBRG001
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000	/腰麻复合连续硬膜外阻滞麻醉	HAC42103	治疗	
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测定CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测定CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000	手术		换药 (中)	ABFA0002
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000	经腹全子宫切除术	HTD75301	静脉输液	ABCA0001
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间 (APTT) 测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间 (PT) 测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000	病理		病理	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000				
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000或 Rh血型c抗原鉴定CAMH1000或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	药物		药物	
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000	麻醉常规用药		抗菌药物	
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000 和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000 和乙肝病毒表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定CGLJ1000 和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000 和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000				
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000				
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
胸部X线摄影	EABJT001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703				
病理					
手术标本病理诊断	BCAD0001				
妇科液基薄层细胞学检查与诊断	BBAE0001				
治疗					
清洁灌肠	ABGE0004				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
静脉采血	ABBB0001				
阴道冲洗	ABZF0001				
药物					
预防性抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
特殊介质交叉配血	CAMX1000			鳞状细胞癌相关抗原（SCC）测定	CGRW1000
疑难交叉配血	CAMY1000	治疗		血浆D-二聚体（D-Dimer）测定	CAJY1000
鳞状细胞癌相关抗原（SCC）测定	CGRW1000	氧气吸入	ABJA0001	治疗	
糖类抗原CA-125测定	CGRP1000	静脉输液	ABCA0001	输血	静脉输血ABCD0001或加压快速输血ABCE0001
甲胎蛋白（AFP）测定	CGRB8000	输血	静脉输血ABCD0001或加压快速输血ABCE0001	病理	
人绒毛膜促性腺激素（HCG）测定	CERR8000	监测			
癌胚抗原（CEA）测定	CGRA1000	院内遥测心电监护	KKA28701	药物	
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001	病理		抗凝药物	
盆腔磁共振成像	ECAQU001	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断BCBA0001或特异性感染标本冷冻切片病理诊断BCBB0001	抗贫血药	
盆腔X线计算机体层（CT）平扫	EBAQU001	药物		白蛋白	
静脉肾盂X线造影	EACRC001	抗菌药物		酌情镇痛、止吐、补液、维持水电解质平衡治疗	
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404	止血药物		止血药物	
弥散功能检查	肺弥散功能检查—一口气法FJE01405或肺弥散功能检查—重复呼吸法FJE01406				
气道阻力测定	FJB02401				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
心功能测定	左心室收缩功能超声测定EDFKJ001或左心室舒张功能超声测定EDFKJ002				
血浆D-二聚体(D-Dimer)测定	CAJY1000				
腹部CT检查	上腹部X线计算机体层(CT)平扫EBAQT001或下腹部X线计算机体层(CT)平扫EBAQT002				
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001				
尿流动力学检测	FRA02402				
治疗					
经膀胱镜输尿管支架置入术	HRF62604				
药物					
阴道上药					

宫颈癌
经腹腔广泛子宫切除术

适用对象：	病种编码：	MS021	
	主要诊断：	宫颈癌	ICD-10码：C53.0, C53.1, C53.8, C53.9
	主要操作/主要治疗方式：	经腹广泛性子宫切除术	CCHI码：HTD77302
入院标准：		1. 第一诊断符合ICD-10：C53.0, C53.1, C53.8, C53.9宫颈癌疾病编码。 2. FIGO分期：I a2期-II a期（或肿瘤>4cm，已完成术前新辅助治疗者）。 3. 符合手术适应证，无手术禁忌证。 4. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。	
出院标准：		1. 病人一般情况良好，体温正常，完成复查项目。 2. 伤口愈合好。 3. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。	
最短住院日参考值：	7-8天		
变异条件：		1. 有影响手术的合并症，需要进行相关的诊断和治疗，相应延长住院时间，增加治疗费用。 2. 术中发现无法行根治性全子宫切除，仅行卵巢移位，术后放疗。 3. 术后根据病理需辅助化疗。 4. 出现手术并发症需对症处理。	
再入院间隔时间：		1个月 例外情况：1) 因手术并发症需入院治疗；2) 需要化疗或放疗等后续治疗而入院；3) 因其他疾病需入院治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查		/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
粪便常规检查	CCCA3000	导尿管留置	ABHA0002	尿常规化学分析	CCAA2000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	静脉输液	ABCA0001	治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000	院内遥测心电监护	KKA28701	经皮盆腔引流管调管 术	HQU63101
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	监测		会阴擦洗	ABZE0001
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000			换药	换药(小)ABFA0001或 换药(中)ABFA0002或 换药(大)ABFA0003或 换药(特大)ABFA0004
血型鉴定	ABOABOABO血型鉴定 (正定型)CAMA1000或 ABO血型鉴定(反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定(正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定(反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000	麻醉		经皮盆腔引流管调管 术	HQU63101
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000或 Rh血型c 抗原鉴定CAMG1000或 Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000或Rh血型e 抗原鉴定CAMJ1000或 Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000	全身麻醉	HAA42901	静脉输液	ABCA0001
生理盐水介质交叉配 血	CAMW1000	/腰麻复合连续硬膜 外阻滞麻醉	HAC42103	药物	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	手术		抗菌药物	
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	经腹广泛性子宫切除 术	HTD77302	静脉补液	
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	经腹腔镜淋巴结切除 术	HNL73301		
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000	经腹腔镜盆腔淋巴结 切除术	HNL73501		
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	病理			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001				
胸部X线摄影	EABJT001	药物			
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703	抗菌药物			
泌尿系B超检查	EDBRA001	止血药物			
经腹部妇科彩色多普勒超声检查	EDCTA002	静脉补液			
治疗					
一般灌肠	ABGE0001				
静脉采血	ABBB0001				
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
特殊介质交叉配血	CAMX1000			肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000
疑难交叉配血	CAMY1000	治疗		电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000
人乳头瘤病毒脱氧核糖核酸检测	人乳头瘤病毒脱氧核糖核酸扩增检测 CLBS8000或人乳头瘤病毒脱氧核糖核酸非扩增定性检测 CLBT8000	氧气吸入	ABJA0001	一般细菌培养+鉴定+药敏	CJAR8000
鳞状细胞癌相关抗原(SCC)测定	CGRW1000	静脉输血	ABCD0001	治疗	
盆腔磁共振成像	ECAQU001	手术			
盆腔X线计算机体层(CT)平扫	EBAQU001	经腹腹主动脉旁淋巴结切除术	HNJ73302	药物	
/盆腔X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBQU001	病理		止吐、止痛药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肿瘤标志物测定	癌胚抗原(CEA)测定 CGRA1000或甲胎蛋白(AFP)测定CGRB8000或碱性胎儿蛋白(BFP)测定CGRC1000或总前列腺特异性抗原(TPSA)测定 CGRD1000或游离前列腺特异性抗原(FPSA)测定CGRE1000或复合前列腺特异性抗原(CPSA)测定CGRF1000或前列腺酸性磷酸酶(PAP)测定CGRG1000或神经元特异性烯醇化酶(NSE)测定 CGRH1000或细胞角蛋白19片段测定 CGRJ1000或细胞角蛋白18片段测定 CGRK1000或糖类抗原CA-27测定CGRL1000或糖类抗原CA-29测定CGRM1000或糖类抗原CA-50测定 CGRN1000或糖类抗原CA-125测定CGRP1000或糖类抗原CA-130测定CGRQ1000或糖类抗原CA-153测定 CGRR1000或糖类抗原CA-199测定CGRS1000或糖类抗原CA-242测定CGRT1000或糖类抗原CA-549测定 CGRU1000或糖类抗原CA-724测定CGRV1000或鳞状细胞癌相关抗原(SCC)测定 CGRW1000或肿瘤坏死因子(TNF)测定 CGRX1000或肿瘤坏死因子 α (TNF- α)测定 CGRY1000或肿瘤相关抗原(MG-Ags)测定 CGRZ1000或肿瘤相关抗原(TA-2)测定 CGSA1000或显形胶质蛋白(AP)测定 CGSB1000或恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定CGSC1000或肿瘤相关物质测定 CGSD1000或人附睾分泌蛋白(HE4)测定 CGSE1000或高尔基体蛋白73(GP73)测定 CGSF1000或组织多肽特异抗原(TPS)测定 CGSG1000或端粒酶活性检测CGSH1000或等克分子前列腺特异抗原测定 CGSJ1000或尿核基质蛋白(NMP22)测定 CGSK1000或甲胎蛋白异质体测定CGSL1000	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
腹部尿路X线摄影(KUB)	EABRA001	药物			
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404	止血药物			
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一口气法FJE01405或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406				
气道阻力测定	FJB02401				
PET/CT肿瘤局部显像	EEFZX001				
治疗					
药物					

宫颈癌

经腹腔镜广泛子宫切除术

适用对象：	病种编码：	MS022			
	主要诊断：	宫颈癌		ICD-10码：	C53. 0, C53. 1, C53. 8, C53. 9
	主要操作/主要治疗方式：	经腹腔镜广泛子宫切除术		CCHI码：	HTD77502
入院标准：		1. 第一诊断符合ICD-10：C53. 0, C53. 1, C53. 8, C53. 9宫颈癌疾病编码。 2. FIGO分期： I a2期- II a期（或肿瘤＞4cm，已完成术前新辅助治疗者）。 3. 符合手术适应证，无手术禁忌证。 4. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
出院标准：		1. 病人一般情况良好，体温正常，完成复查项目。 2. 伤口愈合好。 3. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。			
最短住院日参考值：	7-8天				
变异条件：		1. 有影响手术的合并症，需要进行相关的诊断和治疗，相应延长住院时间，增加治疗费用。 2. 术中发现无法行根治性全子宫切除，仅行卵巢移位，术后放疗。 3. 术后根据病理需辅助放化疗。 4. 出现手术并发症需对症处理。			
再入院间隔时间：		1个月 例外情况：1）因手术并发症需入院治疗；2）需要化疗或放疗等后续治疗而入院；3）因其他疾病需入院治疗			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查		/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
粪便常规检查	CCCA3000	导尿管留置	ABHA0002	尿常规化学分析	CCAA2000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	静脉输液	ABCA0001	治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEE8000和肌酐(Cr) 测定CEE8000和尿酸 (UA)测定CEE8000	院内遥测心电监护	KKA28701	会阴擦洗	ABZE0001
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	监测		换药	换药(小)ABFA0001或 换药(中)ABFA0002或 换药(大)ABFA0003或 换药(特大)ABFA0004
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000			经皮盆腔引流管调管 术	HQU63101
血型鉴定	ABOABOABO血型鉴定 (正定型)CAMA1000或 ABO血型鉴定(反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定(正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定(反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000	麻醉		静脉输液	ABCA0001
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000或 Rh血型c 抗原鉴定CAMG1000或 Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000或Rh血型e 抗原鉴定CAMJ1000或 Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000	全身麻醉	HAA42901	药物	
生理盐水介质交叉配 血	CAMW1000	/腰麻复合连续硬膜 外阻滞麻醉	HAC42103	抗菌药物	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	手术		静脉补液	
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	经腹腔镜广泛子宫切 除术	HTD77502		
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	经腹腔镜盆腔淋巴结 切除术	HNL73501		
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000	经腹腔镜盆腔淋巴结切 除术	HNL73301		
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	病理			
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
胸部X线摄影	EABJT001	药物			
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703	抗菌药物			
泌尿系B超检查	EDBRA001	止血药物			
经腹部妇科彩色多普勒超声检查	EDCTA002	静脉补液			
治疗					
一般灌肠	ABGE0001				
静脉采血	ABBB0001				
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
特殊介质交叉配血	CAMX1000			肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA) 测定CEEE8000
疑难交叉配血	CAMY1000	治疗		电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测定 CEJC8000和总二氧化 化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测定 CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000
人乳头瘤病毒脱氧核糖核酸检测	人乳头瘤病毒脱氧核糖核酸扩增检测 CLBS8000或人乳头瘤病毒脱氧核糖核酸非扩增定性检测 CLBT8000	氧气吸入	ABJA0001	一般细菌培养+鉴定+药敏	CJAR8000
鳞状细胞癌相关抗原 (SCC) 测定	CGRW1000	静脉输血	ABCD0001	治疗	
盆腔磁共振成像	ECAQU001	手术			
盆腔X线计算机体层 (CT) 平扫	EBAQU001	经腹腹主动脉旁淋巴结切除术	HNJ73302	药物	
/盆腔X线计算机体层 (CT) 增强扫描	EBBQU001	病理		止吐、止痛药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肿瘤标志物测定	癌胚抗原(CEA)测定 CGRA1000或甲胎蛋白 (AFP)测定CGRB8000 或碱性胎儿蛋白 (BFP)测定CGRC1000 或总前列腺特异性抗 原(TPSA)测定 CGRD1000或游离前列 腺特异性抗原(FPSA) 测定CGRE1000或复合 前列腺特异性抗原 (CPSA)测定CGRF1000 或前列腺酸性磷酸酶 (PAP)测定CGRG1000 或神经元特异性烯醇 化酶(NSE)测定 CGRH1000或细胞角蛋 白19片段测定 CGRJ1000或细胞角蛋 白18片段测定 CGRK1000或糖类抗原 CA-27测定CGRL1000 或糖类抗原CA-29测 定CGRM1000或糖类抗 原CA-50测定 CGRN1000或糖类抗原 CA-125测定CGRP1000 或糖类抗原CA-130测 定CGRQ1000或糖类抗 原CA-153测定 CGRR1000或糖类抗原 CA-199测定CGRS1000 或糖类抗原CA-242测 定CGRT1000或糖类抗 原CA-549测定 CGRU1000或糖类抗原 CA-724测定CGRV1000 或鳞状细胞癌相关抗 原(SCC)测定 CGRW1000或肿瘤坏死 因子(TNF)测定 CGRX1000或肿瘤坏死 因子 α (TNF- α)测定 CGRY1000或肿瘤相关 抗原(MG-Ags)测定 CGRZ1000或肿瘤相关 抗原(TA-2)测定 CGSA1000或显形胶质 蛋白(AP)测定 CGSB1000或恶性肿瘤 特异生长因子(TSGF) 测定CGSC1000或肿瘤 相关物质测定 CGSD1000或人附睾分 泌蛋白(HE4)测定 CGSE1000或高尔基体 蛋白73(GP73)测定 CGSF1000或组织多肽 特异抗原(TPS)测定 CGSG1000或端粒酶活 性检测CGSH1000或等 克分子前列腺特异抗 原测定CGSJ1000或尿 核基质蛋白(NMP22) 测定CGSK1000或甲胎 蛋白异质体测定 CGSL1000	快速石蜡切片病理诊 断	BCBC0001		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
腹部尿路X线摄影(KUB)	EABRA001	药物			
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活 量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403或最大 通气量功能检查 FJE01404	止吐、止痛药物			
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一 口气法FJE01405或肺 弥散功能检查-重复 呼吸法FJE01406				
气道阻力测定	FJB02401				
PET/CT肿瘤局部显像	EEFZX001				
治疗					
药物					

十四、妊娠、分娩和产褥期疾病

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
NS001	自然临产阴道分娩	单胎顺产接生
NS002	计划性剖宫产	子宫下段剖宫产术
NS003	产钳助产分娩	产钳助产术
NS004	胎膜早破（足月）行阴道分娩	单胎顺产接生

自然临产阴道分娩

单胎顺产接生

适用对象：	病种编码：	NS001			
	主要诊断：	自然临产阴道分娩		ICD-10码：	080.0
	主要操作/主要治疗方式：	单胎顺产接生		CCHI码：	HUE52401
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：080.0孕足月头位自然临产编码。 2. 无阴道分娩禁忌症。 3. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 产后恢复良好。 2. 会阴伤口愈合良好。			
	最短住院日参考值：	2-3天			
	变异条件：	1. 产程中若出现剖宫产指征（如胎儿窘迫、头位难产等），转入剖宫产临床路径，退出本路径。 2. 阴道手术助产者，可适当延长住院时间。 3. 产后出现感染、出血、尿潴留等并发症，导致住院时间延长。 4. 新生儿出生后新生儿窒息需新生儿复苏及抢救者出路径。 5. 产程中若使用无痛分娩，退出本路径，转入自然临产阴道无痛分娩路径。			
	再入院间隔时间：	已分娩结束无需再住院			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001
检查		新生儿护理	ACBA0001	/ II 级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	/早产儿护理	ACBB0001	新生儿护理	ACBA0001
尿常规化学分析	CCAA2000	检查		检查	
骨盆内外测	FUA02701			血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
粪便常规检查	CCCA3000	治疗		治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000	静脉输液	ABCA0001	静脉输液	ABCA0001
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和γ-谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000	手术		会阴擦洗	ABZE0001
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	单胎顺产接生	HUE52401	产后围产期乳房按摩	KYA20701
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000或ABO血 型鉴定(反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定(正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定(反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000	病理		药物	
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000				
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	药物			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	止血药物			
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
经腹部妇科彩色多普勒超声检查	EDCTA002				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703				
胎心监护	KUE28701				
治疗					
会阴擦洗	ABZE0001				
产程观察	KUA28901				
静脉采血	ABBB0001				
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
经腹部胎儿 常规B超检 查	EDBUE001	治疗		治疗	
生理盐水介 质交叉配血	CAMW1000	氧气吸入	ABJA0001	超短波治疗	LEBZX030
治疗		手术		换药	换药(小)ABFA0001或 换药(中)ABFA0002或 换药(大)ABFA0003或 换药(特大)ABFA0004
氧气吸入	ABJA0001	会阴侧切缝合术	HTW83701	经皮盆腔引流管调管 术	HQU63101
药物		会阴 I - II 度裂伤缝 合术	HTW83702	药物	
		低位人工破膜术	HUH50301	促子宫收缩药物	
		高位人工破膜术	HUH50302	抗菌药物	
		药物			
		促子宫收缩药物			
		催产素点滴			
		抗菌药物			
		减毒活疫苗			
		促凝血药			

计划性剖宫产

子宫下段剖宫产术

适用对象：	病种编码：	NS002			
	主要诊断：	计划性剖宫产		ICD-10码：	082
	主要操作/主要治疗方式：	子宫下段剖宫产术		CCHI码：	HUE52303
	入院标准：	1. 第一诊断为ICD-10：082。首选治疗方案符合：HUE52303子宫下段剖宫产术手术编码者。 2. 孕妇患有其他疾病时，但在住院期间不需特殊处理，也不影响第一诊断的临床路径流程，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 一般状况良好，体温正常。 2. 血、尿常规化学分析基本正常。 3. 切口愈合良好。 4. 少量阴道出血。			
	最短住院日参考值：	5天			
	变异条件：	1. 孕妇原因延期手术。 2. 子宫复旧不良，并发阴道流血过多。 3. 并发产褥病率。 4. 切口延期愈合。			
	再入院间隔时间：	已分娩结束无需再住院			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
Ⅱ级护理	ACAB0001	Ⅰ级护理	ACAC0001	Ⅰ级护理	ACAC0001
检查		新生儿护理	ACBA0001	/Ⅱ级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	/早产儿护理	ACBB0001	新生儿护理	ACBA0001
尿常规化学分析	CCAA2000	检查		检查	
粪便常规检查	CCCA3000			血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000	治疗		尿常规化学分析	CCAA2000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和γ-谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(Alb)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000	静脉输液	ABCA0001	治疗	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000或ABO血 型鉴定(反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定(正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定(反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000	会阴擦洗	ABZE0001	氧气吸入	ABJA0001
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	氧气吸入	ABJA0001	产后围产期乳房按摩	KYA20701
乙型肝炎表面抗原(抗 HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	麻醉		静脉输液	ABCA0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	硬膜外阻滞麻醉	骶管单次阻滞麻醉 HAC42104或颈部硬膜外单次阻滞麻醉 HAC42105或颈部硬膜外连续阻滞麻醉 HAC42106或胸部硬膜外单次阻滞麻醉 HAC42107或胸部硬膜外连续阻滞麻醉 HAC42108或腰部硬膜外单次阻滞麻醉 HAC42109或腰部硬膜外连续阻滞麻醉 HAC42110或骶管连续阻滞麻醉HAC42111	药物	
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	/全身麻醉	HAA42901	抗菌药物	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	/局部静脉内麻醉	HAB42201	促子宫收缩药物	
经腹部妇科彩色多普勒超声检查	EDCTA002	/连续腰麻	HAC42102		
胎心监护	KUE28701	/腰麻复合连续硬膜外阻滞麻醉	HAC42103		
治疗		手术			
氧气吸入	ABJA0001	子宫下段剖宫产术	HUE52303		
导尿管留置	ABHA0002	病理			
静脉采血	ABBB0001				
药物		药物			
抗菌药物		促子宫收缩药物			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	治疗		治疗	
治疗		静脉输血	ABCD0001	换药(大)	ABFA0003
		新生儿复苏术	HAR30902	经皮盆腔引流管调管术	HQU63101
药物		病理		药物	
		快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001		
		药物			
		抗菌药物			
		减毒活疫苗			
		促凝血药			
		止血药物			

产钳助产分娩
产钳助产术

适用对象：	病种编码：	NS003	
	主要诊断：	产钳助产分娩	ICD-10码:081
	主要操作/主要治疗方式：	产钳助产术	CCHI码:HUE52408
	入院标准：	1. 第一诊断符合ICD-10码:081产钳助产分娩。 2. 符合手术适应证，无手术禁忌证。 3. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。	
	出院标准：	1. 一般情况良好，体温正常，完成复查项目。 2. 子宫复旧良好。 3. 会阴伤口愈合好。 4. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。	
	最短住院日参考值：	5天	
	变异条件：	1. 本路径以阴道分娩方式终止妊娠，若为剖宫产则进入剖宫产临床路径。 2. 因化验检查异常需要复查。 3. 有影响手术的合并症，需要进行相关的诊断和治疗。 4. 因手术并发症需要进一步治疗。	
	再入院间隔时间：	1个月 例外情况：1) 因手术并发症需入院治疗；2) 因其他疾病需入院治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查		/ II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	阴道检查	阴道分泌物检查CCEB5000或阴道分泌物过氧化氢检测CCED5000	检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	妇产科超声检查	经腹部妇科彩色多普勒超声检查EDCTA002或经阴道彩色多普勒超声检查EDCTA003	血气分析	CEJM1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	胎心监护	KUE28701	换药(中)	ABFA0002
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	治疗		治疗	
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	导尿	ABHA0001	会阴擦洗	ABZE0001
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	静脉输液	ABCA0001	药物	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	麻醉		静脉补液	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	踝关节局部阻滞麻醉	HAB42101	催产素	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000或 Rh血型c 抗原鉴定CAMH1000或 Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000或Rh血型e 抗原鉴定CAMK1000或 Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000	手术			
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000	产钳助产术	HUE52408		
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	会阴侧切缝合术	HTW83701		
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	单胎顺产接生	HUE52401		
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	药物			
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703	催产素			
妇产科多普勒检查	经腹部妇科彩色多普勒超声检查EDCTA002 或经阴道彩色多普勒 超声检查EDCTA003	静脉补液			
阴道检查	阴道分泌物检查 CCEB5000或阴道分泌 物过氧化氢检测 CCED5000				
宫颈粘液评分	FTG01401				
骨盆内外测量	FUA02701				
胎心监护	KUE28701				
治疗					
氧气吸入	ABJA0001				
静脉采血	ABBB0001				
药物					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
粪便常规检查	CCCA3000	一般细菌革兰染色+培养+鉴定+药敏	CJAS8000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000	治疗		妇产科超声检查	经腹部妇科彩色多普勒超声检查EDCTA002或经阴道彩色多普勒超声检查EDCTA003
经阴道羊膜镜检查	FUH01601	氧气吸入	ABJA0001	治疗	
治疗		轻度子宫裂伤修补术	HUM83401	换药(中)	ABFA0002
一般灌肠	ABGE0001	中度子宫裂伤修补	HUM83402	静脉输液	ABCA0001
药物		重度子宫裂伤修补	HUM83403	药物	
		病理		抗菌药物	
		手术标本病理诊断	BCAD0001	止血药物	
		药物		促子宫收缩药物	
		抗菌药物		抗生素	
		止血药物			

胎膜早破（足月）行阴道分娩
单胎顺产接生

适用对象： 病种编码： NS004

主要诊断： 胎膜早破（足月）行阴道分娩 ICD-10码： 042

主要操作/主要治疗方式： 单胎顺产接生 CCHI码： HUE5240

入院标准： 1. 第一诊断必须符合ICD-10：042胎膜早破（足月）疾病编码。
2. 无阴道分娩禁忌症。
3. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。

出院标准： 1. 一般状况良好。
2. 无感染征象。
3. 无产科并发症。

最短住院日参考值： 3-4天

变异条件： 1. 本路径以阴道分娩方式终止妊娠，若为剖宫产则进入剖宫产临床路径。
2. 实施本路径时，若产程中、引产中及治疗过程中出现剖宫产指征（如胎儿窘迫、难产等），即退出路径。
3. 有感染者退出路径。
4. 引产至阴道分娩结束时间不确定，跨度可为1-3天，故标准住院天数存在变异。
5. 若在阴道分娩过程中，发生其他产科并发症则转入相应疾病路径。

再入院时间间隔： 1个月 例外情况：1）因手术并发症需入院治疗；2）因其他疾病需入院治疗

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001
II 级护理	ACAB0001	II 级护理	ACAB0001	II 级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		尿常规化学分析	CCAA2000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000或血浆D-二 聚体(D-Dimer)测定 CAJY1000	皮内注射	ABAA0001	治疗	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000或ABO血 型鉴定(反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定(正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定(反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000	手术			
乙型肝炎五 项检查	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000和乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000 和乙肝病 毒表面抗原确认试验 (HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000和乙型肝炎 表面抗体定性(抗 HBs)测定CGLK1000和 乙型肝炎表面抗体定 量(抗HBs)测定 CGLL1000	单胎顺产接生	HUE52401		
丙型肝炎抗 体(抗HCV) 测定	CGMA1000	药物		药物	
人免疫缺陷 病毒抗体 (抗HIV)测 定	CGMF1000			预防性抗菌药物	
梅毒螺旋体 抗体(抗TP) 测定	CGPP1000				
肾脏功能检 查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000				
胎心监护	KUE28701				
治疗					
会阴擦洗	ABZE0001				
产程观察	KUA28901				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000				
C-反应蛋白(CRP)测定	CGCA1000	治疗		治疗	
产科B超检查	经阴道妇科B超检查EDBTA002和经腹部胎儿常规B超检查EDBUE001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	药物		药物	
		抗菌药物		促子宫收缩药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
		促子宫收缩药物			

十五、新生儿、孕期导致的婴儿疾病

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
OM001	母婴ABO血型不合溶血病	

母婴ABO血型不合溶血病

适用对象：

疾病编码：

OM001

主要诊断：

母婴ABO血型不合溶血病

ICD-10码：P55.800

主要操作/主要治疗方式：

CCHI码：

入院标准：

1. 第一诊断必须符合ICD-10：P55.800疾病编码。
2. 当患者同时具有其他疾病诊断，只要住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。

出院标准：

1. 血清胆红素稳定下降，结束光疗24-48小时后，胆红素仍低于需要临床干预的黄疸标准。
2. 血红蛋白稳定。
3. 患儿一般情况好，体重增加理想。

最短住院日参考值：

7-10天

变异条件：

1. 存在使高胆红素血症进一步加重的其他情况，需要处理干预。
2. 患儿如发生胆红素脑病，需要其他相关检查及处理，延长住院治疗时间。

再入院时间间隔：

7天

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	静脉输液	ABCA0001	维生素	
尿常规化学分析	CCAA2000	监测			
粪便常规检查	CCCA3000	心电监护	院内遥测心电监护 KKA28701 或无创心电监测 FKA05705		
网织红细胞(Ret)显微	CAAE1000				
直接抗人球蛋白(Coombs')试验	CAFH1000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000				
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr)测定 CEEB8000和尿酸(UA)测定 CEEE8000				
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙(Ca)测定 CEJF8000				
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定 CELB1000间接胆红素(I-Bil)测定 CELC1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定 CECC8000和总蛋白(TP)测定 CEAA8000和白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定 CECD8000				
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000				
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000				
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
脑干听觉诱发电位检查	FBF03701	新生儿换血术	ABCK0001	抗癫痫及抗惊厥药	
颅脑磁共振成像	ECABA001	静脉输血	ABCD0001	肠道益生菌	
稳态听觉诱发电位检查	FFA01705	输血输液加温治疗	HAQ32701	清肝利胆药	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000			免疫球蛋白	
δ-胆红素测定	CELD1000			白蛋白	
瞬态声诱发耳声发射检查	FFA01402			抗生素	
外周血细胞形态学分析	CAAS1000			促凝血药	
母子交叉免疫	ABO血型系统抗体致新生儿溶血病检测 CAND1000或Rh血型系统抗体致新生儿溶血病检测 CANE1000			钙剂	
心肌酶检查	肌酸激酶(CK)测定 CECS1000或肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定 CECT1000				
胸部X线透视	EAAJT001				
心脏彩色多普勒超声	EDFKA007				

十六、肌肉骨骼系统和结缔组织疾病

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
PS001	腰椎间盘突出症	腰椎间盘突出术
PS002	腰椎间盘突出症	经椎间盘镜髓核摘除术(MED)
PS003	腰椎间盘突出症	前路椎间盘切除人工椎间盘置换术
PS004	股骨颈骨折	全髋人工关节置换术
PS005	股骨颈骨折	人工股骨头置换术
PS006	胫骨平台骨折	胫骨骨折切开复位内固定术
PS007	踝关节骨折	踝关节骨折切开复位内固定术
PS008	股骨干骨折	股骨干骨折切开复位内固定术
PS009	股骨干骨折	股骨干骨折闭合复位髓内针内固定术
PS010	闭合性髌骨骨折	髌骨骨折闭合复位内固定术
PS011	闭合性髌骨骨折	髌骨骨折切开复位内固定术
PS012	闭合性尺骨鹰嘴骨折	尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术
PS013	闭合性尺骨鹰嘴骨折	尺骨鹰嘴骨折闭合复位内固定术
PS014	闭合性尺桡骨干骨折	尺骨干骨折闭合复位钢板螺丝钉内固定术
PS015	闭合性尺桡骨干骨折	桡骨干骨折切开复位钢板螺丝钉内固定术
PS016	闭合性尺桡骨干骨折	尺骨干骨折切开复位髓内针内固定术
PS017	闭合性尺桡骨干骨折	桡骨干骨折切开复位髓内针内固定术
PS018	闭合性肱骨干骨折	肱骨干骨折切开复位钢板螺丝钉内固定术
PS019	胫腓骨干骨折	胫骨骨折闭合复位钢板螺丝钉内固定术

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
PS020	胫腓骨干骨折	胫骨骨折闭合复位髓内针内固定术
PS021	胫腓骨干骨折	胫骨骨折切开复位髓内针内固定术
PS022	胫腓骨干骨折	胫骨骨折切开复位内固定术
PS023	胫腓骨干骨折	腓骨骨折闭合复位钢板螺丝钉内固定术
PS024	胫腓骨干骨折	腓骨骨折切开复位髓内针内固定术
PS025	闭合性胫骨平台骨折	胫骨平台骨折切开复位钢板螺丝钉内固定术
PS026	闭合性胫骨平台骨折	胫骨平台骨折闭合复位内固定术
PS027	发育性髌脱位	先天性髌关节脱位切开复位骨盆股骨截骨内固定术
PS028	股骨干骨折	股骨干骨折闭合复位外固定架固定术
PS029	股骨干骨折	股骨干骨折切开复位外固定架固定术
PS030	股骨干骨折	股骨干骨折闭合复位钢板螺丝钉内固定术
PS031	髌关节骨关节炎	全髌人工关节置换术
PS032	膝关节骨关节炎	关节镜下膝关节清理术
PS033	膝内翻畸形	胫骨高位外侧截骨术
PS034	膝内翻畸形	胫骨高位内侧截骨术
PS035	先天性肌性斜颈	肌肉松解术
PS036	重度膝关节骨关节炎	全膝人工关节置换术
PS037	颈椎病	前路颈椎间盘切除椎间植骨融合内固定术
PS038	股骨头坏死（FicatIII-IV期，严重疼痛伴功能障碍）	全髌人工关节置换术

腰椎间盘突出症

腰椎间盘突出摘除术

适用对象：	病种编码：	PS001	ICD-10码：
	主要诊断：	腰椎间盘突出症	M51.003/M51.004/M51.000, M51.101/M51.103/M51.100, M51.202/M51.204/M51.200
	主要操作/主要治疗方式：	腰椎间盘突出	CCHI码：HVV56302
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：M51.003/M51.004/M51.000, M51.101/M51.103/M51.100, M51.202/M51.204/M51.200腰椎间盘突出症疾病编码。 2. 如患有其他疾病，但住院期间不需要特殊处理，也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。 3. 不合并腰椎管狭窄及腰椎不稳定。	
	出院标准：	1. 体温正常，常规化验指标无明显异常。 2. 伤口愈合良好：引流管拔除，伤口无感染征象（或可在门诊处理的伤口情况），无皮瓣坏死。 3. 术后复查内植物位置满意。 4. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。	
	最短住院日参考值：	7天	
	变异条件：	1. 围手术期并发症：伤口感染、神经血管输尿管损伤、硬膜外血肿、内植物松动等造成住院日延长和费用增加。 2. 内科合并症：老年患者常合并基础疾病，如脑血管或心血管病、糖尿病、血栓等，手术可能导致这些疾病加重而需要进一步治疗，从而延长治疗时间，并增加住院费用。 3. 内植物的选择：由于病情不同，使用不同的内植物，可能导致住院费用存在差异。	
	再入院间隔时间：	2周	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
III级护理	ACAA0001	I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001
检查		检查		检查	
尿常规化学分析	CCAA2000			血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	治疗		尿常规化学分析	CCAA2000
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000和活化部分凝血活酶时间(APTT)测定 CAGB1000和血浆凝血酶原时间(PT)测定 CAGC1000和血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000和纤维蛋白(原)降解产物(FDP)测定 CAJX1000和血浆D-二聚体(D-Dimer)测定 CAJY1000	静脉输液	ABCA0001	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr)测定 CEEB8000和尿酸(UA)测定 CEEE8000
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000 和乙肝病毒表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定 CGLK1000和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定 CGLL1000	一般灌肠	ABGE0001	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定 CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定 CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定 CECC8000和总蛋白(TP)测定 CEAA8000和白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定 CECD8000
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	血压监测	有创连续动脉血压监测HAN05201 或无创血压监测FKA05709	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙(Ca)测定 CEJF8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	导尿管留置	ABHA0002	腰椎X线摄影	EABVT001
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000			治疗	
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	氧气吸入	ABJA0001	引流管更换	ABZG0001
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	院内遥测心电图监护	KKA28701		
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	静脉输液	ABCA0001	导尿管留置	ABHA0002
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	自体血采集	FNC06201	静脉输液	ABCA0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
胸部X线摄影	EABJT001	监测		换药	换药(小)ABFA0001或 换药(中)ABFA0002或 换药(大)ABFA0003或 换药(特大)ABFA0004
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902	药物	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000或 Rh血型c抗原鉴定CAMG1000或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000或Rh血型e抗原鉴定CAMJ1000或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	麻醉		抗生素	
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	全身麻醉	HAA42901	神经营养药物	
腰椎X线摄影	EABVT001	手术		消炎止痛药物	
腰椎X线计算机体层(CT)平扫	EBAVT001	腰椎间盘突出术	HVU56302		
腰椎磁共振成像	ECAVT001	病理			
院内会诊	AADB0001				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
风湿活动筛查	红细胞沉降率(ESR)测定CAAJ1000和抗链球菌溶血素O(ASO)测定CGPB1000和类风湿因子(RF)测定CGFG1000和超敏C反应蛋白(hs-CRP)测定CEAU1000	药物			
C-反应蛋白(CRP)测定	CGCA1000	抗生素			
配血	生理盐水介质交叉配血CAMW1000或特殊介质交叉配血CAMX1000或疑难交叉配血CAMY1000				
治疗					
一般灌肠	ABGE0001				
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404				
弥散功能检查	肺弥散功能检查--一口气法FJE01405或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	治疗		治疗	
气道阻力测定	FJB02401				
普通二维超声心动图	EDFKA005	药物		药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肌电图监测	FCA03710			镇痛药物	
糖化血红蛋白 (HbA1c)测定	CEBD1000				
血气分析	CEJM1000				
治疗					
静脉输血	ABCD0001				
药物					

腰椎间盘突出症

经椎间盘镜髓核摘除术(MED)

适用对象：	病种编码：	PS002	ICD-10码：	
	主要诊断：	腰椎间盘突出症	M51.003/M51.004/M51.000, M51.101/M51.103/M51.100, M51.202/M51.204/M51.200	
	主要操作/主要治疗方式：	经椎间盘镜髓核摘除术(MED)	CCHI码：	HVF56501
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：M51.003/M51.004/M51.000, M51.101/M51.103/M51.100, M51.202/M51.204/M51.200腰椎间盘突出症疾病编码。 2. 如患有其他疾病，但住院期间不需要特殊处理，也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。 3. 不合并腰椎管狭窄及腰椎不稳定。		
	出院标准：	1. 体温正常，常规化验指标无明显异常。 2. 伤口愈合良好：引流管拔除，伤口无感染征象（或可在门诊处理的伤口情况），无皮瓣坏死。 3. 术后复查内植物位置满意。 4. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。		
	最短住院日参考值：	7天		
	变异条件：	1. 围手术期并发症：伤口感染、神经血管输尿管损伤、硬膜外血肿、内植物松动等造成住院日延长和费用增加。 2. 内科合并症：老年患者常合并基础疾病，如脑血管或心血管病、糖尿病、血栓等，手术可能导致这些疾病加重而需要进一步治疗，从而延长治疗时间，并增加住院费用。 3. 内植物的选择：由于病情不同，使用不同的内植物，可能导致住院费用存在差异。		
	再入院间隔时间：	2周		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
III级护理	ACAA0001	I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		尿常规化学分析	CCAA2000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000和活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000和血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000和血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000和纤维蛋白 (原)降解产物(FDP) 测定CAJX1000和血浆 D-二聚体(D-Dimer) 测定CAJY1000	一般灌肠	ABGE0001	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000和乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000 和乙肝病 毒表面抗原确认试验 (HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000和乙型肝炎 表面抗体定性(抗 HBs)测定CGLK1000和 乙型肝炎表面抗体定 量(抗HBs)测定 CGLL1000	血压监测	有创连续动脉血压监 测HAN05201 或无创 血压监测FKA05709	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	氧气吸入	ABJA0001	电解质检查	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	静脉输液	ABCA0001	腰椎X线摄影	EABVT001
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000			治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	自体血采集	FNC06201	换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	导尿管留置	ABHA0002	引流管更换	ABZG0001
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	院内遥测心电监护	KKA28701	导尿管留置	ABHA0002
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	监测		静脉输液	ABCA0001
胸部X线摄影	EABJT001	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902	药物	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	麻醉		抗生素	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000或 Rh血型c 抗原鉴定CAMG1000或 Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000或Rh血型e 抗原鉴定CAMJ1000或 Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000	全身麻醉	HAA42901	神经营养药物	
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703	手术		消炎止痛药物	
腰椎X线摄影	EABVT001	经椎间盘镜髓核摘除 术(MED)	HVF56501		
腰椎X线计算机体层 (CT)平扫	EBAVT001	病理			
腰椎磁共振成像	ECAVT001				
院内会诊	AADB0001	药物			
风湿活动筛查	红细胞沉降率(ESR) 测定CAAJ1000 和抗链球菌溶血素 O(ASO)测定CGPB1000 和类风湿因子(RF)测 定CGFG1000 和超敏C反应蛋白 (hs-CRP)测定 CEAU1000	抗生素			
C-反应蛋白(CRP)测 定	CGCA1000				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
配血	生理盐水介质交叉配血CAMW1000或特殊介质交叉配血CAMX1000或疑难交叉配血CAMY1000				
血气分析	CEJM1000				
治疗					
一般灌肠	ABGE0001				
静脉输血	ABCD0001				
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404				
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一口气法FJE01405或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	治疗		治疗	
气道阻力测定	FJB02401				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
普通二维超声心动图	EDFKA005	药物		药物	
肌电图监测	FCA03710			镇痛药物	
糖化血红蛋白 (HbA1c)测定	CEBD1000				
治疗					
药物					

腰椎间盘突出症

前路腰椎间盘突出人工椎间盘置换术

适用对象：	病种编码：	PS003	
	主要诊断：	腰椎间盘突出症	ICD-10码： M51.003/M51.004/M51.000, M51.101/M51.103/M51.100, M51.202/M51.204/M51.200
	主要操作/主要治疗方式：	前路腰椎间盘突出人工椎间盘置换术	CCHI码：HVV66302
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10： M51.003/M51.004/M51.000, M51.101/M51.103/M51.100, M51.202/M51.204/M51.200腰椎间盘突出症疾病编码。 2. 如患有其他疾病，但住院期间不需要特殊处理，也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。 3. 不合并腰椎管狭窄及腰椎不稳定。	
	出院标准：	1. 体温正常，常规化验指标无明显异常。 2. 伤口愈合良好：引流管拔除，伤口无感染征象（或可在门诊处理的伤口情况），无皮瓣坏死。 3. 术后复查内植物位置满意。 4. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。	
	最短住院日参考值：	7天	
	变异条件：	1. 围手术期并发症：伤口感染、神经血管输尿管损伤、硬膜外血肿、内植物松动等造成住院日延长和费用增加。 2. 内科合并症：老年患者常合并基础疾病，如脑血管或心血管病、糖尿病、血栓等，手术可能导致这些疾病加重而需要进一步治疗，从而延长治疗时间，并增加住院费用。 3. 内植物的选择：由于病情不同，使用不同的内植物，可能导致住院费用存在差异。	
	再入院间隔时间：	2周	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
III级护理	ACAA0001	I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		尿常规化学分析	CCAA2000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000和活化部分凝血活酶时间(APTT)测定 CAGB1000和血浆凝血酶原时间(PT)测定 CAGC1000和血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000和纤维蛋白(原)降解产物(FDP)测定 CAJX1000和血浆D-二聚体(D-Dimer)测定 CAJY1000	一般灌肠	ABGE0001	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定 CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定 CECC8000和总蛋白(TP)测定 CEAA8000和白蛋白(Alb)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定 CECD8000
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000 和乙肝病毒表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定 CGLK1000和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定 CGLL1000	血压监测	有创连续动脉血压监测HAN05201 或无创血压监测FKA05709	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr)测定 CEEB8000和尿酸(UA)测定 CEEE8000
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	氧气吸入	ABJA0001	电解质检查	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙(Ca)测定 CEJF8000
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	静脉输液	ABCA0001	腰椎X线摄影	EABVT001
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000			治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	自体血采集	FNC06201	换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	导尿管留置	ABHA0002	引流管更换	ABZG0001
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	院内遥测心电监护	KKA28701	导尿管留置	ABHA0002
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	监测		静脉输液	ABCA0001
胸部X线摄影	EABJT001	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902	药物	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	麻醉		抗生素	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000或 Rh血型c 抗原鉴定CAMG1000或 Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000或Rh血型e 抗原鉴定CAMJ1000或 Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000	全身麻醉	HAA42901	神经营养药物	
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703	手术		消炎止痛药物	
腰椎X线摄影	EABVT001	经椎间盘镜髓核摘除 术(MED)	HVF56501		
腰椎X线计算机体层 (CT) 平扫	EBAVT001	病理			
腰椎磁共振成像	ECAVT001				
院内会诊	AADB0001	药物			
风湿活动筛查	红细胞沉降率(ESR) 测定CAAJ1000 和抗链球菌溶血素 O(ASO)测定CGPB1000 和类风湿因子(RF)测 定CGFG1000 和超敏C反应蛋白 (hs-CRP)测定 CEAU1000	抗生素			
C-反应蛋白(CRP)测 定	CGCA1000				
配血	生理盐水介质交叉配 血CAMW1000或特殊介 质交叉配血CAMX1000 或疑难交叉配血 CAMY1000				
治疗					
一般灌肠	ABGE0001				
静脉输血	ABCD0001				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活 量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403或最大 通气量功能检查 FJE01404				
弥散功能检查	肺弥散功能检查--一 口气法FJE01405或肺 弥散功能检查-重复 呼吸法FJE01406	治疗		治疗	
气道阻力测定	FJB02401				
普通二维超声心动图	EDFKA005	药物		药物	
肌电图监测	FCA03710			镇痛药物	
糖化血红蛋白 (HbA1c)测定	CEBD1000				
血气分析	CEJM1000				
治疗					
药物					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码

股骨颈骨折

全髋人工关节置换术

适用对象：	病种编码：	PS004			
	主要诊断：	股骨颈骨折		ICD-10码：	S72.000
	主要操作/主要治疗方式：	全髋人工关节置换术		CCHI码：	HXD66301
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：S72.000股骨颈骨折疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。 3. 单纯闭合性股骨颈骨折。 4. 除外病理性骨折。			
	出院标准：	1. 体温正常，常规化验指标无明显异常。 2. 伤口愈合良好：引流管拔除，伤口无感染征象（或可在门诊处理的伤口情况），无皮瓣坏死。 3. 术后X线片证实假体位置满意，置换侧髋关节稳定。 4. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。			
	最短住院日参考值：	10天			
	变异条件：	1. 围手术期并发症：深静脉血栓形成、伤口感染、骨折、脱位、神经血管损伤等造成住院日延长和费用增加。 2. 内科合并症：老年患者常合并其他内科疾病，如脑血管或心血管病、糖尿病、血栓等，骨折手术可能导致这些疾病加重而需要进一步治疗，从而延长治疗时间，并增加住院费用。 3. 人工髋关节假体的选择：由于患者病情不同，选择不同的关节假体类型，可能导致住院费用存在差异。			
	再入院间隔时间：	2周			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001
/ II 级护理	ACAB0001	检查		/ II 级护理	ACAB0001
检查		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
尿常规化学分析	CCAA2000	院内遥测心电监护	KKA28701	尿常规化学分析	CCAA2000
粪便常规检查	CCCA3000	静脉输液	ABCA0001	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间 (APTT) 测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间 (PT) 测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000	自体血采集	FNC06201	肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000和尿酸 (UA) 测定 CEEE8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil) 测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil) 测定 CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶 (GGT) 测定 CECC8000和总蛋白 (TP) 测定CEAA8000和白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定 CECD8000	监测		电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测定 CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测定 CEJE8000和总钙 (Ca) 测定 CEJF8000
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000和尿酸 (UA) 测定 CEEE8000			凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间 (APTT) 测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间 (PT) 测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000			髋关节X线摄影	EABXD001
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	麻醉		治疗	
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000 和乙肝病 毒表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定 CGLK1000和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定 CGLL1000	全身麻醉	HAA42901	引流管更换	ABZG0001
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	手术		导尿管留置	ABHA0002
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	全髋人工关节置换术	HXD66301	换药	换药(小)ABFA0001或 换药(中)ABFA0002或 换药(大)ABFA0003或 换药(特大)ABFA0004
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	病理		静脉输液	ABCA0001
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703			药物	
胸部X线摄影	EABJT001	药物		抗生素	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血脂检查	甘油三酯(TG)测定 CEHB1000和总胆固醇 (TC)测定CEHA1000和 高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)测定 CEHC1000和低密度脂 蛋白胆固醇(LDL-C) 测定CEHD1000	胃粘膜保护剂		抗凝药物	
髋关节X线摄影	EABXD001			抗骨质疏松药物	
院内会诊	AADB0001			消炎止痛药物	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000或ABO血 型鉴定(反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定(正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定(反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000				
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000或 Rh血型c 抗原鉴定CAMG1000或 Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000或Rh血型e 抗原鉴定CAMJ1000或 Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000				
骨密度测定	EEAX6002				
配血	生理盐水介质交叉配 血CAMW1000或特殊介 质交叉配血CAMX1000 或疑难交叉配血 CAMY1000				
治疗					
一般灌肠	ABGE0001				
导尿管留置	ABHA0002				
静脉输血	ABCD0001				
药物					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
抗凝药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
血气分析	CEJM1000			电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000
普通二维超声心动图	EDFKA005	治疗		下肢动脉彩色多普勒超声检查	EDCL5001
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404	氧气吸入	ABJA0001	/下肢浅静脉彩色多普勒超声检查	EDCM4001
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一口气法FJE01405或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	药物		/下肢深静脉彩色多普勒超声检查	EDCM1001
气道阻力测定	FJB02401			治疗	
下肢动脉彩色多普勒超声检查	EDCL5001			静脉输血	ABCD0001
/下肢深静脉彩色多普勒超声检查	EDCM1001			药物	
/下肢浅静脉彩色多普勒超声检查	EDCM4001			镇痛药物	
糖化血红蛋白(HbA1c)测定	CEBD1000				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
治疗					
药物					

股骨颈骨折

人工股骨头置换术

适用对象：	病种编码：	PS005			
	主要诊断：	股骨颈骨折		ICD-10码：	S72.000
	主要操作/主要治疗方式：	人工股骨头置换术		CCHI码：	HXG66301
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：S72.000股骨颈骨折疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。 3. 单纯闭合性股骨颈骨折。 4. 除外病理性骨折。				
出院标准：	1. 体温正常，常规化验指标无明显异常。 2. 伤口愈合良好：引流管拔除，伤口无感染征象（或可在门诊处理的伤口情况），无皮瓣坏死。 3. 术后X线片证实假体位置满意，置换侧髋关节稳定。 4. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。				
最短住院日参考值：	10天				
变异条件：	1. 围手术期并发症：深静脉血栓形成、伤口感染、骨折、脱位、神经血管损伤等造成住院日延长和费用增加。 2. 内科合并症：老年患者常合并其他内科疾病，如脑血管或心血管病、糖尿病、血栓等，骨折手术可能导致这些疾病加重而需要进一步治疗，从而延长治疗时间，并增加住院费用。 3. 人工髋关节假体的选择：由于患者病情不同，选择不同的关节假体类型，可能导致住院费用存在差异。				
再入院间隔时间：	2周				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001
/ II 级护理	ACAB0001	检查		/ II 级护理	ACAB0001
检查		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
尿常规化学分析	CCAA2000	导尿管留置	ABHA0002	尿常规化学分析	CCAA2000
粪便常规检查	CCCA3000	静脉输液	ABCA0001	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	自体血采集	FNC06201	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	院内遥测心电图监护	KKA28701	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEE8000和肌酐(Cr) 测定CEE8000和尿酸 (UA)测定CEE8000			凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAG1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAG1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAG1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAG1000
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	麻醉		髋关节X线摄影	EABXD001
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	全身麻醉	HAA42901	治疗	
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000和乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000 和乙肝病 毒表面抗原确认试验 (HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000和乙型肝炎 表面抗体定性(抗 HBs)测定CGLK1000和 乙型肝炎表面抗体定 量(抗HBs)测定 CGLL1000	手术		下肢血栓物理预防	经皮穿刺下肢静脉血 栓超声消融术 HM172201
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	人工股骨头置换术	HXG66301	静脉输液	ABCA0001
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	病理		引流管更换	ABZG0001
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000			导尿管留置	ABHA0002
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703	药物		换药	换药(小)ABFA0001或 换药(中)ABFA0002或 换药(大)ABFA0003或 换药(特大)ABFA0004

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
胸部X线摄影	EABJT001	胃粘膜保护剂			
血脂检查	甘油三酯(TG)测定 CEHB1000和总胆固醇 (TC)测定CEHA1000和 高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)测定 CEHC1000和低密度脂 蛋白胆固醇(LDL-C) 测定CEHD1000			药物	
髋关节X线摄影	EABXD001			抗生素	
院内会诊	AADB0001			抗凝药物	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000或ABO血 型鉴定(反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定(正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定(反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000			抗骨质疏松药物	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000或 Rh血型c 抗原鉴定CAMG1000或 Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000或Rh血型e 抗原鉴定CAMJ1000或 Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000			消炎止痛药物	
配血	生理盐水介质交叉配 血CAMW1000或特殊介 质交叉配血CAMX1000 或疑难交叉配血 CAMY1000				
治疗					
一般灌肠	ABGE0001				
导尿管留置	ABHA0002				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
静脉输血	ABCD0001				
药物					
抗凝药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
血气分析	CEJM1000			下肢动脉彩色多普勒超声检查	EDCL5001
普通二维超声心动图	EDFKA005	治疗		/下肢浅静脉彩色多普勒超声检查	EDCM4001
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404	氧气吸入	ABJA0001	/下肢深静脉彩色多普勒超声检查	EDCM1001
弥散功能检查	肺弥散功能检查—一口气法FJE01405或肺弥散功能检查—重复呼吸法FJE01406	药物		治疗	
气道阻力测定	FJB02401			静脉输血	ABCD0001
下肢动脉彩色多普勒超声检查	EDCL5001				
/下肢深静脉彩色多普勒超声检查	EDCM1001			药物	
/下肢浅静脉彩色多普勒超声检查	EDCM4001			镇痛药物	
糖化血红蛋白(HbA1c)测定	CEBD1000				
治疗					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
药物					

胫骨平台骨折

胫骨骨折切开复位内固定术

适用对象：	病种编码：	PS006	
	主要诊断：	胫骨平台骨折	ICD-10码：S82.101
	主要操作/主要治疗方式：	胫骨骨折切开复位内固定术	CCHI码：HXP70316
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：S82.101胫骨平台骨折疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。 3. 闭合性胫骨平台骨折。 4. 除外病理性骨折。		
出院标准：	1. 体温正常，常规化验指标无明显异常。 2. 伤口愈合良好：引流管拔除，伤口无感染征象（或可在门诊处理的伤口情况），无皮瓣坏死。 3. 术后X线片证实复位固定满意。 4. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。		
最短住院日参考值：	10天		
变异条件：	1. 由于术后并发症：胃肠胀气综合征、深静脉血栓形成、伤口感染等造成住院口延长和费用增加。 2. 内科合并症：老年患者常合并基础疾病，如脑血管或心血管病、糖尿病、血栓等，骨折手术可能导致这些疾病加重而需要进一步治疗，从而延长治疗时间，并增加住院费用。 3. 内植物的选择：由于骨折类型不同，使用不同的内固定材料，可能导致住院费用存在差异。		
再入院间隔时间：	2周		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查		/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	院内遥测心电监护	KKA28701	尿常规化学分析	CCAA2000
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000和乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000 和乙肝病 毒表面抗原确认试验 (HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000和乙型肝炎 表面抗体定性(抗 HBs)测定CGLK1000和 乙型肝炎表面抗体定 量(抗HBs)测定 CGLL1000	监测		膝关节X线摄影	EABXJ001
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000			肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和γ-谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000	麻醉		凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000			治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	硬膜外阻滞麻醉	骶管单次阻滞麻醉 HAC42104或颈部硬膜外单次阻滞麻醉 HAC42105或颈部硬膜外连续阻滞麻醉 HAC42106或胸部硬膜外单次阻滞麻醉 HAC42107或胸部硬膜外连续阻滞麻醉 HAC42108或腰部硬膜外单次阻滞麻醉 HAC42109或腰部硬膜外连续阻滞麻醉 HAC42110或骶管连续阻滞麻醉HAC42111		
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEE8000和肌酐(Cr)测定 CEE8000和尿酸(UA)测定 CEE8000	/全身麻醉	HAA42901	药物	
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙(Ca)测定 CEJF8000	手术		抗生素	
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	胫骨骨折切开复位内固定术	HXP70316		
胸椎X线摄影	EABVN001	药物			
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道常规心电图检查 FKA03702或十二通道常规心电图检查 FKA03703	抗生素			
院内会诊	AADB0001				
治疗					
一般灌肠	ABGE0001				
导尿管留置	ABHA0002				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一口气法FJE01405或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406			肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404	治疗		电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO ₂)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000
普通二维超声心动图	EDFKA005	换药(中)	ABFA0002	下肢动脉彩色多普勒超声检查	EDCL5001
气道阻力测定	FJB02401	药物		/下肢浅静脉彩色多普勒超声检查	EDCM4001
血气分析	CEJM1000			/下肢深静脉彩色多普勒超声检查	EDCM1001
膝关节X线摄影	EABXJ001			治疗	
糖化血红蛋白(HbA1c)测定	CEBD1000			换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
治疗				药物	
药物					

踝关节骨折

踝关节骨折切开复位内固定术

适用对象：	病种编码：	PS007	
	主要诊断：	踝关节骨折	ICD-10码： S82.500/S82.501/S82.600/S82.601
	主要操作/主要治疗方式：	踝关节骨折切开复位内固定术	CCHI码：HXZ70301
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：S82.500/S82.501/S82.600/S82.601踝关节骨折疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断时，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。 3. 单纯闭合性踝关节骨折。 4. 除外病理性骨折。		
出院标准：	1. 体温正常，常规化验指标无明显异常。 2. 伤口愈合良好：引流管拔除，伤口无感染征象（或可在门诊处理的伤口情况）、无皮瓣坏死。 3. 术后X线片证实复位固定满意。 4. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。		
最短住院日参考值：	8天		
变异条件：	1. 围手术期并发症：深静脉血栓形成、伤口感染、脱位、神经血管损伤等，造成住院日延长和费用增加。 2. 内科合并症：老年患者常合并内科疾病，如脑血管或心血管病、糖尿病、血栓等，骨折手术可能导致基础疾病加重而需要进一步治疗，从而延长治疗时间，并增加住院费用。 3. 植入材料的选择：由于骨折类型不同，使用不同的内固定材料，可能导致住院费用存在差异。		
再入院间隔时间：	2周		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
Ⅱ级护理	ACAB0001	Ⅰ级护理	ACAC0001	Ⅰ级护理	ACAC0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		尿常规化学分析	CCAA2000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	院内遥测心电监护	KKA28701	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000和乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000 和乙肝病 毒表面抗原确认试验 (HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000和乙型肝炎 表面抗体定性(抗 HBs)测定CGLK1000和 乙型肝炎表面抗体定 量(抗HBs)测定 CGLL1000	监测		凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000			踝关节X线摄影	EABXZ001
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000	麻醉		治疗	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000			换药	换药(小)ABFA0001或 换药(中)ABFA0002或 换药(大)ABFA0003或 换药(特大)ABFA0004

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
梅毒螺旋体抗体 (抗TP) 测定	CGPP1000	硬膜外阻滞麻醉	骶管单次阻滞麻醉 HAC42104或颈部硬膜外单次阻滞麻醉 HAC42105或颈部硬膜外连续阻滞麻醉 HAC42106或胸部硬膜外单次阻滞麻醉 HAC42107或胸部硬膜外连续阻滞麻醉 HAC42108或腰部硬膜外单次阻滞麻醉 HAC42109或腰部硬膜外连续阻滞麻醉 HAC42110或骶管连续阻滞麻醉HAC42111	药物	
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV) 测定	CGMF1000	/全身麻醉	HAA42901	抗生素	
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定CEJB8000和氯 (Cl) 测定CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定CEJD1000和镁 (Mg) 测定CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000	手术			
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000	踝关节骨折切开复位内固定术	HXZ70301		
胸部X线摄影	EABJT001	药物			
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	抗生素			
踝关节X线摄影	EABXZ001				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000				
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000或 Rh血型c抗原鉴定CAMG1000或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000或Rh血型e抗原鉴定CAMJ1000或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000				
治疗					
一般灌肠	ABGE0001				
药物					
镇痛药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活 量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403或最大 通气量功能检查 FJE01404			肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一 口气法FJE01405或肺 弥散功能检查-重复 呼吸法FJE01406	治疗		电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO ₂)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000
普通二维超声心动图	EDFKA005			治疗	
气道阻力测定	FJB02401	药物			
血气分析	CEJM1000			药物	
下肢动脉彩色多普勒 超声检查	EDCL5001				
/下肢浅静脉彩色多 普勒超声检查	EDCM4001				
/下肢深静脉彩色多 普勒超声检查	EDCM1001				
院内会诊	AADB0001				
糖化血红蛋白 (HbA1c)测定	CEBD1000				
治疗					
导尿管留置	ABHA0002				
药物					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码

股骨干骨折

股骨干骨折切开复位内固定术

适用对象：	病种编码：	PS008			
	主要诊断：	股骨干骨折		ICD-10码：	S72.300
	主要操作/主要治疗方式：	股骨干骨折切开复位内固定术		CCHI码：	HXG70320
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD10： S72.300股骨干骨折疾病编码。 2. 外伤引起的单纯性、新鲜股骨干骨折。 3. 除外病理性骨折。 4. 除外合并其他部位的骨折和损伤。 5. 除外对股骨干骨折手术治疗有较大影响的疾病（如心脑血管疾病）。 6. 需要进行手术治疗。			
	出院标准：	1. 体温正常、常规化验无明显异常。 2. X光片证实复位固定符合标准。 3. 切口无异常。 4. 无与本病相关的其他并发症。			
	最短住院日参考值：	7天			
	变异条件：	1. 并发症： 本病常伴有其他部位损伤，应严格掌握入选标准。但仍有一些患者因骨折本身带来的一些合并症而延期治疗，如大量出血需术前输血、血栓形成、血肿引起体温增高等。 2. 合并症： 老年人本身有许多合并症，如骨质疏松、糖尿病、心脑血管疾病等，骨折后这些疾病可能加重，需同时治疗，而需延期治疗。 3. 内固定物选择： 根据骨折类型选择适当的内固定物。			
	再入院间隔时间：	2周			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
尿常规化学分析	CCAA2000	导尿管留置	ABHA0002	尿常规化学分析	CCAA2000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	院内遥测心电监护	KKA28701	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000和乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000 和乙肝病 毒表面抗原确认试验 (HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000和乙型肝炎 表面抗体定性(抗 HBs)测定CGLK1000和 乙型肝炎表面抗体定 量(抗HBs)测定 CGLL1000	监测		肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和γ-谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000			电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧化 碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	麻醉		踝关节X线摄影	EABXZ001
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000			凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	硬膜外阻滞麻醉	骶管单次阻滞麻醉HAC42104或颈部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42105或颈部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42106或胸部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42107或胸部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42108或腰部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42109或腰部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42110或骶管连续阻滞麻醉HAC42111	治疗	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	/全身麻醉	HAA42901	自体血采集	FNC06201
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	手术		静脉输液	ABCA0001
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	股骨干骨折切开复位内固定术	HXG70320	换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
胸部X线摄影	EABJT001	药物		引流管更换	ABZG0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703	抗生素		导尿管留置	ABHA0002
踝关节X线摄影	EABXZ001			药物	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000或ABO血 型鉴定(反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定(正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定(反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000			抗生素	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000或 Rh血型c 抗原鉴定CAMG1000或 Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000或Rh血型e 抗原鉴定CAMJ1000或 Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000			抗凝药物	
配血	生理盐水介质交叉配 血CAMW1000或特殊介 质交叉配血CAMX1000 或疑难交叉配血 CAMY1000			消炎止痛药物	
治疗					
一般灌肠	ABGE0001				
静脉输血	ABCD0001				
药物					
镇痛药物					
抗凝药物					
选择项目					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
普通二维超声心动图	EDFKA005				
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活 量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403或最大 通气量功能检查 FJE01404	治疗		治疗	
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一 口气法FJE01405或肺 弥散功能检查-重复 呼吸法FJE01406				
气道阻力测定	FJB02401	药物		药物	
血气分析	CEJM1000			镇痛药物	
下肢动脉彩色多普勒 超声检查	EDCL5001				
/下肢浅静脉彩色多 普勒超声检查	EDCM4001				
/下肢深静脉彩色多 普勒超声检查	EDCM1001				
院内会诊	AADB0001				
糖化血红蛋白 (HbA1c)测定	CEBD1000				
治疗					
导尿管留置	ABHA0002				
药物					

股骨干骨折

股骨干骨折闭合复位髓内针内固定术

适用对象：	病种编码：	PS009			
	主要诊断：	股骨干骨折	ICD-10码：	S72.300	
	主要操作/主要治疗方式：	股骨干骨折闭合复位髓内针内固定术	CCHI码：	HXG70316	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD10：S72.300股骨干骨折疾病编码。 2. 外伤引起的单纯性、新鲜股骨干骨折。 3. 除外病理性骨折。 4. 除外合并其他部位的骨折和损伤。 5. 除外对股骨干骨折手术治疗有较大影响的疾病（如心脑血管疾病）。 6. 需要进行手术治疗。			
	出院标准：	1. 体温正常、常规化验无明显异常。 2. X光片证实复位固定符合标准。 3. 切口无异常。 4. 无与本病相关的其他并发症。			
	最短住院日参考值：	7天			
	变异条件：	1. 并发症： 本病常伴有其他部位损伤，应严格掌握入选标准。但仍有一些患者因骨折本身带来的一些合并症而延期治疗，如大量出血需术前输血、血栓形成、血肿引起体温增高等。 2. 合并症： 老年人本身有许多合并症，如骨质疏松、糖尿病、心脑血管疾病等，骨折后这些疾病可能加重，需同时治疗，而需延期治疗。 3. 内固定物选择： 根据骨折类型选择适当的内固定物。			
	再入院间隔时间：	2周			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	导尿管留置	ABHA0002	尿常规化学分析	CCAA2000
尿常规化学分析	CCAA2000	院内遥测心电监护	KKA28701	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000和乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000 和乙肝病 毒表面抗原确认试验 (HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000和乙型肝炎 表面抗体定性(抗 HBs)测定CGLK1000和 乙型肝炎表面抗体定 量(抗HBs)测定 CGLL1000	监测		肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和γ-谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(Alb)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000			肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000和肌酐(Cr) 测定CEEB8000和尿酸 (UA)测定CEEE8000
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	麻醉		踝关节X线摄影	EABXZ001
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000			凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	硬膜外阻滞麻醉	骶管单次阻滞麻醉HAC42104或颈部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42105或颈部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42106或胸部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42107或胸部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42108或腰部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42109或腰部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42110或骶管连续阻滞麻醉HAC42111	治疗	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	/全身麻醉	HAA42901	自体血采集	FNC06201
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	手术		静脉输液	ABCA0001
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	股骨干骨折闭合复位髓内针内固定术	HXG70316	换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
胸部X线摄影	EABJT001	药物		引流管更换	ABZG0001
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	抗生素		导尿管留置	ABHA0002

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
踝关节X线摄影	EABXZ001			药物	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000			抗生素	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000或 Rh血型c抗原鉴定CAMG1000或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000或Rh血型e抗原鉴定CAMJ1000或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000			抗凝药物	
配血	生理盐水介质交叉配血CAMW1000或特殊介质交叉配血CAMX1000或疑难交叉配血CAMY1000			消炎止痛药物	
治疗					
一般灌肠	ABGE0001				
静脉输血	ABCD0001				
药物					
镇痛药物					
抗凝药					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
检查		检查		检查	
普通二维超声心动图	EDFKA005				
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活 量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403或最大 通气量功能检查 FJE01404	治疗		治疗	
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一 口气法FJE01405或肺 弥散功能检查-重复 呼吸法FJE01406				
气道阻力测定	FJB02401	药物		药物	
血气分析	CEJM1000			镇痛药物	
下肢动脉彩色多普勒 超声检查	EDCL5001				
/下肢浅静脉彩色多 普勒超声检查	EDCM4001				
/下肢深静脉彩色多 普勒超声检查	EDCM1001				
院内会诊	AADB0001				
糖化血红蛋白 (HbA1c)测定	CEBD1000				
治疗					
导尿管留置	ABHA0002				
药物					

闭合性髌骨骨折

髌骨骨折闭合复位内固定术

适用对象：	病种编码：	PS010	
	主要诊断：	闭合性髌骨骨折	ICD-10码：S82.000
	主要操作/主要治疗方式：	髌骨骨折闭合复位内固定术	CCHI码：HXH70303
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：S82.000髌骨骨折疾病编码。 2. 外伤引起的单纯性、新鲜髌骨骨折。 3. 除外病理性骨折。 4. 除外合并其他部位的骨折和损伤。 5. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。	
	出院标准：	1. 体温正常，常规化验检查无明显异常。 2. 伤口愈合好：引流管拔除，伤口无感染征象（或可在门诊处理的伤口情况）。 3. 术后X线片证实复位固定满意。 4. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。	
	住院标准日：	≤10天（术后最短5天）	
	变异条件：	1. 并发症：本病可伴有其他损伤，应当严格掌握入选标准。部分患者因骨折本身的合并症而延期治疗，如大量出血需术前输血、血栓形成、血肿引起体温增高，骨折本身对骨的血循环破坏较重，术后易出现骨折延迟愈合、不愈合等。 2. 合并症：老年患者易有合并症，如骨质疏松、糖尿病、心脑血管疾病等，骨折后合并症可能加重，需同时治疗，住院时间延长。 3. 内固定物选择：根据骨折类型选择适当的内固定物。 4. 开放性骨折不进入本路径。	
	再入院间隔时间：	无	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	II级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	治疗		膝关节X线摄影	EABXJ001
尿常规化学分析	CCAA2000	氧气吸入	ABJA0001	治疗	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	/氧气雾化吸入	ABKB0001	换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	静脉输液	ABCA0001	静脉输液	ABCA0001
胸部X线摄影	EABJT001	导尿	ABHA0001	监测	
膝关节X线摄影	EABXJ001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	经口气管插管术	HAM62401	药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	院内遥测心电监护	KKA28701	抗菌药物	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000或ABO血 型鉴定(反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定(正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定(反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000	监测		镇痛药物	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000或Rh血型c 抗原鉴定CAMH1000或 Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000或Rh血型e 抗原鉴定CAMK1000或 Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000	全身麻醉下呼吸功能 监测	HAN05902	消肿药物	
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000和乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000和乙肝病毒 表面抗原确认试验 (HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000和乙型肝炎 表面抗体定性(抗 HBs)测定CGLK1000和 乙型肝炎表面抗体定 量(抗HBs)测定 CGLL1000	检测仪中心静脉压测 定	FKA02203		
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	无创血压监测	FKA05709		
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	无创指脉血氧饱和度 监测	FKA05710		
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000	术中体温监测	HAN05702		
治疗		麻醉恢复室监护	HAP28901		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
		麻醉深度电生理监测	HAP05902		
药物		/无创心电监测	FKA05705		
		/有创连续动脉血压监测	HAN05201		
		麻醉			
		全身麻醉	HAA42901		
		/椎管内麻醉	单次腰麻HAC42101或 连续腰麻HAC42102或 腰麻复合连续硬膜外 阻滞麻醉HAC42103或 骶管单次阻滞麻醉 HAC42104或颈部硬膜 外单次阻滞麻醉 HAC42105或颈部硬膜 外连续阻滞麻醉 HAC42106或胸部硬膜 外单次阻滞麻醉 HAC42107或胸部硬膜 外连续阻滞麻醉 HAC42108或腰部硬膜 外单次阻滞麻醉 HAC42109或腰部硬膜 外连续阻滞麻醉 HAC42110或骶管连续 阻滞麻醉HAC42111或 椎管内置管术 HAC62101		
		手术			
		髌骨骨折闭合复位内固定术	HXH70303		
		病理			
		药物			
		抗菌药物			
		止吐药物			
		镇痛药物			
选择项目					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
双下肢血管彩色超声	下肢动脉彩色多普勒超声检查EDCL5001或下肢深静脉彩色多普勒超声检查EDCM1001或下肢浅静脉彩色多普勒超声检查EDCM4001			电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404	治疗		凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000
弥散功能检查	肺弥散功能检查--一口气法FJE01405或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	静脉输血	ABCD0001	大腿X线计算机体层(CT)平扫	EBAXF001
气道阻力测定	FJB02401	加压快速输血	ABCE0001	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
普通二维超声心动图	EDFKA005	外周动脉穿刺置管术	HL962202	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000
血气分析	CEJM1000	经外周静脉置入中心静脉导管术	ABDA0001	治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
膝关节磁共振成像	ECAXJ001	药物		静脉输血	ABCD0001
大腿X线计算机体层(CT)平扫	EBAXF001	抗凝药物		加压快速输血	ABCE0001
治疗				药物	
药物					

闭合性髌骨骨折

髌骨骨折切开复位内固定术

适用对象：	病种编码：	PS011			
	主要诊断：	闭合性髌骨骨折	ICD-10码：	S82.000	
	主要操作/主要治疗方式：	髌骨骨折切开复位内固定术	CCHI码：	HXH70301	
入院标准：		1. 第一诊断必须符合ICD-10：S82.000髌骨骨折疾病编码。 2. 外伤引起的单纯性、新鲜髌骨骨折。 3. 除外病理性骨折。 4. 除外合并其他部位的骨折和损伤。 5. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
出院标准：		1. 体温正常，常规化验检查无明显异常。 2. 伤口愈合好：引流管拔除，伤口无感染征象（或可在门诊处理的伤口情况）。 3. 术后X线片证实复位固定满意。 4. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。			
住院标准日：		≤10天（术后最短5天）			
变异条件：		1. 并发症：本病可伴有其他损伤，应当严格掌握入选标准。部分患者因骨折本身的合并症而延期治疗，如大量出血需术前输血、血栓形成、血肿引起体温增高，骨折本身对骨的血循环破坏较重，术后易出现骨折延迟愈合、不愈合等。 2. 合并症：老年患者易有合并症，如骨质疏松、糖尿病、心脑血管疾病等，骨折后合并症可能加重，需同时治疗，住院时间延长。 3. 内固定物选择：根据骨折类型选择适当的内固定物。 4. 开放性骨折不进入本路径。			
再入院间隔时间：		无			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	II级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		膝关节X线摄影	EABXJ001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000 和肌酐(Cr)测定 CEEB8000 和尿酸(UA)测定 CEEE8000	氧气吸入	ABJA0001	治疗	
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000 和总胆红素(T-Bil) 测定CELA1000 和直接胆红素(D- Bil)测定CELB1000 和γ-谷氨酰基转移 酶(GGT)测定 CECC8000 和总蛋白(TP)测定 CEAA8000 和白蛋白(A1b)测定 CEAE8000 和碱性磷酸酶(ALP) 测定CECD8000	/氧气雾化吸入	ABKB0001	换药	换药(小)ABFA0001 或换药(中)ABFA0002
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000 和氯(Cl)测定 CEJC8000 和总二氧化碳(TCO2) 测定CEJD1000 和镁(Mg)测定 CEJE8000 和总钙(Ca)测定 CEJF8000	静脉输液	ABCA0001	静脉输液	ABCA0001
胸部X线摄影	EABJT001	导尿	ABHA0001	监测	
膝关节X线摄影	EABXJ001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701 或多通道常规心电图 检查FKA03702 或十二通道常规心电 图检查FKA03703	经口气管插管术	HAM62401	药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000 或活化部分凝血活酶 时间(APTT)测定 CAGB1000或血浆凝血 酶原时间(PT)测定 CAGC1000或血浆纤维 蛋白原测定CAGD1000	院内遥测心电监护	KKA28701	抗菌药物	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000或ABO血 型鉴定(反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定(正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定(反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000	监测		镇痛药物	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000或Rh血型c 抗原鉴定CAMH1000或 Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000或Rh血型e 抗原鉴定CAMK1000或 Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000	全身麻醉下呼吸功能 监测	HAN05902	消肿药物	
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000和乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000和乙肝病毒 表面抗原确认试验 (HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000和乙型肝炎 表面抗体定性(抗 HBs)测定CGLK1000和 乙型肝炎表面抗体定 量(抗HBs)测定 CGLL1000	检测仪中心静脉压测 定	FKA02203		
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	无创血压监测	FKA05709		
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	无创指脉血氧饱和度 监测	FKA05710		
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000	术中体温监测	HAN05702		
治疗		麻醉恢复室监护	HAP28901		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
		麻醉深度电生理监测	HAP05902		
药物		/无创心电监测	FKA05705		
		/有创连续动脉血压监测	HAN05201		
		麻醉			
		全身麻醉	HAA42901		
		/椎管内麻醉	单次腰麻HAC42101或 连续腰麻HAC42102或 腰麻复合连续硬膜外 阻滞麻醉HAC42103或 骶管单次阻滞麻醉 HAC42104或颈部硬膜 外单次阻滞麻醉 HAC42105或颈部硬膜 外连续阻滞麻醉 HAC42106或胸部硬膜 外单次阻滞麻醉 HAC42107或胸部硬膜 外连续阻滞麻醉 HAC42108或腰部硬膜 外单次阻滞麻醉 HAC42109或腰部硬膜 外连续阻滞麻醉 HAC42110或骶管连续 阻滞麻醉HAC42111或 椎管内置管术 HAC62101		
		手术			
		髌骨骨折切开复位内 固定术	HXH70301		
		病理			
		药物			
		抗菌药物			
		止吐药物			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
		镇痛药物			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
双下肢血管彩色超声	下肢动脉彩色多普勒超声检查EDCL5001 或下肢深静脉彩色多普勒超声检查EDCM1001 或下肢浅静脉彩色多普勒超声检查EDCM4001			电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定CEJB8000 和氯(Cl)测定CEJC8000 和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000 和镁(Mg)测定CEJE8000 和总钙(Ca)测定CEJF8000
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404	治疗		凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000
弥散功能检查	肺弥散功能检查--一口气法FJE01405 或肺弥散功能检查--重复呼吸法FJE01406	静脉输血	ABCD0001	大腿X线计算机体层(CT)平扫	EBAXF001
气道阻力测定	FJB02401	加压快速输血	ABCE0001	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000 和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000 和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000 和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000 和总蛋白(TP)测定CEAA8000 和白蛋白(A1b)测定CEAE8000 和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
普通二维超声心动图	EDFKA005	外周动脉穿刺置管术	HL962202	肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEEA8000 和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000 和尿酸 (UA) 测定 CEEE8000
血气分析	CEJM1000	经外周静脉置入中心 静脉导管术	ABDA0001	治疗	
大腿X线计算机体层 (CT) 平扫	EBAXF001	药物		静脉输血	ABCD0001
治疗		抗凝药物		加压快速输血	ABCE0001
				药物	
药物					

闭合性尺骨鹰嘴骨折

尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术

适用对象：	病种编码：	PS012			
	主要诊断：	闭合性尺骨鹰嘴骨折	ICD-10码：	S52.001	
	主要操作/主要治疗方式：	尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术	CCHI码：	HWM70302	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10:S52.001鹰嘴骨折疾病编码。 2. 外伤引起的单纯性、新鲜尺骨鹰嘴骨折。 3. 除外病理性骨折。 4. 除外合并其他部位的骨折和损伤。 5. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 体温正常，常规化验检查无明显异常。 2. 伤口愈合好（或可在门诊处理的伤口情况），伤口无感染征象。 3. 术后X线片证实复位固定满意。 4. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。			
	住院标准日：	≤10天			
	变异条件：	1. 开发症：本病可伴有其他损伤，应当严格掌握入选标准。部分患者因骨折本身的合并症而延期治疗，如大量出血需术前输血、血栓形成、血肿引起体温增高等。 2. 合并症：老年患者易有合并症，如骨质疏松、糖尿病、心脑血管疾病等，骨折后合并症可能加重，需同时治疗，住院时间延长。 3. 开放性骨折不进入本路径。			
	再入院间隔时间：	无			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	II级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		肘关节X线摄影	EABWJ001
尿沉渣镜检	CCBB2000	/氧气雾化吸入	ABKB0001	治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000 和肌酐(Cr)测定 CEEB8000 和尿酸(UA)测定 CEEE8000	静脉输液	ABCA0001	换药	换药(小)ABFA0001 或换药(中)ABFA0002
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000	经口气管插管术	HAM62401	静脉输液	ABCA0001
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	院内遥测心电监护	KKA28701	监测	
胸部X线摄影	EABJT001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701 或多通道常规心电图 检查FKA03702 或十二通道常规心电 图检查FKA03703	监测		药物	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	全身麻醉下呼吸功能 监测	HAN05902	抗菌药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	检测仪中心静脉压测定	FKA02203	镇痛药物	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	无创血压监测	FKA05709	其他药物(消肿、营养、神经等)	
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710		
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	术中体温监测	HAN05702		
肘关节X线摄影	EABWJ001	麻醉恢复室监护	HAP28901		
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	麻醉深度电生理监测	HAP05902		
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000和乙肝病毒表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定 CGLK1000和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定 CGLL1000	/无创心电监测	FKA05705		
治疗		/有创连续动脉血压监测	HAN05201		
		麻醉			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
药物		全身麻醉	HAA42901		
		/臂丛神经单次阻滞麻醉	HAG42101		
		手术			
		尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术	HWM70302		
		病理			
		药物			
		抗菌药物			
		胃粘膜保护剂			
		止吐药物			
		止痛药物			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
血气分析	CEJM1000			电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定CEJB8000 和氯(Cl)测定CEJC8000 和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000 和镁(Mg)测定CEJE8000 和总钙(Ca)测定CEJF8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401 或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403 或最大通气量功能检查FJE01404	治疗		凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000 或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定 CAGB1000 或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000 或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000
弥散功能检查	肺弥散功能检查--一口气法FJE01405 或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	导尿管留置	ABHA0002	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000 和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000 和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000 和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定 CECC8000 和总蛋白(TP)测定 CEAA8000 和白蛋白(A1b)测定 CEAE8000 和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
气道阻力测定	FJB02401	导尿	ABHA0001	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000 和肌酐(Cr)测定 CEEB8000 和尿酸(UA)测定 CEEE8000
普通二维超声心动图	EDFKA005	外周动脉穿刺置管术	HL962202	前臂X线计算机体层(CT)平扫	EBAWA003
前臂X线计算机体层(CT)平扫	EBAWA003	经外周静脉置入中心静脉导管术	ABDA0001	治疗	
心电图监测	FCA03710	静脉输血	ABCD0001	静脉输血	ABCD0001
治疗		加压快速输血	ABCE0001	加压快速输血	ABCE0001
		药物		药物	
药物					

闭合性尺骨鹰嘴骨折

尺骨鹰嘴骨折闭合复位内固定术

适用对象：	病种编码：	PS013	
	主要诊断：	闭合性尺骨鹰嘴骨折	ICD-10码：S52.001
	主要操作/主要治疗方式：	尺骨鹰嘴骨折闭合复位内固定术	CCHI码：HWM70301
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10:S52.001鹰嘴骨折疾病编码。 2. 外伤引起的单纯性、新鲜尺骨鹰嘴骨折。 3. 除外病理性骨折。 4. 除外合并其他部位的骨折和损伤。 5. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。	
	出院标准：	1. 体温正常，引流液检查无异常。 2. 伤口愈合好（或可在门诊处理的伤口情况），伤口无感染征象。 3. 术后X线片证实复位固定满意。 4. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。	
	住院标准日：	≤10天	
	变异条件：	1. 并发症：本病可伴有其他损伤，应当严格掌握入选标准。部分患者因骨折本身的合并症而延期治疗，如大量出血需术前输血、血栓形成、血肿引起体温增高等。 2. 合并症：老年患者易有合并症，如骨质疏松、糖尿病、心脑血管疾病等，骨折后合并症可能加重，需同时治疗，住院时间延长。 3. 开放性骨折不进入本路径。	
	再入院间隔时间：	无	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	II级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		肘关节X线摄影	EABWJ001
尿沉渣镜检	CCBB2000	院内遥测心电监护	KKA28701	治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000 和肌酐(Cr)测定 CEEB8000 和尿酸(UA)测定 CEEE8000	监测		换药	换药(小)ABFA0001 或换药(中)ABFA0002
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000	全身麻醉下呼吸功能 监测	HAN05902	静脉输液	ABCA0001
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	检测仪中心静脉压测 定	FKA02203	监测	
胸部X线摄影	EABJT001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703	无创血压监测	FKA05709	药物	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	无创指脉血氧饱和度 监测	FKA05710	抗菌药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	术中体温监测	HAN05702	镇痛药物	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000或Rh血型c抗原鉴定CAMH1000或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	麻醉恢复室监护	HAP28901	其他药物(消肿、营养、神经等)	
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000和乙型肝炎表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定CGLJ1000和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	麻醉深度电生理监测	HAP05902		
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	/无创心电图监测	FKA05705		
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	/有创连续动脉血压监测	HAN05201		
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	麻醉			
肘关节X线摄影	EABWJ001	全身麻醉	HAA42901		
治疗		/臂丛神经单次阻滞麻醉	HAG42101		
		手术			
药物		尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术	HWM70302		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
		病理			
		药物			
		抗菌药物			
		止痛药物			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
检查		检查		检查	
血气分析	CEJM1000			电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404	治疗		凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一口气法FJE01405或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	导尿管留置	ABHA0002	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
气道阻力测定	FJB02401	氧气吸入	ABJA0001	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEE8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定EEEE8000
普通二维超声心动图	EDFKA005	/氧气雾化吸入	ABKB0001	前臂X线计算机体层(CT)平扫	EBAWA003
前臂X线计算机体层(CT)平扫	EBAWA003	静脉输液	ABCA0001	治疗	
/肘关节磁共振成像	ECAWJ001	导尿	ABHA0001	静脉输血	ABCD0001
肌电图监测	FCA03710	外周动脉穿刺置管术	HL962202	加压快速输血	ABCE0001
治疗		经外周静脉置入中心静脉导管术	ABDA0001	药物	
		静脉输血	ABCD0001		
药物		加压快速输血	ABCE0001		
		药物			

闭合性尺桡骨干骨折

尺骨干骨折闭合复位钢板螺丝钉内固定术

适用对象：	病种编码：	PS014
	主要诊断：	闭合性尺桡骨干骨折 ICD-10码：S52.400
	主要操作/主要治疗方式：	尺骨干骨折闭合复位钢板螺丝钉内固定术 CCHI码：HWM70304
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：S52.400尺骨桡骨骨干骨折疾病编码。 2. 患肢肿胀、疼痛、活动受限、畸形，反常活动。 3. X线检查发现尺桡骨干骨折。 4. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在门诊治疗期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。 5. 年龄大于16岁。	
出院标准：	1. 体温正常，常规化验检查无明显异常。 2. 伤口愈合好（或可在门诊处理的伤口情况），伤口无感染征象。 3. 术后X线片证实复位固定满意。 4. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。	
住院日参考值：	≤10天	
变异条件：	1. 存在影响手术的合并症，术前需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、置入物移位、切口愈合不良等并发症，需要延长治疗时间。 3. 开放性骨折不进入本路径。	
再入院间隔时间：	无	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	II级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		尺桡骨X线摄影	EABWM001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定 CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定 CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定 CECD8000	院内遥测心电监护	KKA28701	治疗	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000 和肌酐(Cr)测定 CEEB8000 和尿酸(UA)测定 CEEE8000	监测		换药	换药(小)ABFA0001 或换药(中)ABFA0002
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902	静脉输液	ABCA0001
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000	检测仪中心静脉压测定	FKA02203	监测	
胸部X线摄影	EABJT001	无创血压监测	FKA05709		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
尺桡骨X线摄影	EABWM001	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710	药物	
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	术中体温监测	HAN05702	抗菌药物	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	麻醉恢复室监护	HAP28901	镇痛药物	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000或Rh血型c抗原鉴定CAMH1000或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	麻醉深度电生理监测	HAP05902	其他药物(消肿等)	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	/无创心电监测	FKA05705		
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	/有创连续动脉血压监测	HAN05201		
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000和乙型肝炎表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定CGLJ1000和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	麻醉			
治疗		臂丛神经单次阻滞麻醉	HAG42101		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
		/全身麻醉	HAA42901		
药物		手术			
		尺骨干骨折闭合复位钢板螺丝钉内固定术	HWM70304		
		病理			
		药物			
		抗菌药物			
		镇痛药物			
		其他药物（消肿等）			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401 或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403 或最大通气量功能检查FJE01404			电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000
弥散功能检查	肺弥散功能检查--一口气法FJE01405或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	治疗		肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
气道阻力测定	FJB02401	导尿管留置	ABHA0002	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)测定CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素 (D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT)测定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和白蛋白 (A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP)测定CECD8000
血气分析	CEJM1000	氧气吸入	ABJA0001	上臂X线计算机体层 (CT) 平扫	EBAWA002
普通二维超声心动图	EDFKA005	/氧气雾化吸入	ABKB0001	治疗	
肌电图监测	FCA03710	静脉输液	ABCA0001	静脉输血	ABCD0001
上臂X线计算机体层 (CT) 平扫	EBAWA002	导尿	ABHA0001	加压快速输血	ABCE0001
治疗		外周动脉穿刺置管术	HL962202	药物	
		经外周静脉置入中心静脉导管术	ABDA0001		
药物		静脉输血	ABCD0001		
		加压快速输血	ABCE0001		
		药物			

闭合性尺桡骨干骨折

桡骨干骨折切开复位钢板螺丝钉内固定术

适用对象：	病种编码：	PS015
	主要诊断：	闭合性尺桡骨干骨折 ICD-10码：S52.400
	主要操作/主要治疗方式：	桡骨干骨折切开复位钢板螺丝钉内固定术 CCHI码：HWN70306
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：S52.400尺桡骨干骨折疾病编码。 2. 患肢肿胀、疼痛、活动受限、畸形，反常活动。 3. X线检查发现尺桡骨干骨折。 4. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在门诊治疗期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。 5. 年龄大于16岁。	
出院标准：	1. 体温正常，常规化验检查无明显异常。 2. 伤口愈合好（或可在门诊处理的伤口情况），伤口无感染征象。 3. 术后X线片证实复位固定满意。 4. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。	
住院日参考值：	≤10天	
变异条件：	1. 存在影响手术的合并症，术前需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、置入物移位、切口愈合不良等并发症，需要延长治疗时间。 3. 开放性骨折不进入本路径。	
再入院间隔时间：	无	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
Ⅱ级护理	ACAB0001	Ⅰ级护理	ACAC0001	Ⅱ级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		尺桡骨X线摄影	EABWM001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	院内遥测心电监护	KKA28701	治疗	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000 和肌酐(Cr)测定 CEEB8000 和尿酸(UA)测定 CEEE8000	监测		换药	换药(小)ABFA0001 或换药(中)ABFA0002
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定 CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定 CECD8000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902	静脉输液	ABCA0001
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000	检测仪中心静脉压测定	HAN05201	监测	
胸部X线摄影	EABJT001				
尺桡骨X线摄影	EABWM001	无创血压监测	FKA05709	药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710	抗菌药物	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	术中体温监测	HAN05702	镇痛药物	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	麻醉恢复室监护	HAP28901	其他药物(消肿等)	
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	麻醉深度电生理监测	HAP05902		
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	/全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902		
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	/有创连续动脉血压监测	FKA02203		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000和乙肝病毒表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定 CGLK1000和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定 CGLL1000	麻醉			
治疗		臂丛神经单次阻滞麻醉	HAG42101		
		/全身麻醉	HAA42901		
药物		手术			
		桡骨干骨折切开复位钢板螺丝钉内固定术	HWN70306		
		药物			
		抗菌药物			
		镇痛药物			
		其他药物（消肿等）			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401 或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403 或最大通气量功能检查FJE01404			肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一口气法FJE01405或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	治疗		肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000
气道阻力测定	FJB02401	导尿管留置	ABHA0002	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000
血气分析	CEJM1000	氧气吸入	ABJA0001	上臂X线计算机体层(CT)平扫	EBAWA002
普通二维超声心动图	EDFKA005	/氧气雾化吸入	ABKB0001	治疗	
肌电图监测	FCA03710	静脉输液	ABCA0001	静脉输血	ABCD0001
上臂X线计算机体层(CT)平扫	EBAWA002	导尿	ABHA0001	加压快速输血	ABCE0001
治疗		外周动脉穿刺置管术	HL962202	药物	
		经外周静脉置入中心静脉导管术	ABDA0001		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
药物		静脉输血	ABCD0001		
		加压快速输血	ABCE0001		
		药物			

闭合性尺桡骨干骨折

尺骨干骨折切开复位髓内针内固定术

适用对象：	病种编码：	PS016			
	主要诊断：	闭合性尺桡骨干骨折	ICD-10码：	S52.400	
	主要操作/主要治疗方式：	尺骨干骨折切开复位髓内针内固定术	CCHI码：	HWM70311	
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：S52.400尺桡骨骨干骨折疾病编码。 2. 患肢肿胀、疼痛、活动受限、畸形，反常活动。 3. X线检查发现尺桡骨干骨折。 4. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在门诊治疗期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。 5. 年龄大于16岁。				
出院标准：	1. 体温正常，常规化验检查无明显异常。 2. 伤口愈合好（或可在门诊处理的伤口情况），伤口无感染征象。 3. 术后X线片证实复位固定满意。 4. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。				
住院日参考值：	≤10天				
变异条件：	1. 存在影响手术的合并症，术前需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、置入物移位、切口愈合不良等并发症，需要延长治疗时间。 3. 开放性骨折不进入本路径。				
再入院间隔时间：	无				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	II级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		尺桡骨X线摄影	EABWM001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000 和氯(Cl)测定 CEJC8000 和总二氧化碳(TCO2) 测定CEJD1000 和镁(Mg)测定 CEJE8000 和总钙(Ca)测定 CEJF8000	院内遥测心电监护	KKA28701	治疗	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000 和肌酐(Cr)测定 CEEB8000 和尿酸(UA)测定 CEEE8000	监测		换药	换药(小)ABFA0001 或换药(中)ABFA0002
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(Alb)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000	全身麻醉下呼吸功能 监测	HAN05902	静脉输液	ABCA0001
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000 或活化部分凝血活酶 时间(APTT)测定 CAGB1000 或血浆凝血酶原时间 (PT)测定CAGC1000 或血浆纤维蛋白原测 定CAGD1000	检测仪中心静脉压测 定	FKA02203	监测	
胸部X线摄影	EABJT001				
尺桡骨X线摄影	EABWM001	无创血压监测	FKA05709	药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703	无创指脉血氧饱和度 监测	FKA05710	抗菌药物	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定 型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定 型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定 型)CAME1000 或RhD血型鉴定 CAMF1000	术中体温监测	HAN05702	镇痛药物	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定 CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定 CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴 定CAML1000	麻醉恢复室监护	HAP28901	其他药物（消肿等）	
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	麻醉深度电生理监测	HAP05902		
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV)测定	CGMF1000	/无创心电监测	FKA05705		
梅毒螺旋体抗体(抗 TP)测定	CGPP1000	/有创连续动脉血压 监测	HAN05201		
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000和乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000和乙肝病毒 表面抗原确认试验 (HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000和乙型肝炎 表面抗体定性(抗 HBs)测定CGLK1000和 乙型肝炎表面抗体定 量(抗HBs)测定 CGLL1000	麻醉			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
治疗		臂丛神经单次阻滞麻醉	HAG42101		
		/全身麻醉	HAA42901		
药物		手术			
		/尺骨干骨折切开复位髓内针内固定术	HWM70311		
		病理			
		药物			
		抗菌药物			
		镇痛药物			
		其他药物（消肿等）			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401 或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403 或最大通气量功能检查FJE01404			肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
弥散功能检查	肺弥散功能检查--一口气法FJE01405或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	治疗		肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEE8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定EEEE8000
气道阻力测定	FJB02401	导尿管留置	ABHA0002	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000
血气分析	CEJM1000	氧气吸入	ABJA0001	上臂X线计算机体层(CT)平扫	EBAWA002
普通二维超声心动图	EDFKA005	/氧气雾化吸入	ABKB0001	治疗	
心电图监测	FCA03710	静脉输液	ABCA0001	静脉输血	ABCD0001
上臂X线计算机体层(CT)平扫	EBAWA002	导尿	ABHA0001	加压快速输血	ABCE0001
治疗		外周动脉穿刺置管术	HL962202	药物	
		经外周静脉置入中心静脉导管术	ABDA0001		
药物		静脉输血	ABCD0001		
		加压快速输血	ABCE0001		
		药物			

闭合性尺桡骨干骨折

桡骨干骨折切开复位髓内针内固定术

适用对象：	病种编码：	PS017			
	主要诊断：	闭合性尺桡骨干骨折	ICD-10码：	S52.400	
	主要操作/主要治疗方式：	桡骨干骨折切开复位髓内针内固定术	CCHI码：	HWN70308	
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：S52.400尺骨桡骨骨干骨折疾病编码。 2. 患肢肿胀、疼痛、活动受限、畸形，反常活动。 3. X线检查发现尺桡骨干骨折。 4. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在门诊治疗期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。 5. 年龄大于16岁。				
出院标准：	1. 体温正常，常规化验检查无明显异常。 2. 伤口愈合好（或可在门诊处理的伤口情况），伤口无感染征象。 3. 术后X线片证实复位固定满意。 4. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。				
住院日参考值：	≤10天				
变异条件：	1. 存在影响手术的合并症，术前需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、置入物移位、切口愈合不良等并发症，需要延长治疗时间。 3. 开放性骨折不进入本路径。				
再入院间隔时间：	无				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
Ⅱ级护理	ACAB0001	Ⅰ级护理	ACAC0001	Ⅱ级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		尺桡骨X线摄影	EABWM001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测定 CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	院内遥测心电监护	KKA28701	治疗	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000 和肌酐(Cr)测定 CEEB8000 和尿酸(UA)测定 CEEE8000	监测		换药	换药(小)ABFA0001 或换药(中)ABFA0002
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定 CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定 CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定 CECD8000	/无创心电监测	FKA05705	静脉输液	ABCA0001
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定 CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000	/有创连续动脉血压监测	HAN05201	监测	
胸部X线摄影	EABJT001				
尺桡骨X线摄影	EABWM001	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902	药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	检测仪中心静脉压测定	FKA02203	抗菌药物	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	无创血压监测	FKA05709	镇痛药物	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710	其他药物(消肿等)	
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	术中体温监测	HAN05702		
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	麻醉恢复室监护	HAP28901		
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000或Rh血型c抗原鉴定CAMH1000或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	麻醉深度电生理监测	HAP05902		
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000和乙肝病毒表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定CGLJ1000和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	麻醉			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
治疗		臂丛神经单次阻滞麻醉	HAG42101		
		/全身麻醉	HAA42901		
药物		手术			
		桡骨干骨折切开复位髓内针内固定术	HWN70308		
		病理			
		药物			
		抗菌药物			
		镇痛药物			
		其他药物（消肿等）			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401 或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403 或最大通气量功能检查FJE01404			电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000
弥散功能检查	肺弥散功能检查--一口气法FJE01405或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	治疗		肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000 和肌酐(Cr)测定CEEB8000 和尿酸(UA)测定CEEE8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
气道阻力测定	FJB02401	导尿管留置	ABHA0002	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
血气分析	CEJM1000	氧气吸入	ABJA0001	上臂X线计算机体层(CT)平扫	EBAWA002
普通二维超声心动图	EDFKA005	/氧气雾化吸入	ABKB0001	治疗	
心电图监测	FCA03710	静脉输液	ABCA0001	静脉输血	ABCD0001
上臂X线计算机体层(CT)平扫	EBAWA002	导尿	ABHA0001	加压快速输血	ABCE0001
治疗		外周动脉穿刺置管术	HL962202	药物	
		经外周静脉置入中心静脉导管术	ABDA0001		
药物		静脉输血	ABCD0001		
		加压快速输血	ABCE0001		
		药物			

闭合性肱骨干骨折

肱骨干骨折切开复位钢板螺丝钉内固定术

适用对象：	病种编码：	PS018			
	主要诊断：	闭合性肱骨干骨折	ICD-10码：	S42.300/S42.301	
	主要操作/主要治疗方式：	肱骨干骨折切开复位钢板螺丝钉内固定术	CCHI码：	HWH70310	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：S42.300/S42.301肱骨干骨折疾病编码。 2. 患肢肿胀、疼痛、活动受限、畸形、反常活动等。 3. 年龄大于16岁。 4. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在门诊治疗期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。 5. X线检查发现肱骨干骨折。			
	出院标准：	1. 切口愈合良好，或门诊可处理的愈合不良切口。 2. 体温正常。 3. 胸片呈正常术后改变，无明显异常。 4. 没有需要住院处理的其他并发症或合并症。			
	住院日参考值：	≤14天			
	变异条件：	1. 存在影响手术的合并症，术前需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、置入物移位、切口愈合不良等并发症，需要延长治疗时间。 3. 开放性骨折不进入本路径。			
	再入院间隔时间：	无			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
Ⅱ级护理	ACAB0001	Ⅰ级护理	ACAC0001	Ⅱ级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		肱骨X线摄影	EABWH001
尿沉渣镜检	CCBB2000	监测		治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000 和肌酐(Cr)测定 CEEB8000 和尿酸(UA)测定 CEEE8000	全身麻醉下呼吸功能 监测	HAN05902	换药	换药(小)ABFA0001 或换药(中)ABFA0002 或换药(大)ABFA0003
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000	检测仪中心静脉压测 定	FKA02203	静脉输液	ABCA0001
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000	无创心电监测	FKA05705	监测	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000	/有创连续动脉血压 监测	HAN05201		
胸部X线摄影	EABJT001	无创血压监测	FKA05709	药物	
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703	无创指脉血氧饱和度 监测	FKA05710	抗菌药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	术中体温监测	HAN05702	镇痛药物	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000或Rh血型c抗原鉴定CAMH1000或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	麻醉恢复室监护	HAP28901	其他药物(消肿等)	
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000和乙肝病毒表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定CGLJ1000和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	麻醉深度电生理监测	HAP05902		
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000				
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	麻醉			
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	臂丛神经单次阻滞麻醉	HAG42101		
肱骨X线摄影	EABWH001	/全身麻醉	HAA42901		
治疗		手术			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
		肱骨干骨折切开复位 钢板螺丝钉内固定术	HWH70310		
药物		病理			
		药物			
		抗菌药物			
		镇痛药物			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
血气分析	CEJM1000			肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和γ-谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000
普通二维超声心动图	EDFKA005	治疗		肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000 和肌酐(Cr)测定 CEEB8000 和尿酸(UA)测定 CEEE8000
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活 量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403或最大 通气量功能检查 FJE01404	静脉输血	ABCD0001	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧化 化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
气道阻力测定	FJB02401	加压快速输血	ABCE0001	上臂X线计算机体层(CT)平扫	EBAWA002
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一口气法FJE01405或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	导尿管留置	ABHA0002	治疗	
上臂X线计算机体层(CT)平扫	EBAWA002	氧气吸入	ABJA0001	静脉输血	ABCD0001
心电图监测	FCA03710	/氧气雾化吸入	ABKB0001	加压快速输血	ABCE0001
治疗		静脉输液	ABCA0001	药物	
		导尿	ABHA0001		
药物		外周动脉穿刺置管术	HL962202		
		经外周静脉置入中心静脉导管术	ABDA0001		
		药物			

胫腓骨干骨折

胫骨骨折闭合复位钢板螺丝钉内固定术

适用对象：	病种编码：	PS019			
	主要诊断：	胫腓骨干骨折	ICD-10码：	S82.201/S82.203	
	主要操作/主要治疗方式：	胫骨骨折闭合复位钢板螺丝钉内固定术	CCHI码：	HXP70310	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：S82.201/S82.203胫腓骨干骨折疾病编码。 2. 外伤引起的单纯性、新鲜胫腓骨干骨折。 3. 除外病理性骨折。 4. 除外合并其他部位的骨折和损伤。 5. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 体温正常，常规化验检查无明显异常。 2. 伤口愈合好：引流管拔除，伤口无感染征象（或可在门诊处理的伤口情况）。 3. 术后X线片证实复位固定满意。 4. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。			
	住院日参考值：	12天			
	变异条件：	1. 存在影响手术的合并症，术前需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、置入物移位、切口愈合不良等并发症，需要延长治疗时间。 3. 内固定物选择：根据骨折类型选择适当的内固定物。 4. 开放性骨折不进入本路径。			
	再入院间隔时间：	无			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001
检查		检查		/ II 级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
尿沉渣镜检	CCBB2000	氧气吸入	ABJA0001	胫腓骨X线摄影	EABXP001
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000 和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	/氧气雾化吸入	ABKB0001	治疗	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEE8000 和肌酐(Cr)测定CEEB8000 和尿酸(UA)测定CEEE8000	静脉输液	ABCA0001	换药	换药(中)ABFA0002 或换药(大)ABFA0003
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定CEJB8000 和氯(Cl)测定CEJC8000 和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000 和镁(Mg)测定CEJE8000 和总钙(Ca)测定CEJF8000	导尿	ABHA0001	静脉输液	ABCA0001
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000 或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000 或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000 或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000			监测	
胸部X线摄影	EABJT001	经口气管插管术	HAM62401		
胫腓骨X线摄影	EABXP001	院内遥测心电监护	KKA28701	药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701 或多通道常规心电图检查FKA03702 或十二通道常规心电图检查FKA03703	监测		抗菌药物	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000 或RhD血型鉴定CAMF1000	无创心电监测	FKA05705	镇痛药物	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	/有创连续动脉血压监测	HAN05201	其他药物:消肿、抗血栓等	
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000和乙肝病毒表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定CGLJ1000和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902		
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	检测仪中心静脉压测定	FKA02203		
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	无创血压监测	FKA05709		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710		
治疗		术中体温监测	HAN05702		
		麻醉恢复室监护	HAP28901		
药物		麻醉深度电生理监测	HAP05902		
		麻醉			
		全身麻醉	HAA42901		
		/椎管内麻醉	单次腰麻HAC42101或连续腰麻HAC42102或腰麻复合连续硬膜外阻滞麻醉HAC42103或骶管单次阻滞麻醉HAC42104或颈部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42105或颈部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42106或胸部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42107或胸部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42108或腰部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42109或腰部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42110或骶管连续阻滞麻醉HAC42111或椎管内置管术HAC62101		
		手术			
		胫骨骨折闭合复位钢板螺丝钉内固定术	HXP70310		
		病理			
		药物			
		抗菌药物			
		止痛药物			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
		其他药物（消肿等）			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
弥散功能检查	肺弥散功能检查—一口气法FJE01405 或肺弥散功能检查—重复呼吸法FJE01406			小腿X线计算机体层(CT)平扫	EBAXN001
普通二维超声心动图	EDFKA005	治疗		肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
小腿X线计算机体层(CT)平扫	EBAXN001	静脉输血	ABCD0001	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血气分析	CEJM1000	加压快速输血	ABCE0001	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定CEJB8000 和氯(Cl)测定CEJC8000 和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000 和镁(Mg)测定CEJE8000 和总钙(Ca)测定CEJF8000
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401 或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403 或最大通气量功能检查FJE01404	外周动脉穿刺置管术	HL962202	治疗	
双下肢血管彩色超声	下肢动脉彩色多普勒超声检查EDCL5001或 下肢深静脉彩色多普勒超声检查EDCM1001 或下肢浅静脉彩色多普勒超声检查EDCM4001	经外周静脉置入中心静脉导管术	ABDA0001	静脉输血	ABCD0001
气道阻力测定	FJB02401	药物		加压快速输血	ABCE0001
治疗				药物	
				抗凝药物	
药物					

胫腓骨干骨折

胫骨骨折闭合复位髓内针内固定术

适用对象：	病种编码：	PS020			
	主要诊断：	胫腓骨干骨折	ICD-10码：	S82.201/S82.203	
	主要操作/主要治疗方式：	胫骨骨折闭合复位髓内针内固定术	CCHI码：	HXP70312	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：S82.201/S82.203胫腓骨干骨折疾病编码。 2. 外伤引起的单纯性、新鲜胫腓骨干骨折。 3. 除外病理性骨折。 4. 除外合并其他部位的骨折和损伤。 5. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 体温正常，常规化验检查无明显异常。 2. 伤口愈合好：引流管拔除，伤口无感染征象（或可在门诊处理的伤口情况）。 3. 术后X线片证实复位固定满意。 4. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。			
	住院日参考值：	12天			
	变异条件：	1. 存在影响手术的合并症，术前需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、置入物移位、切口愈合不良等并发症，需要延长治疗时间。 3. 内固定物选择：根据骨折类型选择适当的内固定物。 4. 开放性骨折不进入本路径。			
	再入院间隔时间：	无			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001
检查		检查		/ II 级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
尿沉渣镜检	CCBB2000	氧气吸入	ABJA0001	胫腓骨X线摄影	EABXP001
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	/氧气雾化吸入	ABKB0001	治疗	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000 和肌酐(Cr)测定CEEB8000 和尿酸(UA)测定CEEE8000	静脉输液	ABCA0001	换药	换药(中)ABFA0002 或换药(大)ABFA0003
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定CEJB8000 和氯(Cl)测定CEJC8000 和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000 和镁(Mg)测定CEJE8000 和总钙(Ca)测定CEJF8000	导尿	ABHA0001	静脉输液	ABCA0001
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000 或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000 或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000 或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000			监测	
胸部X线摄影	EABJT001	经口气管插管术	HAM62401		
胫腓骨X线摄影	EABXP001	院内遥测心电监护	KKA28701	药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701 或多通道常规心电图检查FKA03702 或十二通道常规心电图检查FKA03703	监测		抗菌药物	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000 或RhD血型鉴定CAMF1000	无创心电监测	FKA05705	镇痛药物	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	/有创连续动脉血压监测	HAN05201	其他药物(消肿、抗血栓等)	
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000 和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000 和乙肝病毒表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定CGLJ1000 和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000 和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000				
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	检测仪中心静脉压测定	FKA02203		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	无创血压监测	FKA05709		
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710		
治疗		术中体温监测	HAN05702		
		麻醉恢复室监护	HAP28901		
药物		麻醉深度电生理监测	HAP05902		
		麻醉			
		全身麻醉	HAA42901		
		/椎管内麻醉	单次腰麻HAC42101或连续腰麻HAC42102或腰麻复合连续硬膜外阻滞麻醉HAC42103或骶管单次阻滞麻醉HAC42104或颈部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42105或颈部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42106或胸部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42107或胸部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42108或腰部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42109或腰部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42110或骶管连续阻滞麻醉HAC42111或椎管内置管术HAC62101		
		手术			
		胫骨骨折闭合复位髓内针内固定术	HXP70312		
		病理			
		药物			
		抗菌药物			
		止痛药物			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
		其他药物（消肿等）			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
双下肢血管彩色超声	下肢动脉彩色多普勒超声检查EDCL5001或下肢深静脉彩色多普勒超声检查EDCM1001或下肢浅静脉彩色多普勒超声检查EDCM4001	外周动脉穿刺置管术	HL962202	小腿X线计算机体层(CT)平扫	EBAXN001
普通二维超声心动图	EDFKA005	经外周静脉置入中心静脉导管术	ABDA0001	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
小腿X线计算机体层(CT)平扫	EBAXN001	治疗		肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血气分析	CEJM1000	静脉输血	ABCD0001	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000 和氯(Cl)测定 CEJC8000 和总二氧化碳(TCO2) 测定CEJD1000 和镁(Mg)测定 CEJE8000 和总钙(Ca)测定 CEJF8000
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401 或用力肺活量功能检 查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403 或最大通气量功能检 查FJE01404	加压快速输血	ABCE0001	治疗	
弥散功能检查	肺弥散功能检查-- 一口气法FJE01405 或肺弥散功能检查- 重复呼吸法FJE01406	药物		静脉输血	ABCD0001
气道阻力测定	FJB02401			加压快速输血	ABCE0001
治疗				药物	
				抗凝药物	
药物					

胫腓骨干骨折

胫骨骨折切开复位髓内针内固定术

适用对象：	病种编码：	PS021			
	主要诊断：	胫腓骨干骨折	ICD-10码：	S82.201/S82.203	
	主要操作/主要治疗方式：	胫骨骨折切开复位髓内针内固定术	CCHI码：	HXP70314	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：S82.201/S82.203胫腓骨干骨折疾病编码。 2. 外伤引起的单纯性、新鲜胫腓骨干骨折。 3. 除外病理性骨折。 4. 除外合并其他部位的骨折和损伤。 5. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 体温正常，常规化验检查无明显异常。 2. 伤口愈合好：引流管拔除，伤口无感染征象（或可在门诊处理的伤口情况）。 3. 术后X线片证实复位固定满意。 4. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。			
	住院日参考值：	12天			
	变异条件：	1. 存在影响手术的合并症，术前需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、置入物移位、切口愈合不良等并发症，需要延长治疗时间。 3. 内固定物选择：根据骨折类型选择适当的内固定物。 4. 开放性骨折不进入本路径。			
	再入院间隔时间：	无			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001
检查		检查		/ II 级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
尿沉渣镜检	CCBB2000	氧气吸入	ABJA0001	胫腓骨X线摄影	EABXP001
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	/氧气雾化吸入	ABKB0001	治疗	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	静脉输液	ABCA0001	换药	换药(中)ABFA0002 或换药(大)ABFA0003
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	导尿	ABHA0001	静脉输液	ABCA0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000 或活化部分凝血活酶 时间(APTT)测定 CAGB1000 或血浆凝血酶原时间 (PT)测定CAGC1000 或血浆纤维蛋白原测 定CAGD1000			监测	
胸部X线摄影	EABJT001	经口气管插管术	HAM62401		
胫腓骨X线摄影	EABXP001	监测		药物	
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701 或多通道常规心电图 检查FKA03702 或十二通道常规心电 图检查FKA03703	院内遥测心电监护	KKA28701	抗菌药物	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000或ABO血 型鉴定(反定 型)CAMB1000或ABO亚 型鉴定(正定 型)CAMD1000或ABO亚 型鉴定(反定 型)CAME1000或RhD血 型鉴定CAMF1000	/无创心电监测	FKA05705	镇痛药物	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000或Rh血型c 抗原鉴定CAMH1000或 Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000或Rh血型e 抗原鉴定CAMK1000或 Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000	/有创连续动脉血压 监测	HAN05201	其他药物:消肿、抗 血栓等	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000和乙肝病毒表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定 CGLK1000和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定 CGLL1000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902		
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	检测仪中心静脉压测定	FKA02203		
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	无创血压监测	FKA05709		
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710		
治疗		术中体温监测	HAN05702		
		麻醉恢复室监护	HAP28901		
药物		麻醉深度电生理监测	HAP05902		
		麻醉			
		全身麻醉	HAA42901		
		/椎管内麻醉	单次腰麻HAC42101或连续腰麻HAC42102或腰麻复合连续硬膜外阻滞麻醉HAC42103或骶管单次阻滞麻醉HAC42104或颈部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42105或颈部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42106或胸部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42107或胸部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42108或腰部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42109或腰部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42110或骶管连续阻滞麻醉HAC42111或椎管内置管术HAC62101		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
		手术			
		胫骨骨折切开复位髓内针内固定术	HXP70314		
		病理			
		药物			
		抗菌药物			
		止痛药物			
		其他药物（消肿等）			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
双下肢血管彩色超声	下肢动脉彩色多普勒超声检查EDCL5001或下肢深静脉彩色多普勒超声检查EDCM1001或下肢浅静脉彩色多普勒超声检查EDCM4001			小腿X线计算机体层(CT)平扫	EBAXN001
普通二维超声心动图	EDFKA005	治疗		肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
小腿X线计算机体层(CT)平扫	EBAXN001	静脉输血	ABCD0001	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000 和肌酐(Cr)测定 CEEB8000 和尿酸(UA)测定 CEEE8000
血气分析	CEJM1000	加压快速输血	ABCE0001	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000 和氯(Cl)测定 CEJC8000 和总二氧化碳(TCO2) 测定CEJD1000 和镁(Mg)测定 CEJE8000 和总钙(Ca)测定 CEJF8000
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401 或用力肺活量功能检 查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403 或最大通气量功能检 查FJE01404	外周动脉穿刺置管术	HL962202	治疗	
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一 口气法FJE01405 或肺弥散功能检查- 重复呼吸法FJE01406	经外周静脉置入中心 静脉导管术	ABDA0001	静脉输血	ABCD0001
气道阻力测定	FJB02401	药物		加压快速输血	ABCE0001
治疗				药物	
				抗凝药物	
药物					

胫腓骨干骨折

胫骨骨折切开复位内固定术

适用对象：	病种编码：	PS022			
	主要诊断：	胫腓骨干骨折	ICD-10码：	S82.201/S82.203	
	主要操作/主要治疗方式：	胫骨骨折切开复位内固定术	CCHI码：	HXP70316	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：S82.201/S82.203胫腓骨干骨折疾病编码。 2. 外伤引起的单纯性、新鲜胫腓骨干骨折。 3. 除外病理性骨折。 4. 除外合并其他部位的骨折和损伤。 5. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 体温正常，常规化验检查无明显异常。 2. 伤口愈合好：引流管拔除，伤口无感染征象（或可在门诊处理的伤口情况）。 3. 术后X线片证实复位固定满意。 4. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。			
	住院日参考值：	12天			
	变异条件：	1. 存在影响手术的合并症，术前需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、置入物移位、切口愈合不良等并发症，需要延长治疗时间。 3. 内固定物选择：根据骨折类型选择适当的内固定物。 4. 开放性骨折不进入本路径。			
	再入院间隔时间：	无			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001
检查		检查		/ II 级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
尿沉渣镜检	CCBB2000	氧气吸入	ABJA0001	胫腓骨X线摄影	EABXP001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素 (Urea) 测定 CEE8000 和肌酐 (Cr) 测定 CEEB8000 和尿酸 (UA) 测定 CEEE8000	/氧气雾化吸入	ABKB0001	治疗	
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶 (AST) 测定 CECB1000 和总胆红素 (T-Bil) 测定CELA1000 和直接胆红素 (D- Bil) 测定CELB1000 和 γ -谷氨酰基转移 酶 (GGT) 测定 CECC8000 和总蛋白 (TP) 测定 CEAA8000 和白蛋白 (Alb) 测定 CEAE8000 和碱性磷酸酶 (ALP) 测定CECD8000	静脉输液	ABCA0001	换药	换药 (中) ABFA0002 或换药 (大) ABFA0003
电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000 和氯 (Cl) 测定 CEJC8000 和总二氧化碳 (TCO2) 测定CEJD1000 和镁 (Mg) 测定 CEJE8000 和总钙 (Ca) 测定 CEJF8000	导尿	ABHA0001	静脉输液	ABCA0001
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT) 测定 CAGA1000 或活化部分凝血活酶 时间 (APTT) 测定 CAGB1000 或血浆凝血酶原时间 (PT) 测定CAGC1000 或血浆纤维蛋白原测 定CAGD1000			监测	
胸部X线摄影	EABJT001	经口气管插管术	HAM62401		
胫腓骨X线摄影	EABXP001	院内遥测心电图监护	KKA28701	药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701 或多通道常规心电图检查FKA03702 或十二通道常规心电图检查FKA03703	监测		抗菌药物	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	/无创心电监测	FKA05705	镇痛药物	
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	/有创连续动脉血压监测	HAN05201	其他药物(消肿、抗血栓等)	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902		
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000 或RhD血型鉴定CAMF1000	检测仪中心静脉压测定	FKA02203		
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	无创血压监测	FKA05709		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000 和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000 和乙肝病毒表面抗原确认试验 (HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000 和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定 CGLK1000 和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定 CGLL1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710		
治疗		术中体温监测	HAN05702		
		麻醉恢复室监护	HAP28901		
药物		麻醉深度电生理监测	HAP05902		
		麻醉			
		全身麻醉	HAA42901		
		/椎管内麻醉	单次腰麻HAC42101或连续腰麻HAC42102或腰麻复合连续硬膜外阻滞麻醉HAC42103或骶管单次阻滞麻醉HAC42104或颈部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42105或颈部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42106或胸部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42107或胸部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42108或腰部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42109或腰部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42110或骶管连续阻滞麻醉HAC42111或椎管内置管术HAC62101		
		手术			
		胫骨骨折切开复位内固定术	HXP70316		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
		病理			
		药物			
		抗菌药物			
		止痛药物			
		其他药物（消肿等）			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
双下肢血管彩色超声	下肢动脉彩色多普勒超声检查EDCL5001 或下肢深静脉彩色多普勒超声检查EDCM1001 或下肢浅静脉彩色多普勒超声检查EDCM4001			小腿X线计算机体层(CT)平扫	EBAXN001
普通二维超声心动图	EDFKA005	治疗		肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000 和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000 和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000 和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000 和总蛋白(TP)测定CEAA8000 和白蛋白(A1b)测定CEAE8000 和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
小腿X线计算机体层(CT)平扫	EBAXN001	静脉输血	ABCD0001	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEE8000 和肌酐(Cr)测定 CEEB8000 和尿酸(UA)测定 CEEE8000
血气分析	CEJM1000	加压快速输血	ABCE0001	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000 和氯(Cl)测定 CEJC8000 和总二氧化碳(TCO2) 测定CEJD1000 和镁(Mg)测定 CEJE8000 和总钙(Ca)测定 CEJF8000
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401 或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403 或最大通气量功能检查FJE01404	外周动脉穿刺置管术	HL962202	治疗	
弥散功能检查	肺弥散功能检查—一口气法FJE01405 或肺弥散功能检查—重复呼吸法FJE01406	经外周静脉置入中心静脉导管术	ABDA0001	静脉输血	ABCD0001
气道阻力测定	FJB02401	药物		加压快速输血	ABCE0001
治疗				药物	
				抗凝药物	
药物					

胫腓骨干骨折

腓骨骨折切开复位钢板螺丝钉内固定术

适用对象：	病种编码：	PS023			
	主要诊断：	胫腓骨干骨折	ICD-10码：	S82.201/S82.203	
	主要操作/主要治疗方式：	腓骨骨折闭合复位钢板螺丝钉内固定术	CCHI码：	HXQ70304	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：S82.201/S82.203胫腓骨干骨折疾病编码。 2. 外伤引起的单纯性、新鲜胫腓骨干骨折。 3. 除外病理性骨折。 4. 除外合并其他部位的骨折和损伤。 5. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 体温正常，常规化验检查无明显异常。 2. 伤口愈合好：引流管拔除，伤口无感染征象（或可在门诊处理的伤口情况）。 3. 术后X线片证实复位固定满意。 4. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。			
	住院日参考值：	12天			
	变异条件：	1. 存在影响手术的合并症，术前需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、置入物移位、切口愈合不良等并发症，需要延长治疗时间。 3. 内固定物选择：根据骨折类型选择适当的内固定物。 4. 开放性骨折不进入本路径。			
	再入院间隔时间：	无			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001
检查		检查		/ II 级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
尿沉渣镜检	CCBB2000	氧气吸入	ABJA0001	胫腓骨X线摄影	EABXP001
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000 和肌酐(Cr)测定 CEEB8000 和尿酸(UA)测定 CEEE8000	/氧气雾化吸入	ABKB0001	治疗	
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000 和氯(Cl)测定 CEJC8000 和总二氧化碳(TCO2) 测定CEJD1000 和镁(Mg)测定 CEJE8000 和总钙(Ca)测定 CEJF8000	静脉输液	ABCA0001	换药	换药(中)ABFA0002 或换药(大)ABFA0003
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000 和总胆红素(T-Bil) 测定CELA1000 和直接胆红素(D- Bil)测定CELB1000 和γ-谷氨酰基转移 酶(GGT)测定 CECC8000 和总蛋白(TP)测定 CEAA8000 和白蛋白(A1b)测定 CEAE8000 和碱性磷酸酶(ALP) 测定CECD8000	导尿	ABHA0001	静脉输液	ABCA0001
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000 或活化部分凝血活酶 时间(APTT)测定 CAGB1000 或血浆凝血酶原时间 (PT)测定CAGC1000 或血浆纤维蛋白原测 定CAGD1000			监测	
胸部X线摄影	EABJT001	经口气管插管术	HAM62401		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
胫腓骨X线摄影	EABXP001	院内遥测心电监护	KKA28701	药物	
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701 或多通道常规心电图检查FKA03702 或十二通道常规心电图检查FKA03703	监测		抗菌药物	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	/无创心电监测	FKA05705	镇痛药物	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000或Rh血型c抗原鉴定CAMH1000或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	/有创连续动脉血压监测	HAN05201	其他药物:消肿、抗血栓等	
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000和乙型肝炎表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定CGLJ1000和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902		
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	检测仪中心静脉压测定	FKA02203		
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	无创血压监测	FKA05709		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710		
治疗		术中体温监测	HAN05702		
		麻醉恢复室监护	HAP28901		
药物		麻醉深度电生理监测	HAP05902		
		麻醉			
		全身麻醉	HAA42901		
		/椎管内麻醉	单次腰麻HAC42101或连续腰麻HAC42102或腰麻复合连续硬膜外阻滞麻醉HAC42103或骶管单次阻滞麻醉HAC42104或颈部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42105或颈部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42106或胸部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42107或胸部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42108或腰部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42109或腰部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42110或骶管连续阻滞麻醉HAC42111或椎管内置管术HAC62101		
		手术			
		腓骨骨折切开复位钢板螺丝钉内固定术	HXQ70301		
		病理			
		药物			
		抗菌药物			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
		止痛药物			
		其他药物（消肿等）			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
双下肢血管彩色超声	下肢动脉彩色多普勒超声检查EDCL5001 或下肢深静脉彩色多普勒超声检查EDCM1001 或下肢浅静脉彩色多普勒超声检查EDCM4001			小腿X线计算机体层(CT)平扫	EBAXN001
普通二维超声心动图	EDFKA005	治疗		肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000 和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000 和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000 和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000 和总蛋白(TP)测定CEAA8000 和白蛋白(Alb)测定CEAE8000 和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
小腿X线计算机体层(CT)平扫	EBAXN001	静脉输血	ABCD0001	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000 和肌酐(Cr)测定CEEB8000 和尿酸(UA)测定CEEE8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血气分析	CEJM1000	加压快速输血	ABCE0001	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定CEJB8000 和氯(Cl)测定CEJC8000 和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000 和镁(Mg)测定CEJE8000 和总钙(Ca)测定CEJF8000
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401 或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403 或最大通气量功能检查FJE01404	外周动脉穿刺置管术	HL962202	治疗	
弥散功能检查	肺弥散功能检查--一口气法FJE01405 或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	经外周静脉置入中心静脉导管术	ABDA0001	静脉输血	ABCD0001
气道阻力测定	FJB02401	药物		加压快速输血	ABCE0001
治疗				药物	
				抗凝药物	
药物					

胫腓骨干骨折

腓骨骨折闭合复位钢板螺丝钉内固定术

适用对象：	病种编码：	PS024			
	主要诊断：	胫腓骨干骨折	ICD-10码：	S82.201/S82.203	
	主要操作/主要治疗方式：	腓骨骨折切开复位髓内针内固定术	CCHI码：	HXQ70305	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：S82.201/S82.203胫腓骨干骨折疾病编码。 2. 外伤引起的单纯性、新鲜胫腓骨干骨折。 3. 除外病理性骨折。 4. 除外合并其他部位的骨折和损伤。 5. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 体温正常，常规化验检查无明显异常。 2. 伤口愈合好：引流管拔除，伤口无感染征象（或可在门诊处理的伤口情况）。 3. 术后X线片证实复位固定满意。 4. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。			
	住院日参考值：	12天			
	变异条件：	1. 存在影响手术的合并症，术前需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、置入物移位、切口愈合不良等并发症，需要延长治疗时间。 3. 内固定物选择：根据骨折类型选择适当的内固定物。 4. 开放性骨折不进入本路径。			
	再入院间隔时间：	无			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001
检查		检查		/ II 级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
尿沉渣镜检	CCBB2000	氧气吸入	ABJA0001	胫腓骨X线摄影	EABXP001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000 和肌酐(Cr)测定 CEEB8000 和尿酸(UA)测定 CEEE8000	/氧气雾化吸入	ABKB0001	治疗	
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000	静脉输液	ABCA0001	换药	换药(中)ABFA0002 或换药(大)ABFA0003
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000 和氯(Cl)测定 CEJC8000 和总二氧化碳(TCO2) 测定CEJD1000 和镁(Mg)测定 CEJE8000 和总钙(Ca)测定 CEJF8000	导尿	ABHA0001	静脉输液	ABCA0001
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000			监测	
胸部X线摄影	EABJT001	经口气管插管术	HAM62401		
胫腓骨X线摄影	EABXP001	院内遥测心电监护	KKA28701	药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701 或多通道常规心电图检查FKA03702 或十二通道常规心电图检查FKA03703	监测		抗菌药物	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000 或RhD血型鉴定CAMF1000	/无创心电监测	FKA05705	镇痛药物	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	/有创连续动脉血压监测	HAN05201	其他药物（消肿、抗血栓等）	
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000和乙肝病毒表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定CGLJ1000和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902		
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	检测仪中心静脉压测定	FKA02203		
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	无创血压监测	FKA05709		
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
治疗		术中体温监测	HAN05702		
		麻醉恢复室监护	HAP28901		
药物		麻醉深度电生理监测	HAP05902		
		麻醉			
		全身麻醉	HAA42901		
		/椎管内麻醉	单次腰麻HAC42101或 连续腰麻HAC42102或 腰麻复合连续硬膜外 阻滞麻醉HAC42103或 骶管单次阻滞麻醉 HAC42104或颈部硬膜 外单次阻滞麻醉 HAC42105或颈部硬膜 外连续阻滞麻醉 HAC42106或胸部硬膜 外单次阻滞麻醉 HAC42107或胸部硬膜 外连续阻滞麻醉 HAC42108或腰部硬膜 外单次阻滞麻醉 HAC42109或腰部硬膜 外连续阻滞麻醉 HAC42110或骶管连续 阻滞麻醉HAC42111或 椎管内置管术 HAC62101		
		手术			
		腓骨骨折闭合复位钢板螺丝钉内固定术	HXQ70304		
		病理			
		药物			
		抗菌药物			
		止痛药物			
		其他药物（消肿等）			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
双下肢血管彩色超声	下肢动脉彩色多普勒超声检查EDCL5001或下肢深静脉彩色多普勒超声检查EDCM1001或下肢浅静脉彩色多普勒超声检查EDCM4001			小腿X线计算机体层(CT)平扫	EBAXN001
普通二维超声心动图	EDFKA005	治疗		肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
小腿X线计算机体层(CT)平扫	EBAXN001	静脉输血	ABCD0001	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEE8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000
血气分析	CEJM1000	加压快速输血	ABCE0001	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TC02)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401 或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403 或最大通气量功能检查FJE01404	外周动脉穿刺置管术	HL962202	治疗	
弥散功能检查	肺弥散功能检查--一口气法FJE01405 或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	经外周静脉置入中心静脉导管术	ABDA0001	静脉输血	ABCD0001
气道阻力测定	FJB02401	药物		加压快速输血	ABCE0001
治疗				药物	
				抗凝药物	
药物					

闭合性胫骨平台骨折

胫骨平台骨折切开复位钢板螺丝钉内固定术

适用对象：	病种编码：	PS025			
	主要诊断：	闭合性胫骨平台骨折	ICD-10码：	S82.101	
	主要操作/主要治疗方式：	胫骨平台骨折切开复位钢板螺丝钉内固定术	CCHI码：	HXP70301	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：S82.101闭合性胫骨平台骨折疾病编码。 2. 外伤引起的单纯性、新鲜胫骨平台骨折。 3. 除外病理性骨折。 4. 除外合并其他部位的骨折和损伤。 5. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 体温正常，常规化验检查无明显异常。 2. 伤口愈合好：引流管拔除，伤口无感染征象（或可在门诊处理的伤口情况）。 3. 术后X线片证实复位固定满意。 4. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。			
	住院日参考值：	14天			
	变异条件：	1. 存在影响手术的合并症，术前需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、置入物移位、切口愈合不良等并发症，需要延长治疗时间。 3. 内固定物选择：根据骨折类型选择适当的内固定物。 4. 开放性骨折不进入本路径。			
	再入院间隔时间：	无			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001
检查		检查		/ II 级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
尿沉渣镜检	CCBB2000	氧气吸入	ABJA0001	胫腓骨X线摄影	EABXP001
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	/氧气雾化吸入	ABKB0001	治疗	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000 和肌酐(Cr)测定CEEB8000 和尿酸(UA)测定CEEE8000	静脉输液	ABCA0001	换药	换药(中)ABFA0002 或换药(大)ABFA0003
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定CEJB8000 和氯(Cl)测定CEJC8000 和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000 和镁(Mg)测定CEJE8000 和总钙(Ca)测定CEJF8000	导尿	ABHA0001	静脉输液	ABCA0001
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000 或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000 或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000 或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000			监测	
胸部X线摄影	EABJT001	经口气管插管术	HAM62401		
胫腓骨X线摄影	EABXP001	院内遥测心电监护	KKA28701	药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701 或多通道常规心电图检查FKA03702 或十二通道常规心电图检查FKA03703	监测		抗菌药物	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000 或RhD血型鉴定CAMF1000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902	镇痛药物	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	检测仪中心静脉压测定	FKA02203	其他药物(消肿、抗血栓等)	
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000 和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000 和乙肝病毒表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定CGLJ1000 和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000 和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	/无创心电监测	FKA05705		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	/有创连续动脉血压监测	HAN05201		
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	无创血压监测	FKA05709		
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710		
治疗		术中体温监测	HAN05702		
		麻醉恢复室监护	HAP28901		
药物		麻醉深度电生理监测	HAP05902		
		麻醉			
		全身麻醉	HAA42901		
		/椎管内麻醉	单次腰麻HAC42101或 连续腰麻HAC42102或 腰麻复合连续硬膜外 阻滞麻醉HAC42103或 骶管单次阻滞麻醉 HAC42104或颈部硬膜 外单次阻滞麻醉 HAC42105或颈部硬膜 外连续阻滞麻醉 HAC42106或胸部硬膜 外单次阻滞麻醉 HAC42107或胸部硬膜 外连续阻滞麻醉 HAC42108或腰部硬膜 外单次阻滞麻醉 HAC42109或腰部硬膜 外连续阻滞麻醉 HAC42110或骶管连续 阻滞麻醉HAC42111或 椎管内置管术 HAC62101		
		手术			
		胫骨平台骨折切开复位钢板螺丝钉内固定术	HXP70301		
		病理			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
		药物			
		抗菌药物			
		止痛药物			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
双下肢血管彩色超声	下肢动脉彩色多普勒超声检查EDCL5001或下肢深静脉彩色多普勒超声检查EDCM1001或下肢浅静脉彩色多普勒超声检查EDCM4001			小腿X线计算机体层(CT)平扫	EBAXN001
普通二维超声心动图	EDFKA005	治疗		肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
小腿X线计算机体层(CT)平扫	EBAXN001	静脉输血	ABCD0001	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血气分析	CEJM1000	加压快速输血	ABCE0001	电解质测定	钾 (K) 测定CEJA8000 和钠 (Na) 测定 CEJB8000和氯 (Cl) 测定CEJC8000和总二氧化碳 (TCO2) 测定 CEJD1000和镁 (Mg) 测定CEJE8000和总钙 (Ca) 测定CEJF8000
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查 FJE01404	外周动脉穿刺置管术	HL962202	治疗	
弥散功能检查	肺弥散功能检查--一口气法FJE01405或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	经外周静脉置入中心静脉导管术	ABDA0001	静脉输血	ABCD0001
气道阻力测定	FJB02401	药物		加压快速输血	ABCE0001
治疗				药物	
				抗凝药物	
药物					

闭合性胫骨平台骨折

胫骨平台骨折闭合复位内固定术

适用对象：	病种编码：	PS026			
	主要诊断：	闭合性胫骨平台骨折	ICD-10码：	S82.101	
	主要操作/主要治疗方式：	胫骨平台骨折闭合复位内固定术	CCHI码：	HXP70307	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：S82.101闭合性胫骨平台骨折疾病编码。 2. 外伤引起的单纯性、新鲜胫骨平台骨折。 3. 除外病理性骨折。 4. 除外合并其他部位的骨折和损伤。 5. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 体温正常，常规化验检查无明显异常。 2. 伤口愈合好：引流管拔除，伤口无感染征象（或可在门诊处理的伤口情况）。 3. 术后X线片证实复位固定满意。 4. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。			
	住院日参考值：	14天			
	变异条件：	1. 存在影响手术的合并症，术前需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、置入物移位、切口愈合不良等并发症，需要延长治疗时间。 3. 内固定物选择：根据骨折类型选择适当的内固定物。 4. 开放性骨折不进入本路径。			
	再入院间隔时间：	无			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001
检查		检查		/ II 级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
尿沉渣镜检	CCBB2000	氧气吸入	ABJA0001	胫腓骨X线摄影	EABXP001
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	/氧气雾化吸入	ABKB0001	治疗	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	静脉输液	ABCA0001	换药	换药(中)ABFA0002 或换药(大)ABFA0003
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	导尿	ABHA0001	静脉输液	ABCA0001
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000			监测	
胸部X线摄影	EABJT001	经口气管插管术	HAM62401		
胫腓骨X线摄影	EABXP001	院内遥测心电监护	KKA28701	药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	监测		抗菌药物	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	/无创心电监测	FKA05705	镇痛药物	
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	/有创连续动脉血压监测	HAN05201	其他药物:消肿、抗血栓等	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902		
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	检测仪中心静脉压测定	FKA02203		
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000或Rh血型c抗原鉴定CAMH1000或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	无创血压监测	FKA05709		
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000和乙肝病毒表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定CGLJ1000和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
治疗		术中体温监测	HAN05702		
		麻醉恢复室监护	HAP28901		
药物		麻醉深度电生理监测	HAP05902		
		麻醉			
		全身麻醉	HAA42901		
		/椎管内麻醉	单次腰麻HAC42101或 连续腰麻HAC42102或 腰麻复合连续硬膜外 阻滞麻醉HAC42103或 骶管单次阻滞麻醉 HAC42104或颈部硬膜 外单次阻滞麻醉 HAC42105或颈部硬膜 外连续阻滞麻醉 HAC42106或胸部硬膜 外单次阻滞麻醉 HAC42107或胸部硬膜 外连续阻滞麻醉 HAC42108或腰部硬膜 外单次阻滞麻醉 HAC42109或腰部硬膜 外连续阻滞麻醉 HAC42110或骶管连续 阻滞麻醉HAC42111或 椎管内置管术 HAC62101		
		手术			
		胫骨平台骨折闭合复位内固定术	HXP70307		
		病理			
		药物			
		抗菌药物			
		止痛药物			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
双下肢血管彩色超声	下肢动脉彩色多普勒超声检查EDCL5001 或下肢深静脉彩色多普勒超声检查EDCM1001 或下肢浅静脉彩色多普勒超声检查EDCM4001			小腿X线计算机体层(CT)平扫	EBAXN001
普通二维超声心动图	EDFKA005	治疗		电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定CEJB8000 和氯(Cl)测定CEJC8000 和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000 和镁(Mg)测定CEJE8000 和总钙(Ca)测定CEJF8000
小腿X线计算机体层(CT)平扫	EBAXN001	静脉输血	ABCD0001	肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000 和肌酐(Cr)测定CEEB8000 和尿酸(UA)测定CEEE8000
血气分析	CEJM1000	加压快速输血	ABCE0001	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000 和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000 和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000 和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000 和总蛋白(TP)测定CEAA8000 和白蛋白(A1b)测定CEAE8000 和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401 或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403 或最大通气量功能检查FJE01404	外周动脉穿刺置管术	HL962202	治疗	
弥散功能检查	肺弥散功能检查--一口气法FJE01405 或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	经外周静脉置入中心静脉导管术	ABDA0001	静脉输血	ABCD0001
气道阻力测定	FJB02401	药物		加压快速输血	ABCE0001
治疗				药物	
				抗凝药物	
药物					

发育性髋脱位

先天性髋关节脱位切开复位骨盆股骨截骨内固定术

适用对象：	病种编码：	PS027			
	主要诊断：	发育性髋脱位	ICD-10码：	Q65.0–Q65.2	
	主要操作/主要治疗方式：	先天性髋关节脱位切开复位骨盆股骨截骨内固定术	CCHI码：	HXD71309	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10:Q65.0–Q65.2发育性髋脱位疾病编码。 2. 患儿年龄在2岁以上，8岁以下。 3. 双侧病变行单侧手术者。 4. 当患儿合并其他疾病，但住院期间不需特殊处理，也不影响第一诊断的临床路径实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 体温正常。 2. 切口干燥无出血、感染、肢体无明显肿胀或血供障碍等表现。 3. 术后复查X线证实股骨头复位良好、头臼同心。 4. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。			
	住院日参考值：	最短天数8天（术后最短6天）			
	变异条件：	1. 存在影响手术的合并症，术前需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、置入物移位、切口愈合不良等并发症，需要延长治疗时间。 3. 双侧病变同时手术者，转入其他相应临床路径。			
	再入院间隔时间：	无			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
Ⅱ级护理	ACAB0001	特级护理	ACAD0001	Ⅰ级护理	ACAC0001
检查		检查		/Ⅱ级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
粪便常规检查	CCCA3000	氧气吸入	ABJA0001	骨盆X线摄影	EABXB001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000 和肌酐(Cr)测定 CEEB8000 和尿酸(UA)测定 CEEE8000	静脉输液	ABCA0001	治疗	
骨盆X线摄影	EABXB001	经口气管插管术	HAM62401	换药	换药(小)ABFA0001 或换药(中)ABFA0002 或换药(大)ABFA0003
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000 和总胆红素(T-Bil) 测定CELA1000 和直接胆红素(D- Bil)测定CELB1000 和γ-谷氨酰基转移 酶(GGT)测定 CECC8000 和总蛋白(TP)测定 CEAA8000 和白蛋白(A1b)测定 CEAE8000 和碱性磷酸酶(ALP) 测定CECD8000	院内遥测心电监护	KKA28701	静脉输液	ABCA0001
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000 或活化部分凝血活酶 时间(APTT)测定 CAGB1000 或血浆凝血酶原时间 (PT)测定CAGC1000 或血浆纤维蛋白原测 定CAGD1000	监测		监测	
常规心电图检查	单通道常规心电图检 查FKA03701 或多通道常规心电图 检查FKA03702 或十二通道常规心电 图检查FKA03703	/无创心电监测	FKA05705		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000 或RhD血型鉴定CAMF1000	/有创连续动脉血压监测	HAN05201	药物	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902	抗菌药物	
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000 和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000 和乙肝病毒表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定CGLJ1000 和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000 和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	检测仪中心静脉压测定	FKA02203	镇痛药物	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	无创血压监测	FKA05709		
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710		
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	术中体温监测	HAN05702		
治疗		麻醉恢复室监护	HAP28901		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
		麻醉深度电生理监测	HAP05902		
药物		麻醉			
		全身麻醉	HAA42901		
		手术			
		先天性髋关节脱位切开复位骨盆股骨截骨内固定术	HXD71309		
		/髌白造盖成形术	HXD83303		
		/先天性髋关节脱位切开复位石膏固定术	HXD71305		
		病理			
		药物			
		抗菌药物			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
髋部X线计算机体层(CT)平扫	EBAXB002	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000 和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000 和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000 和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000 和总蛋白(TP)测定CEAA8000 和白蛋白(A1b)测定CEAE8000 和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
治疗		治疗		肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000 和肌酐(Cr)测定CEEB8000 和尿酸(UA)测定CEEE8000
		静脉输血	ABCD0001	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定CEJB8000 和氯(Cl)测定CEJC8000 和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000 和镁(Mg)测定CEJE8000 和总钙(Ca)测定CEJF8000
药物		加压快速输血	ABCE0001	治疗	
		外周动脉穿刺置管术	HL962202	静脉输血	ABCD0001
		经外周静脉置入中心静脉导管术	ABDA0001	加压快速输血	ABCE0001
		药物		药物	

股骨干骨折

股骨干骨折闭合复位外固定架固定术

适用对象：	病种编码：	PS028			
	主要诊断：	股骨干骨折	ICD-10码：	S72.300	
	主要操作/主要治疗方式：	股骨干骨折闭合复位外固定架固定术	CCHI码：	HXG70318	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD10：S72.300股骨干骨折疾病编码。 2. 外伤引起的单纯性、新鲜股骨干骨折。 3. 除外病理性骨折。 4. 除外合并其他部位的骨折和损伤。 5. 除外对股骨干骨折手术治疗有较大影响的疾病(如心脑血管疾病)。 6. 需要进行手术治疗。			
	出院标准：	1. 体温正常、常规化验无明显异常。 2. 术后X线片证实复位固定满意。 3. 切口无异常。 4. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。			
	住院日参考值：	≤10天（术后最短5天）			
	变异条件：	1. 并发症：本病可伴有其他损伤，应严格掌握入选标准。部分患者因骨折本身的合并症而延期治疗，如大量出血需术前输血、血栓形成、血肿引起体温增高等。 2. 合并症：老年患者易有合并症，如骨质疏松、糖尿病、心脑血管疾病等，骨折后合并症可能加重，需同时治疗，住院时间延长。 3. 内固定物选择：根据骨折类型选择适当的内固定物。			
	再入院间隔时间：	无			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001
检查		检查		/ II 级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
尿沉渣镜检	CCBB2000	氧气吸入	ABJA0001	凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	/氧气雾化吸入	ABKB0001	股骨X线摄影	EABXG001
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	静脉输液	ABCA0001	治疗	
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	导尿	ABHA0001	换药	换药(小)ABFA0001 或换药(中)ABFA0002 或换药(大)ABFA0003

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
胸部X线摄影	EABJT001			静脉输液	ABCA0001
股骨X线摄影	EABXG001	经口气管插管术	HAM62401	监测	
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701 或多通道常规心电图检查FKA03702 或十二通道常规心电图检查FKA03703	院内遥测心电监护	KKA28701		
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000 或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000 或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000 或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	监测		药物	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000 或RhD血型鉴定CAMF1000	/无创心电监测	FKA05705	抗菌药物	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	/有创连续动脉血压监测	HAN05201	其他对症药物（消肿、止痛、预防应激性溃疡等）	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性 (HBsAg) 测定 CGLG1000 和乙型肝炎表面抗原定量 (HBsAg) 测定 CGLH1000 和乙肝病毒表面抗原确认试验 (HBsAgConfirm) 测定 CGLJ1000 和乙型肝炎表面抗体定性 (抗HBs) 测定 CGLK1000 和乙型肝炎表面抗体定量 (抗HBs) 测定 CGLL1000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902		
丙型肝炎抗体 (抗HCV) 测定	CGMA1000	检测仪中心静脉压测定	FKA02203		
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV) 测定	CGMF1000	无创血压监测	FKA05709		
梅毒螺旋体抗体 (抗TP) 测定	CGPP1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710		
治疗		术中体温监测	HAN05702		
四肢关节功能牵引	LEJW8001	麻醉恢复室监护	HAP28901		
药物		麻醉深度电生理监测	HAP05902		
		麻醉			
		全身麻醉	HAA42901		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
		/椎管内麻醉	单次腰麻HAC42101或连续腰麻HAC42102或腰麻复合连续硬膜外阻滞麻醉HAC42103或骶管单次阻滞麻醉HAC42104或颈部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42105或颈部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42106或胸部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42107或胸部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42108或腰部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42109或腰部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42110或骶管连续阻滞麻醉HAC42111或椎管内置管术HAC62101		
		手术			
		/股骨干骨折闭合复位外固定架固定术	HXG70318		
		病理			
		药物			
		抗菌药物			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血气分析	CEJM1000			肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定 CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定 CECD8000
大腿X线计算机体层(CT)平扫	EBAXF001	治疗		肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEE8000 和肌酐(Cr)测定CEEB8000 和尿酸(UA)测定CEEE8000
双下肢血管彩色超声	下肢动脉彩色多普勒超声检查EDCL5001 或下肢深静脉彩色多普勒超声检查EDCM1001 或下肢浅静脉彩色多普勒超声检查EDCM4001	静脉输血	ABCD0001	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定CEJB8000 和氯(Cl)测定CEJC8000 和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000 和镁(Mg)测定CEJE8000 和总钙(Ca)测定CEJF8000
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401 或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403 或最大通气量功能检查FJE01404	加压快速输血	ABCE0001	大腿X线计算机体层(CT)平扫	EBAXF001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
弥散功能检查	肺弥散功能检查--一口气法FJE01405 或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	经外周静脉置入中心静脉导管术	ABDA0001	治疗	
气道阻力测定	FJB02401	外周动脉穿刺置管术	HL962202	静脉输血	ABCD0001
普通二维超声心动图	EDFKA005	药物		加压快速输血	ABCE0001
动态心电图	三通道动态心电图检查FKA03704 或十二通道动态心电图检查FKA03705			药物	
治疗				抗血栓药物	
药物					
抗血栓药物					

股骨干骨折

股骨干骨折切开复位外固定架固定术

适用对象：	病种编码：	PS029			
	主要诊断：	股骨干骨折		ICD-10码：	S72.300
	主要操作/主要治疗方式：	股骨干骨折切开复位外固定架固定术		CCHI码：	HXG70324
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD10：S72.300股骨干骨折疾病编码。 2. 外伤引起的单纯性、新鲜股骨干骨折。 3. 除外病理性骨折。 4. 除外合并其他部位的骨折和损伤。 5. 除外对股骨干骨折手术治疗有较大影响的疾病(如心脑血管疾病)。 6. 需要进行手术治疗。			
	出院标准：	1. 体温正常、常规化验无明显异常。 2. 术后X线片证实复位固定满意。 3. 切口无异常。 4. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。			
	住院日参考值：	≤10天（术后最短5天）			
	变异条件：	1. 并发症：本病可伴有其他损伤，应严格掌握入选标准。部分患者因骨折本身的合并症而延期治疗，如大量出血需术前输血、血栓形成、血肿引起体温增高等。 2. 合并症：老年患者易有合并症，如骨质疏松、糖尿病、心脑血管疾病等，骨折后合并症可能加重，需同时治疗，住院时间延长。 3. 内固定物选择：根据骨折类型选择适当的内固定物。			
	再入院间隔时间：	无			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001
检查		检查		/ II 级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
尿沉渣镜检	CCBB2000	氧气吸入	ABJA0001	凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	/氧气雾化吸入	ABKB0001	股骨X线摄影	EABXG001
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	静脉输液	ABCA0001	治疗	
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	导尿	ABHA0001	换药	换药(小)ABFA0001 或换药(中)ABFA0002 或换药(大)ABFA0003

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
胸部X线摄影	EABJT001			静脉输液	ABCA0001
股骨X线摄影	EABXG001	经口气管插管术	HAM62401	监测	
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701 或多通道常规心电图检查FKA03702 或十二通道常规心电图检查FKA03703	院内遥测心电监护	KKA28701		
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000 或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000 或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000 或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	监测		药物	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000 或RhD血型鉴定CAMF1000	/无创心电监测	FKA05705	抗菌药物	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	/有创连续动脉血压监测	HAN05201	其他对症药物（消肿、止痛、预防应激性溃疡等）	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000 和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000 和乙肝病毒表面抗原确认试验 (HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000 和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定 CGLK1000 和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定 CGLL1000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902		
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	检测仪中心静脉压测定	FKA02203		
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	无创血压监测	FKA05709		
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710		
治疗		术中体温监测	HAN05702		
四肢关节功能牵引	LEJW8001	麻醉恢复室监护	HAP28901		
药物		麻醉深度电生理监测	HAP05902		
		麻醉			
		全身麻醉	HAA42901		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
		/椎管内麻醉	单次腰麻HAC42101或连续腰麻HAC42102或腰麻复合连续硬膜外阻滞麻醉HAC42103或骶管单次阻滞麻醉HAC42104或颈部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42105或颈部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42106或胸部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42107或胸部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42108或腰部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42109或腰部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42110或骶管连续阻滞麻醉HAC42111或椎管内置管术HAC62101		
		手术			
		股骨干骨折切开复位外固定架固定术	HXG70324		
		病理			
		药物			
		抗菌药物			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血气分析	CEJM1000			电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000 和氯(Cl)测定 CEJC8000 和总二氧化碳(TC02) 测定CEJD1000 和镁(Mg)测定 CEJE8000 和总钙(Ca)测定 CEJF8000
大腿X线计算机体层 (CT)平扫	EBAXF001	治疗		肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEE8000 和肌酐(Cr)测定 CEEB8000 和尿酸(UA)测定 CEEE8000
双下肢血管彩色超声	下肢动脉彩色多普勒 超声检查EDCL5001 或下肢深静脉彩色多 普勒超声检查 EDCM1001 或下肢浅静脉彩色多 普勒超声检查 EDCM4001	静脉输血	ABCD0001	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和γ-谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000 和总蛋白(TP)测定 CEAA8000 和白蛋白(Alb)测定 CEAE8000 和碱性磷酸酶(ALP) 测定CECD8000
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401 或用力肺活量功能检 查FJE01402 或肺每分通气量功能 检查FJE01403 或最大通气量功能检 查FJE01404	加压快速输血	ABCE0001	大腿X线计算机体层 (CT)平扫	EBAXF001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
弥散功能检查	肺弥散功能检查--一口气法FJE01405 或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	经外周静脉置入中心静脉导管术	ABDA0001	治疗	
气道阻力测定	FJB02401	外周动脉穿刺置管术	HL962202	静脉输血	ABCD0001
普通二维超声心动图	EDFKA005	药物		加压快速输血	ABCE0001
动态心电图	三通道动态心电图检查FKA03704 或十二通道动态心电图检查FKA03705			药物	
治疗				抗血栓药物	
药物					
抗血栓药物					

股骨干骨折

股骨干骨折闭合复位钢板螺丝钉内固定术

适用对象：	病种编码：	PS030
	主要诊断：	股骨干骨折 ICD-10码：S72.300
	主要操作/主要治疗方式：	股骨干骨折闭合复位钢板螺丝钉内固定术 CCHI码：HXG70314
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10:S72.300股骨干骨折疾病编码。 2. 外伤引起的单纯性、闭合性、新鲜股骨干骨折。 3. 除外病理性骨折。 4. 除外合并其他部位的骨折和损伤。 5. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。
	出院标准：	1. 体温正常、常规化验无明显异常。 2. 术后X线片证实复位固定满意。 3. 切口无异常。 4. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。
	住院日参考值：	≤14天（术后最短10天）
	变异条件：	1. 并发症：本病可伴有其他损伤，应严格掌握入选标准。部分患者因骨折本身的合并症而延期治疗，如大量出血需术前输血、血栓形成、血肿引起体温增高等。 2. 合并症：老年患者易有合并症，如骨质疏松、糖尿病、心脑血管疾病等，骨折后合并症可能加重，需同时治疗，住院时间延长。 3. 内固定物选择：根据骨折类型选择适当的内固定物。
	再入院间隔时间：	无

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001
/ II 级护理	ACAB0001	检查		/ II 级护理	ACAB0001
检查		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
尿常规化学分析	CCAA2000	氧气吸入	ABJA0001	凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000或血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000或血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000
尿沉渣镜检	CCBB2000	/氧气雾化吸入	ABKB0001	股骨X线摄影	EABXG001
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红 素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨 酰基转移酶(GGT)测 定CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和 白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸 酶(ALP)测定 CECD8000	静脉输液	ABCA0001	治疗	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000 和肌酐(Cr)测定 CEEB8000 和尿酸(UA)测定 CEEE8000	导尿	ABHA0001	换药	换药(小)ABFA0001 或换药(中)ABFA0002 或换药(大)ABFA0003
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000和氯(Cl)测 定CEJC8000和总二氧 化碳(TCO ₂)测定 CEJD1000和镁(Mg)测 定CEJE8000和总钙 (Ca)测定CEJF8000			静脉输液	ABCA0001
胸部X线摄影	EABJT001	经口气管插管术	HAM62401	监测	
股骨X线摄影	EABXG001	院内遥测心电监护	KKA28701		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701 或多通道常规心电图检查FKA03702 或十二通道常规心电图检查FKA03703	监测		药物	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	/无创心电监测	FKA05705	抗菌药物	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000 或RhD血型鉴定CAMF1000	/有创连续动脉血压监测	HAN05201	其他对症药物(消肿、止痛、预防应激性溃疡等)	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000和乙肝病毒表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定 CGLK1000和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定 CGLL1000	检测仪中心静脉压测定	FKA02203		
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	无创血压监测	FKA05709		
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710		
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	术中体温监测	HAN05702		
治疗		麻醉恢复室监护	HAP28901		
四肢关节功能牵引	LEJW8001	麻醉深度电生理监测	HAP05902		
药物		麻醉			
		全身麻醉	HAA42901		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
		/椎管内麻醉	单次腰麻HAC42101或连续腰麻HAC42102或腰麻复合连续硬膜外阻滞麻醉HAC42103或骶管单次阻滞麻醉HAC42104或颈部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42105或颈部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42106或胸部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42107或胸部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42108或腰部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42109或腰部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42110或骶管连续阻滞麻醉HAC42111或椎管内置管术HAC62101		
		手术			
		股骨干骨折闭合复位钢板螺丝钉内固定术	HXG70314		
		病理			
		药物			
		抗菌药物			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血气分析	CEJM1000			肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
大腿X线计算机体层(CT)平扫	EBAXF001	治疗		肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000
双下肢血管彩色超声	下肢动脉彩色多普勒超声检查EDCL5001或下肢深静脉彩色多普勒超声检查EDCM1001或下肢浅静脉彩色多普勒超声检查EDCM4001	静脉输血	ABCD0001	电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000
治疗		加压快速输血	ABCE0001	大腿X线计算机体层(CT)平扫	EBAXF001
		外周动脉穿刺置管术	HL962202	治疗	
药物		经外周静脉置入中心静脉导管术	ABDA0001	静脉输血	ABCD0001
抗血栓药物		药物		加压快速输血	ABCE0001
				药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
				抗凝药物	

髋关节骨关节炎
全髋人工关节置换术

适用对象：	病种编码：	PS031	
	主要诊断：	髋关节骨关节炎	ICD-10码：M16.0- M16.7, M16.9
	主要操作/主要治疗方式：	全髋人工关节置换术	CCHI码：HXD66301
入院标准：	1. 第一诊断必须符合上述主要诊断所列出的疾病编码。 2. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 体温正常，血常规无明显异常。 2. 伤口无感染征象（或可在门诊处理的伤口情况）。 3. 髋关节功能改善。 4. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。		
住院日参考值：	14天		
变异条件：	1. 住院影响于本路径升址，本则需要进行相大的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、置入物移位、切口愈合不良等并发症，需要延长治疗时间。 3. 根据病因不同，可能影响内植物选择上的治疗费用差别。		
再入院间隔时间：	无		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	特级护理	ACAD0001	I级护理	ACAC0001
检查				/ II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定CEJB8000 和氯(Cl)测定CEJC8000 和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000 和镁(Mg)测定CEJE8000 和总钙(Ca)测定CEJF8000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000 和肌酐(Cr)测定CEEB8000 和尿酸(UA)测定CEEE8000	导尿管留置	ABHA0002	髋关节X线摄影	EABXD001
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000 和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000 和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000 和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000 和总蛋白(TP)测定CEAA8000 和白蛋白(A1b)测定CEAE8000 和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	氧气吸入	ABJA0001	治疗	
胸部X线摄影	EABJT001			换药	换药(中)ABFA0002 或换药(大)ABFA0003
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701 或多通道常规心电图检查FKA03702 或十二通道常规心电图检查FKA03703	/氧气雾化吸入	ABKB0001	静脉输液	ABCA0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000和活化部分 凝血活酶时间(APTT) 测定CAGB1000和血浆 凝血酶原时间(PT)测 定CAGC1000和血浆纤 维蛋白原测定 CAGD1000和纤维蛋白 (原)降解产物(FDP) 测定CAJX1000和血浆 D-二聚体(D-Dimer) 测定CAJY1000	静脉输液	ABCA0001	监测	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定 型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定 型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定 型)CAME1000 或RhD血型鉴定 CAMF1000	导尿	ABHA0001		
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定 CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定 CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴 定CAML1000	经口气管插管术	HAM62401	药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000 和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000 和乙肝病毒表面抗原确认试验 (HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000 和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定 CGLK1000 和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定 CGLL1000	院内遥测心电监护	KKA28701	抗菌药物	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	监测		镇痛药物	
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	/无创心电监测	FKA05705	抗凝药物	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	/有创连续动脉血压监测	HAN05201	其他药物(消肿等)	
尿常规化学分析	CCAA2000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902		
髋关节X线摄影	EABXD001	检测仪中心静脉压测定	FKA02203		
风湿活动筛查	红细胞沉降率(ESR)测定 CAAJ1000 和抗链球菌溶血素O(ASO)测定 CGPB1000 和类风湿因子(RF)测定 CGFG1000 和超敏C反应蛋白(hs-CRP)测定 CEAU1000	无创血压监测	FKA05709		
C-反应蛋白(CRP)测定	CGCA1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710		
红细胞沉降率(ESR)测定	CAAJ1000	术中体温监测	HAN05702		
治疗		麻醉恢复室监护	HAP28901		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
一般灌肠	ABGE0001	麻醉深度电生理监测	HAP05902		
药物		麻醉			
		全身麻醉	HAA42901		
		椎管内麻醉	单次腰麻HAC42101或 连续腰麻HAC42102或 腰麻复合连续硬膜外 阻滞麻醉HAC42103或 骶管单次阻滞麻醉 HAC42104或颈部硬膜 外单次阻滞麻醉 HAC42105或颈部硬膜 外连续阻滞麻醉 HAC42106或胸部硬膜 外单次阻滞麻醉 HAC42107或胸部硬膜 外连续阻滞麻醉 HAC42108或腰部硬膜 外单次阻滞麻醉 HAC42109或腰部硬膜 外连续阻滞麻醉 HAC42110或骶管连续 阻滞麻醉HAC42111或 椎管内置管术 HAC62101		
		手术			
		全髋人工关节置换术	HXD66301		
		病理			
		药物			
		抗菌药物			
		镇痛药物			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
检查		检查		检查	
血气分析	CEJM1000			双下肢血管彩色超声	下肢动脉彩色多普勒超声检查EDCL5001 或下肢深静脉彩色多普勒超声检查EDCM1001 或下肢浅静脉彩色多普勒超声检查EDCM4001
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401 或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403 或最大通气量功能检查FJE01404	治疗		治疗	
弥散功能检查	肺弥散功能检查--一口气法FJE01405 或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	静脉输血	ABCD0001	静脉输血	ABCD0001
气道阻力测定	FJB02401	加压快速输血	ABCE0001	加压快速输血	ABCE0001
普通二维超声心动图	EDFKA005	外周动脉穿刺置管术	HL962202	药物	
双下肢血管彩色超声	下肢动脉彩色多普勒超声检查EDCL5001 或下肢深静脉彩色多普勒超声检查EDCM1001 或下肢浅静脉彩色多普勒超声检查EDCM4001	经外周静脉置入中心静脉导管术	ABDA0001		
治疗					
		药物			
药物					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码

膝关节骨关节炎

关节镜下膝关节清理术

适用对象：	病种编码：	PS032	
	主要诊断：	膝关节骨关节炎	ICD-10码：M17.0- M17.5, M17.9
	主要操作/主要治疗方式：	关节镜下膝关节清理术	CCHI码：HXJ73501
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合上述主要诊断所列出的疾病编码。 2. 当患有其他疾病时，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。	
	出院标准：	1. 体温正常，常规化验指标无明显异常（血沉、CRP除外）。 2. 伤口愈合良好：引流管拔除，伤口无感染征象（或可在门诊处理的伤口情况）、无皮瓣坏死。 3. 膝关节功能改善。 4. 无需要住院处理的并发症和/或合并症。	
	住院日参考值：	≤5天（术后最短4天）	
	变异条件：	1. 存在影响手术的合并症，术前需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、置入物移位、切口愈合不良等并发症，需要延长治疗时间。	
	再入院间隔时间：	无	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
Ⅱ级护理	ACAB0001	特级护理	ACAD0001	Ⅱ级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	治疗			
尿常规化学分析	CCAA2000	导尿管留置	ABHA0002	治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	氧气吸入	ABJA0001	换药	换药(小)ABFA0001 或换药(中)ABFA0002 或换药(大)ABFA0003
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	/氧气雾化吸入	ABKB0001	静脉输液	ABCA0001
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000			监测	
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404	静脉输液	ABCA0001		
弥散功能检查	肺弥散功能检查—一口气法FJE01405或肺弥散功能检查—重复呼吸法FJE01406	导尿	ABHA0001	药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
气道阻力测定	FJB02401	经口气管插管术	HAM62401	镇痛药物	
胸部X线摄影	EABJT001	院内遥测心电监护	KKA28701	其他药物（消肿等）	
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701 或多通道常规心电图检查FKA03702 或十二通道常规心电图检查FKA03703	监测			
膝关节X线摄影	EABXJ001	/无创心电监测	FKA05705		
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000 或RhD血型鉴定CAMF1000	/有创连续动脉血压监测	HAN05201		
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902		
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	检测仪中心静脉压测定	FKA02203		
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	无创血压监测	FKA05709		
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000和乙肝病毒表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定 CGLK1000和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定 CGLL1000	术中体温监测	HAN05702		
治疗		麻醉恢复室监护	HAP28901		
一般灌肠	ABGE0001	麻醉深度电生理监测	HAP05902		
药物		麻醉			
		全身麻醉	HAA42901		
		/椎管内麻醉	单次腰麻HAC42101或连续腰麻HAC42102或腰麻复合连续硬膜外阻滞麻醉HAC42103或骶管单次阻滞麻醉HAC42104或颈部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42105或颈部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42106或胸部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42107或胸部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42108或腰部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42109或腰部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42110或骶管连续阻滞麻醉HAC42111或椎管内置管术HAC62101		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
		/神经阻滞麻醉	椎旁神经单次阻滞麻醉HAE42101或椎旁神经连续阻滞麻醉HAE42102或星状神经节阻滞麻醉HAE42103或枕大/枕小神经阻滞麻醉HAF42102或正中神经阻滞麻醉HAG42107或坐骨神经单次阻滞麻醉HAK42101或坐骨神经连续阻滞麻醉HAK42102或隐神经阻滞麻醉HAK42103或腓窝入路胫神经单次阻滞麻醉HAK42104或腓窝入路胫神经连续阻滞麻醉HAK42105或腓总神经阻滞麻醉HAK42106		
		手术			
		关节镜下膝关节清理术	HXJ73501		
		病理			
		药物			
		止痛药物			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
血气分析	CEJM1000			血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
普通二维超声心动图	EDFKA005	治疗		膝关节X线摄影	EABXJ001
双下肢血管彩色超声	下肢动脉彩色多普勒超声检查EDCL5001或下肢深静脉彩色多普勒超声检查EDCM1001或下肢浅静脉彩色多普勒超声检查EDCM4001	静脉输血	ABCD0001	治疗	
膝关节磁共振成像	ECAXJ001	加压快速输血	ABCE0001	静脉输血	ABCD0001
治疗		外周动脉穿刺置管术	HL962202	加压快速输血	ABCE0001
		经外周静脉置入中心静脉导管术	ABDA0001	药物	
药物		药物		抗菌药物	

膝内翻畸形

胫骨高位外侧截骨术

适用对象：	病种编码：	PS033			
			M21.104	后天性膝内翻	
主要诊断：	膝内翻畸形		Q74.101	先天性膝内翻	
主要操作/主要治疗方式：	胫骨高位外侧截骨术		CCHI码：HXP73303		
入院标准：	1. 术前影像学检查证实膝内翻畸形，胫骨高位外侧截骨术为最佳治疗方案。 2. 膝内翻畸形、膝关节单间室受累。 3. 除外膝关节及周围感染、严重的膝关节不稳、髌股关节骨关节炎、膝关节屈曲畸形。 4. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。				
出院标准：	1. 体温正常，血常规无明显异常。 2. 伤口无感染征象、外固定针道无渗液（或可在门诊处理的伤口情况）。 3. 术后X线片显示截骨矫形角度及固定满意。 4. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。				
住院日参考值：	≤14天（术后最短5天）				
变异条件：	1. 有影响手术的合并症，术前需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、呼吸功能衰竭、心脏功能衰竭、肝肾功能衰竭等并发症，需要延长治疗时间。 3. 根据病因不同可能影响内植物选择上的治疗费用差别。				
再入院间隔时间：	无				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	特级护理	ACAD0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查		/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	导尿管留置	ABHA0002	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	氧气吸入	ABJA0001	治疗	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	/氧气雾化吸入	ABKB0001	换药	换药(小)ABFA0001 或换药(中)ABFA0002 或换药(大)ABFA0003
股骨X线摄影	EABXG001	静脉输液	ABCA0001	监测	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000				
胸部X线摄影	EABJT001	导尿	ABHA0001	药物	
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703	经口气管插管术	HAM62401		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000 或RhD血型鉴定CAMF1000	院内遥测心电监护	KKA28701		
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	监测			
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000和乙肝病毒表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定 CGLK1000和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定 CGLL1000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902		
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	检测仪中心静脉压测定	FKA02203		
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	/无创心电监测	FKA05705		
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	/有创连续动脉血压监测	HAN05201		
治疗		无创血压监测	FKA05709		
一般灌肠	ABGE0001	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
药物		术中体温监测	HAN05702		
		麻醉恢复室监护	HAP28901		
		麻醉深度电生理监测	HAP05902		
		麻醉			
		全身麻醉	HAA42901		
		/椎管内麻醉	单次腰麻HAC42101或 连续腰麻HAC42102或 腰麻复合连续硬膜外 阻滞麻醉HAC42103或 骶管单次阻滞麻醉 HAC42104或颈部硬膜 外单次阻滞麻醉 HAC42105或颈部硬膜 外连续阻滞麻醉 HAC42106或胸部硬膜 外单次阻滞麻醉 HAC42107或胸部硬膜 外连续阻滞麻醉 HAC42108或腰部硬膜 外单次阻滞麻醉 HAC42109或腰部硬膜 外连续阻滞麻醉 HAC42110或骶管连续 阻滞麻醉HAC42111或 椎管内置管术 HAC62101		
		手术			
		胫骨高位外侧截骨术	HXP73303		
		病理			
		药物			
		抗菌药物			
		止痛药物			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
双下肢血管彩色超声	下肢动脉彩色多普勒超声检查EDCL5001或下肢深静脉彩色多普勒超声检查EDCM1001或下肢浅静脉彩色多普勒超声检查EDCM4001			肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
普通二维超声心动图	EDFKA005	治疗		肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404	静脉输血	ABCD0001	血浆D-二聚体(D-Dimer)测定	CAJY1000
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一口气法FJE01405或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	加压快速输血	ABCE0001	治疗	
气道阻力测定	FJB02401	外周动脉穿刺置管术	HL962202	静脉输血	ABCD0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血气分析	CEJM1000	经外周静脉置入中心 静脉导管术	ABDA0001	加压快速输血	ABCE0001
治疗		药物		药物	
药物					

膝内翻畸形

胫骨高位内侧截骨术

适用对象：	病种编码：	PS034			
			M21.104	后天性膝内翻	
主要诊断：	膝内翻畸形		Q74.101	先天性膝内翻	
主要操作/主要治疗方式：	胫骨高位内侧截骨术		CCHI码：	HXP73304	
入院标准：	1. 体温正常，血常规无明显异常。 2. 膝内翻畸形、膝关节单间室受累。 3. 除外膝关节及周围感染、严重的膝关节不稳、髌股关节骨关节炎、膝关节屈曲畸形。 4. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。				
出院标准：	1. 体温正常，血常规无明显异常。 2. 伤口无感染征象、外固定针道无渗液（或可在门诊处理的伤口情况）。 3. 术后X线片显示截骨矫形角度及固定满意。 4. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。				
住院日参考值：	≤14天（术后最短5天）				
变异条件：	1. 有影响手术的合并症，术前需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、呼吸功能衰竭、心脏功能衰竭、肝肾功能衰竭等并发症，需要延长治疗时间。 3. 根据病因不同可能影响内植物选择上的治疗费用差别。				
再入院间隔时间：	无				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
Ⅱ级护理	ACAB0001	特级护理	ACAD0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查		/Ⅱ级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
尿常规化学分析	CCAA2000	导尿管留置	ABHA0002	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	氧气吸入	ABJA0001	治疗	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000 和肌酐(Cr)测定CEEB8000 和尿酸(UA)测定CEEE8000	/氧气雾化吸入	ABKB0001	换药	换药(小)ABFA0001 或换药(中)ABFA0002 或换药(大)ABFA0003
股骨X线摄影	EABXG001	静脉输液	ABCA0001	监测	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000				
胸部X线摄影	EABJT001	导尿	ABHA0001	药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701 或多通道常规心电图检查FKA03702 或十二通道常规心电图检查FKA03703	经口气管插管术	HAM62401		
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000 或RhD血型鉴定CAMF1000	院内遥测心电监护	KKA28701		
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	监测			
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000和乙肝病毒表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定CGLJ1000和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定CGLK1000和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定CGLL1000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902		
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	检测仪中心静脉压测定	FKA02203		
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	/无创心电监测	FKA05705		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	/有创连续动脉血压监测	HAN05201		
治疗		无创血压监测	FKA05709		
一般灌肠	ABGE0001	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710		
药物		术中体温监测	HAN05702		
		麻醉恢复室监护	HAP28901		
		麻醉深度电生理监测	HAP05902		
		麻醉			
		全身麻醉	HAA42901		
		/椎管内麻醉	单次腰麻HAC42101或 连续腰麻HAC42102或 腰麻复合连续硬膜外 阻滞麻醉HAC42103或 骶管单次阻滞麻醉 HAC42104或颈部硬膜 外单次阻滞麻醉 HAC42105或颈部硬膜 外连续阻滞麻醉 HAC42106或胸部硬膜 外单次阻滞麻醉 HAC42107或胸部硬膜 外连续阻滞麻醉 HAC42108或腰部硬膜 外单次阻滞麻醉 HAC42109或腰部硬膜 外连续阻滞麻醉 HAC42110或骶管连续 阻滞麻醉HAC42111或 椎管内置管术 HAC62101		
		手术			
		胫骨高位内侧截骨术	HXP73304		
		病理			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
		药物			
		抗菌药物			
		止痛药物			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
双下肢血管彩色超声	下肢动脉彩色多普勒超声检查EDCL5001或下肢深静脉彩色多普勒超声检查EDCM1001或下肢浅静脉彩色多普勒超声检查EDCM4001			肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
普通二维超声心动图	EDFKA005	治疗		肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404	静脉输血	ABCD0001	血浆D-二聚体(D-Dimer)测定	CAJY1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一口气法FJE01405或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406	加压快速输血	ABCE0001	治疗	
气道阻力测定	FJB02401	外周动脉穿刺置管术	HL962202	静脉输血	ABCD0001
血气分析	CEJM1000	经外周静脉置入中心静脉导管术	ABDA0001	加压快速输血	ABCE0001
治疗		药物		药物	
药物					

先天性肌性斜颈

肌肉松解术

适用对象：	病种编码：	PS035			
	主要诊断：	先天性肌性斜颈	ICD-10码：	Q68.001/Q68.002	
	主要操作/主要治疗方式：	肌肉松解术	CCHI码：	HX857301	
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD10：Q68.001/Q68.002先天性胸锁乳突肌性斜颈疾病编码。 2. 患儿大于1岁。 3. 当患儿合并其他疾病，但住院期间不需特殊处理，也不影响第一诊断的临床路径实施时，可以进入路径。				
出院标准：	1. 术后体温平稳，切口无渗出、出血、感染等表现。 2. 无术后并发症。				
住院日参考值：	4天（术后最短3天）				
变异条件：	1. 如术中出现血管或神经损伤、可能要输血，术后住院时间需要延长。 2. 存在其他原因所致斜颈。				
再入院间隔时间：	无				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	特级护理	ACAD0001	II级护理	ACAB0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		治疗	
粪便常规检查	CCCA3000	静脉输液	ABCA0001	换药(小)	ABFA0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)测定 CECB1000和总胆红素 (T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素 (D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶 (GGT)测定 CECC8000和总蛋白 (TP)测定CEAA8000和白蛋白 (Alb)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP)测定 CECD8000	经口气管插管术	HAM62401	静脉输液	ABCA0001
肾脏功能检查	尿素 (Urea)测定 CEEA8000 和肌酐 (Cr)测定 CEEB8000 和尿酸 (UA)测定 CEEE8000	院内遥测心电监护	KKA28701	外固定架使用	PBBA0801
凝血功能测定	凝血酶时间 (TT)测定 CAGA1000 或活化部分凝血活酶时间 (APTT)测定 CAGB1000 或血浆凝血酶原时间 (PT)测定CAGC1000 或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	监测		监测	
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701 或多通道常规心电图检查FKA03702 或十二通道常规心电图检查FKA03703	/无创心电监测	FKA05705		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性 (HBsAg) 测定 CGLG1000和乙型肝炎表面抗原定量 (HBsAg) 测定 CGLH1000和乙肝病毒表面抗原确认试验 (HBsAgConfirm) 测定 CGLJ1000和乙型肝炎表面抗体定性 (抗HBs) 测定 CGLK1000和乙型肝炎表面抗体定量 (抗HBs) 测定 CGLL1000	/有创连续动脉血压监测	HAN05201	药物	
丙型肝炎抗体 (抗HCV) 测定	CGMA1000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902	抗菌药物	
人免疫缺陷病毒抗体 (抗HIV) 测定	CGMF1000	检测仪中心静脉压测定	FKA02203	镇痛药物	
梅毒螺旋体抗体 (抗TP) 测定	CGPP1000	无创血压监测	FKA05709		
颈椎X线摄影	EABVH001	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710		
治疗		术中体温监测	HAN05702		
		麻醉恢复室监护	HAP28901		
药物		麻醉深度电生理监测	HAP05902		
		麻醉			
		全身麻醉	HAA42901		
		手术			
		肌肉松解术	HX857301		
		病理			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
		药物			
		抗菌药物			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
治疗		治疗		治疗	
		静脉输血	ABCD0001	静脉输血	ABCD0001
药物		外周动脉穿刺置管术	HL962202	药物	
		经外周静脉置入中心静脉导管术	ABDA0001		
		药物			

重度膝关节骨关节炎

全膝人工关节置换术

适用对象：	病种编码：	PS036			
	主要诊断：	重度膝关节骨关节炎	ICD-10码：	M17.0- M17.5, M17.9	
	主要操作/主要治疗方式：	全膝人工关节置换术	CCHI码：	HXJ66301	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合上述主要诊断所列出的疾病编码。 2. 当患有其他疾病时，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。			
	出院标准：	1. 体温正常，常规化验指标无明显异常（血沉、CRP除外）。 2. 伤口愈合良好：引流管拔除，伤口无感染征象（或可在门诊处理的伤口情况）、无皮瓣坏死。 3. 膝关节功能改善。 4. 无需要住院处理的并发症和/或合并症。			
	住院日参考值：	最短天数12天（术后最短5天）			
	变异条件：	1. 存在影响手术的合并症，术前需要进行相关的诊断和治疗。 2. 术后出现肺部感染、置入物移位、切口愈合不良等并发症，需要延长治疗时间。 3. 根据病因不同，可能影响内植物选择上的治疗费用差别。			
	再入院间隔时间：	无			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
Ⅱ级护理	ACAB0001	特级护理	ACAD0001	Ⅰ级护理	ACAC0001
检查				/Ⅱ级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查		检查	
尿常规化学分析	CCAA2000			血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定 CEEA8000 和肌酐(Cr)测定 CEEB8000 和尿酸(UA)测定 CEEE8000	导尿管留置	ABHA0002	尿常规化学分析	CCAA2000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转 移酶(AST)测定 CECB1000 和总胆红素(T-Bil) 测定CELA1000 和直接胆红素(D- Bil)测定CELB1000 和γ-谷氨酰基转移 酶(GGT)测定 CECC8000 和总蛋白(TP)测定 CEAA8000 和白蛋白(A1b)测定 CEAE8000 和碱性磷酸酶(ALP) 测定CECD8000	氧气吸入	ABJA0001	凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000 或活化部分凝血活酶 时间(APTT)测定 CAGB1000 或血浆凝血酶原时间 (PT)测定CAGC1000 或血浆纤维蛋白原测 定CAGD1000
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定 CEJB8000 和氯(Cl)测定 CEJC8000 和总二氧化碳(TCO ₂) 测定CEJD1000 和镁(Mg)测定 CEJE8000 和总钙(Ca)测定 CEJF8000	/氧气雾化吸入	ABKB0001	膝关节X线摄影	EABXJ001
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000 或活化部分凝血活酶 时间(APTT)测定 CAGB1000 或血浆凝血酶原时间 (PT)测定CAGC1000 或血浆纤维蛋白原测 定CAGD1000	静脉输液	ABCA0001	治疗	
胸部X线摄影	EABJT001			换药	换药(中)ABFA0002 或换药(大)ABFA0003

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701 或多通道常规心电图检查FKA03702 或十二通道常规心电图检查FKA03703	导尿	ABHA0001	静脉输液	ABCA0001
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	经口气管插管术	HAM62401	院内遥测心电监护	KKA28701
糖化血红蛋白(HbA1c)测定	CEBD1000	院内遥测心电监护	KKA28701	监测	
血脂四项	甘油三酯(TG)测定CEHB1000 和总胆固醇(TC)测定CEHA1000 和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定CEHC1000 和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定CEHD1000	监测		无创血压监测	FKA05709
风湿活动筛查	红细胞沉降率(ESR)测定CAAJ1000 和抗链球菌溶血素O(ASO)测定CGPB1000 和类风湿因子(RF)测定CGFG1000 和超敏C反应蛋白(hs-CRP)测定CEAU1000	/无创心电监测	FKA05705	/有创连续动脉血压监测	HAN05201
膝关节X线摄影	EABXJ001	/有创连续动脉血压监测	HAN05201	/无创心电监测	FKA05705
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000 或RhD血型鉴定CAMF1000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定 CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定 CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴定 CAML1000	检测仪中心静脉压测定	FKA02203	药物	
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000 和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000 和乙肝病毒表面抗原确认试验 (HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000 和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定 CGLK1000 和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定 CGLL1000	无创血压监测	FKA05709	止吐药物	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	无创指脉血氧饱和度监测	FKA05710	抗凝药物	
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	术中体温监测	HAN05702	抗菌药物	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	麻醉恢复室监护	HAP28901	镇痛药物	
治疗		麻醉深度电生理监测	HAP05902	其他药物:抗血栓等	
一般灌肠	ABGE0001	麻醉			
药物		全身麻醉	HAA42901		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
		/椎管内麻醉	单次腰麻HAC42101或连续腰麻HAC42102或腰麻复合连续硬膜外阻滞麻醉HAC42103或骶管单次阻滞麻醉HAC42104或颈部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42105或颈部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42106或胸部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42107或胸部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42108或腰部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42109或腰部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42110或骶管连续阻滞麻醉HAC42111或椎管内置管术HAC62101		
		/神经阻滞麻醉	椎旁神经单次阻滞麻醉HAE42101或椎旁神经连续阻滞麻醉HAE42102或星状神经节阻滞麻醉HAE42103或枕大/枕小神经阻滞麻醉HAF42102或正中神经阻滞麻醉HAG42107或坐骨神经单次阻滞麻醉HAK42101或坐骨神经连续阻滞麻醉HAK42102或隐神经阻滞麻醉HAK42103或腓窝入路胫神经单次阻滞麻醉HAK42104或腓窝入路胫神经连续阻滞麻醉HAK42105或腓总神经阻滞麻醉HAK42106		
		手术			
		全膝人工关节置换术	HXJ66301		
		病理			
		药物			
		抗菌药物			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
颈椎X线摄影	EABVH001			红细胞沉降率(ESR)测定	CAAJ1000
腰椎X线摄影	EABVT001	治疗		超敏C反应蛋白(hs-CRP)测定	CEAU1000
双下肢负重位X线摄影	EABXA001	静脉输血	ABCD0001	血浆D-二聚体(D-Dimer)测定	CAJY1000
普通二维超声心动图	EDFKA005	加压快速输血	ABCE0001	下肢深静脉彩色多普勒超声检查	EDCM1001
血气分析	CEJM1000	外周动脉穿刺置管术	HL962202	尿常规化学分析	CCAA2000
胸椎磁共振成像	ECAVN001	经外周静脉置入中心静脉导管术	ABDA0001	肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000 和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000 和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000 和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000 和总蛋白(TP)测定CEAA8000 和白蛋白(A1b)测定CEAE8000 和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000
腰椎磁共振成像	ECAVT001	药物		肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000 和肌酐(Cr)测定CEEB8000 和尿酸(UA)测定CEEE8000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肺通气功能检查	肺活量功能检查 FJE01401 或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403 或最大通气量功能检查FJE01404			电解质测定	钾(K)测定CEJA8000 和钠(Na)测定CEJB8000 和氯(Cl)测定CEJC8000 和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000 和镁(Mg)测定CEJE8000 和总钙(Ca)测定CEJF8000
弥散功能检查	肺弥散功能检查--一口气法FJE01405 或肺弥散功能检查--重复呼吸法FJE01406			治疗	
气道阻力测定	FJB02401			静脉输血	ABCD0001
院内会诊	AADB0001			加压快速输血	ABCE0001
治疗				药物	
药物					

颈椎病

前路颈椎间盘切除椎间植骨融合内固定术

适用对象：	病种编码：	PS037
主要诊断：	颈椎病	ICD-10码：M48.9
主要操作/主要治疗方式：	前路颈椎间盘切除椎间植骨融合内固定术	CCHI码：HVJ73304
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：M48.9颈椎病（脊髓型）疾病编码。 2. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。	
出院标准：	1. 体温正常，常规化验指标无明显异常。 2. 伤口情况良好：引流管拔除，伤口无感染征象（或可在门诊处理的伤口情况），无皮瓣坏死。 3. 术后复查内植物位置满意。 4. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。	
最短住院日参考值：	7天	
变异条件：	1. 围手术期并发症：内植物松动、伤口感染、脊髓等神经损伤、血管损伤、食管损伤、硬膜外血肿和伤口血肿等造成住院日延长和费用增加。 2. 内科合并症：老年患者常合并基础疾病，如脑血管或心血管病、糖尿病、血栓、骨质疏松等，手术可能导致这些疾病加重而需要进一步治疗，从而延长治疗时间，并增加住院费用。 3. 有上胸椎或上颈椎同时累及者，可能同期手术。 4. 内植物的选择：由于病情不同，使用不同的内植物，可能导致住院费用存在差异。	
再入院间隔时间：	14天	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
Ⅱ级护理	ACAB0001	Ⅰ级护理	ACAC0001	Ⅰ级护理	ACAC0001
检查		检查		Ⅱ级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(Alb)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	静脉输液	ABCA0001	颈椎X线摄影	EABVH001
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	一般灌肠	ABGE0001	治疗	
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000	血压监测	有创连续动脉血压监测HAN05201 或无创血压监测FKA05709	自控静脉镇痛治疗	HAZ48101
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000和活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000和血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000和血浆纤维蛋白原测定CAGD1000和纤维蛋白(原)降解产物(FDP)测定CAJX1000和血浆D-二聚体(D-Dimer)测定CAJY1000	导尿管留置	ABHA0002	药物	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 CGLG1000和乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 CGLH1000 和乙肝病毒表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000和乙型肝炎表面抗体定性(抗HBs)测定 CGLK1000和乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定 CGLL1000			激素	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	氧气吸入	氧气吸入ABJA0001或 密闭式氧气吸入 ABJB0001	神经营养药物	
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	麻醉		镇痛药物	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	全身麻醉	HAA42901	静脉/口服抗生素	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	/局部静脉内麻醉	HAB42201	脱水药物	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定CAMG1000或Rh血型c抗原鉴定CAMH1000或Rh血型E抗原鉴定CAMJ1000或Rh血型e抗原鉴定CAMK1000或Rh血型其它抗原鉴定CAML1000	监测			
生理盐水介质交叉配血	CAMW1000	全身麻醉下呼吸功能监测	HAN05902		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703	心电监护	院内遥测心电监护 KKA28701 或无创心电监测 FKA05705		
颈椎平片	颈椎X线摄影 EABVH001	手术			
颈椎X线计算机体层 (CT)平扫	EBAVH001	前路颈椎体及椎管内 肿瘤切除植骨融合内 固定术	HVH73313		
颈椎磁共振成像	ECAVH001	药物			
葡萄糖 (Glu) 测定	CEFA8000	抗菌药物			
红细胞沉降率 (ESR) 测定	CAAJ1000	止血药物			
C-反应蛋白 (CRP) 测 定	CGCA1000				
胸部X线摄影	EABJT001				
治疗					
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
特殊介质交叉配血	CAMX1000	血气分析	CEJM1000	血浆抗凝血酶抗原(AT:Ag)测定	CAJD1000
疑难交叉配血	CAMY1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000
血脂四项	甘油三酯(TG)测定CEHB1000和总胆固醇(TC)测定CEHA1000和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定CEHC1000和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定CEHD1000	治疗		电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和镁(Mg)测定CEJE8000和总钙(Ca)测定CEJF8000
普通二维超声心动图	EDFKA005	静脉输血	ABCD0001	颈椎X线计算机体层(CT)平扫	EBAVH001
肺功能检查	肺活量功能检查FJE01401和用力肺活量功能检查FJE01402和肺每分通气量功能检查FJE01403和最大通气量功能检查FJE01404	加压快速输血	ABCE0001	颈椎磁共振成像	ECAVH001
弥散功能检查	肺弥散功能检查-一口气法FJE01405或肺弥散功能检查-重复呼吸法FJE01406			治疗	
肌电图监测	FCA03710			换药	换药(小)ABFA0001或换药(中)ABFA0002或换药(大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
诱发电位	上肢运动诱发电位检查FCZ03701或下肢运动诱发电位检查FCZ03702或盆底磁刺激运动诱发电位检查FCZ03703	药物		静脉输液	ABCA0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
骨断层显像	EECX6001			氧气雾化吸入	ABKB0001
下腔静脉彩色多普勒超声检查	EDCML001			药物	
院内会诊	AADB0001			通便药物	
糖化血红蛋白(HbA1c)测定	CEBD1000			抗凝药物	
肌酸激酶(CK)测定	CECS1000			抑制消化道应激反应药物	
肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定	CECT1000			抗骨质疏松药物	
肌酸激酶-MB同工酶质量(CK-MBmass)测定	CECU1000				
肌酸激酶同工酶测定	CECV1000				
肌钙蛋白T(TnT)测定	CEAX1000				
肌钙蛋白 I (TnI)测定	CEAY1000				
肌红蛋白(Mb)测定	CEAZ8000				
动态心电图	三通道动态心电图检查FKA03704或十二通道动态心电图检查FKA03705				
动态血氧	无创指脉血氧饱和度监测FKA05710				
骨密度测定	EEAX6002				
治疗					
药物					

股骨头坏死（FicatIII-IV期，严重疼痛伴功能障碍）

全髋人工关节置换术

适用对象：	病种编码：	PS038
主要诊断：	股骨头坏死（FicatIII-IV期，严重疼痛伴功能障碍）	ICD-10：M87.002, M87.102, M87.203, M87.901
主要操作/主要治疗方式：	全髋人工关节置换术	CCHI：HXD66301
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：M87.002, M87.102, M87.203, M87.901股骨头坏死疾病编码。 2. 股骨头坏死终末期，已出现股骨头塌陷变形。 3. 除外股骨近端肿瘤及骨折。 4. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。 5. 病变影响患者生活质量，患者有改善患髋疼痛及活动度的要求。	
出院标准：	1. 体温正常，血常规无明显异常。 2. 伤口无感染征象（或可在门诊处理的伤口情况）。 3. 术后X线片证实假体位置满意。 4. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。	
最短住院日参考值：	≤8天	
变异条件：	1. 并发症：术中或术后骨折、术后关节脱位、大量出血需输血、深静脉血栓形成或肺栓塞、肺部及泌尿系感染、伤口并发症或假体周围感染等造成住院时间延长和医疗费用增加。 2. 合并症：如骨质疏松、糖尿病、心脑血管疾病等，需同时治疗而导致住院时间延长和医疗费用增加。 3. 内植物选择：根据患者髋臼及股骨骨质条件选择生物型假体、骨水泥型假体或混合型假体。如选择生物型假体，可根据患者年龄选择不同摩擦界面假体，可能导致住院费用存在差异。	
再入院间隔时间：	无	

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		检查			
血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000	检查	

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000 和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000 和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000 和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000 和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000 和总蛋白(TP)测定CEAA8000 和白蛋白(A1b)测定CEAE8000 和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	经口气管插管术	HAM62401	髋关节X线摄影	EABXD001
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000 和肌酐(Cr)测定CEEB8000 和尿酸(UA)测定CEEE8000	院内遥测心电监护	KKA28701	治疗	
髋关节X线摄影	EABXD001	监测		换药	换药(小)ABFA0001或 换药(中)ABFA0002或 换药(大)ABFA0003或 换药(特大)ABFA0004
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000和活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000和血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000和血浆纤维蛋白原测定CAGD1000和纤维蛋白(原)降解产物(FDP)测定CAJX1000和凝血酶原活动度(PA)和凝血酶原比值(R)和凝血酶原INR值(INR)和血浆D-二聚体(D-Dimer)测定CAJY1000	/无创心电监测	FKA05705	静脉输液	ABCA0001

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
胸部X线摄影	EABJT001	/有创连续动脉血压监测	HAN05201	监测	
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道 常规心电图检查 FKA03702或十二通道 常规心电图检查 FKA03703	全身麻醉下呼吸功能 监测	HAN05902		
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定 型)CAMA1000 或ABO血型鉴定(反定 型)CAMB1000 或ABO亚型鉴定(正定 型)CAMD1000 或ABO亚型鉴定(反定 型)CAME1000 或RhD血型鉴定 CAMF1000	检测仪中心静脉压测 定	FKA02203	药物	
红细胞沉降率(ESR) 测定	CAAJ1000	无创血压监测	FKA05709	镇痛药物	
C-反应蛋白(CRP)测 定	CGCA1000	无创指脉血氧饱和度 监测	FKA05710	抗凝药物	
Rh血型其他抗原鉴定	Rh血型C抗原鉴定 CAMG1000 或Rh血型c抗原鉴定 CAMH1000 或Rh血型E抗原鉴定 CAMJ1000 或Rh血型e抗原鉴定 CAMK1000 或Rh血型其它抗原鉴 定CAML1000	术中体温监测	HAN05702	抗菌药物	
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定 性(HBsAg)测定 CGLG1000和乙型肝炎 表面抗原定量 (HBsAg)测定 CGLH1000和乙肝病毒 表面抗原确认试验 (HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000和乙型肝炎 表面抗体定性(抗 HBs)测定CGLK1000和 乙型肝炎表面抗体定 量(抗HBs)测定 CGLL1000	麻醉恢复室监护	HAP28901		

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	麻醉深度电生理监测	HAP05902		
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	麻醉			
风湿活动筛查	红细胞沉降率(ESR)测定CAAJ1000和抗链球菌溶血素O(ASO)测定CGPB1000和类风湿因子(RF)测定CGFG1000和超敏C反应蛋白(hs-CRP)测定CEAU1000	椎管内麻醉	单次腰麻HAC42101或连续腰麻HAC42102或腰麻复合连续硬膜外阻滞麻醉HAC42103或骶管单次阻滞麻醉HAC42104或颈部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42105或颈部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42106或胸部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42107或胸部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42108或腰部硬膜外单次阻滞麻醉HAC42109或腰部硬膜外连续阻滞麻醉HAC42110或骶管连续阻滞麻醉HAC42111或椎管内置管术HAC62101		
C-反应蛋白(CRP)测定	CGCA1000	/全身麻醉	HAA42901		
治疗		手术			
一般灌肠	ABGE0001	全髋人工关节置换术	HXD66301		
药物		病理			
抗菌药物					
		药物			
		抗菌药物			

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
		镇痛药物			
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
双下肢血管彩色超声	下肢动脉彩色多普勒超声检查EDCL5001 或下肢深静脉彩色多普勒超声检查EDCM1001 或下肢浅静脉彩色多普勒超声检查EDCM4001			双下肢血管彩色超声	下肢动脉彩色多普勒超声检查EDCL5001 或下肢深静脉彩色多普勒超声检查EDCM1001 或下肢浅静脉彩色多普勒超声检查EDCM4001
普通二维超声心动图	EDFKA005	治疗		尿常规化学分析	CCAA2000
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401 或用力肺活量功能检查FJE01402 或肺每分通气量功能检查FJE01403 或最大通气量功能检查FJE01404	外周动脉穿刺置管术	HL962202	治疗	
弥散功能检查	肺弥散功能检查—一口气法FJE01405 或肺弥散功能检查—重复呼吸法FJE01406	经外周静脉置入中心静脉导管术	ABDA0001	加压快速输血	ABCE0001
气道阻力测定	FJB02401	静脉输血	ABCD0001	药物	
髋部X线计算机体层(CT)平扫	EBAXB002	加压快速输血	ABCE0001	其他药物（消肿等）	
治疗		氧气吸入	ABJA0001		
		监测			

术前	CCHI	术中	CCHI	术后	CCHI
药物		心电监护	院内遥测心电监护 KKA28701 或无创心电监测 FKA05705		
		药物			
		胃粘膜保护剂			
		止吐药物			
		镇痛药物			

十七、皮肤、皮下组织、乳腺疾病和烧伤

病种编码	主要诊断	主要操作/主要治疗方式
QM007	乳腺癌	术前新辅助治疗
QM008	乳腺癌	术后辅助治疗
QM009	乳腺癌	姑息治疗
QM010	带状疱疹（不伴有并发症）	
QM011	皮炎/多发性肌炎	
QM012	寻常型天疱疮	
QM013	重症多形红斑/中毒性表皮坏死松解型药疹	
QS001	急性乳腺炎	乳房浅表脓肿切开引流术
QS002	急性乳腺炎	乳房深部脓肿切开引流术
QS003	乳腺良性肿瘤	乳腺肿物切除术
QS004	乳腺癌	乳腺肿物切除术
QS005	乳腺癌	乳腺癌根治术(Halsted)
QS006	乳腺癌	乳腺癌改良根治术

乳腺癌

术前新辅助治疗

适用对象：	病种编码：	QM007	
	主要诊断：	乳腺癌	ICD - 10码：Z51.101+C50.0-C50.6, Z51.101+C50.8, Z51.101+C50.9
	主要操作/主要治疗方式：	术前新辅助治疗	CCHI码：
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：Z51.101+C50.0-C50.6, Z51.101+C50.8, Z51.101+C50.9乳腺癌疾病编码。 2. 符合化疗适应症，无化疗禁忌症。若接受化疗患者受益可能大于风险，可行术后辅助化疗。 3. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 病人一般情况良好，体温正常，完成复查项目。 2. 没有需要住院处理的并发症。		
最短住院日参考值：	10-15天		
变异条件：	1. 治疗全程有感染、贫血、出血及其他合并症者，需进行相关的诊断和治疗，可能延长住院时间并致费用增加。 2. 化疗后出现骨髓抑制，需要对症处理，导致治疗时间延长、费用增加。 3. 根据患者HER2表达情况，可选用针对HER2受体的靶向治疗药物（目前主要药物是曲妥珠单抗克隆抗体）联合化疗方案，导致治疗费用增加。 4. 70岁以上的乳腺癌患者根据个体化情况具体实施。 5. 医师认可的变异原因分析。 6. 其他患者方面的原因等。		
再入院间隔时间：			

检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		护理		药物	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	抗菌药物	
检查					
血常规	全血细胞计数+3分群检测 CAAA1000或全血细胞计数 +5分类检测CAAB1000				
尿常规化学分析	CCAA2000				

检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
粪便常规检查	CCCA3000				
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000				
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000				
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO ₂)测定CEJD1000和总钙(Ca)测定CEJF8000				
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000和活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000和血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000和血浆纤维蛋白原测定CAGD1000和纤维蛋白(原)降解产物(FDP)测定CAJX1000和凝血酶原活动度(PA)和凝血酶原比值(R)和凝血酶原INR值(INR)和血浆D-二聚体(D-Dimer)测定CAJY1000				
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000				
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001				

检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查 FKA03703				
普通病理会诊	疑难病理读片会诊 AADC0001或同步远程病理会诊AADD0001或非同步远程病理会诊AADD0002				
乳腺X线摄影	EABYA001				
乳腺B超检查	EDBYA001				
乳腺磁共振成像	ECAYA001				
上腹部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBQT001				
下腹部X线计算机体层(CT)增强扫描	EBBQT002				
上腹部磁共振成像	ECAQT001				
下腹部磁共振成像	ECAQT002				
上腹部磁共振增强成像	ECBQT001				
下腹部磁共振增强成像	ECBQT002				
头颅MRI或CT	颅脑磁共振成像ECABA001 或头部X线计算机体层(CT)平扫EBABP001				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		治疗		药物	

检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
全身骨显像	EEAX6004				
普通二维超声心动图	EDFKA005				
血或尿妊娠试验	人绒毛膜促性腺激素 (HCG) 兴奋试验FDA04207或人绒毛膜促性腺激素 (HCG) 测定CERR8000				
心肌酶	肌酸激酶-MB同工酶活性 (CK-MB) 测定CECT1000、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定CECB1000、乳酸脱氢酶同工酶测定CECX1000、肌酸激酶-MB同工酶活性 (CK-MB) 测定CECT1000、 α 羟基丁酸脱氢酶 (α -HBD) 测定CECY1000				
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702或三通道动态心电图检查FKA03704或十二通道动态心电图检查FKA03705				
肺功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404				
肿瘤标志物检查	癌胚抗原 (CEA) 测定CGRA1000和甲胎蛋白 (AFP) 测定CGRB8000和糖类抗原CA-125测定CGRP1000和糖类抗原CA-153测定CGRR1000和糖类抗原CA-199测定CGRS1000和神经元特异性烯醇化酶 (NSE) 测定CGRH1000和肿瘤坏死因子 α (TNF- α) 测定CGRY1000和糖类抗原CA-724测定CGRV1000				

检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
胸部影像学检查	胸部X线摄影EABJT001或胸部X线计算机体层(CT)平扫EBAJT001或胸部X线计算机体层(CT)增强扫描EBBJT001				

乳腺癌

术后辅助治疗

适用对象：	病种编码：	QM008	
	主要诊断：	乳腺癌	ICD - 10码：Z51.102+C50.0-C50.6, Z51.102+C50.8, Z51.102+C50.9
	主要操作/主要治疗方式：	术后辅助治疗	CCHI码：
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：Z51.102+C50.0-C50.6, Z51.102+C50.8, Z51.102+C50.9乳腺癌疾病编码。 2. 符合化疗适应症，无化疗禁忌症。若接受化疗患者受益可能大于风险，可行术后辅助化疗。 3. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 病人一般情况良好，体温正常，完成复查项目。 2. 没有需要住院处理的并发症。		
最短住院日参考值：	10-15天		
变异条件：	1. 治疗全程有感染、贫血、出血及其他合并症者，需进行相关的诊断和治疗，可能延长住院时间并致费用增加。 2. 化疗后出现骨髓抑制，需要对症处理，导致治疗时间延长、费用增加。 3. 根据患者HER2表达情况，可选用针对HER2受体的靶向治疗药物（目前主要药物是曲妥珠单克隆抗体）联合化疗方案，导致治疗费用增加。 4. 70岁以上的乳腺癌患者根据个体化情况具体实施。 5. 医师认可的变异原因分析。 6. 其他患者方面的原因等。		
再入院间隔时间：			

检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		护理		药物	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	抗菌药物	
检查					
血常规	全血细胞计数+3分群检测 CAAA1000或全血细胞计数 +5分类检测CAAB1000				
尿常规化学分析	CCAA2000				

检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
粪便常规检查	CCCA3000				
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定 CECA1000和天门冬氨酸 氨基转移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素(T- Bil)测定CELA1000和直接 胆红素(D-Bil)测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转 移酶(GGT)测定CECC8000和 总蛋白(TP)测定CEAA8000 和白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP)测定CECD8000				
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000 和肌酐(Cr)测定CEEB8000 和尿酸(UA)测定CEEE8000				
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠 (Na)测定CEJB8000和氯 (Cl)测定CEJC8000和总 二氧化碳(TCO ₂)测定 CEJD1000和总钙(Ca)测 定CEJF8000				
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000和活化部分凝血 活酶时间(APTT)测定 CAGB1000和血浆凝血酶原 时间(PT)测定CAGC1000和 血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000和纤维蛋白(原) 降解产物(FDP)测定 CAJX1000和凝血酶原活动 度(PA)和凝血酶原比值 (R)和凝血酶原INR值 (INR)和血浆D-二聚体 (D-Dimer)测定CAJY1000				
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000				

检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查 FKA03703				
普通病理会诊	疑难病理读片会诊 AADC0001或同步远程病理会诊AADD0001或非同步远程病理会诊AADD0002				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		治疗		药物	
全身骨显像	EEAX6004				
普通二维超声心动图	EDFKA005				
血或尿妊娠试验	人绒毛膜促性腺激素(HCG)兴奋试验FDA04207或人绒毛膜促性腺激素(HCG)测定 CERR8000				
心肌酶	肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定CECT1000、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000、乳酸脱氢酶同工酶测定CECX1000、肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定CECT1000、 α 羟基丁酸脱氢酶(α -HBD)测定CECY1000				

检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
动态心电图检查	24小时心率变异性分析 FKA05702或三通道动态心电图检查FKA03704或十二通道动态心电图检查FKA03705				
肺功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404				
肿瘤标志物检查	癌胚抗原(CEA)测定 CGRA1000和甲胎蛋白(AFP)测定CGRB8000和糖类抗原CA-125测定CGRP1000和糖类抗原CA-153测定 CGRR1000和糖类抗原CA-199测定CGRS1000和神经元特异性烯醇化酶(NSE)测定 CGRH1000和肿瘤坏死因子 α (TNF- α) 测定CGRY1000和糖类抗原CA-724测定 CGRV1000				
胸部影像学检查	胸部X线摄影EABJT001或胸部X线计算机体层(CT)平扫EBAJT001或胸部X线计算机体层(CT)增强扫描EBBJT001				
腹部磁共振检查	上腹部磁共振增强成像ECBQT001和下腹部磁共振增强成像ECBQT002和盆腔磁共振增强成像ECBQU001				
食管X线造影	EACPC001				
全消化道造影	EACPA002				

乳腺癌

姑息治疗

适用对象：	病种编码：	QM009
	主要诊断：	乳腺癌 ICD - 10码：Z51.104+C50
	主要操作/主要治疗方式：	姑息治疗 CCHI码：
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：Z51.104+C50乳腺癌疾病编码。 2. 符合化疗适应症，无化疗禁忌症。若接受化疗患者受益可能大于风险，可行术后辅助化疗。 3. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。	
出院标准：	1. 病人一般情况良好，体温正常，完成复查项目。 2. 没有需要住院处理的并发症。	
	最短住院日参考值：	10-15天
变异条件：	1. 治疗全程有感染、贫血、出血及其他合并症者，需进行相关的诊断和治疗，可能延长住院时间并致费用增加。 2. 化疗后出现骨髓抑制，需要对症处理，导致治疗时间延长、费用增加。 3. 根据患者HER2表达情况，可选用针对HER2受体的靶向治疗药物(目前主要药物是曲妥珠单抗克隆抗体)联合化疗方案，导致治疗费用增加。 4. 70岁以上的乳腺癌患者根据个体化情况具体实施。 5. 医师认可的变异原因分析。 6. 其他患者方面的原因等。	

再入院间隔时间：

检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		护理		药物	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	抗菌药物	
检查					
血常规	全血细胞计数+3分群检测 CAAA1000或全血细胞计数 +5分类检测CAAB1000				
尿常规化学分析	CCAA2000				
粪便常规检查	CCCA3000				

检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和 γ -谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000				
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000				
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和总钙(Ca)测定CEJF8000				
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000和活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000和血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000和血浆纤维蛋白原测定CAGD1000和纤维蛋白(原)降解产物(FDP)测定CAJX1000和凝血酶原活动度(PA)和凝血酶原比值(R)和凝血酶原INR值(INR)和血浆D-二聚体(D-Dimer)测定CAJY1000				
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000				
胸部X线计算机体层(CT)平扫	EBAJT001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703				

检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
普通病理会诊	疑难病理读片会诊 AADC0001或同步远程病理 会诊AADD0001或非同步远 程病理会诊AADD0002				
乳腺X线摄影	EABYA001				
乳腺B超检查	EDBYA001				
乳腺磁共振成像	ECAYA001				
上腹部X线计算机 体层(CT)增强扫 描	EBBQT001				
下腹部X线计算机 体层(CT)增强扫 描	EBBQT002				
上腹部磁共振成像	ECAQT001				
下腹部磁共振成像	ECAQT002				
上腹部磁共振增强 成像	ECBQT001				
下腹部磁共振增强 成像	ECBQT002				
头颅MRI或CT	颅脑磁共振成像ECABA001 或头部X线计算机体层(CT) 平扫EBABP001				
全身骨显像	EEAX6004				
病理					
活检组织病理诊断	BCAB0001				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		治疗		药物	

检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
普通二维超声心动图	EDFKA005				
血或尿妊娠试验	人绒毛膜促性腺激素 (HCG) 兴奋试验FDA04207或人绒毛膜促性腺激素 (HCG) 测定CERR8000				
心肌酶	肌酸激酶-MB同工酶活性 (CK-MB) 测定CECT1000、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 测定CECB1000、乳酸脱氢酶同工酶测定CECX1000、肌酸激酶-MB同工酶活性 (CK-MB) 测定CECT1000、 α 羟基丁酸脱氢酶 (α -HBD) 测定CECY1000				
动态心电图检查	24小时心率变异性分析FKA05702或三通道动态心电图检查FKA03704或十二通道动态心电图检查FKA03705				
肺功能检查	肺活量功能检查FJE01401或用力肺活量功能检查FJE01402或肺每分通气量功能检查FJE01403或最大通气量功能检查FJE01404				
肿瘤标志物检查	癌胚抗原 (CEA) 测定CGRA1000和甲胎蛋白 (AFP) 测定CGRB8000和糖类抗原CA-125测定CGRP1000和糖类抗原CA-153测定CGRR1000和糖类抗原CA-199测定CGRS1000和神经元特异性烯醇化酶 (NSE) 测定CGRH1000和肿瘤坏死因子 α (TNF- α) 测定CGRY1000和糖类抗原CA-724测定CGRV1000				

检验	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
胸部影像学检查	胸部X线摄影EABJT001或胸部X线计算机体层(CT)平扫EBAJT001或胸部X线计算机体层(CT)增强扫描EBBJT001				

带状疱疹（不伴有并发症）

适用对象：

病种编码：

QM010

主要诊断：

带状疱疹（不伴有并发症）

ICD-10码：
B02.900

主要操作/主要治疗方式：

CCHI码：

入院标准：

1. 第一诊断必须符合ICD-10：B02.900带状疱疹（不伴有并发症）疾病编码。
2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。

出院标准：

1. 皮疹痊愈：无水疱、皮疹或创面已结痂。
2. 没有需要住院处理的并发症。

最短住院日参考值：

7天

变异条件：

1. 神经痛剧烈、常规治疗无效者，需请神经内科或镇痛科会诊协助治疗。
2. 伴有其他基础疾病或并发症，需进一步诊断及治疗或转至其他相应科室诊治，延长住院时间，增加住院费用。

再入院间隔时间：

14天

（本病一般不再发）

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		静脉输液	ABCA0001	抗病毒药物	
I 级护理	ACAC0001	换药	换药 (小)ABFA0001或换药 (中)ABFA0002或换药 (大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004	止痛药物	
/ II 级护理	ACAB0001	热湿敷法	ABZC0001	神经营养药物	
/III级护理	ACAA0001	冷湿敷法	ABZB0001	皮肤科用药	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
检查		红外线局部照射治疗	LEAYR001	抗菌药物	
血常规	全血细胞计数+3分群检测 CAAA1000或全血细胞计数 +5分类检测CAAB1000	可见光照射治疗	LEAYR007	外用止痛剂	
尿常规化学分析	CCAA2000	窄谱UVB紫外线治疗	KYR32703		
粪便常规检查	CCCA3000	宽波UVB紫外线治疗	KYR32704		
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000 或肌酐(Cr)测定CEEB8000 或尿酸(UA)测定CEEE8000	氦氛(He-Ne)激光照射治疗	KYR72701		
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000				
血脂四项	甘油三酯(TG)测定 CEHB1000 和总胆固醇(TC) 测定CEHA1000 和高密度脂 蛋白胆固醇(HDL-C)测定 CEHC1000 和低密度脂蛋白 胆固醇(LDL-C)测定 CEHD1000				
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠 (Na)测定CEJB8000和氯 (Cl)测定CEJC8000和总二 氧化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙(Ca)测定 CEJF8000				
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定 CECA1000和天门冬氨酸 氨基转移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素(T- Bil)测定CELA1000和直接 胆红素(D-Bil)测定 CELB1000和γ-谷氨酰基转 移酶(GGT)测定CECC8000和 总蛋白(TP)测定CEAA8000 和白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP)测定CECD8000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
免疫球蛋白测定	免疫球蛋白G (IgG) 定量测定CGAT1000或免疫球蛋白M (IgM) 定量测定CGAU1000或免疫球蛋白D (IgD) 定量测定CGAV1000或免疫球蛋白E (IgE) 定量测定CGAW1000或分泌型免疫球蛋白A测定CGAX1000或免疫球蛋白亚类定量测定CGBA1000或免疫球蛋白轻链测定CGBB8000或免疫球蛋白游离轻链测定CGBC8000或B细胞膜表面免疫球蛋白测定CGBH1000或脱敏免疫球蛋白IgG测定CGUU1000或脱敏免疫球蛋白IgG4测定CGUV1000				
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000				
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000				
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001				
胸部X线摄影	EABJT001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或常规心电图检查FKA03703				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		治疗		药物	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肿瘤标志物检查	癌胚抗原(CEA)测定 CGRA1000和甲胎蛋白(AFP) 测定CGRB8000和糖类抗原 CA-125测定CGRP1000和糖 类抗原CA-153测定 CGRR1000和糖类抗原CA- 199测定CGRS1000和神经元 特异性烯醇化酶(NSE)测定 CGRH1000和肿瘤坏死因子 α (TNF- α)测定CGRY1000 和糖类抗原CA-724测定 CGRV1000	颈椎2—5横突局部 封闭术	HVH48101	免疫球蛋白	
一般细菌培养	CJAN8000	颈椎第6横突局部 封闭术	HVH48102	糖皮质激素	
普通细菌药敏定性 试验	CJBX9000	椎体外侧钩椎关 节局部封闭术	HVH48103	免疫调节剂	
一般细菌培养+鉴 定	CJAP8000				
环钻皮肤活检术	FYR07701				
切除皮肤活检术	FYR07702				
胃肠排空试验-钡 餐透视法	EACPA001				
普通细菌药敏定量 试验	CJBY9000				
院内会诊	AADB0001				
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001				
腹部CT检查	上腹部X线计算机体层(CT) 平扫EBAQT001或下腹部X线 计算机体层(CT)平扫 EBAQT002				
腹部磁共振检查	上腹部磁共振增强成像 ECBQT001和下腹部磁共振 增强成像ECBQT002和盆腔 磁共振增强成像ECBQU001				
食管X线造影	EACPC001				
全消化道造影	EACPA002				

皮炎炎/多发性肌炎

适用对象:	病种编码:	QM011	
	主要诊断:	皮炎炎/多发性肌炎	ICD-10码: M33
	主要操作/主要治疗方式:	CCHI码:	
入院标准:	1. 第一诊断必须符合ICD-10: M33皮炎炎/多发性肌炎疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断,但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。		
出院标准:	1. 临床症状好转。 2. 血清肌酶恢复或接近正常。 3. 糖皮质激素可改为口服。 4. 没有需要住院处理的并发症。		
最短住院日参考值:	14天		
变异条件:	1. 伴有合并症如恶性肿瘤,或其他并发症,需进一步诊断及治疗或转至其他相应科室诊治。 2. 对常规治疗效果差,需延长住院时间。 3. 如发生呼吸衰竭,需行机械通气治疗,延长住院时间,增加住院费用。		

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		氧气吸入	ABJA0001	抗变态反应药	
I 级护理	ACAC0001	静脉输液	ABCA0001	抗麻风药	
/ II 级护理	ACAB0001	换药	换药 (小)ABFA0001或换药	外用激素	
/III级护理	ACAA0001			外用免疫抑制剂	
检查				护胃	
血常规	全血细胞计数+3分群检测 CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000			清脏腑热药物	
尿常规化学分析	CCAA2000			补钾	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
粪便常规检查	CCCA3000				
隐血试验	CCCB8000				
肌酸激酶(CK)测定	CECS1000				
肌酐(Cr)测定	CEEB8000				
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000 或肌酐(Cr)测定CEEB8000 或尿酸(UA)测定CEEE8000				
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000				
血脂四项	甘油三酯(TG)测定 CEHB1000 和总胆固醇(TC) 测定CEHA1000 和高密度脂 蛋白胆固醇(HDL-C)测定 CEHC1000 和低密度脂蛋白 胆固醇(LDL-C)测定 CEHD1000				
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001				
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠 (Na)测定CEJB8000和氯 (Cl)测定CEJC8000和总二 氧化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙(Ca)测定 CEJF8000				
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定 CECA1000和天门冬氨酸 氨基转移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素(T- Bil)测定CELA1000和直接 胆红素(D-Bil)测定 CELB1000和γ-谷氨酰基转 移酶(GGT)测定CECC8000和 总蛋白(TP)测定CEAA8000 和白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP)测定CECD8000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
免疫球蛋白测定	免疫球蛋白G(IgG)定量测定CGAT1000或免疫球蛋白M(IgM)定量测定CGAU1000或免疫球蛋白D(IgD)定量测定CGAV1000或免疫球蛋白E(IgE)定量测定CGAW1000或分泌型免疫球蛋白A测定CGAX1000或免疫球蛋白亚类定量测定CGBA1000或免疫球蛋白轻链测定CGBB8000或免疫球蛋白游离轻链测定CGBC8000或B细胞膜表面免疫球蛋白测定CGBH1000或脱敏免疫球蛋白IgG测定CGUU1000或脱敏免疫球蛋白IgG4测定CGUV1000				
抗核抗体(ANA)测定	CGDB1000				
ENA抗体谱六项测定	CGDC1000				
抗双链DNA(抗dsDNA)测定	CGDT1000				
类风湿因子(RF)测定	CGFG1000				
抗补体抗体测定	CGFD1000				
红细胞沉降率(ESR)测定	CAAJ1000				
抗链球菌溶血素O(ASO)测定	CGPB1000				
肿瘤标志物检查	癌胚抗原(CEA)测定CGRA1000和甲胎蛋白(AFP)测定CGRB8000和糖类抗原CA-125测定CGRP1000和糖类抗原CA-153测定CGRR1000和糖类抗原CA-199测定CGRS1000和神经元特异性烯醇化酶(NSE)测定CGRH1000和肿瘤坏死因子 α (TNF- α)测定CGRY1000和糖类抗原CA-724测定CGRV1000				
胸部X线摄影	EABJT001				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
同心圆针极肌电图检查	FCA03702				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或常规心电图检查FKA03703				
环钻皮肤活检术	FYR07701				
切除皮肤活检术	FYR07702				
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000				
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000				
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000				
血清肌酶谱	肌酸激酶(CK)测定 CECS1000或肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定 CECT1000或肌酸激酶-MB同工酶质量(CK-MBmass)测定 CECU1000或肌酸激酶同工酶测定CECV1000或乳酸脱氢酶(LD)测定CECW1000或乳酸脱氢酶同工酶测定 CECX1000或 α 羟基丁酸脱氢酶(α -HBD)测定 CECY1000				
痰液常规检查	CCEK5000				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		治疗		药物	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
上消化道X线造影	EACPB001	无创呼吸机辅助通气	KJA21401	免疫球蛋白	
梅毒螺旋体抗体 (Anti-TP)测定	BDQQ101-106	有创呼吸机辅助通	KJA21402		
肺通气功能检查	FJC01201-05	监测		降糖药物	
血气分析	CEJM1000			降压药物	
肌肉活检术	FX807301			抗菌药物	
普通二维超声心动 图	EDFKA005			糖皮质激素	
肺高分辨率CT	肺小结节CT三维成像 EBCJE001或肺动脉CT三维 成像EBCLA001或肺静脉CT 三维成像EBCMA001			免疫抑制剂	
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001			免疫球蛋白	
腹部CT检查	上腹部X线计算机体层(CT) 平扫EBAQT001或下腹部X线 计算机体层(CT)平扫 EBAQT002			骨质疏松治理 (钙剂)	
腹部磁共振检查	上腹部磁共振增强成像 ECBQT001和下腹部磁共振 增强成像ECBQT002和盆腔 磁共振增强成像ECBQU001				
胃肠排空试验-钡 餐透视法	EACPA001				
全消化道造影	EACPA002				
普通细菌药敏定性 试验	CJBX9000				
普通细菌药敏定量 试验	CJBY9000				
一般细菌培养	CJAN8000				
肺功能检查	肺活量功能检查FJE01401 或用力肺活量功能检查 FJE01402或肺每分通气量 功能检查FJE01403或最大 通气量功能检查FJE01404				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
骨密度测定	EEAX6002				
肌电图监测	FCA03710				

寻常型天疱疮

适用对象：	病种编码：	QM012			
	主要诊断：	寻常型天疱疮	ICD-10码：	L10.000	
	主要操作/主要治疗方式：		CCHI码：		
入院标准	1. 第一诊断必须符合ICD-10：L10.000寻常型天疱疮疾病编码。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。				
出院标准	1. 皮疹控制：无新发水疱、糜烂面好转无感染。 2. 糖皮质激素可改为口服。 3. 没有需要住院处理的并发症。				
最短住院日参考值：	21天				
变异条件	1. 对常规治疗效果差，需适当延长住院时间。 2. 继发严重感染者（如败血症等）。 3. 出现应用糖皮质激素、免疫抑制剂引起的并发症，需要进行相关的治疗。 4. 伴恶性肿瘤，转至其他相应科室诊治。				
再入院间隔时间：	14天				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		单重血浆置换	KNC66201	糖皮质激素	
I 级护理	ACAC0001	双膜血浆置换	KNC66202	免疫抑制剂	
/ II 级护理	ACAB0001	静脉输液	ABCA0001	免疫球蛋白	
/III级护理	ACAA0001	换药	换药 (小)ABFA0001或换药 (中)ABFA0002或换药 (大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004	抗菌药物溶液和/或软膏	
检查		红外线局部照射治疗	LEAYR001	抑酸药物	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
血常规	全血细胞计数+3分群检测 CAAA1000或全血细胞计数 +5分类检测CAAB1000	可见光照射治疗	LEAYR007	清脏腑热药 物	
尿常规化学分析	CCAA2000	宽波UVB紫外线治 疗	KYR32704	外用激素	
粪便常规检查	CCCA3000	氦氖(He-Ne)激光 照射治疗	KYR72701	补钾	
隐血试验	CCCB8000	药物浸浴治疗	LEFZY001		
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000 或肌酐(Cr)测定CEEB8000 或尿酸(UA)测定CEEE8000				
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000				
血脂四项	甘油三酯(TG)测定 CEHB1000 和总胆固醇(TC) 测定CEHA1000 和高密度脂 蛋白胆固醇(HDL-C)测定 CEHC1000 和低密度脂蛋白 胆固醇(LDL-C)测定 CEHD1000				
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠 (Na)测定CEJB8000和氯 (Cl)测定CEJC8000和总二 氧化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙(Ca)测定 CEJF8000				
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测 定CECA1000和天门冬氨酸 氨基转移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素(T- Bil)测定CELA1000和直接 胆红素(D-Bil)测定 CELB1000和γ-谷氨酰基转 移酶(GGT)测定CECC8000和 总蛋白(TP)测定CEAA8000 和白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP)测定CECD8000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
免疫球蛋白测定	免疫球蛋白G (IgG) 定量测定CGAT1000或免疫球蛋白M (IgM) 定量测定CGAU1000或免疫球蛋白D (IgD) 定量测定CGAV1000或免疫球蛋白E (IgE) 定量测定CGAW1000或分泌型免疫球蛋白A测定CGAX1000或免疫球蛋白亚类定量测定CGBA1000或免疫球蛋白轻链测定CGBB8000或免疫球蛋白游离轻链测定CGBC8000或B细胞膜表面免疫球蛋白测定CGBH1000或脱敏免疫球蛋白IgG测定CGUU1000或脱敏免疫球蛋白IgG4测定CGUV1000				
乙型肝炎表面抗原(抗HBs) 测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg) 测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg) 测定CGLH1000				
丙型肝炎抗体(抗HCV) 测定	CGMA1000				
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV) 测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体(抗TP) 测定	CGPP1000				
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001				
环钻皮肤活检术	FYR07701				
切除皮肤活检术	FYR07702				
免疫荧光染色诊断	BEBB0001				
天疱疮抗体测定	CGMZ1000				
胸部X线摄影	EABJT001				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或常规心电图检查FKA03703				
一般细菌培养+鉴定	CJAP8000				
普通细菌药敏定性试验	CJBX9000				
普通细菌药敏定量试验	CJBY9000				
一般细菌培养	CJAN8000				
病理					
手术标本病理诊断	BCAD0001				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		治疗		药物	
肿瘤标志物检查	癌胚抗原 (CEA) 测定 CGRA1000和甲胎蛋白 (AFP) 测定 CGRB8000和糖类抗原CA-125测定 CGRP1000和糖类抗原CA-153测定 CGRR1000和糖类抗原CA-199测定 CGRS1000和神经元特异性烯醇化酶 (NSE) 测定 CGRH1000和肿瘤坏死因子 α (TNF- α) 测定 CGRY1000和糖类抗原CA-724测定 CGRV1000	单重血浆置换	KNC66201	糖皮质激素的辅助用药	
痰液常规检查	CCEK5000	双膜血浆置换	KNC66202	抗菌药物	
真菌培养+鉴定	CJHL8000			白蛋白	
治疗药物浓度测定	CENA1000			生物制剂	
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001			骨质疏松治理(钙剂)	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
腹部CT检查	上腹部X线计算机体层(CT)平扫EBAQT001或下腹部X线计算机体层(CT)平扫EBAQT002				
腹部磁共振检查	上腹部磁共振增强成像ECBQT001和下腹部磁共振增强成像ECBQT002和盆腔磁共振增强成像ECBQU001				
全消化道造影	EACPA002				

重症多形红斑/中毒性表皮坏死松解型药疹

适用对象：	病种编码：	QM013	
	主要诊断：	重症多形红斑/中毒性表皮坏死松解型药疹	ICD-10码：L51
	主要操作/主要治疗方式：	CCHI码：	
	入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：L51重症多形红斑/中毒性表皮坏死松解型药疹。 2. 当患者同时具有其他疾病诊断，但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。	
	出院标准：	1. 皮疹基本痊愈，创面愈合无感染。 2. 糖皮质激素可改为口服。 3. 没有需要住院处理的并发症。	
	最短住院日参考值：	14天	
	变异条件：	1. 继发严重感染者（如败血症），需反复多次行病原学检测及药敏试验，致住院时间延长。 2. 伴有肝、肾、心、脑、胃肠道、血液系统等多器官严重损害，需进行相应的治疗。 3. 由于应用糖皮质激素引起的并发症，如高血糖、电解质紊乱、消化道出血、继发感染、二重感染等，需要进行相关的治疗。 4. 由于患者处于高敏状态，可能发生的药物再次致敏会导致病情的反复和住院天数的延长。	
	再入院间隔时间：	14天	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
基本项目					
护理		静脉输液	ABCA0001	免疫球蛋白	
I 级护理	ACAC0001	换药	换药 (小)ABFA0001或换药 (中)ABFA0002或换药 (大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004	免疫抑制剂	
/ II 级护理	ACAB0001	热湿敷法	ABZC0001	糖皮质激素	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
/III级护理	ACAA0001	冷湿敷法	ABZB0001	胃粘膜药物	
口腔护理	ACBH0001	红外线局部照射治疗	LEAYR001	营养支持	
检查		可见光照射治疗	LEAYR007	水电平衡	
血常规	全血细胞计数+3分群检测 CAAA1000或全血细胞计数 +5分类检测CAAB1000	窄谱UVB紫外线治疗	KYR32703		
尿常规化学分析	CCAA2000	宽波UVB紫外线治疗	KYR32704		
粪便常规检查	CCCA3000	环钻皮肤活检术	FYR07701		
隐血试验	CCCB8000	切除皮肤活检术	FYR07702		
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000 或肌酐(Cr)测定CEEB8000 或尿酸(UA)测定CEEE8000				
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000				
血脂四项	甘油三酯(TG)测定 CEHB1000 和总胆固醇(TC) 测定CEHA1000 和高密度脂 蛋白胆固醇(HDL-C)测定 CEHC1000 和低密度脂蛋白 胆固醇(LDL-C)测定 CEHD1000				
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠 (Na)测定CEJB8000和氯 (Cl)测定CEJC8000和总二 氧化碳(TCO2)测定 CEJD1000和镁(Mg)测定 CEJE8000和总钙(Ca)测定 CEJF8000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 测定 CECA1000和天门冬氨酸 氨基转移酶 (AST) 测定 CECB1000和总胆红素 (T- Bi1) 测定CELA1000和直接 胆红素 (D-Bi1) 测定 CELB1000和 γ -谷氨酰基转 移酶 (GGT) 测定CECC8000和 总蛋白 (TP) 测定CEAA8000 和白蛋白 (A1b) 测定 CEAE8000和碱性磷酸酶 (ALP) 测定CECD8000				
红细胞沉降率 (ESR) 测定	CAAJ1000				
C-反应蛋白 (CRP) 测定	CGCA1000				
肝胆胰脾B超检查	EDBQT001				
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs) 测定	乙型肝炎表面抗原定性 (HBsAg) 测定CGLG1000或乙 型肝炎表面抗原定量 (HBsAg) 测定CGLH1000				
丙型肝炎抗体 (抗 HCV) 测定	CGMA1000				
人免疫缺陷病毒抗 体 (抗HIV) 测定	CGMF1000				
梅毒螺旋体抗体 (抗TP) 测定	CGPP1000				
胸部X线摄影	EABJT001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道常规心 电图检查FKA03702或常规 心电图检查FKA03703				
普通细菌药敏定性 试验	CJBX9000				
普通细菌药敏定量 试验	CJBY9000				
一般细菌培养	CJAN8000				

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000 或活化部分凝血活酶时间 (APTT)测定CAGB1000 或血浆凝血酶原时间(PT) 测定CAGC1000 或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000				
真菌培养+鉴定+药敏	CJHM8000				
一般细菌培养+鉴定	CJAP8000				
免疫球蛋白 E(IgE)定量测定	CGAW1000				
病理					
真菌直接涂片镜检	CJHG8000				
手术标本病理诊断	BCAD0001				
衣原体培养+鉴定	CJEA8000				
支原体培养+鉴定	CJFA8000				
病毒培养+鉴定	CJJA8000				
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		治疗		药物	
皮肤斑贴变应原试验	FYR04701	静脉输血	ABCD0001	免疫球蛋白	
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000			白蛋白	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000			抗菌药物	
				糖皮质激素的 辅助用药	

检查	CCHI码	治疗	CCHI码	药物	CCHI码
				抗真菌药物	
				止血药物	

急性乳腺炎

乳房浅表脓肿切开引流术

适用对象：病种编码：QS001

主要诊断：急性乳腺炎 ICD-10码：
N61. x05

主要操作/主要治疗方式：乳房浅表脓肿切开引流术 CCHI码：
HYA45301

入院标准：
1. 第一诊断必须符合ICD-10：N61. x05急性乳腺炎疾病编码。
2. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。

出院标准：
1. 体温正常3天，引流管通畅或已拔除。
2. 常规化验指标无明显异常。
3. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。

最短住院日参考值：≤11天

变异条件：
1. 有影响手术的其他疾病，需要进行相关的诊断和治疗，住院时间延长。
2. 出现新发脓肿，需要继续治疗，将延长住院时间，增加治疗费用。
3. 未形成脓肿患者，不进入本路径。
4. 特殊类型感染，重症感染，有感染中毒表现如休克。

再入院间隔时间：14天

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		/II级护理	ACAB0001	/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测 CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测 CAAB1000	麻醉		检查	
尿常规化学分析	CCAA2000	局部静脉内麻醉	HAB42201	乳腺彩色多普勒 超声检查	EDCYA001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
粪便常规检查	CCCA3000	/全身麻醉	HAA42901	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分凝血酶时间(APTT)测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或 血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000	手术		一般细菌培养+鉴定+药敏	CJAR8000
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型) CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型) CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型) CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型) CAME1000或RhD血型鉴定 CAMF1000	乳房浅表脓肿切开引流术	HYA45301	治疗	
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定 CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定 CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定 CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定 CECC8000和总蛋白(TP)测定 CEAA8000和白蛋白(A1b)测定 CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定 CECD8000	药物		换药	换药 (小) ABFA0001或换药 (中) ABFA0002或换药 (大) ABFA0003或换药(特大) ABFA0004
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000 或肌酐(Cr)测定CEEB8000 或尿酸(UA)测定CEEE8000	抗菌药物		氧气吸入	ABJA0001
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	麻醉常规用药		监测	
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	镇痛药物		院内遥测心电监护	KKA28701

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000			药物	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000			抗菌药物	
胸部X线摄影	EABJT001				
乳腺彩色多普勒超声检查	EDCYA001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查 FKA03703				
治疗					
静脉采血	ABBB0001				
药物					
基础用药					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401和用力肺活量功能检查FJE01402和肺每分通气量功能检查FJE01403和最大通气量功能检查FJE01404和肺弥散功能检查-一口气法FJE01405和流速容量曲线(V-V曲线)测定FJE02401和残气容积测定-体描箱法FJE02402	冠状动脉CT三维成像	EBCKU002		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
普通二维超声心动图	EDFKA005	冠脉光学相干断层扫描(OCT)检查	FKU01202		
治疗		心电图平板负荷试验	FKA04702		
		高压氧舱内常规治疗	KJA21901		
药物		血气分析	CEJM1000		
		监测			
		治疗			
		院内遥测心电监护	KKA28701	治疗	
		全胃肠外营养深静脉输注	ABCF0001		
		外周静脉营养输注	ABCG0001		
		静脉输血	ABCD0001	药物	
		药物			

急性乳腺炎

乳房深部脓肿切开引流术

适用对象：	病种编码：	QS002	
	主要诊断：	急性乳腺炎	ICD-10码： N61.x05
	主要操作/主要治疗方式：	乳房深部脓肿切开引流术	CCHI码： HYA45302
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：N61.x05急性乳腺炎疾病编码。 2. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 体温正常3天，引流管通畅或已拔除。 2. 常规化验指标无明显异常。 3. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。		
最短住院日参考值：	≤11天		
变异条件：	1. 有影响手术的其他疾病，需要进行相关的诊断和治疗，住院时间延长。 2. 出现新发脓肿，需要继续治疗，将延长住院时间，增加治疗费用。 3. 未形成脓肿患者，不进入本路径。 4. 特殊类型感染，重症感染，有感染中毒表现如休克		
再入院间隔时间：	14天		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	I级护理	ACAC0001
检查		/II级护理	ACAB0001	/II级护理	ACAB0001
血常规	全血细胞计数+3分群检测 CAAA1000 或全血细胞计数+5分类检测 CAAB1000	麻醉		检查	

尿常规化学分析	CCAA2000	局部静脉内麻醉	HAB42201	乳腺彩色多普勒超声检查	EDCYA001
粪便常规检查	CCCA3000	/全身麻醉	HAA42901	血常规	全血细胞计数+3分群检测CAAA1000或全血细胞计数+5分类检测CAAB1000
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分凝血酶时间(APTT)测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或 血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000	手术		治疗	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	乳房深部脓肿切开引流术	HYA45302	换药	换药 (小)ABFA0001或换药 (中)ABFA0002或换药 (大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	药物		氧气吸入	ABJA0001
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000或肌酐(Cr)测定CEEB8000或尿酸(UA)测定CEEE8000	抗菌药物		一般细菌培养+鉴定+药敏	CJAR8000
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	镇痛药物		监测	

丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000			院内遥测心电监	KKA28701
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000			药物	
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000			抗菌药物	
胸部X线摄影	EABJT001				
乳腺彩色多普勒超声检查	EDCYA001				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道常规心电图检查 FKA03702或十二通道常规心电图检查 FKA03703				
治疗					
静脉采血	ABBB0001				
药物					
基础用药					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	

肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401和用力肺活量功能检查FJE01402和肺每分通气量功能检查FJE01403和最大通气量功能检查FJE01404和肺弥散功能检查--一口气法FJE01405和流速容量曲线(V-V曲线)测定FJE02401和残气容积测定-体描箱法FJE02402	冠状动脉CT三维成像	EBCKU002		
普通二维超声心动图	EDFKA005	冠脉光学相干断层扫描(OCT)检查	FKU01202		
治疗		心电图平板负荷试验	FKA04702		
		高压氧舱内常规治疗	KJA21901		
		血气分析	CEJM1000		
药物		监测			
		治疗			
		院内遥测心电监护	KKA28701	治疗	
		全胃肠外营养深静脉输注	ABCF0001		
		外周静脉营养输注	ABCG0001		
		静脉输血	ABCD0001	药物	
		药物			

乳腺良性肿瘤

乳腺肿物切除术

适用对象：	病种编码：	QS003	
	主要诊断：	乳腺良性肿瘤	ICD-10码：D24
	主要操作/主要治疗方式：	乳腺肿物切除术	CCHI码：HYA73307
入院标准：	1. 第一诊断必须符合ICD-10：D24 乳腺良性肿瘤疾病编码。 2. 当患者合并其他疾病，但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时，可以进入路径。		
出院标准：	1. 伤口愈合好：无积血，无感染征象。 2. 没有需要住院处理的并发症和/或合并症。		
最短住院日参考值：	3-5天		
变异条件：	1. 有影响手术的合并症，需要进行相关的诊断和治疗。 2. 病理报告为恶性病变，需要按照乳腺癌进入相应路径治疗。		
再入院间隔时间：			

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
II级护理	ACAB0001	I级护理	ACAC0001	III级护理	ACAA0001
III级护理	ACAA0001				
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测 CAAA1000或全血细胞计数 +5分类检测CAAB1000			血常规	全血细胞计 数+3分群检 测CAAA1000 或全血细胞 计数+5分类 检测 CAAB1000

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		治疗	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	监测		换药	换药 (小)ABFA0001或换药 (中)ABFA0002或换药 (大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	心电监测远程传输	FKA05704	药物	
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000	麻醉			
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	局部静脉内麻醉	HAB42201	病理	
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和总钙(Ca)测定CEJF8000	/全身麻醉	HAA42901		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
乙型肝炎五项检查	乙型肝炎表面抗原定性 (HBsAg)测定CGLG1000和乙 型肝炎表面抗原定量 (HBsAg)测定CGLH1000和乙 肝病毒表面抗原确认试验 (HBsAgConfirm)测定 CGLJ1000和乙型肝炎表面 抗体定性(抗HBs)测定 CGLK1000和乙型肝炎表面 抗体定量(抗HBs)测定 CGLL1000	胸部硬膜外连续阻 滞麻醉	HAC42108		
丙型肝炎核心抗原 测定	CGLY1000	手术			
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	乳腺肿物切除术	HYA73307		
人免疫缺陷病毒抗 体(抗HIV)测定	CGMF1000	病理			
梅毒螺旋体抗体 (抗TP)测定	CGPP1000				
胸部X线摄影	EABJT001	药物			
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道常规心 电图检查FKA03702或十二 通道常规心电图检查 FKA03703				
乳腺彩色多普勒超 声检查	EDCYA001				
乳腺X线摄影	EABYA001				
治疗					
药物					
选择项目					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401 或用力肺活量功能检查 FJE01402或肺每分通气量 功能检查FJE01403或最大 通气量功能检查FJE01404				
钼靶检查	乳腺X线摄影EABYA001	病理			
		冷冻切片病理诊断	BCBA0001		
		/特异性感染标本 冷冻切片病理诊断	BCBB0001	治疗	
血气分析	CEJM1000	治疗		静脉输液	ABCA0001
普通二维超声心动 图	EDFKA005	静脉输血	ABCD0001	药物	
治疗		病理		止痛药物	
				止吐药物	
药物		药物		抗菌药物	

乳腺癌

乳腺肿物切除术

适用对象：病种编码：QS004

主要诊断：乳腺癌 ICD-10码：C50.0-C50.6, C50.8, C50.9

主要操作/主要治疗方式：乳腺肿物切除术 CCHI码：HYA73307

入院标准：
1. 第一诊断必须符合ICD10：C50.0-C50.6, C50.8, C50.9乳腺癌疾病编码；
2. 当患者合并其他疾病，但住院期间无需特殊处理也不影响第一诊断时，可以进入路径。

出院标准：
1. 切口愈合好：引流管拔除，切口无感染，无皮下积液（或门诊可处理的少量积液），无皮瓣坏死（或门诊可处理的皮缘坏死）；
2. 没有需要住院处理的并发症和 / 或合并症。

最短住院日参考值：6天

变异条件：
1. 有影响手术的合并症，需要进行相应的诊断和治疗；
2. 不能耐受改良根治术的患者，行局部扩大切除术；
3. 希望保乳的乳腺癌患者，不能行常规保乳手术，有条件者可进行“I”期再造手术；
4. 行保乳手术时，必须行钼靶或核磁检查以排除多病灶；
5. 术前有条件可行Core needle、麦默通等穿刺活检；
6. 患者其他方面的原因；
7. 本路径仅限手术方面，其他如新辅助化疗（术中化疗、术后辅助化疗）等均未纳入本路径范围。

再入院间隔时间：1周

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001	III级护理	ACAA0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测 CAAA1000或全血细胞计数 +5分类检测CAAB1000				
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	氧气吸入	ABJA0001	换药	换药 (小)ABFA0001或换药 (中)ABFA0002或换药 (大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
粪便常规检查	CCCA3000	院内遥测心电监护	KKA28701	药物	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定 CAGD1000	监测			
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEEA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000			病理	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	麻醉		免疫组织化学染色诊断	BEBA0001
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	局部静脉内麻醉	HAB42201		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
电解质测定	钾（K）测定CEJA8000和钠（Na）测定CEJB8000和氯（Cl）测定CEJC8000和总二氧化碳（TCO2）测定CEJD1000和总钙（Ca）测定CEJF8000	/全身麻醉	HAA42901		
血脂检查	甘油三酯(TG)测定CEHB1000和总胆固醇(TC)测定CEHA1000和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定CEHC1000和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定CEHD1000	手术			
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	乳腺肿物切除术	HYA73307		
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	病理			
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001		
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或 特异性感染标本冷冻切片病理诊断 BCBB0001		
胸部X线摄影	EABJT001	药物			
肿瘤标记物测定	癌胚抗原(CEA)测定CGRA1000和糖类抗原CA-153测定CGRR1000和雌激素类及抗雌激素药(E2)测定CERH1000和卵泡刺激素(FSH)测定CEQE8000				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703				
乳腺彩色多普勒超声检查	EDCYA001				
乳腺X线摄影	EABYA001				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
治疗					
药物					
抗菌药物					
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401 或用力肺活量功能检查 FJE01402或肺每分通气量 功能检查FJE01403或最大 通气量功能检查FJE01404				
气道阻力测定	FJB02401	治疗		治疗	
血气分析	CEJM1000			静脉输液	ABCA0001
普通二维超声心动图	EDFKA005	病理		药物	
乳管镜检查	FYA01501			止痛药物	
乳腺术前定位术	HYA43302	药物		止吐药物	
头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001				
乳腺磁共振成像	ECAYA001				
治疗					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
病理					
细针穿刺细胞学检查与诊断	BBAA0001				
穿刺组织活检病理诊断	BCAA0001				
药物					

乳腺癌

乳腺癌根治术(Halsted)

适用对象：病种编码：QS005

主要诊断：乳腺癌 ICD-10码：C50.0-C50.6, C50.8, C50.9

主要操作/主要治疗方式：乳腺癌根治术(Halsted) CCHI码：HYA77301

入院标准：
1. 第一诊断必须符合ICD10：C50.0-C50.6, C50.8, C50.9乳腺癌疾病编码；
2. 当患者合并其他疾病，但住院期间无需特殊处理也不影响第一诊断时，可以进入路径。

出院标准：
1. 切口愈合好：引流管拔除，切口无感染，无皮下积液（或门诊可处理的少量积液），无皮瓣坏死（或门诊可处理的皮缘坏死）；
2. 没有需要住院处理的并发症和 / 或合并症。

最短住院日参考值：6天

变异条件：
1. 有影响手术的合并症，需要进行相应的诊断和治疗；
2. 不能耐受改良根治术的患者，行局部扩大切除术；
3. 希望保乳的乳腺癌患者，不能行常规保乳手术，有条件者可“I”期再造手术；
4. 行保乳手术时，必须行钼靶或核磁检查以排除多病灶；
5. 术前有条件可行Core needle、麦默通等穿刺活检；
6. 患者其他方面的原因；
7. 本路径仅限手术方面，其他如新辅助化疗（术中化疗、术后辅助化疗）等均未纳入本路径范围。

再入院间隔时间：1周

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001	III级护理	ACAA0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测 CAAA1000或全血细胞计数 +5分类检测CAAB1000				
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		治疗	

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	氧气吸入	ABJA0001	换药	换药 (小)ABFA0001或换药 (中)ABFA0002或换药 (大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
粪便常规检查	CCCA3000	院内遥测心电监护	KKA28701	药物	
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	监测			
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000			病理	
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	麻醉		免疫组织化学染色诊断	BEBA0001
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	局部静脉内麻醉	HAB42201		
电解质测定	钾(K)测定CEJA8000和钠(Na)测定CEJB8000和氯(Cl)测定CEJC8000和总二氧化碳(TCO2)测定CEJD1000和总钙(Ca)测定CEJF8000	/全身麻醉	HAA42901		

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
血脂检查	甘油三酯(TG)测定 CEHB1000和总胆固醇(TC) 测定CEHA1000和高密度脂 蛋白胆固醇(HDL-C)测定 CEHC1000和低密度脂蛋白 胆固醇(LDL-C)测定 CEHD1000	手术			
乙型肝炎表面抗原 (抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性 (HBsAg)测定CGLG1000或乙 型肝炎表面抗原定量 (HBsAg)测定CGLH1000	乳腺癌根治术 (Halsted)	HYA77301		
丙型肝炎抗体(抗 HCV)测定	CGMA1000	病理			
人免疫缺陷病毒抗 体(抗HIV)测定	CGMF1000	快速石蜡切片病理 诊断	BCBC0001		
梅毒螺旋体抗体 (抗TP)测定	CGPP1000	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理 诊断 BCBA0001或 特异性感染标 本冷冻切片病 理诊断 BCBB0001		
胸部X线摄影	EABJT001	药物			
肿瘤标记物测定	癌胚抗原(CEA)测定 CGRA1000和糖类抗原CA- 153测定CGRR1000	雌激素类及抗雌激 素药			
常规心电图检查	单通道常规心电图检查 FKA03701或多通道常规心 电图检查FKA03702或十二 通道常规心电图检查 FKA03703	促卵泡生成素			
乳腺彩色多普勒超 声检查	EDCYA001				
乳腺X线摄影	EABYA001				
治疗					
药物					
抗菌药物					

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401 或用力肺活量功能检查 FJE01402或肺每分通气量 功能检查FJE01403或最大 通气量功能检查FJE01404				
气道阻力测定	FJB02401	治疗		治疗	
血气分析	CEJM1000			静脉输液	ABCA0001
普通二维超声心动图	EDFKA005	病理		药物	
乳管镜检查	FYA01501	细针穿刺细胞学检查与诊断	BBAA0001	止痛药物	
乳腺术前定位术	HYA43302	穿刺组织活检病理诊断	BCAA0001	止吐药物	
头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001	药物			
乳腺磁共振成像	ECAYA001				
治疗					
药物					

乳腺癌

乳腺癌改良根治术

适用对象：病种编码：Q5006

主要诊断：乳腺癌 ICD-10码：C50.0-C50.6, C50.8, C50.9

主要操作/主要治疗方式：乳腺癌改良根治术 CCHI码：HYA77302

入院标准：
1. 第一诊断必须符合ICD10：C50.0-C50.6, C50.8, C50.9乳腺癌疾病编码；
2. 当患者合并其他疾病，但住院期间无需特殊处理也不影响第一诊断时，可以进入路径。

出院标准：
1. 切口愈合好：引流管拔除，切口无感染，无皮下积液（或门诊可处理的少量积液），无皮瓣坏死（或门诊可处理的皮缘坏死）；
2. 没有需要住院处理的并发症和 / 或合并症。

最短住院日参考值：6天

变异条件：
1. 有影响手术的合并症，需要进行相应的诊断和治疗；
2. 不能耐受改良根治术的患者，行局部扩大切除术；
3. 希望保乳的乳腺癌患者，不能行常规保乳手术，有条件者可行“I”期再造手术；
4. 行保乳手术时，必须行钼靶或核磁检查以排除多病灶；
5. 术前有条件可行Core needle、麦默通等穿刺活检；
6. 患者其他方面的原因；
7. 本路径仅限手术方面，其他如新辅助化疗（术中化疗、术后辅助化疗）等均未纳入本路径范围。

再入院间隔时间：1周

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
基本项目					
护理		护理		护理	
I 级护理	ACAC0001	I 级护理	ACAC0001	III级护理	ACAA0001
检查		检查		检查	
血常规	全血细胞计数+3分群检测 CAAA1000或全血细胞计数 +5分类检测CAAB1000				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
尿常规化学分析	CCAA2000	治疗		治疗	
血型鉴定	ABO血型鉴定(正定型)CAMA1000或ABO血型鉴定(反定型)CAMB1000或ABO亚型鉴定(正定型)CAMD1000或ABO亚型鉴定(反定型)CAME1000或RhD血型鉴定CAMF1000	氧气吸入	ABJA0001		
粪便常规检查	CCCA3000	院内遥测心电监护	KKA28701	换药	换药 (小)ABFA0001或换药 (中)ABFA0002或换药 (大)ABFA0003或换药(特大)ABFA0004
凝血功能测定	凝血酶时间(TT)测定 CAGA1000或活化部分凝血活酶时间(APTT)测定 CAGB1000或血浆凝血酶原时间(PT)测定CAGC1000或血浆纤维蛋白原测定CAGD1000	监测		药物	
肝功能检查	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定CECA1000和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定CECB1000和总胆红素(T-Bil)测定CELA1000和直接胆红素(D-Bil)测定CELB1000和γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定CECC8000和总蛋白(TP)测定CEAA8000和白蛋白(A1b)测定CEAE8000和碱性磷酸酶(ALP)测定CECD8000				
肾脏功能检查	尿素(Urea)测定CEEA8000和肌酐(Cr)测定CEEB8000和尿酸(UA)测定CEEE8000	麻醉		病理	
葡萄糖(Glu)测定	CEFA8000	局部静脉内麻醉	HAB42201	免疫组织化学染色诊断	BEBA0001

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
电解质测定	钾（K）测定CEJA8000和钠（Na）测定CEJB8000和氯（Cl）测定CEJC8000和总二氧化碳（TCO2）测定CEJD1000和总钙（Ca）测定CEJF8000	/全身麻醉	HAA42901		
血脂检查	甘油三酯(TG)测定CEHB1000和总胆固醇(TC)测定CEHA1000和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定CEHC1000和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定CEHD1000	手术			
乙型肝炎表面抗原(抗HBs)测定	乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定CGLG1000或乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定CGLH1000	乳腺癌改良根治术	HYA77302		
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定	CGMA1000	病理			
人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定	CGMF1000	快速石蜡切片病理诊断	BCBC0001		
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定	CGPP1000	冷冻切片病理诊断	冷冻切片病理诊断 BCBA0001或 特异性感染标本冷冻切片病理诊断 BCBB0001		
胸部X线摄影	EABJT001	药物			
肿瘤标记物测定	癌胚抗原(CEA)测定CGRA1000和糖类抗原CA-153测定CGRR1000				
常规心电图检查	单通道常规心电图检查FKA03701或多通道常规心电图检查FKA03702或十二通道常规心电图检查FKA03703				
乳腺彩色多普勒超声检查	EDCYA001				
乳腺X线摄影	EABYA001				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
治疗					
药物					
抗菌药物					

选择项目					
因病情需要而选择的其他项目：					
检查		检查		检查	
肺通气功能检查	肺活量功能检查FJE01401 或用力肺活量功能检查 FJE01402或肺每分通气量 功能检查FJE01403或最大 通气量功能检查FJE01404				
气道阻力测定	FJB02401	治疗		治疗	
血气分析	CEJM1000			静脉输液	ABCA0001
普通二维超声心动图	EDFKA005	病理		药物	
乳管镜检查	FYA01501			止痛药物	
乳腺术前定位术	HYA43302	药物		止吐药物	
头部X线计算机体层(CT)平扫	EBABP001				
乳腺磁共振成像	ECAYA001				
病理					
细针穿刺细胞学检查与诊断	BBAA0001				

术前	CCHI码	术中	CCHI码	术后	CCHI码
穿刺组织活检病理 诊断	BCAA0001				
治疗					
药物					